

LOKALRAPPORTEN 1981

ÅRHUS AMT

DEL 2



INDHOLD

Del I	side	1-68
Indledning (Allan Janniche)	side	3
Behandling af materialet (Allan Janniche)	side	4-5
Retningslinier for indsendelse af materiale (Rapportgruppen)	side	5-6
Specialundersøgelser (Allan Janniche)	side	7-9
Bidragydere (Allan Janniche)	side	9-10
Betænelser (Rapportgruppen m.fl.)	side	10
Arts gennemgang, lommer-Stor Regnspøve	side	11-67
Lommer-storke (Hans Henrik Høj)	side	11-19
Svaner, gæs, svømmesænder (Jørgen Franck)	side	19-29
Dykkender, skalleslugere (Per Henriksen)	side	29-40
Erne-Hvepsevåge (Henning Lykke Larsen)	side	40-43
Kærhøge-falke (Jean Rasmussen)	side	44-51
Hønsefugle-vandhøns (Bjarke Huus Jensen)	side	51-53
Vadefugle- Stor Regnspøve (Allan Janniche)	side	53-67
Biologiske tidsskrifter (Allan Janniche)	side	68
Del II	side	69-140
Arts gennemgang, Lille Regnspøve-varlinger	side	71-131
Lille Regnspøve-alkefugle (Allan Janniche)	side	71-97
Duer-svaler (Bjarke Huus Jensen)	side	98-107
Fiol-drosselfugle (Niels Aagaard)	side	107-116
Sangere (John R. Rasmussen)	side	116-120
Fluesnapperne-varlinger (Henning Estrup)	side	120-131
Appendix I (Niels Aagaard)	side	132
Appendix II (Niels Aagaard, Allan Janniche m.fl.)	side	133-139
Litteratur	side	140

Redaktion: Rapportgruppen

Renskrivning: Hanne Eriksen

Lay-out: Allan Janniche

Tegninger: Erik Hørring

Tryk: Poul Bruun

Rapportgruppen, juni 1982:

Niels Aagaard, Henning Estrup, Jørgen Franck, Per Henriksen, Allan Janniche, Bjarke Huus Jensen, Henning Lykke Larsen, Jean Rasmussen og John R. Rasmussen.

Kontaktadresse: Rapportgruppen, DOF/Århus Amt Viborgvej 29 8000 Århus C.

Kontakttelefon: Niels Aagaard 06 124151.

Kontakt til landsrapportgruppen: Niels Aagaard.

Lille Regnspejle (Larus glaucoptus)

Udfaldet (ofteballig, ret almindelig, visse år) trækgest om foråret (med enkelte ret almindelig, og meget spredt forekommende trækgest om efteråret (sædvanligvis juli-aug.). Kun to forårsfund. Efterårstrækket indtræder i juli, men næsten hele trækket foregår ulv. juli (21.07/pr. ex) (21.08). Velt forårsfund og lagttagelserne fra Hesselholm på Samsø. De 28 fundene og fåregige lagttagelser kunne formodes at være samme flok, nemlig 19/7 11 S Hesselholm og 19/7 11 S Hesselholm, Samsø. Alle lagttagelser nævnes.

Forår:

1975: 1 Samsø's Fjerde udløb (JRR) og 19/5 hørt Alrø Polder (FC).

Efterår:

Jylland: Samsø: 18/7 26, 18/7 21 S, 20/7 4, 21/7 4 + flok 60 SØ, 22/7 24 (10 ved KL, 14,45 - 11 SØ KL, 18.45, 22/7 39, 23/7 23 + 11 S, 24/7 14 + 7 S, 25/7 39, 26/7 34, 27/7 11, 28/7 ca. 5, 29/7 15, 30/7 25, 31/7 14, 1/8 51, 2/8 10, 3/8 ca. 5, 4/8 26 og 5/8 5 (alle 18).
 Grønland: 5/8 2 S Dråby Strand (BS), 8/7 3 øer ved Ebeltoft (FF), 9/7 1 S Dråby Strand (ZHS), 15/7 1 Høring Westerskov (JDK), 19/7 11 S Hesselholm (GGP), 1 Sørnes (JDK), 24/7 2-4 trk Lundbygsgade, Aarhus (SA), 1/8 1 Lærre Havn (SNe), 1 Soebø Rev (KEH, BRK, JRR), 3/8 1 Kysing Fjord (SM), 9/8 1 Kysing Fjord (DOF), 15/8 1 Kysing Fjord (HP).

Efterår-fund: 3 år ex lagttagelsernes antal fordelt således:


1976: ingen

1978: 1 ex. forår og 11 ex. efterår

1979: 38 ex. forår, 5 ex. i juni, 316 ex. efterår

1979: 11 ex. forår og 179 ex. efterår

1980: 276 ex. forår, 1 ex. juni og 306 ex. efterår.



Figur 24. Lille Regnspejle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver 1 individ.

Fra 1978, hvor LB indsender de første iagttagelser fra Hesselholm, Samsø, dominerer dette materiale fuldstændigt om efteråret. Forårs-materialet domineres kun i 1978 af Hesselholm, men der er næppe tvivl om, at forårstrækket også hovedsageligt går over Samsø og Anholt, hvor sidstnævnte dominerer materialet i foråret 1980. På baggrund af vor nuværende viden om arten, må det antages, at der findes en hovedtrækrute forår som efterår over Samsø og Anholt.

Kobbersneppe sp (*Limosa limosa/lapponica*)

7/7 2 Ahl Hage ved Ebeltoft (FF).


Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*)

Se appendix II 1980.

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*)

Almindelig, men spredt forekommende trækgæst om foråret (ult. marts-ult. maj), meget sjælden (visse år sjælden-fåtalig), uregelmæssig sommergæst (juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (pr. juli-ult. okt). For denne arts vedkommende mangler iagttagelserne fra vadehavsområdet omkring Gylling Næs. Dette er også den væsentligste årsag til den sene første-iagttagelse (31.03). Faktisk er det ikke muligt at sige noget generelt om forårstrækket med det svage materiale. Efterårsbilledet er pænere, da arten har en mere jævn udbredelse i amtet om efteråret. Trækket indledes pr. juli, kulminerer i månedsskiftet juli/aug og ophører så med. aug. Herefter ses enkelte efternølere i sept. og okt. Artens trækforhold gør som bekendt, at der kun er nogle få forårslokaliteter, hvor alle fuglene ses. Om efteråret er den jævnt fordelt over landet, men i ringe antal, da fuglene søger langs den jyske vestkyst til Vadehavet. Alle iagttagelser nævnes:
 Hesselholm, Samsø: 12/4 4, 14/4 4, 15/4 5, 17/4 6, 18/4 2, 8/5 23, 9/5 21, 10/5 28, 23/7 1, 29/7 1, 2/8 3, 4/8 4 (alle LB).
 Alrø: 31/3 1000 (CQP), 11/4 14 NV + 18 rast Egehoved og 38 rast Polderne (LPJ), 7/5 100 (HLL), 19/5 400 (FC), 14/6 1 Polderne - sommerobs - (LPJ), 14/7 13 (PN), og 27/7 14 Polkrog.
 Kysing Fjord: 7/5 1 (KHe), 9/5 1 (JDK, EH), 3 (JF), 5/7 1 (CQP), 21/7 2 (BHJ), 3/8 1 (JF), 4 (BHJ, FL), 6/8 1 (LPJ), 9/8 1 (DOF), 24 (SH).

Øvrige: 1/6 19 Brabrand Sø (AJ), 5/4 1 Kalsmadsø (SH), 11/4 6 Hørskær
 (ØBF), 17/4 3 Sværm, Samsø (AJ), 10/4 40-60 Barnekold, Samsø (AJ),
 21/4 1 X Hoesgård Strand (Moes), 7/5 40 Søby Rev og 40 Stavns Fjord,
 Jæren (HLL), 19/5 18 Søby Rev (FC), 28/5 2 Sværm og 1 Lilleholm, Samsø
 (ØBF), 5/7 2 ad. Aarhus Havn (KHe), 13/7-5/8 1 ad. han Aarhus Havn
 (WHe), 21/7 5 trk Fortes (MC), 1/8 3 Randers Fjords udløb (KEH, BRR,
 JRR), 2/8 15 Spilling Næs (ØBF), 4-8-13 SV Hassensør (JTL), 8/8 1 S
 Aarhus Havn (WHe), 15/8 5 Randers Fjords udløb (JRR), 6/9 1 Sødring Kær
 (HLL), 28/9 1 Hassensør (LBJ) og 25/10 1 Soels Rev (JRR).
 Underfor de sidste 5 år foreligger følgende sommeriagttagelser, alle
 fra År: 10/8 50 og 15/8 32 1978 samt 8/6 3 og 12/6 5 1980.



Figur 28. Lille Kobbersneppe, Aarhus ant 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.
 Et = angiver < 20 individer

Blækske (Fringa ochropus)

Fåtalig brækgest (med. marts-pr. maj og med. juni-med. sept). Vi er
 efterhånden ved at have et ret godt materiale om denne art. Forårs-
 strækket indledes med. marts, kulminerer pr. med. april og slutter pr.
 maj. Efterårstrækket starter med. juni, svinger lidt i antal ult.
 juni/med. juli, kulminerer ult. juli, antallet holder sig jævnt med.
 aug, falder omkring 1. sept og slutter med. sept. Alle iagttagelser
 nævnes.

Kysing Fjord: 7/4 2 (JF), 15/4 3 (JF), 1/7 2 (JF), 29/7 1 (HLL), 1/8
 1 (H+JE), 3/8 1 (JF, BHJ, PH), 9/8 1 (DOF) og 4 (NA), 11/8 1 (JF),
 15/8 3 (HP), 16/8 2 (SH, JF), 28/8 1 (HLL), 31/8 1 (JF), 15/9 1 (JF).
 Østerby Mose: 30/4 1, 4/5 1, 7-8/5 1, 17/6 1 og 23/8 1 (PH, BHJ).


Brabrand Sø: 28/3 1 (AJ), 9/4 3 (KHe, AJ), 10/4 4 (AJ), 15/4 4 (HM),
 2+3/5 1 (AJ), 27/8 1 (HLL).

Bjerregrav Mose: 17/3 3 (EH), 30/3 4 (Gejrf, KEH, BRR, JRR), 2/4 1
 (JRR), 26/4 2 (Gejrf, SH), 5/9 1 (Gejrf, SH, JRR, ØBF).

Øvrige: 29/3 1 Ramten Sø (JRR), 30/3 2 Astrup Mose (AJ), 6/4 2 Hørret

Enge (BHJ), 7/4 1 hørt Horskær (LPJ), 11/4 1 Båstrup Mose (HHH), 12/4 1 Lillenor (PH), 5 Bakken, Gjerrild (St1), 15/4 2 NV Gjerrild (HP), 15/4 1 mose ved Gassum (JRR), 16/4 1 Kasted Mose (SH), 18/4 2 Hellelose, Samsø (AJ), 2 N Moesgård Strand (CQP), 1 trk Bakken, Gjerrild (St1), 23-24/4 1 Hesselballe (NT), 3/5 1 Tomkær, Alsrode (OF), 5/5 2 Sorte Sø, Skanderborg (GG), 25/6 2 Kasted Mose (KHe), 2/7 1 Lilleå-dalen (SMJ), 8/7 3 øer ved Ebeltoft (FF), 23/7 5 Hesselholm, Samsø (LB), 27/7 7 Polkrog, Alrø (KHe), 1 Hesselholm, Samsø (LB), 5 Gjerrild Skovene (BHJ), 28/7 1 Gjerrild Skovene (BHJ, FL), 5/8 2 Solbjerg Sø (BHJ), 3 Hattemager (SMJ), 6/8 1 Hesselholm, Samsø (LB), 12/8 1 Kasted Mose (AJ), 22/8 2 Tved Øhoved (AJ), 27/8 3 Grenå Enge (CO).

Se appendix II 1980.



Figur 26. Svaleklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Tinksmed (Tringa glareola)

Fåtalig trækgæst om foråret (pr. ult. maj), meget sjælden og uregelmæssig sommergæst (pr. juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (ult. juni-pr. sept). Også for denne art har vi efterhånden fået samlet et ret godt materiale. Forårstrækket foregår mellem 5. og 23. maj, med kulminationen 5.-10. Uden for kulminationsperioden kun få fugle. En enkelt oversomrende fugl. Mistanke om en yngleforekomst, dog på et tidspunkt, hvor efterårstrækket netop indledes. Biotopen er dog formentlig velegnet som yngleområde. Først med. juli kommer trækket for alvor i gang og to toppe, den ene med./ult. juli hidrører fra de adulte og den anden pr. med. aug hidrører fra juvenile fugle. Trækket ophører de første dage i sept. Alle iagttagelser nævnes.

Kysing Fjord: 7/5 1 (KHe), 10/5 3 (PH, BHJ), 19/5 2 (KHe), 16/7 2 (JF), 18/7 17 (JF), 21/7 2 (JDK), 29/7 3 (HLL), 1/8 2 (FL, JF), 6/8 1 (LPJ), 9/8 5 (DOF), 6 (SH), 7 (PH, BHJ, FL), 9 (NÅ), 11/8 7 (JF), 11 (AJ), 14/8 5 (JF), 15/8 7 (HP), 16/8 2 (SH), 20/8 8 (HLL), 21/8 2 (JF).

Østerby Mose: 5/5 1, 6/5 1, 7/5 12, 8/5 7, 9/5 6, 10/5 2, 11/5 1, 20/5 1, 23/5 3 (PH, BHJ).

Skovsmed Sø: 10/5 2, 10/5 2 (AJ), 4/6 1 (EH), 22/6 1 (AJ), 10/8 1 (AJ).


Kalundborg: 7/5 13, 11/5 7, 21/5 1, 7/8 3, 10-11/8 2 (JJP).

København: 27/5 4, 28/5 1, 29/5 2, 31/5 2-3, 1/9 5, 3/9 7 (CO).

Skovsmed Sø: 20/5 2 Frederiksdal Hede (ME), 19/7 2 Tved Øhoved (CQP), 27/7 1

Polenborg, Aløb (UHE), 1 Hesselholm, Sansø (LB), 23/8 1 Hattemager (SMJ).
 Inden for de sidste 5 år foretager 2 formodede sommerfund fra 16/5 1977 og 14/5 1978.

Se appendiks II 1980.



Figur 27. Dinksmad, Søhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle dagtagne fugle pr. 3-dages periode.

Såben (Fringilla coccyzus)

Fåttellig (ret almindelig) yngletrækfugl (med. marts/med. april - med. juli/ult. aug). Ret almindelig trækgæst (med. marts-pr. maj og pr. juli-med. sept, sjældnere til okt), sjælden, men formodentlig regelmæssig vintergæst (nov-feb). 12 ynglet lokaliteter indrapporteret. Forårstrækket indledes med enkelte fugle med. marts men først i slutningen af måneden kommer trækket i gang. To toppe med kulmination med. april, men også et større træk pr. maj. Fra med. maj til ult. juni er det ynglefuglene, som registreres. Efterårstrækket indledes pr. juli. Tre, måske egentlig fire toppe kan skelnes. Toppen med. juli kan formodes at være adult-trækket eller måske være egne (danske) ynglefugles (adulte som juvenile) borttræk. Sidstnævnte synes at underbygges med LB's kommentarer for Hesselholm (se senere). Toppen i månedsskiftet juli/aug hører måske sammen med den næste top med. aug. Adskilles de to, kan den første være adulttræk og den næste juveniltræk af de skandinaviske ynglefugle. Samles de to toppe, kan det måske alene være adult-trækket af skandinaviske fugle. Den sidste top må så være juvenil-trækket af skandinaviske fugle. En anden mulighed var en kulmination i de Islandske Rødbens træk. Mod sidstnævnte taler dog den pludselige forsvinden af fuglene med. sept. Okt-dec fuglene kan

dog foreligger racebestemte fund af fuglene. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund, første, sidste i sept, alle fra okt-dec, alle på mindst 6, dog undtaget alle obs mellem 20/5-1/7 som henregnes til ynglefuglene.

Ynglefund med antal par:

2-3 Hesselholm, Samsø (LB), 2 Alrø Polder (FC), 3 Alrø Egehoved (LPJ), 3 Horskær (LPJ), 1 Solbjerg Sø (BHJ), 1-2 Østerby Mose (BHJ), 2 Brabrand Sø (AJ), 3-5 Følle Bund (HA), 1 halvøen ved Kalø Slotsruin (HA), 2 Kolindsund (JJP), 0-1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 3 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), ialt 23-28 par.

Første: 14/3 1 Kysing Fjord (JF) og 15/3 1 Barnekold, Samsø (LB).

Sidste i sept: 14/9 30 (PMT, ET) og 15/9 10 Kysing Fjord (JF).

Oktoberfund: 4/10 6, 17/10 1 og 21/10 1 Kysing Fjord (JF).

Vinterfund (nov-dec): 28/11 5 Pletten, Mariager Fjord (AJ, JM, JRR), 5/12 2 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 20/12 1 Kysing Fjord (PH, BHJ) og 1 (samme?) Kysing Næs (SH), 29/12 1 Kysing Fjord (H+JE).


Hesselholm, Samsø: 11/4 - 29/8; 12/4 15 og 28/7 6. Efter med. juli er det formentlig trækgæster og ikke ynglefuglene, der ses på stedet (LB).

Horskær: 5/4 2 - 14/6 3 par. 7/4 6 (SH, LPJ, PN).

Kysing Fjord: 14/3 1 - 15/9 10; 9/4 6, 12/4 9, 13/4 6, 15/4 13, 20/4 8, 26/4 8, 29/4 9, 2/5 7, 6/5 2, 7/5 13, 9/5 15, 15/5 9, 20/5 - 1/7 ynglefuglene, 12/7 7, 16/7 7, 18/7 33, 21/7 7, 1/8 13, 2/8 16, 3/8 12, 5/8 31, 9/8 24, 11/8 32, 14/8 20, 15/8 12, 16/8 68, 21/8 8, 28/8 8, 31/8 28, 4/9 10, 7/9 25, 9/9 29, 12/9 23, 14/9 30 og 15/9 10 (LPJ, AJ, EH, JDK, SH, JF, KHe, PMT, ET, NÅ, H+JE, BHJ, PH, FL).

Brabrand Sø: 26/3 1 - 22/6 3; 4/5 5 (AJ, NÅ, EH, HM, NT).

Kolindsund: 23/4 2 - 13/9 6; 13/9 6 (JJP, SPA).



Figur 28. Rødben, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver < 3 individer.

Råby Odde, Randers Fjord: 12/4 4 par ~ 1/8 3; 12/4 8 (KEH, EH, BRR, JRR).
Randers Fjords udløb: 12/4 9 - 22/8 15; 12/4 9, 4/5 9, 1/8 12, 15/8
14, 22/8 15 (KEH, PH, BRR, JRR).

Øvrige: 5/4 36 Alrø (SH), 11/4 10 St. Sjørup (KEH, BRR, JRR), 20/4 13
Langelandsø, Samsø (AJ), 7/5 70 Børnekold, Samsø (AJ), 6/5 10 Følle Bund
(NA), 17/5 13 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 18/5 10 Følle
Bund (NA), 14/7 25 Alrø (PH), 19/7 44 Boels Rev (KEH, BRR, JRR), 2/8
15 V Fjellerup Strand (NA).

Inden for de sidste 5 år foreligger følgende vinterfund. Dog er fund
fra Vorse/Vejle amt, som er nævnt i tidligere rapporter, ladet ude af
betragtning her.

År	1976				1977				1978				1979				1980			
	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D
Antal fund	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1
Antal fugle	0	0	0	0	0	0	52	22	314	1	279	86	4	0	0	0	0	0	4	1

På ovenstående tabel må det bemærkes, at Rødben slet ikke er medtaget
i 1978-rapporten, og januarfundet dette år er fra 1980-rapportens
appendix III.

Bortklire (*Tringa erythropus*)


Båtdaglig trækfugt (med. april-pr. maj og pr. juni-med. sept). Bortset
fra en enkelt april-fugl, er arten i foråret kun set mellem 2. og 10.
maj. Efterårstrækket noget mystisk, når man ser på 5-dages-kurven.
Junitrækket er adulte hunner, julitrækket adulte hanner og fra aug ses
ungfuglene, som iøvrigt i aug viser et meget jævnt gennemtræk. Ult.
aug ebber trækket ud og med. sept er de sidste fugle væk. Alle iagt-
tagelser nævnes.

Kysing Fjord: 12/4 1 (DOF), 7/5 3 ad. (KHe), 9/5 3 (JF, JDK, EH),
10/5 1 (PH, BHJ), 3/8 2 (JF, BHJ, FL), 5/8 6 (JF), 9/8 1 (NA), 11/8
1 (JF), 6 (AJ), 14/8 4 (JF), 15/8 1 (HP), 16/8 4 (SH), 6 (JF), 20/8
6 (HLL), 21/8 3 (JF), 28/8 2 (JF).

Øvrige: 2/5 1 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 4/5 1 Østerby Mose (PH,
BHJ), 1 Brabrand Sø (AJ), 5/5 1 Østerby Mose (BHJ), 6/5 1-2 Brabrand
Sø (KHe, AJ), 8/5 3 Kolindsund (JJP), 9/5 6 Hesselholm, Samsø (LB),
1 N Østerby Mose (PH, BHJ), 3 Kolindsund (JJP), 8/6 3 Randers Fjords
udløb (JRR), 10+18/6 1 Kolindsund (JJP), 30/7 2 Ramten Sø (Jacob og
Jan Silberg), 1/8 1 Ramten-Dystrup Sø (NA), 6 Randers Fjords udløb
(KEH, BRR, JRR), 7/8+10-11/8 1 Kolindsund (JJP), 6/9 1 Sødring Kær

(HLL), 14/9 1 og 15/9 2 Østerby Mose (PH, BHJ).

Se appendix II 1980.



Figur 29. Sortklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Hvidklire (Tringa nebularia)

Ret almindelig trækgæst (pr. april-ult. maj og ult. juni-ult. okt), meget sjælden og uregelmæssig sommergæst (pr. med./juni). Forårstrækket indledes pr. april, hvilket er tidligere end normalt. I midten af april ses enkelte fugle, men det egentlige forårstræk starter først ult. april og overstås meget hurtigt med kulminationen pr. maj og de sidste forårsfugle med. maj. I de første junidage ses en oversomrende fugl. Efterårstrækket indledes ult. juni, men også her går der lang tid inden trækket rigtigt kommer i gang. Nogenlunde jævnt adult-træk med. juli/pr. aug. Kulminationen i juvenil-trækket falder i sidste halvdel af aug og mod månedens slutning falder antallet markant og i løbet af sept ebber trækket langsomt ud. Ult. sept ses de sidste fugle med en efternøler ult. okt, som dog er inden for den normale træktid. Følgende iagttagelser nævnes: Alle april-, juni- og okt-fund. De sidste september-fugle og alle over 5 fugle.

April:

7/4 1 Begtrup Røn (EH), 12/4 2 Ø Kysing Fjord (PH, BHJ, FL), 13/4 1 Ramten-Dystrup Sø (St1), 15/4 2 Kysing Fjord (JF), 17/4 1 Fornæs (St1), 20/4 1 Barnekold, Samsø (AJ), 20/4 1 (JF) og 26/4 6 (JF) Kysing Fjord, 26/4 1 Brabrand Sø (AJ), 28/4 1 Flakket, Anholt (NT) og 29/4 14 Kysing Fjord (JF).

Juni: 4/6 1 Brabrand Sø (EH) og 20/6 4 Hesselholm, Samsø (LB).

Oktober: 23/10 2 Følle Bund (HA).

Sidste i september: 28/9 1 Hesselholm, Samsø (LB).

Hesselholm, Samsø: 18/7 7 - 28/9 1; 18-19/7 7, 26/7 8, 27/7 7, 28/8 7, 29/8 6 (alle LB).

Kysing Fjord: 12/4 2 Ø - 22/5 1; 26/4 6, 29/4 14, 1/5 31, 2/5 8, 6/5 45, 7/5 80, 9/5 70, 10/5 41. 1/7 1 - 12/9 1; 9/7 6, 18/7 21, 21/7 14, 29/7 8, 1/8 8, 3/8 12, 5/8 15, 9/8 10, 11/8 21, 14/8 11, 16/8 25,


21/4 1, 21/4 1, 23/4 2, 23/8 14 (KEH, SH, NT, PH, BHJ, FL, JDK, HLL, LPJ, EE, DOF, AJ, PH, JF, MA, BARR).

Østerby Mose: 4/5 1 - 7/5 3, 21/7 1 - 17/9 2. (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 26/4 1 - 3/5 1, 3/5 1 - 27/8 4. (BHJ, FL, AJ, HLL).

Holtebjerg: 4/5 2 - 11/5 2, 7/8 1 - 13/9 1; 22/8 20 og 29/8 15 (SPA, JJP, CF).

Øvrige: 2/5 12 (KEH, BRR, JRR), 4/5 59 (PN) Randers Fjords udløb, 8/5 12 Rals slotsruin (JR), 17/5 9 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR), 1/8 14 Boels Rav (KEH, BRR, JRR), 5/8 26 Dråby Sø (JTL), 15/8 6 Bjerregaard Mose (SH), 6 Randers Fjords udløb (JRR), 15 Pletten, Mariager



Figur 30. Hvidklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. En + angiver < 3 individer.

Hvidklire (Tringa hypoleucos)

Er almindelig trækfugl (med. april-ult. maj og pr. juli-pr. okt, yderst sjældent til ult. okt). Trækket indledes med. april med en jævnt stigning til kulminationen pr. med. maj og herefter et hurtigt fald med de sidste forårsfugle ult. maj. Efterårstrækket starter pr. juli og stiger til den første kulmination med de adulte fugle med./ult. juli. Herefter et fald i antallet omkring månedsskiftet juli/aug, men en ny kulmination med de juvenile fugle med./ult. aug. Herefter et hurtigt fald, dog et pænt antal til med. sept, og de sidste fugle ses i slutningen af måneden. Oktoberfundene er temmelig sene. Følgende iagttagelser nævnes: første og sidste forår og efterår, alle april- og oktoberfund, alle over 5 fugle.

Forår: 11/4 2 Brabrand Sø (PH, BHJ, FL) og 31/5 1 Brabrand Sø (NA).

Efterår: 1/7 2 Kysing Fjord (JF), 1 Brabrand Sø (HM), 28/9 1 Hassensør (LPJ).

April: 11/4 2 Brabrand Sø (PH, BHJ, FL), 25/4 1 Aarhus Havn (PH), 1 Ramten-Dystrup Sø (DOF), 26/4 1 (AJ), 27/4 2 (AJ) og 28/4 1 (JR)

Brabrand Sø, 28/4 1 Flakket, Anholt (NT), 29/4 1 Tåstrup Sø (BB).
 Oktober: 14/10 2 Kysing Fjord (EH) og 23/10 1 trk Følle Bund (NA).
 Kysing Fjord: 2/5 2 - 22/5 5; 9/5 17, 10/5 6 og 19/5 19. Efteråret pr.
 1/7 2 - 12/9 3; 9/7 8, 12/7 12, 16/7 79, 18/7 27, 21/7 32, 22/7 28,
 25/7 53, 28/7 26, 29/7 17, 1/8 20, 2/8 19, 3/8 22, 5/8 23, 9/8 29,
 11/8 23, 14/8 28, 15/8 38, 16/8 31, 20/8 38, 21/8 38, 22/8 21, 23/8
 15, 28/8 14, 31/8 11, 9/9 7 (JDK, EH, BKJ, PH, FL, AJ, NA, SH, JRR, BJK,
 PH, DOF, H+JE, HLL).

Østerby Mose: 4/5 2 - 20/5 3; 14/5 7 og 18/5 6. I efteråret fra 18/9
 6 - 15/9 1; 18/7 6, 6/8 7 (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 11/4 2 - 31/5 1; 9/5 6 og 14/5 7. Fra efteråret 1/7 1 -
 24/9 1; 11/7 11, 9/8 9 (HM, JDK, JR, NA, JTL, EH, PH, FL, HLL, AJ, BJK).
 Aarhus Havn: 25/4 1 - 18/5 1. Efteråret 12/7 1 - 17/9 2; 29/7 15, 30/7
 25, 23/8 8 og 14/9 7 (NA, PH, CQP, FF, KHe).


Øvrige: 17/5 8 Vilhelmsborg (PH, BHJ), 21/5 10 Hov Røn (FC), 17/7 10
 Kalø Slotsruin (HA), 20/7 25 Brattingsborg, Samsø (LB), 21/7 22 trk
 Fornæs (HC), 23/7 6 Alrø (JDK), 24/7 8-10 Tranemosen, Samsø (LB),
 30/7 11 Horskær-Kalsemade (PN), 1/8 16 Randers Fjords udløb (KEH, BJK,
 JRR), 13/8 6 SV Hassensør (AJ), 16/8 10 Kalø slotsruin (HA), 29/8 10
 Glenstrup Sø (JRR).

Inden for de sidste 5 år foreligger følgende april og oktoberfund.

April: 1980 1 fund af 4 fugle.

Oktober: 1976 1 fund af 1 fugl.

Se appendix II 1980.



Figur 31. Mudderklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Sjælden, visse år ret almindelig, men uregelmæssig trækgæst om foråret (april-maj), ret almindelig (fåtalig-almindelig) trækgæst om efteråret (pr. juli-ult. okt, visse år til pr. nov). 7. og 8. forårsfund i Aarhus amt. Efterårstrækket normalt, måske nærmest lidt over normalt. Trækket indledes pr. juli, og en lille top i månedsskiftet juli/aug antyder kulminationen i de adulte fugles træk. Fra med. aug stiger

antallet vil en kumulativt 1. sept., der udgøres af årsungerne. Alle angivelser nævnes:

Forår: 4/4 1 Kysing Fjord (JF), 20/4 4 Barnekold, Samsø (AJ).
 Efterår: 5/7 2 Studstrup (KHe), 12/7 1 Kysing Fjord (JF), 19/7 6 Tved
 Ørsted (CO), 25/7 3 Hesselholm, Samsø (LB), 28/7 2 Aarhus Havn (KHe),
 29/7 8 Aarhus Havn (CO), 31/7 8 Aarhus Havn (KHe), 1/8 3 Kysing Fjord
 (JF, FL), 3/8 4 Kysing Fjord (HLL, FL), 5/8 5 Kysing Fjord (JF), 12/8
 1 Aarhus Havn (KHe), 14/8 3 Kysing Fjord (JF), 1 Aarhus Havn (KHe),
 20/8 6 Kysing Fjord (HLL), 28/8 10 Hesselholm, Samsø (LB), 2 Kysing
 Fjord (JF, AJ, HLL), 31/8 1 og 1/9 2 Grenå Enge (CO), 6/9 19 Sødring Kær
 (HLL), 12/9 84 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 25/10 7 Randers
 Fjords udløb (JRR).

Inden for de sidste 5 år er der alle forårsfund. 1978 var et fint
 forår, det viste for arten glimtelige og overvældende træk, som visse
 år har funde sted. Efterårstrækket er regelmæssigt, men meget varieret
 i antal hvad nedenstående også viser:

Forår: 1978: 19/4-17/5 5 fund af 476 fugle.

1980: april 1 fund af 12 fugle.

Efterår: 1976: 13/7-13/9 mindst 4 fund af mindst 112 fugle


1977: juli-sept ukendt antal fund af 136-141 fugle

1978: 19/7-7/11 23 fund af 1999 fugle

1979: 14/7-14/9 3 fund af 72 fugle

1980: 22/7-24/8 15 fund af 64 fugle

Med appendix II 1980 blev det til 16 fund af 244 fugle mellem 22/7 -
 5/10.



Figur 32. Islandsk Ryle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Dværgryle (Calidris minuta)

Meget sjælden-sjælden, uregelmæssig trækgæst om foråret (med. maj-
 pr. juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (med. juli-pr. okt).
 Et helt utroligt stort materiale, som ikke tidligere er set i rappor-
 tens historie. Forårsfundet er det 4. i amtet. Forløbet af efterårs-

trækket er meget flot. I juli ses nogle enkelte fugle, og fra omkring 10. aug kommer der rigtigt gang i trækket, som kulminerer pr. sept. Herefter holder antallet sig ret højt til fuglene forsvinder ult. sep. Et par efternøglere afrunder efterårets træk.


Forår: 10/5 1 Kysing Fjord (BHJ).

Efterår: Kysing Fjord: 1-2/8 1 (JF, FL), 9/8 1 (DOF), 2 (SH), 4 (WA), 11/8 2 (AJ), 3 (JF), 20/8 3 (HLL), 21/8 3 (JF), 23/8 2 (JF), 28/8 1 (JF), 10 (AJ, HLL), 31/8 1 (JF), 4/9 2 (H+JE), 7/9 48 (JF), 9/9 15 (JF), 12/9 3 (AJ), 21 (JF, BHJ, FL), 15/9 23 (JF), 20/9 26 (PH, BHJ), 4/10 2 (JF, BHJ, PH, CQP), Aarhus Havn: 12/7 1 (FF), 29/7 9 (CQP), 9/8 3 (CQP), 12/8 2 (KHe), 14/8-9/9 2 (KHe), 11/9 1 (HLL), 17/9 1 (HLL), 18/9 2 (PH, BHJ, FL). Grenå Enge: 19/8 1, 29/8 2, 31/8 3, 1/9 7-9, 3/9 7 (CO). Øvrige: 30/8 3 Glatved Strand (KEH, JRR), 6/9 60 Sødring Kær (HLL), 15/9 9 Overgård ved Mariager Fjord (KjH).

1981 overgår totalt 1978, som på landsplan var topåret med flokke på op til 1000 i Vestjylland (se lokalrapporten for 1977). At arten nærsat feltornitologisk aktivitet svinger meget i antal, fremgår tydeligt af en sammenstilling af iagttagelserne fra de sidste 5 år i Aarhus amt.

Forår: 2 fund maj 1977 og 1 fund juni 1978.

Efterår: 1976: 28/8-2/10 7 fund af 62 fugle. Desuden et nov-fund, som blev anbefalet forelagt SU, grundet dets antal (50 ex.).
1977: 13/8-24/9 5 fund af 33 fugle
1978: 15/8-15/10 9 fund af 60 fugle
1979: kun 14/7 1
1980: 26/7-21/9 9 fund af 26 fugle



Figur 33. Dvergrylle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver 1 individ.

Temmincksrylle (Calidris temminckii)

Fåtalig trækgæst (med./ult. maj og med. juli-med. sept). Arten er

Den i den nævnte lokalitet m.v. Den træffes i loks. ofte i grusgrave og lignende, altså et biotopkrav, der ligner Lille Præstekraves. Om vinteren træffes arten, med meget få undtagelser, kun i tiden 10.-25. maj. De fleste stemmer overens med 1981-observationerne. Om efteråret ses den m.v. med. juli og med. sept. som oftest kun i juli/aug. Generelt 1981 langt over normalt.

1981: Vesterby Mose: 14/5 3, 15/5 2, 17/5 2, 18/5 3, 20/5 2, 21/5 1, 21/5 2 (BHS, BHS, FL). Foruden disse kun 21/5 1 Hov Røn (FC).

Efterår: Kysing Fjord: 21/7 2 (BHS), 1/8 1 (JF, FL), 2/8 3 (JF, FL), 3/8 1 (JF, BHS, FL), 4/8 1 (H+JE), 9/8 3 (JF), 12/8 3 (JF, BHS, FL), 18/8 1 (JF), 20/8 1 (PH, BHS). Aarhus Havn: 12/7 4 (KHe), 19/7 2 (FF), 21/7 1 (KHe), 6/8 1 (PNN). Øvrige: 18/7 1 Eskelund, Brabrand Sø (KHe), 28/7 1 S Fornsæs (BHS, FL).

Inden for de sidste 5 år er arten truffet som vist i skemaet:

År	1976				1977	1978		1979	1980		
	maj	juni	aug	sep	maj	jul	aug	jul	apr	maj	aug
Antal fund	1	1	1	1	2	1	1	2	1	4	7
Antal individer	1	1	2	1	31	1	1	4	2	7	11

Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Arten: sjælden (sjælden) yngletrækfugl, almindelig trækgæst (pr. marts-ult. maj og med juli-med. nov). Fåtalig og regelmæssig vintergæst (dec-feb). Kun et ynglefund rapporteret i år. Forårets træk indledes i marts, men herudover er det svært at give en beskrivelse af det, bortset fra, at der er et meget tydeligt og stort gennemtræk med. maj. Efterårstrækket indledes med. juli og varer til med. nov. Flere mindre toppe i efterårets løb med den helt store kulmination ult. okt. Fra såvel forår som efterår savnes i år optegnelser fra det sydlige vadehav omkring Gyllingnæs-halvøen. Efter med. nov foreligger der 7 vinterfund fra dec. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund, første fugl, kyst observationer på mindst 50, alle indlandsiagttagelser og vinterfund (dec).

Ynglefund:

1 par Alrø Polder (FC).

Første: 2/3 1 Aarhus Havn (HLL) og 14/3 8 Kalø slotsruin (JJP).

Kystiagttagelser:

Hesselholm: 19/7 11 - 11/10 8 i antal 2-24 (LB).

Alrø: 15/3 117 (LPJ), 31/3 1000 (CQP), 5/4 200 (SH), 19/5 1100 (FC).

Kysing Fjord: 18/3 2 - 10/5 2, i antal 1-4. 2/7 2 - 16/11 20, med

følgende over 50: 9/8 300, 7/9 140, 12/9 113, 20/9 72, 4/10 57, 17/10 59, 26/10 65 (JF, HP, AJ, DOF, PMT, ET, T. Bøgeskov, CQP, NÅ, H+JE, KHe, BHJ, LPJ, PH, FL, NT, JDK, SH, HLL).

Aarhus Havn: 12/7 14 - 18/10 10 i antal 14-35 (PH, BHJ, FL, CQP, NÅ, FF, KHe, PH, PNN, HLL).

Randers Fjords udløb: 17/5 2465, 1/8 9 - 14/11 73, med følgende over 50: 15/8 92, 24/10 410, 25/10 1989, 14/11 73 (KEH, EH, BRR, JRR).

Pløtten, Mariager Fjord: 17/5 280. 15/8 1 - 14/11 80, med følgende over 50: 24/10 430, 14/11 80 (KEH, BRR, JRR).


Øvrige over 50: 15/3 70 (LB) og 20/4 75-125 Barnekold, Samsø (AJ), 19/5 800 Søby Rev (FC), 1/8 108 Boels Rev (KEH, BRR, JRR), 6/9 350 Sødring Kær (HLL), 21/9 125 Kysing Næs (CQP), 18/10 60 Horskær (LPJ) og 25/10 221 Boels Rev (JRR).

Indlandsiaagttagelser: 28/5 1 Østerby Mose (PH, BHJ, FL), 27/8 1 Brabrand Sø (HLL), 29/8 4 og 31/8 2 Grenå Enge (CO), 21/10 7 Brabrand Sø (AJ), 22/10 50 (OF) og 2/11 9 (CO) Grenå Enge.

Følgende vinterfund fra de sidste 5 år. De i tidligere rapporter nævnte fund fra Vorsø, Vejle amt er udeladt af tabellen.

År	1976			1977			1978			1979			1980	
	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb
Antal fund	2	3	4	1	1	1	2	3	0	3	0	0	4	0
Antal fugle	39	76	100	3	225	218	7	68	0	8	0	0	91-	101

Se appendix II 1980.



Figur 34. Almindelig Ryle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.


Figuren viser en summering af alle iagttagelser pr. 5-dages periode. Et + angiver < 20 individer.

1981-1982 Ryge (Calidris alpina)

Uregelmæssig og uregelmæssig træk om foråret, fåtallig træk om efteråret (ult. juli-med. okt). Amtets 2. forårsfund og igen 18. Kysing Fjord. I efteråret iagttages ikke nogen klar adskillelse mellem de gamle og unge fugles træk, og alligevel antyder de "tomme" jagtoperatører med. aug. ved forløbet. Alle jagttagelser nævnes.

Forår: 21/3 1 Kysing Fjord. Efterår: 19/7 1 (JF), 21/7 5 (BHJ), 22/7 1 (JF), 23/7 3 (HLL), 1/8 6, 2/8 2 (JF, FL), 3/8 1 (JF, BHJ, FL), 9/8 5 (NA, HLL), 9/8 4 (BA, BHJ, FL), 11/8 1 (JF), 20/8 7 (HLL), 21/8 1, 23/8 2 (HLL), 4/9 3 (HLL), 7/9 4, 9/9 2 (JF), 12/9 5 (JF, BHJ, FL), 15/9 3 (JF, BHJ, FL), 21/9 2 (JF, BHJ). Aarhus Havn: 12/7 1 (JF), 12/7 2 ad. (KHe), 18/7 2 ad. (KHe), 28/7 1 ad. (KHe). Grenå: 6/8 3 (PH), 12/8 3 (PH). Øvrige: 31/7 3, 1/8 3-4, 2/8 3 (HLL). Øvrige: 12/9 11 Kjetten, Mariager Fjord (HLL, BHJ, JF).

1981



Figur 1. Kronesøbet Ryge, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Jagttagelser en summering af alle jagttagelser pr. 5-dages periode.

Langbejn (Calidris alpina)

Uregelmæssig og uregelmæssig træk om foråret, fåtallig træk om efteråret (ult. juli-med. okt), fåtallig og uregelmæssig vintergast.

Martsjagttagelsen er 4. Forårsfund i amtet. De øvrige 3 alle fra ult. april-ult. maj 1975. Efteråret ganske godt med Aarhus Havn som den dominerende lokalitet. Jagttagelserne viser tydeligt adskillelsen mellem de gamle og unges træk. I sept er der nok flere gengangere. Inden for de sidste 5 efterår er arten truffet i aug 1976, sept 1977, aug+sept+nov 1978, juli+aug 1979 og juli+aug+sept+okt 1980. Novemberfundet fra 1978 henregnes til de sene træk og amtets 1. vinterfund er således en kendsgerning i december 1981.

Forår: 23/3 10 N Fornæs (HC).

Efterår: Aarhus Havn: 28/7 2 ad. (KHe), 3/8 3 ad. (KHe), 9/9 5 1K (KHe), 11/9 3 juv. (HLL), 13/9 1 juv. (PH), 14/9 4 (HLL), 17/9 4 juv. (HLL), 18/9 4 (PH, BHJ, FL). Øvrige: 22/7 2 trk Fornæs (HC), 9/8 2 Kysing

Fjord (DOF), 19/9 1 Langør, Samsø (LB), 13/10 6 Grenå Strand (CO),
14/10 Polde-Rev, Grenå (CO).

Vinter: 20/12 11 Polde-Rev - Havknude, Grenå (CO).

Brushane (Philomachus pugnax)

Ret almindelig trækfugl om foråret (med. april-ult. maj), fåtallig sommergast (ult. maj/pr. juni-ult. juni/pr. juli), almindelig trækfugl om efteråret (ult. juni/pr. juli-med./ult. okt), sjælden og uregelmæssig vintergast. Forårstrækket indledes med. april med de første fugle, men bliver så bremset af en længere "kuldeperiode". Derefter ses de næste 5. maj, hvorefter forårstrækket iøvrigt kulminerer. I slutningen af maj ses de sidste trækfugle, som forbliver i området for at oversomme. Først midt i juli indledes efterårstrækket, og den første kulmination falder omkring midten af august. Det drejer sig om de gamle fugle. Herefter en glidende overgang til ungfuglenes enorme kulmination i begyndelsen af september. I lokalrapportens omkreds, uanset den forøgede interesse for indrapportering, er lignende observationer ikke iagttaget. Efter ungfuglenes kulmination falder antallet hurtigt, og det sidste træk ophører i slutningen af september med enkelte enkelte nølere til midten af oktober. Herefter forligger 3 isolerede iagttagelser, som må henføres til vinterobs. Alle iagttagelser nævnes.

Kysing Fjord: 13/4 2 (JF), 1/5 41 (JF), 10/5 7, 19/5 3, 23/6 1 hanner, 16/7 2, 18/7 5, 21/7 8, 28/7 21, 1/8 12, 2/8 11, 3/8 22, 5/8 14, 9/8 45 (PH, BHJ, FL), 11/8 46 (JF), 14/8 36, 15/8 70 (HF), 16/8 56 (JF), 20/8 15, 21/8 27, 22/8 5, 23/8 45 (JF), 28/8 96 (JF), 31/8 55 (JF), 1-4/9 250-300 (FE, PMT), 7/9 113 (JF), 9/9 28, 12/9 40 (BHJ, FL), 13/9 102 (JF), 20/9 8, 21/9 90 (CQP), 27/9 2, 1/10 1, 4/10 8, 12/10 1, 21/10 4, 23/11 1-2 hanner (CQP), 28/11 1 (JF), 5/12 1 (JF); (L&B, Torben Bøgeskov, H+JE, JF, KHe, PH, SH, EH, AJ, BHJ, JDK, HLL, FL, CQP, KE, ET, PMT, NA, DOF).


Østerby Mose: 6/5 1, 7/5 8, 9/5 2, 18/5 1, 14-15/9 1 (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 5-6/5 1, 9/5 2, 12/5 6, 2/7 hanner, 10/8 35 (AJ), 27/8 15, 28/8 14, 29/8 1, 31/8 76 (CO), 1/9 90 (CO), 3/9 125 (CO); (OF, CO).

Øvrige: 11/4 1 hun Alrø (LPJ), 8/5 7 Tranekær Mose (OF), 19/7 2 Tved Øhoved (CQP), 27/7 1 Hesselholm, Samsø (LB), 1/8 5 Ramten-Dystrup Sø (NA), 15/8 100 Bjerregrav Mose (SH), 29/8 2 Glenstrup Sø (JRR), 30/8 2 (BHJ), 18/9 6 Aarhus Havn (PH, BHJ, FL), 26/9 2 Fornæs (CO).

Vinter: 23/11 1-2 hanner (CQP), 28/11 1 og 5/12 1 (JF) Kysing Fjord.
Se appendix II 1980.

Kare Holm: 11/4 3 (KHE, BRR, JRR), 7/6 6 (EH, JRR); y1-3par.
 Råby Odde, Randers Fjord: 12/4 9 (KEH, BRR, JRR), 2/5 6, 17/5 12 (JRR),
 31/5 1 (EH, JRR); y1-?.
 Randers Fjords udløb: 12/4 2 (KEH, BRR, JRR), 17/5 1, 22/8 1 (JRR).
 Pletten, Mariager Fjord: 17/5 2 (JRR), 12/9 1 ad. (KEH, BRR, JRR).
 Øvrige: 7/4 2 Begtrup Røn (EH), 17/4 2 Sværm, Samsø (AJ), 20/4 15-20.
 Barnekold, Samsø (AJ), 24/5 5 Skødshoved (KHe); y1-2/3par, 25/5 2.
 Følle Bund (KHe); yngler ikke her.



Hellemåge (Stercorarius pomarinus)

Se appendix II 1973.

Svartbag (Larus marinus)

Fåtalrig (ret almindelig), men spredt og lokalt forekommende yngletrækfugl. Rapporteret fra 3 ynglepladser, men kendes desuden fra øerne i Stavns Fjord og Ørkenen på Anholt. Overvintringen skal hovedsagelig i vore egne farvande.

Ynglefund:

13 par Svanegrund, 1 par Søby Rev, 85 par Hov Røn (alle FC), ialt 100 par.

Sildemåge (Larus fuscus)

Fåtalrig (ret almindelig), men spredt og lokalt forekommende yngletrækfugl (med. marts-med. okt), fåtalrig træk- og sommergæst ved større ferskvandssøer i indlandet (med. feb/med. marts-ult. juli). To ynglefund er rapporteret, men det vides med sikkerhed, at arten også yngler på øerne i Stavns Fjord og i Ørkenen på Anholt, hvor landets største koloni findes. Iagttagelserne fra større ferskvandssøer langt fra kysten fortsætter. At de første iagttagelser af arten gøres ved

Svaner og albatros er meget usædvanligt. At arten var udfældet fra med. februar, er det næppe tvivl om, men at den alle-
 neidse optræder ved ferierne, er det nok dokumenteret. Hvad der taler
 mod udrømsten er også dens tidmæssige isolation fra de næste jagt-
 tagelser i begyndelsen af april. Alle jagttagelser nævnes:

Ynglefund:

16 par Svanegrund og 1 par Albatros (begge FC), ialt 27 par.

Kvælandsjagttagelser:

Svanemosen, Damsø: 25/5 2 (BCH) og 11/7 2 (HHH, AJ), Skanderborg Sø.
 28/4 1, 2/7 4, 2/7 1, 5/7 3 (alle HHH), Mossø: 5/7 1, 7/7 1, 14/7
 1 (alle HHH), Prætor Sø: 15/7 2, 16/2 3, 16/2 14, 10/3 1 (alle EH), og
 18/7 3 (EH, YAK). Lading Sø: 2 3 4 og 24/3 1 (BH). Salten Langesø.
 22/7 1 ad. (NA).

Tidlige jagttagelser:

Kvæglind Sørand: 14/4 8 unger, 14/4 1 sub-ad. N, 22/4 1 sub-ad. N,
 24/4 1 unger N (alle NA). Havn Havn: 11/5 1 ad. (NA) og 12/7 2
 (PH). Lading Sø: 11-28/4 ca 11-12 almindelig (NT) og 7/7 10 (PH, BH,
 YAK). Albatros Fjersrup Sørand. BHJ, 14/6 2 Kysing Fjord (BHJ),
 Søby Rev (BHJ, FL), 18/7 1 ad -britisk race- Lundbyesgade,
 Søby (BHJ). 25/7 1 ad. Søby (BHJ, FL), 24/9 mindst 10 Grenå
 Sørand (BHJ). 11/10 2 ad. Søby (BHJ). Næs (HF).

Litteratur: Dybbro 1978, Oversigt over Danmarks fugle

Danmarks Dyreverdiv Bd. 7

Hættemåge (Larus argentatus)

Er almindelig og spredt fordelt både ynglestrejfugt, meget almindelig
 sommer- og vintergæst. Den er rapporteret fra 4 kolonier,
 men det er næppe alle inden for hvert område, hvor den i hvert fald også
 yngler på søerne i Stavns Fjord og på Anholt. Sindes formentlig også
 på flere andre søområder og søer som f.eks. Vejvø, Tunge, Segtrup Røn,
 Hjertebæk, Sønder og Liding Sø. Nogle tal fra Lading Sø, hvor arten
 synes at træffe størst antal som Hættemåger i antal

Ynglefund:

114 par Svanegrund, 5 par Alcø Polder, 116 par Søby Rev og 477 par Hov
 Røn (alle FC), ialt 712 par.

Lading Sø: 30/3 250, 1/4 250, 2/4 400 og 11/4 250 (alle BH).

Stormmåge (Larus canus)

Ret almindelig yngletrækfugl (marts-nov), fåtallig ynglestandfugl, almindelig/meget almindelig træk- og vintergæst (sept-april). Fire yngleiagttagelser og to sovepladser rapporteret.

Ynglefund:

9 par Svanegrund, 69 par Alrø Polder, 245 par Søby Rev og 10 par Nøv Røn (alle FC), ialt 333 par.

Sovepladser:

31/3 650 Fussing Sø (JRR) og 3/9 10.000 Storm/Hættemåger Stilling Sø (ET).

Gråmåge (Larus hyperboreus)

Meget sjælden og uregelmæssig træk- og vintergæst.

1 fund: 28/12 1 1K Svanegrund (HLL).

I de sidste 5 år er arten iagttaget maj+sept+nov 1976, maj 1977, feb+apr 1979 og mar+maj+dec 1980.

Hvidvinget Måge (Larus glaucooides)

1 fund: Se appendix I.

Udgik af SU-listen i 1972 og kom igen på listen fra 1979. En tidligere iagttagelse fra amtet, nov 1973 skal således anbefales forelagt SU til godkendelse.

Sortrovedet Måge (Larus melanocephalus)

1 fund: Se appendix I.

Arten er truffet tre gange i Østjylland, Aarhus amt. To af iagttagelserne er godkendt af SU, nemlig: 27/4-2/5 1975 1 ad. Hjelm (yngleårs sø) havde bygget redeskål og udviste parringsadfærd overfor Stormmåge; og 7/9 1975 1 - skudt - Brabrand Sø (ringmærket ved Sortehavet, USSR). Om en 3. iagttagelse fra 1976 er forelagt SU vides ikke.

Se appendix II 1975.

Østergård (Larus argentatus)

Uregelmæssigt væksgæst (med april-ult. sept.).
 I 1970 meget fågttagelsesfund (1), hvor arten iøvrigt var meget tal-
 rigt forekommende i dele af Nord- og Øst-Europa og for Danmarks vedkommende
 specielt i Vestjylland.

1970: 21 N + 2 S i Østerby Mose (PH, EKS), 10/5 1 2K Østerby Mose (PH, EKS),
 11/5 1 N + 1 S i Østerby Mose (PH, EKS), 6/6 1 juv. Mørke Rør
 (JTB), 5/8 1 Kysing Fjord (JTB), 8-8/8 1 2K Østerby Mose (BHU), 9/8 1
 1 Kysing Fjord (DOF), 24/9 1 LF Brabrand Sø (HLL) og 25/9 1 juv.
 Brabrand Sø (HLL, JTB).

Inden for de sidste 5 år er arten fågttaget aug 1970, aug+sept+nov
 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 og juli 1980.

Brudefugl (Larus tridactylus)

Uregelmæssigt meget almindelig og bestand- og yngletal af fugl (marts-
 april) og meget almindelig væksgæst og vintergæst (aug-april). 21 yngler-
 fund er registreret, men helt givet findes flere kolonier, bl.a. i flere
 af de nævnte steder, herunder i Østjylland (meddelt af BHM og Jens Kirkeby).
 Indtil nu er registreret 10 kolonier i søveplads.

Ynglefund med antal par:

100 Ålborg polder (EC), 5 Søby (EC), mindst 100 Møgelmosen, Samsø
 (DOF m.fl.), 10 Kragemosen, Samsø (DOF m.fl.), mindst 2 Østerby
 Mose (PH), 1000 Brabrand Sø (HLL, PH, EKS, AT), 100 Kysing Sø (BHU),
 mindst 100 Tuemose (Mgr), 100 Søby meller Lyseby (HLL), Grauballe Mose
 (Mgr), 100 Grauballe Mose (Mgr), 25 Tomaskov Sø (Mgr), 100
 Tuemose (Mgr), 300 Gammelmoort Sø (Mgr), 150 Frøbjergsø ved Hede (ME), 15
 Græs Sande (JB), 200 Mørke Rør (JTB), 65 halvøen ved Kalø slots-
 ruin (HLL), 10 Tuemose ved Bjerslev (SH), 300 Bjerslev Mose (Gejrf),
 5-10 Kolind Sø (HLL) og 10 Søby Sø i Sønder-Dystrup Søer (CS).
 Søveplads: 100 Søby Sø i Sønder-Dystrup Søer (ET).

Bude (Larus tridactylus)

Sjælden og uregelmæssig væksgæst /ult. marts-april og pr. okt-ult. nov).
 I 1981 flest forårsfund med 9-10 ex. mod efterårets 5 ex.

28/3 4 N + 2 S Fornæs (HC), 29/3 1 N Fornæs (HC, EH), 19/4 1 trk Fornæs

Fyr og 1 trk Gjerrild Fyr (St1) - må være det samme individ-, 24/4 1 ad. Anholt (NT), 3/10 1 N + 1 S Fornæs (HC), 17/10 1 juv. havet øst for Samsø (PN), 14/11 1 ad. Grenå Havn (NT) og 21/11 1 S Fornæs (HC). Inden for de sidste 5 år er arten truffet i nov 1976, okt+nov 1978, april+okt 1979 og mar+maj+sept+nov 1980.

Sortterne (Chlidonias niger)

Fåtalig og uregelmæssig trækgæst om foråret (maj-juni og sjælden og uregelmæssig trækgæst om efteråret (ult. juli-pr. aug). En meget stor majforekomst fra Kysing Fjord er usædvanlig og i øvrigt den største forårsobs i lokalrapportens historie. Kysing Fjord er afgjort amtets bedste lokalitet for Sortterne både hvad "regelmæssighed" og hyppighed angår.

8/5 2 Østerby Mose (PH, BHJ), 9/5 13 (JF) og 2 (EH, JDK) Kysing Fjord, 17/5 2 Østerby Mose (PH, BHJ), 23/5 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 26/5 1 ad. Brabrand Sø (RD, EH), 27/7 1 juv. Kysing Fjord (JF), 28/7 3 Kysing Fjord (HLL), 29/7 2 Aarhus Havn (CQP), 1-3+5/8 1 Kysing Fjord (JF). Fra Viborg amt: 21/4 1 Knudstrup (KeH).

Inden for de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 juni+aug, 1977 juni+juli, 1979 maj+aug, 1980 juni+aug.

Fjord/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea)

1 Fjællands-egttagelser og sidste obs af Fjord- eller Havterne.

12/8 2 Fjællands Sø (BHF, FL), 7/9 1 Solbjerg Sø (BHJ, FL), 12/8 3 Fjællands Sø (LH), 6/9 7 V Edslev (BHJ) og sidste 12/9 4 Pletten, Karlaget Fjord (KEE, BEE, JRR).

Se appendix II 1978.

Fjællands-egttagelser (Sterna hirundo)

Sjælden yngletrækfugl og fåtalig træk- og sommergæst (med. maj-ult. aug/med. sept). To ynglefund rapporteret, men det er næppe de eneste, trods det, at vor samlede ynglebestand næppe overstiger 20 par. Flere sommeriagttagelser langt fra de rapporterede ynglepladser. Alle iagttagelser nævnes.

Samsø: I hvert fald en koloni med mindst 5 par på Besser Rev. Disse ses fouragere langs kysten omkring øens nordlige del, således: 28/5 mindst 10 - i koloni med Havterne - Besser Rev (DOF), 30/5 2 Østre Hedekrog (LB, DOF) og 20/6 5 Østre Hedekrog (LB).

Kysing Fjord: Iagttagelserne fra fjorden og Kysing næs giver formodning om et ynglepar. Endnu i de seneste år har arten ynglet på næsset og bl.a. fourageret i fjorden med ungerne. Sådanne obs er dog ikke rapporteret i år, det skyldes måske manglende ynglesucces. Iagttagelser: 1 (KHe), 15/5 2 Kysing Næs (BHJ, FL), 5/7 2 (CQP), 9/7 4 (JF), 9/7 1 (KHe), 16/7 2 (JF), 18/7 2 (JF), 21/7 2 (JDK), 22/7 1 (JF), 25/7 3 (GG), 28/7 2 (JF), 29/7 1 ad (HLL), 2/8 2 (JF).

Aarhus Havn: Mindst to par har ynglet på det opfyldte areal i den nye Østhavn, da pullus og juv. er set. Pullus er set meget sent, pr. alt hvilket formentlig skyldes ødelæggelse af rede(r) i forbindelse med anlægsarbejdet først på sæsonen, og det er således unger fra omlagt ægkuld. Et andet par var mere heldig, da flyvedygtige unger så med juli. Det kan vel næppe tænkes, at et par har udruget to kuld?! Iagttagelserne var: 9/5 3 (KHe), 11/5 1 (NA), 28/6 2 (FF), 15/7 4 ad. (KHe), 29/7 1 (CQP), 6/8 2 ad + 2 pull (PNN), 8/8 2 ad + 1 pull (KHe), 9/8 1 ad. + 2 juv. (CQP), 19/8 2 ad. (KHe).


Anholt: Ingen rapportering fra ynglekolonien, men ud fra de indseende oplysninger må det synes, at bestanden på øen er på mindst 10 par. Følgende er set: 28/4 1 Flakket, 22/5 1, 24/5 1, 25/5 ca. 20 (alle 4 arter): 28/5 2 fouragerende Moesgård Strand (NA) og 19/7 2 Fornæs - er nærliggende yngleplads? (JDK).

Skuerne (Sterna sandracensis)

Formodentlig regelmæssig og fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl - fåtallig træk og sommergæst (ult. marts-med. okt). Ingen rapporteret ynglesund, men mange forårs- og sommeriagttagelser fra Samsø og Sjerrild Nordstrand giver formodning om mindre kolonier. I den sydlige del af amtene Alsø Fjelder og Søby Rev, skifter ynglekolonien mellem disse to øgrupper og Hjarnø og Endelave i Vejle amt. Arten er kendt for sin "uregelmæssige" optræden på langt de fleste danske ynglepladser. Alle iagttagelser nævnes.

Første: 28/3 6 S Fornæs (HC), 29/3 2 trk Fornæs (EH), 5/4 12 Kalsemade (SH), 13/4 3 Fornæs Fyr (Stl)

Sidste: 28/9 2 Vesborg Fyr, Samsø (LB), 11/10 1 S Kysing Næs (HP),



Figur 37. Alkefugle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne alkefugle, såvel ubestemte som bestemte, pr. 5-dages periode. Et + angiver < 10 individer.

Alk (Alca torda)

17/4 2 trk Fornæs Fyr (St1), 19/4 1 trk Fornæs Fyr (St1), 21/11 2 Aarhus-Kalundborg overfarten (NP), 21/11 57 N + 4 S (KEH, BRR, JRR) og 38 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC).

I de sidste 5 år foreligger der sikre iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 for- og efterår.

Se appendix II 1980.

Spkonge (Alca alle)

19/4 1 trk Fornæs Fyr (St1), 18/7 1 N Fornæs Fyr (RD), 21/11 2 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC), 28/12 1 fouragerede 5 m fra Skovsengenstrup (SH).

I de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 forår.

Lomvie (Uria lomvia)

19/4 1 Aarhushavn (PH, BHJ), 17/4 2 trk Fornæs Fyr (St1), 19/4 3 trk Fornæs Fyr (St1), 18/10 1 N Kysing Næs (PH, BHJ, FL; HP), 25/10 1 rast Fornæs (CO), 8/11 2 rast Fornæs (CO), 21/11 4 Aarhus-Kalundborg overfarten (NA), 21/11 6 S (KEH, BRR, JRR) og 2 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC).

Fra de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 forår.

Huldue (Columba oenas)

Fåtalig ynglefugl (ult. marts-aug), ret almindelig trækgæst om foråret (pr. marts-april) og fåtalig efterårsgæst (med. aug-okt).

Arten er i yngletiden konstateret på følgende lokaliteter:

Brattingborg, Samsø: 14/4 1, 24/7 1 (LB), Kysing Fjord: 15/4 1, 15/4 1, 1/8 1, 3/8 3, 14/8 3, 16/8 1 (JF, BHJ, FL), Vilhelmsborg: 2-3 par (BHJ, NPO) Moesgård Skov v. hejrekolonien 1 par (SH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 28/3 1 syngende, 2/4 1 par v. redegul (JTL), 14/5 1 (KH). Risskov: 28/7 1 par v. redegul (LPJ), Tølløke Skov: 2 par (JTL),

Tange Sø: 9/5 1 (KEH), ialt 7-11 registrerede ungepar.

Trækiaftagelser:

Moesgård Strand: 9/3-18/4 313 trk (Moes, m.fl), max 18/3 104 N (AJ),

Gjerrild: 15/4 1 P, resten trækkende: 12/4 2, 13/4 5, 14/4 5, 16/4 1

17/4 1, 18/4 3, 8/6 10 (Stl, RD, HP), Fornæs: 29/3 13 (EH), 31/3 1

(HLL), 5/4 1 (B+JRR, KEH), 6/4 2 (HLL), 8/4 2, 9/4 10, 12/4 1 (NT),

14/4 1 (Stl), alle trk. Øvrige: Kysing Fjord: 9/8 1 trk (SH), 21/8 1

23/8 1 (JF, BHJ, FL), Tåstrup Sø: 7/4 1 (AJ), Sletterhage: 18/10 8 trk

(JTL), Stubbe Sø: 16/4 1 N (Stl), Anholt: 25/4 2, 26/4 10 (NT).

Se Grafen

Se appendix II 1980.

Ringdue (Columba palumbus)

Arten er meget almindelig i amtet, men forekommer i træktiden (ult. med. maj) og okt i store tal på enkelte lokaliteter, som bør nævnes

Brabrand Sø: 31/1 2200 N (ØBF), Moesgård Strand: 31/1-15/5 ialt 313

(Moes, m.fl) max 13/3 1214 N (HLL), og 18/3 1191 N (AJ), Gjerrild og

Fornæs: 13/4-18/4 6194 trk (Stl), Sletterhage, Helgenæs: 18/10 1863

trk (JTL).

Turterdue (Coturnicops turtur)

Den er trækgæst, følgende to obs foreligger:

Bjersregrav Mose: 25/4 1 (Gejrf), Skæring v. Aarhus Planteskole: 1/6 2

NØ (EH).

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Arten er hovedsagelig standfugl, følgende træk obs er derfor lidt

Natugle (Strix aluco)

Ca. 35 par er indrapporteret, men mangler på mange potentielle lokaliteter, især mange skovområder. Arten må antages at være ret almindelig - almindelig ynglestandfugl.

Kysing Fjord: 13/3 2 (NT), Nørreskov: nær Torrild 1 par, Vilhelmsborg: 2 par (BHJ), Mårslet: 1 par (BHJ, FL), Hørret Skov: 2 par (BHJ), Obakke v. Mårslet 20/10 1 (BHJ), Moesgård Strand: 9/4 1 hørt (NA), Dørup: 1 par (ET, PMT), Dørup Mølle: 1 par, Bodil Mølle: 1 par, Pinds Mølle: 1 par (ET), Edslev Knude: 5/9 1 hørt (BHJ), Store Ravnsbjerg i Viby: 1 par (BHJ, FL), Storskoven: 1 par (DOF's kassegruppe), Konstansdal Skov: 10/3 1-2 hørt, Søsken: 10/3 1 hørt (DOF), Stautrup Skov: 10/3 1 (AJ), Brabrand: ses og høres jævnligt (LaB), Risskov: 1 par (ET, PMT) + 26/3 1 (NA) - nov-dec 1 (LPJ), Norring Mølle: 23/1 1 hørt (DOF), Nørrens: 24/5 3 juv, Hår Skov: 15/5 1 ad. v. rede (SMJ), Alsrode: 1 par (OF), Kolindsund v. Sivestedodde: 9/8 1 trafikdræbt, Tøstrup: 1 par, Vallum Skov: 1 par m. 2 pulli, Ryongård Slot: 1 par (JJP), Gjerrild: 15+16/4 1 (St1), Grenå Plantage: 4+9/11 1 (CO), Fussingø Skov: 23/1 1 juv. (JRR), Randers: Tøjhushaven 8/2 1, Skovbakken 2/5 1 ad + 6/11 1 (JRR).

Skovhornugle (Asio otus)

Stæden ynglefugl (dog ingen indsendt fra Syddjursland) og fåtallig træk- og vintergast (pr. nov-med. april).

Ynglefund:

Sørre Skov: Odder Korm: 12/6 1 (BHJ), Mårup Skov, Samsø: 8/3 1 (AJ), 11. 21.47 (JJP), Norringure: 14/6 2 pulli i gl. kragerede (SMJ), 23/1 1 ad. fund rede forladt af unger (SMJ), Grenå Plantage: 13/5 1 hørt (JRR).

Rest. træk- og vinterlagttagelser:

Brabrand Sø: 0/1 2, 6/1 7, 10/1 5, 19/1 min 8, 25/1 8, 27/1 2, 30/1 1, 31/1 7, 1/2 1, 2/2 2, 4/2 6, 5/2 10, 9/2 6, 11/2 3, 14/2 7, 15/2 5, 16/2 7, 18/2 3, 21/2 5, 22/2 5, 26/2 1, 1/3 4, 4/3 3-4, 5/3 3, 10/3 3, 12-16/3 2, 17-19/3 3, 20-22/3 1, --- 1/11 1, 10/11 3, 12/11 2, 15/11 3, 29/11 2, 6/12 3, 8/12 2, 1+10/12 3, 13/12 4, 15/12 9, 20/12 6, 22/12 7, 28/12 8, 30/12 11. (ØBF, PH, EH, KJH, BHJ, PJJ, JØK, FL, PNN, NT, NA og især AJ).

Øvrige: Gjerrild: 18/4 1 trk (St1), Dørup Mølle: 4/11 1 Ø (ET, PMT), Viby v. Søndervangsalle: 1 indiv. iagtt. ved juletid (meddelt PH). Se fig. over Brabrand Sø.

(EH) og 1/5 1 Viby v. Søndervangen (PH), er usædvanligt tidlige, dette skyldes nok SØ-vindene i april.

De "normale":

8/5 Åbyhøj: 1 (HET), Aarhus: 1 (PN), Brabrand Sø: 21 (HLL, AJ), Tåstrup Sø: 4 (HP), Sortesø: 1 (HP), Lushage, Samsø: 1 (LB). 9/5 Brabrand Sø: 22 (PH, BHJ), Moesgård Strand: 1 N (Moes). 10/5 Brabrand Sø: 2 (JDE), Lundbyesgade i Aarhus: 3 (NÅ). 13/5 Gammel Mose v. Galten: 3 (BH). Den sidste: 3/10 1 SV Dørup (ET, PMT).

Nogle store tal: Brabrand Sø: 2/6 110, 4/6 190 (EH), Fornæs: 18. eller 19/7 200 trk (Meddelt BHJ).


Isfugl (Alcedo atthis)

Sjælden ynglefugl og fåtallig træk- og vintergæst (nov- marts).

Følgende er indsendt:

Klostermølle: 6/12 1 (ØBF), Brillerne v. Silkeborg: 6/8 1 (Jakob Bønløkke), Salten Langsø: 19/7 1 (PN), 25/10 (HB), Giber Å: pr. marts 2 (meddelt BEJ), Aarhus Å: Dørup Mølle: 21/11 1-2 hørt, 4/12 1 hørt (ET, PMT), Bodis Mølle: 7+8/11 2, 30/11 1-2, 10/12 1 (ET, PMT), Palle Mølle: 14/2 2-3 (ØBF), v. Carl Blochsgade: 16/3 1 (HM), v. Ceres: 25/1 1 (HET), Brabrand Sø: 2/1 1-2 (HLL), 15/3 1 (AJ, JDK), 9/11 (JDE), 12/12 1 (KHe), Fussing Sø: 7/2 1, 26/3 1 (PER), Fussing Vandsø melle: 5/9 1 (ØBF).

Se Appendix II 1973, 1978, 1980.



Figur 40. Isfugl, Århus Amt 1981.

Figuren viser summeret månedlig forekomst.

Isfugl (Alcedo atthis)


Denne pragtfulde fugl optræder helt usædvanligt i amtet, noget overraskende er det derfor, at hele 17 individer blev iagttaget på Annolt i tidsrummet 27/5 (hvor de ankom om aftenen) - 31/5, dette er den største flok, der er registreret i Danmark! Tidspunktet falder sammen med de øvrige iagttagelser af sydøstlige arter i amtet, hvilket som nævnt under disse skyldes vejrforholdene.

Sortspætte (Dryocopus martius)

Arten er sjælden - fåtallig i amtet, men der foreligger ingen sikre ynglefund. Der er 6 obs fra okt-nov, hvilket nok skyldes en mindre invasion.

4/3 1 (?) Gjerrild Skov (JJP), 14/3 1 hørt svagt Velling Skov (JB),
6/5 1 hørt Gjerrild Nordstrand (RD), 14/10 1 Vrads Sande (HUSM, PH-M),
14/10 1 Hampen Sø (HUSM), 22/10 1 Fussing Skov (PER), ?/11 1 hun
Salten Langsø (Lars Hansen), 29/11 1 Fussing Skov (B+JRR, KEH), 27/11
1 St. Hjøllund Plantage (HUSM)

Se appendix II 1977, 1978, 1980.



Figur 41. Sortspætte, Århus Amt 1981.
Figuren viser summeret månedlig forekomst.

Vendehals (Jynx torquilla)

landsynligvis fåtallig ynglefugl, dog ingen sikre fund i år. Desuden
åbentlig forårsgæst (red. april-ult. maj) og sjælden efterårsgæst
(aug-sept).


Vedår:

Grindstrup, Skanderborg: 14/4 + 9/5 1 (GG). Sepstrup: 13/5 2 (ME). Sande
1/5 1 (LE). Næsgerd Strand: 5/5 1 rast (JTL), 23/5 1 hørt (JTL, PH-M),
24/5 1 hørt (BP). Rødschaven, Aarhus: 6/5 1 (NA). Risskov: 24/5 1
(PH-M). Alsø: 9/5 1 (delt OF). Alsrode: 9/5 1 (OF).

EFuerår:

Vested Kuse: 13/8 1 hørt (AJ).

Se appendix II 1980.



Figur 42. Vendehals, Århus Amt 1981.
Figuren viser summeret månedlig forekomst.

9/2 6 N Moesgård Strand (NA), 9/2 2 syngende Kolindbro (JJP), 8/12
1 Aarhus Havn (HLL).

Fornæs: 29/3 900 trk (HC). Moesgård Strand: 8/3 1957 trk (Moes), 9/3
550 N (NA), ialt 31/1-9/5 6332 trk (Moes).

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*)

Sjalden træk- og vintergæst, to iagttagelser foreligger:

Moesgård Strand: 14/3 9 rast (CQP), Fornæs: 28/12 1 (SH).

Landsvale (*Hirundo rustica*)

Første iagttagelser fra april:

10/4 1 Tapdrup Enge (HeP), 11/4 1 Brabrand Sø (AJ), 11/4 1 syd for
Viborg (KeH), 12/4 1 trk Gjerrild (St1), 15/4 1 Hesselholm (LB), 16/4
S Kysing Fjord (JF), 16/4 1 Kasted Mose (SH), 22/4 1 Brabrand Sø (HE),
23/4 1 Brabrand (LaB), 25/4 1 Ramten-Dystrup Sø (DOF), 26/4 1 Brabrand
(LaB), 27/4 1 Hinnerup (PN), 27/4 1 Dørup (ET, PMT), 28/4 3 Brabrand
Sø (LaB, AJ), 29/4 6 Brabrand Sø (AJ).

Sidste iagttagelser fra efter 10/10:

11/10 7 S Kysing Næs (HP), 11/10 28 SV Kysing Fjord (HP), 13/10 12
Dørup (ET, PMT), 14/10 2 Østerby Mose (BHJ), 22/10 1 S + 2 rast
Skatterhage Fyr (JTE).

Moesgård Strand: 4/5-29/5 557 trk (Moes).

4. appendix II 1978.

Opvalse (*Delichon urbica*)

Alle 4 indsamlet 1/1-10/5 og oktober nævnes:

1. Moesgård Strand: 6/5-29/5 134 N, max: 9/5 106 N (Moes).

2. Brabrand Sø (AJ). 8/5 Lisbjerg Bro: 1 (PN), Brabrand Sø: 1
(HE), AJ), Østerby Mose: 2 (PH, BHJ). 9/5 Norsminde: 1 (EH), Brabrand
Sø: 7 (PH, BHJ), Hesselholm: 1 (LB). 10/5 Brabrand Sø: 2 (PNN),
Botanisk Have, Aarhus: 1 (NA). 3/10 Dørup: 2 (ET). 11/10 Kysing
Fjord: 3-4 (DOF) + Kysing Næs: 4 SV (HP).

Digesvale (*Riparia riparia*)

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA),
29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD),
6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

Svale sp (Hirundinidae sp)

Gjernild Nordstrand: 10/5 omkring 1500 (RD).

Pir. (Hirundinidae sp)

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

Nest. (Hirundinidae sp)

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).


19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA), 29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD), 6/5 1 km. Samsø (LB).

19/4 1000-1500 (1000-1500) (NA),
29/4 1 Langballe Grusgrav (BHD),
24/4 1 Langballe Grusgrav (RD),
6/5 1 km. Samsø (LB).



Figur 43. Ravn, Århus Amt 1/1 -31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sortkrage (Corvus corone corone)

Meget sjælden yngletrækfugl, meget sjælden vintergæst (med. nov-feb) og fåtallig trækgæst (ult. marts-maj og sept-okt). Alle sommer og vinter obs nævnes:


Sommer: Ynglepar Vilhelmsborg (BHJ) og 5/7 1 Sondrup (HLL).

Vinter: 8/2 1 Kysing Fjord (BHJ, FL, PH), 26/11 1 Dørup (ET, PMT) og 29/12 2 Åbyhøj (HET).

Forår: Moesgård Strand har flest trækgæster med ialt 17 trk og 1 rast i perioden 18/3 - 15/5. Trækkets forløb kan aflæses af figur

Efterår: Maximum var 12/9 4 Kysing Fjord (PH, BHJ).

Se appendix II 1980.



Figur 44. Sortkrage, Århus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sortkrage (Corvus corone cornix)

Ynglestandfugl og almindelig trækgæst. Kun få oplysninger. En vinter- flock og trækoptællinger fra Moesgård og Gjerrild.

Vinter: 11/2 300 Kysing Fjord (SH).

Forår: 31/3-18/5 ialt 3316 trk Moesgård (NA, Moes), flest 18/3 1850 (AJ, HLL) og 13/4 - 18/4 ialt 430 trk Gjerrild, flest 15/4 128 (Sti).

Sortkrage (Corvus frugilegus)

Rat almindelig (-almindelig?) ynglestræjfugl og almindelig trækgæst. Fugleoptællinger af kolonier og forårstrækket.

Ynglefund:

75 par Kolindsund (JJP), 80 par Tingskoven ved Tranbjerg (BHJ), 184 par Grønlykkeskov ved Tranbjerg (BHJ), 9 par Tre Broer, Brabrand Sø (AJ), og 126 par Stautrup Skov (AJ).


Forår: 17/2-5/5 306 trk Moesgård (NA, Moes), flest 18/3 189 N (AJ, HLL). 31/3 172 trk Fornæs (HLL) og 13-18/4 32 trk Gjerrild/fornæs (Sti).

Vallum Skov, Forstbotanisk Have i Aarhus, Moesgård Strand og Brattingsborg på Samsø (NA, LB, JJP).

Følgende flokke med mindst 20 fugle er set: 9/2 20 + 15/2 20 + 27/3 ca. 25 Moesgård Strand (NA, H+JE, NT), 26/11 21 Pinds Mølle (ET, PMT), 26/12 26 Gudensø (HHH) og 27/12 22 Brabrand Sø (H+JE).

Premover bedes alle se efter og indsende racen på de iagttagne Halemejsler.

Se appendix II 1978.



Figur 45. Halemejsle, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Halemejsle (*Haliaeetus pendulinaus*)

Se appendix II 1978.

Spøtmejsle (*Sitta europaea*)


Englestandfugl. Ifølge JJP yngler den hvidbuede race (*S. e. caesia*) ved Ryomgård Slot. Vi troede ellers kun, vi havde den rødbugede race (*S. e. europaea*) her i Jylland. Vi opfordrer alle til at race-bestemme de Spøtmejsler, de ser - især potentielle ynglefugle.

og 11 rast (Moes, m.fl), flest 18/3 26 N (AJ, HLL) og 10/3 23 N (NA, AJ, HLL). Ved Gjerrild-Fornæs er på 11 dage i perioden 25/3-15/4 set 15 trk og 9 rast (EH, HLL, HP, JRR, St1), flest 29/3 3 trk og 6 rast (EH).

Efterår: Arten er tilsyneladende her i amtet fåtallig på efterårstrækket. Alle obs nævnes: 29/9 1 Hesselholm (LB), 4/10 21 Salten Langsø (DOF), 24/10 1 Fuglebakkevej, Aarhus V (NA) og 6/11 2 Den kommunale Højskole, Grenå (meddelt OF).

Vi har nu et vist kendskab til forårstrækket, mens materialet fra de øvrige årstider er meget lille. Vi efterlyser alle obs (det var måske en ide at genopfriske kendetegnene?)

Se appendix II 1980.



Figur 47. Misteldrossel, Århus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den særlige træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sjægger (Sturnus pilaris)

Meget støjende yngletrækkfugl og almindelig trækfugl. Uregelmæssig, fåtalrig almindelig vintergæst.

Ynglefund:

14-16/7 1 juv Fuglebakkevej 62, Aarhus V (NA). Måske overset, da arten ikke gør meget væsen af sig i yngletiden.

Vinter:

4/11 30-40 og 31/1 30 Brabrand Sø (ET, PMT) samt 17/1 15 Moesgård Strand (BHI). Ingen dec-obs trods de mange fugle i efteråret. Antallet af vintergæster er afhængigt af snemængden.

Fozar

Se i perioden 11-13/4. 1968 trak observeret ved Moesgård. Ved Gjerneåderfontænen trak i perioden 12-18/4 178 ex., flest 13/4 66 (St1). Antal over 20 i øvrigt: 18/4 15 Tranemoen, Samsø og 13/4 29 Ramten-Dystrup (St1). Sidste 9/5 i Hesselholm (LB).

Efterår:

Første 12/9 10 Skotte (Langsø (SB)), herefter få indtal med. okt. da store flokke var over og nedslid. nov sås endnu småflokke, men i dec var det kun få indiv. over 100 ex.: 18/10 600 Bjerregrav Moss (SB), 19/10 500 BSV Dørup (ET), 27/10 200 Pinds Mølleedal (ET), 7/11 200 Haveløslund (SB), 10/11 300 Dørup (ET), 11/11 350 Brabrand Sø (NA) og 13/11 200 Pinds Mølleedal (ET). De sidste 30/11 50 J. Sønderåbøge, Aarhus S (NA).

Sangrossel (Turdus philomelos)

Første 21/3 i det kongelige skov efter 7/3 i Brabrand Sø (AU). Sidste 17/4 i Haveløslund (SB). 35 Gjerneå Strøb. og 17/4 50 Gjerneå (begge St1).

Vindrossel (Turdus iliacus)

Opstår vintergæst og almindelig strækgæst især om efteråret.

Første 4/4 3-3 Brabrand Sø (ET, PMT) og 18/11 1 Sønderå, Aarhus (AU). Sidste 17/4 1 i Haveløslund (SB), sidst i Dørup (ET, PMT) og 15/4 50-80 i Hesselholm Skov (ET). Sidste 17/4 i Haveløslund, Aarhus (NA). Alene.

Første 29/9 3 Hesselholm (SB). Herefter store flokke igennem oktober. Efter 10/11 kun få tilbage og kun små angreb. Indtællinger over 50 ex. nævnes: 6/10 200 Dørup (ET), 13/10 75 og med. kult. okt 50-100 Botanisk Have, Aarhus (NA), 10/11 100 i Dørup (GG), 13/10 1500 BSV + 20/10 700 BSV + 10/11 100 + 17/11 100 + 27/10 200 + 2/11 50 + 4/11 100 Pinds Mølleedal (ET). Første 21/11 i Dørup (ET).

Ringdrossel (Turdus torquatus)

Fåtalig forårstrækgæst og meget sjælden - sjælden efterårstrækgæst. Alle obs nævnes.

Forår:

(22 ex), 9/4 1 hun + 10/4 1 han Fornæs (NT), 11/4 1 Hesselholm (LB), 12/4 1 han Brabrand Sø (AJ), 13/4 1 Permelille, Samsø (Svend Dybkjær via LB), 13/4 1 + 15/4 2 + 18/4 1 Gjerrild Strand (St1), 17/4 1 hun + 18/4 1 Gjerrild (HP, St1), 21/4 2 Alsrode (OF), 25/4 1 han Løvenholm Skov (DOF), 27/4 3 Anholt (NT), 3/5 1 Alsrode (OF), 3/5 2 (ad. han +) Botanisk Have, Aarhus (NÅ), 7/5 1 han syngende Rød Sø (Vib) (HeP) og 10/5 1 han Dejret Øhoved (KHe).

Efterår: eneste 11/10 1 Alsrode (OF).

Se appendix II 1980.



Figur 48. Ringdrossel, Århus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Stenslakker (Oenanthe oenanthe)

Formentlig fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl og ret almindelig trækfugl. Meget uensartet indrapporteret, især mangler rastobservationer fløks. Fra Anholt.

Englefund:

Eneste rapporteret er Aarhus Østhavn 1 par (NÅ).

Forår:

Eneste 12/4 1 Gjerrild (St1) og 1 Hesselholm (LB); herefter forblev den på med. nag; max 10/5 10 Hesselholm (LB).

Efterår:

Alle obs nævnes. 22/8 1 Kysing Fjord (SH), 18/9 1 + 19/9 1 + 25/9 1 Hesselholm (LB) og 14/10 1 Kysing Fjord (EH).

Se appendix II 1972.

Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata)

Meget sjælden, men muligvis regelmæssig trækfugl. Truffet i amtet i oktober 1974, marts 1975, oktober 1977, oktober 1978 og marts 1979.

Årets obs: 23/3 1 juv. vandværket i Risskov (NT). Det kan stærkt anbefales at lære denne arts kendetegn.

Bynkeflue (Muscivora) - muscivora

Yngletrækende, lokaltrækende, fælles trætrækfugl og formentlig ret almindelig trætrækfugl i trætrækket. Ofte i små oversat.

Indsigt:

1 par i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP) og 1 par Bjerregrav Mose (Gegof).

Parter:

Første iagttagelse: Engø (ReP) - meget tidligt, næsten for tidligt. Måske der have været foregående art? - derefter 8/5 1 par i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP) + 20 Hesselholm (LE). Første iagttagelse 11. juni.

Indsigt:

1 par i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP), 4/8 1 par i Kysing Kilde (JUP) + 1 par i Hesselholm (LE).

Bjergtrækfugl (Muscivora) - muscivora

Yngletrækende og trætrækende. Mange rapporteringer. Første iagttagelse er maj, senere syngende fugle maj-juni og et par efterår.

Første iagttagelse: 1 par i Engø (ReP). Første iagttagelse for 1 par i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP), 1/5 1 par i Kasted Mose (PN), 6/5 2 syngende trætrækfugle i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP); desuden 7 første iagttagelser 8-15/5.

Fra efteråret nævnes kun sidste obs, der slet ikke er sen: 4/8 hun i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP).

Busrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Fåtalig yngletrækfugl og trætrækfugl. Fælles trætrækfugl.

21-24 gr. fl. i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP).

Første iagttagelse: 1 par i det gamle "BN" i parken ved Alsund (JUP). Første iagttagelse for Ringgaden (2 par), Bymarken og Langenæsvej (2 par), Bymarken og Langenæs Alle). Bymarken (1 par i Hølsrupgårdsvej og Bymarken), Viby (3 par). Hølsrup (1 par), Hinnerup (1 par), Randers (1 par), Mariager (1 par v. Danla), Silkeborg (1 par v. Missionshotellet), Skanderborg (1-4 par). (NÅ, NE, FF, GG, EH, PH, KeH, HHH, AJ, BHJ, HLL, HM, PN, PNN, HP, JRR).

Følgende iagttagelser anses for trækobs:

28/3 + 31/3 1 hun Fornæs (HC, HLL), 10/4 + 25/4 1 hun Alsrode (OF), 13/4

1-2 Hesselholm, Samsø (LB), 26/4 1 syngende Stautrup (HM), 21/7 1 juv. indtræk-rast Fornæs Fyr (RD), 31/7 1 hun/juv. Grenå (RD), 15-16/10 1 juv. Alsrode (OF) og ult. okt. 1 han + 3 hun/juv. Aarhus Havn (CQP).



Figur 49. Husrødstjert, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*)

Se appendix II 1973 og 1976

Nattergal (*Luscinia luscinia*)

Ret almindelig yngletrækfugl og formentlig trækfugl.

Arten er truffet i maj-juni på følgende potentielle ynglelokaliteter. antallet af syngende hunner i parentes:

Kysing Fjord (2) (JF, FH, BHJ), Vilhelmsborg (4) (BHJ), Dørup Nølle (1) (ET, PMT), Brabrand Sø (12) (NA, KJH, EH, AJ, HLL, HM), Tåstrup Sø (1) (EH), Kasted Mose (20) (SH, EH, ØBF), Kysmose v. Mundelstrup (2) (NA, JF), Tønder Gammelose (2) (BH), Lading Sø (3) (EH), Damsbro Mose v. Sølle (1) (JW), Engerose v. Søling (4) (EH), Vallum Sø v. Ryomgård (2) (JF, JH), Sønder Sø (1) (JJP), Skarv Sø (1) (JJP), Hadrup Skov (1) (DLJ), Høngård v. Randers (3) (YKR), Ejerregrav Mose (56) (AJ, JRR, Gejrf) og Pussing Sø (1) (PER).

1. Strand Fugle kor 6/5 1 syngende Ankersgade, Aarhus (AJ), 1 syngende Ejerregrav Mose (AJ) og 1 syngende Tre Broer, Brabrand Sø (NA).

De sidste indrapporterede er 16/6 10 syngende Kasted Mose (EH).

Cettisanger (*Cettia cetti*)

Se appendix I.

Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Det er interessante på den grund af den høje forekomst i Aarhus Amt.

Talbyggesang: 2/12/1980 7 syngende i 1980.

Dansbo: 2/12/1980 1 syngende (PN), 7/7 4 syngende + 9/7 5 syngende (SND), 15/7 1 syngende (SND).

Sjundeengst: 22/12 2 syngende (HP), 7/6 2 syngende (HP), 18/6 2 syngende (SND).

Øvrige: 2/7/5 2 syngende Konge Sø Randers (JRR), 23/5 1 syngende Sorte Sø Skanderborg (BBH), 23/5 1 syngende Strand Sø (HLL).

Se appendix II 1980.

Flodsanger (Locustella fluviatilis)

Se appendix II.

Savisanger (Locustella luscinchioides)

1/12/1980 1 syngende i 1980. Syngende hele formlingen Tapdrup Sø (SND), 1/12/1980 1 syngende i 1980 i Sø (AJ) + (BBH d. 24/6).

Svartbjergsanger (Acrocephalus melanopeus)

Se appendix II 1976 og 1979.

Største partibjergsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Største partibjergsanger er først set af Nose i 1979. Den optalling foretaget af ØRF nummer 15 betragter syv syngende kaner. Den optalling i Solindsund på Sjursland (JJP) viser 5-8 ynglerepar. Øvrige optallinger viser 5 eller færre syngende fugle.

De første blev registreret 18/7 i hørt Brabrand Sø (JDK) og Lading Sø (SH). 15/8 1 syngende Rydning Fjord (BRJ, FL, JF), 17/5 1 syngende Endekilde, Brabrand Sø (SH).

Den første set af indrapporteret er meget sen: 17/10 1 Kysing Fjord (HP). Det betyder sig selv at den kommer fra Norge, hvor den ses indtil 14. av (Haftorn 1971).

Kærsanger (Acrocephalus palustris)

Minder i antal og ankomsttider om ovenstående art. Ligeledes største

yngeleokalitet: Bjerregrav Mose med 50 par.

De første hørtes: 10/5 10 Brabrand Sø (HLL), 10/5 1 Lading Sø (SH),
12/5 2 syngende Astrup Mose (BHJ, FL, PH), 19/5 2 syngende Moesgård
Strand (Moes). På Samsø (Hesselholm) blev den første registreret
30/5 (LB).

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)

Se appendix I.

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Bjerregrav Mose og Kolindsund er indrapporteret med de største tal for
optælling i yngletid. 15 territoriehævdende hanner Bjerregrav Mose
(Gejrf), 5 par Kolindsund (JPP).

Et forholdsvis stort antal, lokalitetens størrelse taget i betragtning
er: 22/5 10 syngende Kogslund, Randers. Tidspunktet er lige omkring
artens "form-kulmination" - så der er sikkert tale om rastende hanner.
Den første hørtes 6/5.

Brabrand Sø: 6/5 1 syngende (AJ, HM), 9/5 3 syngende (BHJ, PH), 14/5
21/5 2 syngende (EH), 2/6 1 syngende (EH).

Hæstrup Sø: 8/5 1 syngende (HF).

Yderligere iagttagelser fra flg. lokaliteter: Tornsbjerg-Hadrup Skov
(JPP), Moesgård Strand (Moes), Lading Sø (BH), Smørmosen v. Auning
(EH), Grund Fjord (EH), Kare Holm, Randers Fjord (EH).

Indberetning: på grund af indrapportering at notere om du mener, at der
er tale om en tilbage på de lokaliteter, du besøger.

Se appendix II 1983.

Sivensanger (Sylvia icterina)

Alle bidragsydere til denne art har de første i tidsrummet 15-29/5
De "felleførste": 15/5 1 syngende Moesgård Strand (Moes), 15/5 1
Søfåen (SMF), 17/5 2 syngende Grundfør Vdm (PN).

Munk (Sylvia atricapilla)

En art, der i de seneste år har vist fremgang.

De første: 11/4 1 syngende Høskoven (BHJ, PH, FL), 23/4 1 han Brabrand

Sø (S)

Vindmålingstasjonen 21+23 1/2 i hun M. Drachmannsvej, Aarhus (H+JE),
28-31/3 i Mosegård Strand (Moes + BHJ), 28. Brabrand (ETN)

Hørsanger (Sylvia borin)

Ligesom ovenstående i fremgang:

De første: 5/5 i Kasted Mose (NT), 10/5 i Brabrand Sø (JDK, AJ), 11/5
i syngende Mosegård Strand (Moes + BHJ) og i Brabrand Sø (HLL).

Tornsanger (Sylvia communis)

De første iagttager ved Brabrand Sø 5/5 1 (AJ), 6/5 1 (HLL), 8/5 2 (AJ).
På Gammel Hesselholm 29/5 1 (LB).
Kun en iagttagelse: 17/5 i Kystfjord (HF).

Kardesanger (Sylvia curruca)

De første: 28/4 i Brabrand Sø (HLL), 28/4 i syngende Reginehøj, Aarhus
(PNN), 28/4 i Mosegård Strand (Moes + BHJ), 29/4 i syngende Mårslet
(BHJ), 29/4 i syngende Kystfjord, Aarhus (AJ).

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

De første: 11/4 i Lading Sø (SH), 14/4 i syngende Bryrup Langsø (JB),
15/4 i Brabrand Sø (AJ), 15/4 i syngende Tåstrup Sø (PNN), 15/4 i rast
Fornæs Fyr (SH), 16/4 i syngende Mosegård Strand (Moes).
De sidste: 20/9 i Brabrand Sø (AJ), 29/9 Hesselholm, Samsø (LB).

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides)

Se appendix 1.

Gransanger (Phylloscopus collybita)

De første: 24/3 i syngende Brabrand Sø (AJ), 25/3 hørt Kysing Fjord
(NT), 29/3 i syngende Vilhelmsborg (BHJ), 30/3 2 Brabrand Sø (LaB, EH,
AJ), 30/3 hørt Kasted Mose (NT).

De sidste iagttagelser: 15/10 i syngende Brabrand Sø (PNN).

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

De første: 6/5 1 syngende Skovbakken, Randers (JRR), 9/5 1 syngende Moesgård (Moes, EH), 12/5 1 hørt Norring Vesterskov (JDK).

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

Fåtalig yngletrækfugl, som ankommer i maj, samt trækgæst.

Kun 6 oplysninger indrapporteret.

Første obs: 15/5 1-2 Brabrand Sø (AJ), 14/5 1 samme sted (EH) og 15/5 1 par Søften (SMJ). Desuden 14/6 1 hørt Brabrand Sø (EH), 15/6 1 Aarhus Seminarium (NA), 4/8 Hesselholm, Samsø (LB).

Bloget Fluesnapper (Muscicapa hypoleuca)

Sjælden til fåtalig yngletrækfugl (primo maj-aug) og trækgæst (maj og aug/sept).

6/5 1 han Rømerhaven (NA), 1 Brabrand Sø (HLL), 8/5 1 par Hesselholm Samsø (LB), 9/5 1 par Brabrand Sø (BHJ, PH), 1 han Bjerregrav Mose (JRR), 1 Hinnerup (SMJ), 10/5 1 hun Hesselholm (LB). Desuden en trækiagttagelse fra Samsø: 29/9 1 Hesselholm (LB).

Almindelig Fluesnapper (Muscicapa albicollis)

Se appendix II 1977.

Træsburre (Prunella modularis)

Almindelig yngletræk- og standfugl samt trækgæst i amtet. Alle indrapporterede er trækiagttagelser.

10/3 1 syngende Moesgård Strand (NA), 11/4, 12/4 og 15/4 er enkelte obs v. Hesselholm Samsø (LB). Endelig er gjort 18 obs ved Fornæs og Gjerrild i Påsken (13-18/4) med max 31 17/4 v. Gjerrild Strand (Stl).

Engpiber (Anthus pratensis)

Almindelig yngletrækfugl, som findes på amtets endnu uopdyrkede eng-, moser- og græsarealer. Ses almindeligt på træk (marts/maj og okt). De

(endelig rapportering 18. okt.) fra vintertiden tyder på, at den også kommer til at blive en særlig ynglefugl (se Sørvadse 1/31). Kun max 1000-1500 og efterårsmængden samt alle vinterlagttagelser.

Mar. 1961 og:

Opd. 14. 6. 775 v. Gjesrild NB; efterår 3/10 210 v. Fornæs (HC).

Alle vinterlagttagelser

4/1 1 Skovgaard SE (SE), 11/1 1 Brabrand SE (HLL), 11/1 1 Vysø; 11/1 1 Hjørne SE (HLL), 13/1 1 Astrup Mose (AJ), 20/1 3 Aarhus Ege (NÅ), 5/2 1 på mark v. Rysing Næs (HLL), 1/11 1 Vang S. (OCF), 17/11 1 Klostermølle (HHL), 1/12 5-6, 4/12 4, 6+8/12 10, 9/12 10, 20/12 15, 13/12 11 alle Skovgaard SØ (AJ), 10/12 2 Skanderborg SE (HHL), 22/12 6 Fornæs (SE).

Se appendix II 14-75

Markpiber (Anthus campestris)

Sjælden trækfugl (april maj) og meget sjælden sommergast/ynglefugl.

100-1500 er indrapporteret (1 er øvrigt Gejrfuglen 2/79).

14/4 1 Bakken Gjesrild og 16/4 1 Fornæs Fyr (Stl), 13/5 og 16/5 1 @ Gjesrild Fyr (SE); 8/5 1 @ Gjesrild Nordstrand (SD).

Skovpiber (Anthus trivialis)

Fordømmende ret almindelig yngletrækfugl og almindelig trækfugl (april maj). Kun 10 forårsfugle (1 er indrapporteret hvoraf 10 er foretaget i Påsken (Stl)).

Trækfugttagelser:

Tidligste 9/4 og 12/4 1 N Moesgård (NÅ), hvor også max 122 N (Moes) er talt den 6/5. Desuden 10 fagttagelser fra Fornæs/Gjesrild i Påsken (13-18/4) af 1-4 fugle (Stl).

Øvrige indrapporteringer:

11/4 1 Mark v. Ørting (SE), 12/4 1 Tornsbjerg-Hadstrup Skov (DLJ), 15/5 1 spærende Vilhelmsdal (SE), 22/5 1 ved skovfogedboligen "Frederiksbåb" Samsø (LB).

Skærpiber (Anthus spinoletta littoralis)

Meget sjælden ynglefugl (stand/strejff/trækfugl?) i amtet, som ses fåtalligt på træk (marts/april og sept/nov). Træffes ligeledes fåtalligt

overvintrende ved kysterne og meget sjældent på indlandslokaliteter.

Ynglefugle:

1 par Hov Røn (FC).

Vinteriagttagelser:

5/1 1 Aarhus Havn (HLL), 11/1 3 og 26/1 2 Kalø Slotsruin (HA), 26/1 1 Kysing Næs (HLL), 6/2 2 Egå Marina (NA), 9/2 1 Kysing Næs (HLL), 22/2 2 (JDK) og 1 (EH) ved Fornæs, 24/2 3 Aarhus Havn (NA), 27/2 1 Kysing Næs, 8/12, 11/12 og 18/12 1 Aarhus Havn (HLL), 20/12 3 syd for Grenå (CO), 20/12 og 27/12 1 Døde A, Brabrand Sø (H+JE).

Øvrige obs:

2/3 2 Aarhus Havn (HLL), 6/3 8 Kysing Næs (HLL), 29/3 19 på træk Fornæs (EH), i Påsken (13-18/4) 5 obs af 1-7 fugle Fornæs Fyr (St1), 18/4 2 Bakken Gjerrild (St1), 15/9 3 Overgård v. Mariager Fjord (KjH), 3/10 1, 8/11 4 og 22/11 5 alle Fornæs (CO), 14/10 1 syd for Grenå (CO), 23/10 3 Kalø Slotsruin (HA).

Alvid Vipstjert (Motacilla alba)

Formodentlig almindelig yngletrækfugl og trækæst (marts-sept) i hele amtet.

Første: 12/3 1 Kysing Fjord (JF), 19/3 1 Brabrand (KjH), 23/3 1 Søby (SMJ), 26/3 1 Hinnerup (PN), 28/3 1 Fussing Sø (PER).

Sidste: 30/9 Hesselholm Samsø (LB), 4/10 1 Alrø (PN), 6/10 1 Brabrand Sø (AJ).

Max trækobs: 14/4 23 Fornæs N (St1).

Besuden foreligger to oplysninger om fugle på overnatningsplads: 15/4 1 på Rønbæksøen Hinnerup (SMJ), 8/5 35 Tåstrup Sø (HP).

Sjærgvipstjert (Motacilla cinerea)

Sjælden (-fåtalig?) yngletræk-(stand?)fugl (marts/april-okt?), som især forekommer ved vandløb i den sydlige og vestlige del af amtet. Der få oplysninger om yngel i år, men det kan ikke betragtes som reelt (se f.eks. Lokalrapporten 1980). Træffes sjældent (?) overvintrende.

Ynglefund:

Lilleåen v. Hinnerup (PN), Glenstrup Sø (JRR).

Vinteriagttagelser: 4/1 og 10/1 1 Noring Enge (JDK), 22/2 2 Pinds Mølle (ØBF), 2/12 3 Pinds Mølle (ET).

Øvrige: 14/3 1 Kollens Mølle (ET, PMT), 17/3 3 Brabrand Sø (JR), 23/3

y Vedde Mølle (PH), 1 par Tarskov Mølle (AJ), 1/3 1 hun Ciber Å
 (NT), 2/3 1 par Ciber Å v. Vædehusborg (BHJ, PH, FL), 29/3 2 og 30/3
 1 Pinds Mølle (ET), 30/3 1 Torsø, Alsrode (OF), 31/3 2 N Moesgård Strand
 (NA), 1/4 1 hun Tarskov Mølle (AJ), 8/4 2 ØSØ Veggørslev (RD), 10/4 2
 Hassing Sø (PER), 5/4 1 par Kollens Mølle (ET, HET), 4 trækobs i Påsken
 (max 5) v. Kornæs/Gjerrild (STL), 15/4 1 han Glenstrup Sø (JRR, BRR),
 1/5 2 Pinds Mølle (HEU), 10/5 1 Vædehus Mølle (JTL), 31/7 1 Grundfør
 Mølle (SMO), 12/8 1 Sønderby Mølle (ØBF), 5/10 1 Dørug v. Hørning (ET),
 9/11 og 13/11 1 Pinds Mølle (HEU).
 Se appendix II 1975, 1978.

Gul Vandsnede (Botacilla alava)

2 hannar set i Østjylland. Hvis ikke andet er nævnt af indrapportøren
 er observationen betragtet som tilhørende nominatformen (Almindelig
 Gul Vandsnede). Ialt foreligger 27 indrapporteringer.

Almindelig Gul Vandsnede (M.f. alava)

Trækfugl set almindelig yngletrækfugl (med. april-aug) og ret al-
 mindelig trækfugl.

Heglesund

Sæls: 1 adsk. v. Vorret (2) (JB), Kolindsund (JJP), 3 par Bjerregrav
 Mose (Gejrf).

Første obs. 16/4 1 Kysing Fjord (JF), 21/4 1 Kolindsund (JJP), 23/4
 1 han Østerby Mose (BHJ), 27/4 1 han Brabrand Sø (AJ).

Sidste obs. 29/7 12 Aarhus Havn (CQP), 15/8 8-10 Salten Å v. Vorret (JB).
 Max træk: 205 Ø Gjerrild Nordstrand (RD).

Forrige: 2/5 1 Brabrand Sø (AJ), 4/5 1 han Døde Å Brabrand Sø (NA), 5/5
 1 Hinnerup (PN), 9/5 21 N Moesgård Strand (Moes), 10/5 7 Hesselholm,
 Samsø (LB), 11/5 10 hanner + 2 hanner Aarhus Østhavn (NA), 14/5 25
 Bjerregrav Mose (Gejrf), 18/5 1 N Moesgård Strand (Moes), 18/5 15-25
 Aarhus Østhavn (NA), 18/5 35 Galten Gammelose (BH), 23/5 4 N Moesgård
 Strand (Moes), 29/5 set Møgelmosen Samsø (LB), 29/7 12 Aarhus Havn (CQP).

Nordlig Gul Vipstjert (M.f. thunbergi)

Fåtalig - ret almindelig trækfugl som ses i maj undervejs til yngre-
 områdernes mod nord. 4 indrapporteringer foreligger.

9/5 og 10/5 5 Hesselholm, Samsø (LB), 14/5 39 Bjerregrav Mose (Gejrf),
 18/5 4 han + 2 hun Aarhus Havn (NA).


Se appendix II 1980.

Silkehale (*Bombycilla garrulus*)

Fåtalig - ret almindelig udbredt (i invasionsår almindelig - meget almindelig) træk og vintergæst (okt/nov-marts) spredt i amtet, dog med de største koncentrationer i Aarhus: Den udeblev fundstændigt i vinteren 80/81, hvorfra der slet ingen oplysninger foreligger (se også Lokalrapporten 1980), mens der må siges at være foregået en mindre invasion i efteråret 81. Der foreligger således 77 indrapporteringer, hvoraf de 49 er fra det centrale Aarhus. De århusianske flokke når i november en størrelse på 100-500 fugle, mens flokstørrelsen aftager meget i december (mindre end 10 fugle pr. flok) (se figur). Alle obs udenfor Aarhus C nævnes, samt første og største obs, Aarhusobs er indtegnet i figuren.

Første obs: 11/10 ca 15 Busgaden Aarhus (PNN), 1/11 15 Dr. Margrethes vej Aarhus (HB), 2/11 25 Kolind (JPP), 6/11 >100 Mølleparken Aarhus (JTL, SH).

Øvrige: 7/11 17 på træk Stavns Fjord (DOF), 12/11 21 Hinnerup (PN), 12/11 ca. 15 Tranbjerg (BJH), 13/11 15 Koling (JJP), medio nov. 1 på Børup v. Hørning (ET), 16-25/11 208 Randers (JRR), 19/11 1 Hammer (JL), 23/11 1 Alsrode (OF), 23-27/11 93-500 Viby Amtsgymnasium (BHJ, PN), 25/11 1 Brabrand (LaB), 1/12 200 Risskov (PJJ), 1/12 4 Bryrup (JB), 4/12 60 Aarhus N (PN), 10/12 10 Risskov (HLL), 10/12 5 Brabrand Se (AN), 11/12 5 Brabrand (LaB), 11/12 4 Aarhus Havn (NA), 20/12 >10 Bønde (ET), 20/12 5 Havknuden s.f. Grenå (CO), 22/12 2 Hørning (ET), 23/12 23 Brabrand (JTL), 26/12 2 Grenå (CO).
Se appendix II 1978.



Figur 50. Silkehale, Storåarhus 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser maksimal forekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.


Stor Tornskade (Lanius excubitorides)

Ses fåtalligt som værende og vil søvest (primo okt.-april) (figur).
 11/1 1 (GG), og 2 (MF Mose), 11/2 1 Ry (GG), 22/2 og 1/3 1 Bjerregrav
 Mose (Gøjrsø, JRR, EH, BRR, KEH), 31/3 1 Gjerrild (HLL), 4/4 1 Gjerrild
 Nordskov (OF), 5/4 1 Salten Langsø, 3/10 1 Stansmark v. Fornæs (CO),
 4/10 1 Mols Bjerge (HB), 17/10 1 Kysing Fjord (GG, PH), 18/10 2 S
 Sletterhage Fyr (JTL), 22/10 1 Pletten Mariager Fjord (JRR, BRR, KEH),
 6/11 1 Salten Langsø vest. (MF), 11/11 2 Salten Langsø (MF), 28/11 1 Pletten
 Mariager Fjord (JRR, JM, AW), 3/12 1 Fugleø Bæk Enge (JRR), 6/12 1
 Rye Møllekov (DOF), 28/12 1 Bjerregrav Mose (NÅ).
 Se appendix II 1976.

Rødrygget Tornskade (Lanius borealis)

Forekommer fåtalligt som ynglefugl spredt i amtet (maj-aug). Ses få-
 talligt (=net almindeligt?) på bæk forår (primo maj/juni) og efterår
 (aug/sept). Af figurer ses at Stor Tornskade og Rødrygget
 Tornskade sandsynligvis ikke foretrækker samtidig i Østjylland. Ialt
 foreligger 73 indrapporteringer
 Ynglefand.

St. Vorbjerg Samsø (LB), Øberup Skov (JJP), Borum Stormose (JTL), Nød-
 ager (JJP), 2 par Kysing Fjord (BHJ, FL, KHe), 8 par Salten Langsø
 (JTL, DOF, JB), 2 par v. Mols Løb (JTL), 1 par Øer-området (FF), 1-2
 par Norring Vesterskov (JDK, SMJ), 3 par Katholm Skov (OF), 1 par
 Tornsbjerg-Hadrup Skov (DLJ), 2 par Lading Sø (BH, LPJ).



Figur 51. Stor Tornskade og Rødrygget Tornskade, Århus Amt
 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede antal Stor Tornskade (lukket søjle) og
 Rødrygget Tornskade (åben søjle) pr. 5-dagsperiode.

Rødhovedet Tornskade (Lanius senator)

Se appendix II 1972

Grønsisken (Carduelis spinus)

Sjælden (Måske fåtallig) ynglefugl meget spredt i amtet. Ret almindelig til almindelig træk- og vintergæst (medio sept-april), som kan optræde invasionsagtigt. Der foreligger 85 obs, hvoraf de 35 er fra Brabrand Sø (figur 52), 10 er trækobs fra Moesgård (Moes), mens 14 er fra Fomme Gjerriild, hvor der i Påsken (14-19/4) er set fra 1 til 107 fugle (fra Gjerriild 17/4) på træk (St1). Kun ynglefund, sommeriagttagelser og større flokke (over 40 individer) nævnes.


Ynglefund:

Nørreris og Norring Vesterskov (SMJ), 1 par Vrold Skanderborg (SC), muligvis ynglepar Dråby Sø (JTL).

Sommeriagttagelser: 5/7 1 Sondrup Bakker (HLL), 14/7 ca. 25 Nørreris (SMJ), 17/7 ca. 50 Norring Vesterskov (SMJ), 23/7 2 hørt Salten Løngård (NA).

Større flokke: 4/1 100 Aarhus Å v. Aby Eng (HET), 23/9 81 Riiskov (HLL), 30/9 50-60 Løgten (AF), 11/10 45 Fornæs (HLL), 19/10 150 S Slettevej Ege (JTL), 20/10 ca. 50 Bryrup (JB), 26/10 125 Pindes Mølle (ET), 28/10 88 Janesvej Brabrand (LaB), 28/12 60 Galten (AJ).

Se appendix II 1978, 1980.



Figur 52. Grønsisken, Brabrand Sø 1/1 - 31/12 1981. Figuren viser maksimal forekomst pr. 5-dagsperiode.

Tornirisk (Carduelis cannabina)

Almindelig yngletrækfugl og trækgæst (marts/maj og nov?), ligesom den optræder som fåtallig vintergæst (dec-feb). Bortset fra en yngle-

mulig vintertid i p. Bayum (SMJ), Vørrerlis (SMJ), Bjørnholm Kær og Alsønder (OF).

tidligere obser: 5/5 1 han Aarhus Rådebane (NA), 15/5 Lading Sø (BH), 19/5 1 Brabrand Sø (JR), 19/5 1 Kysing Fjord (KHe).

tidligere obs: 14/8 1 han Skærbæk (AJ), 23/8 1 juv. Sønder (SMJ), 7/9 1 juv. Fornæs (CO), 12/9 1 juv. Kysing Fjord (BRR, FL).

Øvrige: 21/3 1 Brabrand Sø (NA), 21/3 1 Åskelund v. Aarhus Å (KHe), 21/3 1 hun Minsøparken Aarhus (AJ), 21/3 1 han Pindes Mølle (ET), 23/5 1 par Skærbæk Plantage (JB), 24/5 1 Brøndskoven N-Djursland (HB), 21/7 1 han Brabrand Sø (NA), 29/5 1 Vestborg Fyl (DOF, LB), 29/5 1 han Klapskov (SMJ), 30/5 1 han Måne Skov og Nørup Havn (DOF, LB), 31/5 1 han Sæding (JRR, EH), 31/5 1 Lading Sø og 1 han Tølløkke Skov (ØBE), 5/6 1 han Tomkær, Ålsøde (AJ), 6/6 Hesselholm Samsø (LB), 13/6 1 par Gjerrild Strand (OF), 25/6 1 Kysing Fjord (BRR), 2/7 1 par Åleø (OF), 4/7 1 par Glatved (OF) og 1 han Lyngebæk (AJ), 5/7 4 Lading Sø (BH), 9/7 1 han Ajstrup (KHe), 11/7 1 han Nørningøre (SMJ), 14/7 1 han Kysing Fjord v. Nørning (BRR), 2 Salten Langsø, sørsiden (DOF), 19/7 Hesselholm Samsø (LB), 20/7 1 juv. Kysing Fjord og 1 juv. Kysing Næs (JDK), 23/7 1 par Lading Sø s.f. Salten Langsø (NA, OF), 24/7 1 v. Tinning Skov (PM), 28/7 1 han + 1 juv. Gjerrild Strand (BRR, FL), 29/7 1 han Brøndstrup (BRR), 1/2 5 Kysing Fjord (H+JE).

Se appendix II 1978.

Nærubåder (Coccothraustes coccothraustes)

Forekommer som fåtallig ynglefugl i amtet (Gejrfuglen 1/81), og ses fåtalligt - ret almindelig (P) som træk- og vintergæst (nov. - ultimo nov.). Ingen yngleplysninger fra i år, men et enkelt sommerfund.

Sommerfund: 7/6 2 Salten Langsø (DOF).

Øvrige: 2/1 1 Botanisk Have (NA), 6/2 og 17/2 1 Skovbakken Randers (JRR), 18/2 1 Brabrand Sø (KHe), 21/2 8 Vrold Skanderborg (GG), 17/4 1 Dystrup-Ranten Sø (HP), 4/5 1 Skovbakken Randers (JRR), 22/5 1 han Dørup v. Hørning (ET), 23/5 1 trak v. Brøndstrup (EH), 18/11 1 Pindes Mølle (ET), 5/12 Brabrand Sø (AJ), 5/12 5 Ndr. Kirkegård Aarhus (PJJ), 9/12 5 Botanisk Have (NA), 12/12 1 Brabrand Sø (KHe), 15/12 1 Åby Eng v. Brabrand Sø (AJ), 18/12 1 Langenæs Alle Aarhus (AJ), 19/12 3 Schleppegrellsgade Aarhus (HLL), 28/12 1 hun Åbyhøj (HET).

oplysning (1 par Hesselholm Samsø (LB) foreligger kun forårstræk-
 iagttagelser og enkelte vinterobs. Ialt er 30 indrapporteringer, hvoraf
 af 20 er fra Påsken (Fornæs/Gjerrild) med 3-77 fugle (Stl).
 Vinteriagttagelser: 16/2 hørt Brabrand Sø (EH), 3/12 2, 8/12 3, 26/12
 15-20 og 27/12 5-10 Aarhus Havn (PH, HLL).
 Øvrige: 9/3-9/5 278 på træk Moesgård Strand (max 56 N 14/4) (Moes, NA),
 28/3 110 Fornæs (HC).

Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Ret almindelig træk- og vintergæst (sept/okt - medio marts) langs
 amtets kyster. Forekommer sjældnere (i mindre flokke?) på indlands-
 lokaliteter. 45 obs foreligger.

Indlandsiagttagelser: 4/1 1 Vilholt Mølle (DOF), 4/1 10 Brabrand Sø
 (PMT, ET), 6/1 5 og 11/1 15 Brabrand Sø (HLL), 7/1 1 Mølleparken Aarhus
 (NÅ), 10-18/2 15 Kemisk Institut, Aarhus (JE), 3/2 40 (JTL) og 11/2
 30-50 + 16/3 20 (AJ) og 30/8 16 Brabrand Sø (LPJ), 13/10 10 Østerby
 Mose (BHJ), 21/10 40 Solbjerg Sø (BHJ), 25/10 60 Mygind Marker (O),
 10/11 5 Botanisk Have Aarhus (NÅ), 20/12 6 Brabrand Sø vestenden (NÅ).
 Aarhus Havn: 5/1 4 (HLL), 17/1 26 (PH, BHJ), 20/2 50 (NT), 24/2 30 (NT),
 10/11 25 (NT), 3/12 - 27/12 er foretaget 9 obs af 9-90 fugle (HLL, NÅ,
 NÅ, KHe).

Øvrige: 11/1 10 Mariager Fjord (H+JE), 22/2 6 Horskær (LPJ), 15/3 50
 Overgård v. Mariager Fjord (ØBF), 22/3 115 Kure Holm og 6 Sødringsø
 Randers Fjord (JRR, BRR, EH), 28/3 18 Fornæs (HC), 14/4 22 N Moesgård
 Strand (Moes), 14/4 32 Moesgård Strand (NÅ), 12-15/4 1-2 Fornæs/Gjerrild
 (Stl), 23/10 12 Kysing Fjord (BHJ, FL), 24/10 17 Pletten Mariager Fjord
 (JRR, BRR, KEH), 28/11 275 Ajstrup Bugt Mariager Fjord (JRR, AJ, SM),
 13/12 8 Randers Fjords udløb (JRR).

Gråsirken (Carduelis flammea)

To racer optræder (Almindelig Gråsirken (C.f. flammea) og Lille Grå-
 sirken (C.f. cabaret)), men de er næsten umulige at skæle fra hinanden,
 hvilket der derfor ikke er gjort. Ynglefundene skulle dog være Lille
 Gråsirken, mens vinterfundene skulle være Almindelig Gråsirken. Grå-
 sirken optræder som meget sjælden til sjælden yngletrækfugl, mens den
 ses ret almindeligt - almindeligt som træk- og vintergæst (sept?/nov-
 april/maj). Den kan med års mellemrum optræde som invasionsfugl.

Engelmann: 1 var Bjerregrav Mose (Gejrf).

Mållø Langsø 2/5 1 syngende Mossø (DOF), 31/5 5 syngende Hassenø (JRR).

Andre: 1/2 1 Støvringgård Skov (JRR), 5/4 1 hørt Vold (GG), 5/4 1 N Moesgård Strand (Moes), 6/4 3 Fornæs (HLL), 12-19/4 1-31 Fornæs/Gjerrild (Stl), 24/4 20 Anholt (NT), 4/5 1 N Moesgård Strand (Moes), 9/5 1 Støvringgård Skov (JRR), 27-1 1 N Moesgård Strand (Moes), 13/6 1 Fuglsø (HLL), 18/6 1 Bjerregrav Mose (JRR, ØBF, SH), 19/7 2 Fornæs og Gjerrild Strand (JDK), 21/7 5 trk Fornæs (HC), 23/7 1 Søften (SMJ), 27/7 2 Gjerrild Strand (BHJ), 27/7 1 Mørreris (SMJ), 1/8 1 S Boels Rev (JRR, BRR, KEH), 6/9 1 Salten Langsø (DOF), 19/9 8 Brabrand Sø (HLL), 3/11 2 trk Gudenåen v. Randers (JRR), 15/11 4 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 19/11 12 Bodil Mølle (ST), 26/11 1 Flads Mølle (ET), 28/11 10 Sødringhede (JRR, AJ, JM), 1/12 2 Brabrand Sø (AJ), 5/12 1 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 10/12 2 Brabrand Sø (AJ), 28/12 12 Bentesvej Brabrand (BHJ, PH).

Se appendix II 1980.

Karmindepap (Carpodacus erythrinus)

Optræder som meget sjælden gæst i det sene forår, hvor den kommer med milde østlige vinde. Kun en undrappotertering foreligger: 13/6 2 hanner sang ved Fornæs (CO).

Se appendix II 1980.

Korsnæb sp (Loxia sp.)

14/11 9 Gjerrild (CO), 6/12 1 hørt v. Øjesø (CO).

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra)

Sjælden ynglestrejffugl i amtet. Optræder spredt som trækgæst året rundt, dog hyppigst i forbindelse med invasioner. Kun 6 observationer foreligger.

17/1 1 rast Moesgård Strand (Moes), 1/3 2 Salten Langsø (HP), 5/4 5 syngende Salten Langsø (DOF), 23/5 5 trk Bjerregrav Mose (Gejrf), 7/6 10 Salten Langsø (DOF), 15/11 2 Fuglsø Bæk Enge (JRR).

Se appendix II 1978.

Hortulan (*Emberiza hortulana*)

Meget sjælden-sjælden (men regelmæssig?) forårs- og sommergast (april-juni). Der foreligger 2-3 iagttagelser.

16/4 1 Gjerrild Strand (St1), 8/6 1 syngende Gjerrild Strand (RD).
Desuden muligvis 1 17/4 Gjerrild (St1).

Pileværting (*Emberiza rustica*)


Se appendix II 1977.

Oværgværting (*Emberiza pusilla*)

Se appendix II 1974

Kørspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Meget almindelig forekommende ynglefugl ved søer og moser i amtet. Spredt almindeligt på træk og mødes overvintrende. Kun 20 oplysninger er indsendt.



Yngletand:

1 par Kesselholm Samsø (LB), 1 par Tornbjerg-Hadrup Skov (DLS), 1 par Søby Rev (FC), 1-2 par Galten Gammelose og 2-3 par Galten Sømose (BH), 48 par Bjerregrav Mose (Gejrø)

Trækobs:

af 1-8 fugle (12 obs) 13-18/4 - Fornæs/Gjerrild (StL).

Snespurv (Plectrophenax nivalis)

Ret almindelig træk- og vintergæst (nov - marts/april) langs amtets kyster. Sjælden på indlandslokaliteter.

5/1 4 Aarhus Havn (HLL), 28/2 30 Skirø (HP), 6/3 1 hun + 1 juv. Kysing Næs (HLL), 13/3 25 Thorsø Næs (HLL), 14/3 12 Aarhus Havn (HLL), 27/3 1 og 6/11 2 Kysing Fjord (HLL), 8/11 2 Kysing Fjord (BHJ, FL), 15/11 69 Fuglsø Bæk Enge (JRE), 15/11 4 5 Fornæs (JRR, BRR, KEH), 28/11 9 Randers Fjords udløb og 29 Ejersrup Bugt Mariager Fjord (JRR, JM, AJ), 2/12 ca. 40 og 3/12 2 hun + 1 juv. Aarhus Havn (HLL), 11/12 42 Aarhus Havn (AJ), 8/12 55 Aarhus Havn (HLL), 9/12 2 Aarhus Fælled (NA), 10/12 4 hun + 2 hun Døde & Brabrand Sø (AJ), 11/12 54 Aarhus Havn (HLL), 13/12 6 Randers Fjords udløb (JRR).

Se appendix II 1980.

Appendix I

Nedenstående observationer skal forelægges Sjældenhedsudvalget (SU) til godkendelse.

To foreign readers. The species in this appendix have not yet been accepted by the rarity committee.

Stor Skrigeørn (*Aquila clanga*)

17/4 1 trk Gjerrild (GG, HP) og 4/7 1 Stubbe Sø (AJ)

Små Skrigeørn (*Aquila pomarina*)

15/5 1 Ø Gjerrild Fyr (RD)

Hvidvinget Måge (*Larus glaucooides*)

2/3 1 3K N Moesgård Strand (NÅ)

Sørhovedet Måge (*Larus melanocephalus*)

13/5 1 juv. Brabrand Sø (JTh)

Pungmejse (*Remuz pendulinus*)

14/5 1 han + 1 Bjerregrav Mose (Gejrf)

Flodsanger (*Locustella fluviatilis*)

22/5 1 hørt Bjerregrav Mose (GG, HP, Gejrf)

Lettisanger (*Cettia cetti*)

7/6 1 syngende Gjerrild Nordstrand (RD)

Baskrørsanger (*Acrocephalus dumetorum*)

22/5 1 syngende Aarhus Å v. Søren Frichs Vej (NÅ)

Lundsanger (*Phylloscopus trociloides*)

7/6 2 syngende Gjerrild Nordstrand (RD)

APPENDIX II (Eldre iagttagelser)

1972

- *Nathejre (*Nycticorax nycticorax*): 23-24/5 1 ad. Ry Møllesø (H.N. Garner).
- *Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*): 1/4 1 han Nordisamsø (Hans Vohlmuth).
- *Grønlandsk Stenpikker (*Oenanthe oenanthe leucorhoa*): 22/5 1 rnk. Hjelm (KjH).
- *Rødhovedet Tornskade (*Lanius senedon*): 6/6 1 ad. hun Aarhus (Knud Pedersen).

1973

- *Mellemkjove (*Stercorarius pomarinus*): 23/5 1 ad. lys Hjelm (KjH).
- Isfugl (*Alcedo atthis*): Har ynglet ved Fussing Sø siden 1973 (PER).
- *Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): 23/5 1 ad. rnk. Hjelm (KjH).

1974

- *Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 6/6 1 Sangstrup Klint (Tove Skjødt og Steen Kjærlund Hansen).
- *Dværgværting (*Emberiza pusilla*): 22/5 1 rnk. Hjelm (KjH).

1975

- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 30/3 og dagene derefter i Fussing Sø (PER). Bringer totalen op på 13 eks. dette forår.
- *Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus*): 27/4-12/5 1 ad. Hjelm (KjH), 7/9 i skudt Brabrand Sø (rnk. 19/6 1975 ved Sortehavet, USSR).
- Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): har ynglet ved Fussing Sø siden 1975 (PER).

1976

- Pibesvane/Sangsvane (*Cygnus bewickii/cygnus*): 4/3 4 Pibesvaner Brabrand Sø (AJ), rettes til Pibe-/Sangsvaner.
- Bramgås (*Branta leucopsis*): 12/11 200 S Brabrand Sø (AJ), rettes til "12/11, formodet Bramgæs".
- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 27/4+29/4+13/6 1 Fussing Sø (PER). Bringer

totalen op på 20 ex.

- Skovsneppe (*Scolopax rustica*): 27/3 5 St. Ravnsbjerg, Viby, 27/3 3
 Arslevskoven, 29/3 1, 30/3 1, 3/4 1, 4/4 1, 5/4 1 alle St. Ravnsbjerg
 Viby, 7/11 1 Arslevskoven (alle Søren Loft).
- *Pungmejse (*Remiz pendulinus*): 9/8 1 han, rnk. Brabrand Sø (Michael
 Anker).
- *Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): 9/5 1 rnk. Hjelm (KjH).
- Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): 9/5 1 Mariendal Havbakker (AJ).

1977

- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 31/7 1 Salten Langsø (JB).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 16/12 1 Kvindsø-Kulsø (JB).
- *Hvidhalset Fluesnapper (*Muscicapa albicollis*): 8/5 1 han, rnk. Anholt
 (Michael Anker, NA), 14/5 1 han, Sønderby Skov, Alrø (Niels Anton
 Petersen, AJ), 15/5 1 han Lisbjerg Skov (Carsten Janus Andersen, Børge
 Skriver, Michael og Søren Brinch Pedersen).
- Desuden en mundtlig meddelelse om endnu en fugl med. maj, som bør
 lægges SU).
- *Pileværbling (*Emberiza rustica*): 23/5 1 hun, rnk. Anholt (Michael Anker
 NA).

1978

- Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 7/5 1 Salten Langsø (JB).
- Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 6/5 1 Bryrup - sætter sig i en græs-
 løst (JB).
- Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 2/11 7 ad. Mørke Kær (JTL).
- Pibesvane (*Cygnus bewickii*): 2/12 5 Salten Langsø (JB).
- Grågås (*Anser anser*): 18/4 1 V Aarhus (JTL), 21/4 min. 5 og 7/5 2 par
 Salten Langsø (JB), 4/8 12 S og 8/8 9 Ø Helgenæs (JTL).
- Knortegås (*Branta bernicla*): 25/3 4 rast Kalø Vig (JTL).
- Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): 4/11 1 Salten Langsø vest (JB).
- Havørn (*Haliaëtus albicilla*): 20/10 1 ad. (Ebbe Teibel) og 22/10 1 ad.
 (JTL) Kysing Fjord.
- Hvepsevåge (*Fernis apivorus*): 29/7-12/8 ialt 12 S Helgenæs (JTL).
- Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 2/11 1 brun Løvenholmskovene (JTL), 4/11
 1 hun Salten Langsø (JB).
- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 22/4 1 Salten Langsø vest (JB). Forårs-
 totalen bliver herefter 10-11 ex.

- Dværgfalk (*Falco columbarius*): 21/4 1 han Vinding (JB), 21/4 1 han Katrinedal (JB) og 22/4 1 han Salten Langsø vest (JB). Måske samme fugl? Bringer forårstotalen op på (12-)14 ex.
- Fjord-/Havterne (*sterne hirundo paradisaes*): 1/8 30-40 Bryrup Langsø (JB).
- Isfugl (*Alcedo atthis*): 1 par Lyngbygård Adal (JTL).
- Grønspætte (*Picus viridis*): 1 par Trige Skov (JTL).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 18/10 1 Velling Skov (JTL). Iflg. lokale 1-2 fugle set siden foråret 1978 og 17/10.
- Toplærke (*Galerida cristata*): 8/10 9 Vejlbj Kirke (JTL).
- Landsvale (*Hirundo rustica*): 25/9 1 albino Bryrup (JB).
- Ravn (*Corvus corax*): 5/7 1 par med 3 juv. syd for Fløjstrup Skov (JTL).
- Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): ult. jan 1 i have i Risskov (Henning Jensen).
- Halemejse (*Aegithalos caudatus*): 1 par Søsken, Brabrand Sø (JTL).
- Skægmejse (*Panurus biarmicus*): 1/3 1 nordsiden af Brabrand Sø (JTL) 3. obs fra 1978.
- Drosselrørsanger (*Accrocephalus arundinaceus*): 15/6 1 syngende Mørke Kær (JTL) har nu fået en eksakt dato. Var nævnt som pr. juni i 1978-rapporten. Ved Brabrand Sø sang fuglen kun til 16/6 og samme steds gennem hele perioden fra 20/5 - 16/6.
- Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 1/4 1 @ Gjerrild (JTL), 1 par Madse Bæk, Constantinsborg ved Brabrand Sø (JTL).
- Silkehale (*Bombycilla garrulus*): 1/1 ca 90 og 25/12 6 nordsiden af Brabrand Sø (JTL).
- Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): 1 par Kysing Fjord, 1 par Lading Sø, 3 par Hinnerup, 1 par Helgenæs (3/8 1 han Fuglsølejrer, Djursland (alle JTL).
- Grønsisken (*Carduelis spinus*): 3/8 1 Sletterhage Fyr, Helgenæs (JTL).
- Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): 5/8 ca 65 SV Helgenæs (JTL).

1979

- *Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 12/4 1 dødfundet Karlby Klint, Djursland (EH), 13/4 1 dødfundet Anholts nordkyst (Mads-Perter Heide-Jørgensen)
- Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 6/5 3 og 16/5 2 ad. Salten Langsø (JB).
- Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 28/5 1 Salten By (JB).
- Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 16/12 2 ad + 3 juv. Lykkendalsvej, Brabrand (LaB).
- Kongeørn (*Aquila chrysaëtus*): To iagttagelser af formodentlig samme

Fugl. 8-30/11 1 Syd-Djursland (JTL), okt/nov 1 juv. Katholm Skov (aer/delt OF).

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 1 par Fusingø (PER).

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 21/8 2 juv. Kvind Sø (JB).

Hvidklire (*Tringa nebularia*): 20/8 1 Salten Langsø vest (JB).

Drosselrørsanger (*Accrocephalus arundinaceus*): 3/6 1 Brabrand Sø (JTB).

Engpiber (*Anthus pratensis*): 18/10 100 SSV Helgenæs (JTL).

1980

Nordisk/Sorthalset Lappedykker (*Podiceps auritus/nigricollis*): 30/12 1 S Fornæs (RD).

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps griseigena*): 5/4 6 Horskær (SH).

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 21-26/4 1 Brabrand Sø (KHe), 21/7 2 Vråds Sande (JB), 16/11 2 Salten Langsø vest (JB).

Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): Yderligere 2 ynglefund. 1 par Randlev-Ørting Mose (SS), 1 par Vilhelmsborg - 2 kuld med henholdsvis 3 og 4 pulli - (BRJ). Desuden 30/10 4 Brabrand Sø (KHe).

Gule (*Morus bassanus*): 12/8 1 2K Aarhus Havn, ydermolen (Carsten Gannu Andersen) og 22/11 1 adl. fundet skudt! Kysing Strand (Johannes Sørensen).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): 6-7 ynglepar ved Moesgård (SH).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 16/11 18 Salten Langsø vest (JB).

Pibesvane (*Cygnus bewickii*): 16/11 14 Salten Langsø vest (JB).

Grågås (*Anser anser*): 24/10 175-200 Grund Fjord (FFa).

Rustand (*Tadorna ferruginea*): 20/7 1 Brabrand Sø (KHe).

Gråand (*Anas platyrhynchos*): marts 70 Grund Fjord (FFa) og 2/11 ca 100 (løst anslået) Salten Langsø vest (JB).

Krikand (*Anas crecca*): et ynglefund, 29/6 1 hun på rede Begtrup Røn (SH). Desuden 19/4 60 Brabrand Sø og 2/11 ca 100 Salten Langsø (SR).

Atlingand (*Anas querquedula*): 16/5 1 par Lading Sø (SH).

Pibeand (*Anas penelope*): april 125 Grund Fjord (FFa), 12/10 3-10 Salten Langsø vest (JB).

Spidsand (*Anas acuta*): 1-4/4 1 Brabrand Sø (KHe).

Taffeland (*Aythya ferina*): 16/5 1 han Lading Sø (SH).

Hvinand (*Bucephala clangula*): 14/7 2 hunner Kulsø (JB).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): 14/12 ca 100 (JB) og 26/12 min 100 (SH) Salten Langsø.

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): 13/4 1 par Bjerregrav Mose (Gejrf) - indlandsiagttagelse.

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): 2/3 19 Kysing Fjord (SH).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): 20/1 1 Odder (KB).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 11/4 1 Ålsrode (OF), 14/5 3 Alsø (OF), 15/5 1 N Constantinsborg Enge, Brabrand Sø (KHe). Bringer forårstotalen op på 15 ex. mellem 16/3-15/5.

Havørn (*Haliaëtus albicilla*): 26/10 1 juv. (HB), 2/11 og 21/12 1 juv. (JB) alle fra Salten Langsø.

Hvæpsevåge (*Pernis apivorus*): 8/7 1 par Anholt (Martin Seeberg Lembe). NÅ kommentar: Kan næppe være yngel. Der er ikke større sammenhængende løvskov af passende alder til Hvæpsevåge på Anholt.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 3/5 1 han Tåstrup Sø (SH), 4/5 3 (1 han + 2 hunner) Brabrand Sø (LaB).

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 6/1 1 Kysing Fjord (SH), 14/3 1 hun Ålsrode (OF) og 15/3 1 han Tomkær (OF). Nu 31 iagttagelser for hele 1980.

Duehøg (*Accipiter gentilis*): Mulig yngel Fussig Ø (PER) og 16/11 1 hun Salten Langsø (JB).

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 13/4 1 Katholm Skov (OF), 10/5 1 Tomkær (OF), 3-4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), aug/sept 1 Grund Fjord (FFa), 10/9 1 og 19/9 1 Fussing Sø (PER) bringer totalen på 46 ex.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 27/3 1 Ålsrode (OF). Nu med korrekt observatørnavn.

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 16/5 1 N Constantinsborg Enge, Brabrand Sø (KHe).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Yderligere 5 indrapporteringer, der ændrer det viste skema til maj 17, juni 8, december 10.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 2/2 1 og 24/8 1 Brabrand Sø (KHe).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): Hesselholm: 3-5 ynglepar. Set på stedet i tiden 3/4-8/8. 4/4 70 Barnekold, 7/9 4 Armhoved og 25/10 1 Issehoved. Alt er fra Samsø og skyldes (LB).

Vibe (*Vanellus vanellus*): Hesselholm: 5-6 ynglepar. Set på stedet i tiden 3/4-26/10 (LB).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): 23/5 ca. 50 NØ kl. 21.40 + ca. 100 NØ kl. 21.45 Mårup Plantage, Samsø. Hesselholm, Samsø: 26/7 1, 2/8 1, 3/8 1 + 5 SV, 4/8 18 V, 7/8 5, 22/8 1, 23/8 3, 24/8 ca. 15, 7/9 7, 20/9 1. Alle iagttagelser skyldes (LB). Disse obs var beklageligvis gledet udi 1980 rapporten.

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): Følgende fra Samsø: 24/7 2 Hesselholm, 29/7 4 Barnekold, 23/8 3 Hesselholm, 23/8 9 SV + 4 og 24/8 1 Hesselholm, 4/10 5 ved Nørreskifte (alle LB).

- Skovsnepe (*Scolopax rustica*): 2/3 1 Brabrand Sø (KHe) og 23/5 2 ~~Plantage~~ Plantage (LB).
- Stor Regnspove (*Numenius arquata*): 5/4 100 Horskær (SH) og 1/5 1 ~~Plantage~~ grav Mose (Gejrf).
- Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 4/5 1 Bjerregrav Mose (Gejrf).
- Svæleklixe (*Tringa ochropus*): Hele maj + 27/7 - hele august 2 Vilhelmsborg (BHJ), 3/6 + 4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Tinksmed (*Tringa glareola*): 9/5 3 Brabrand Sø (KHe), 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Sortklixe (*Tringa erythropus*): 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Hvidklixe (*Tringa nebularia*): 29/6 1 Begtrup Røn (SH).
- Mudderklixe (*Tringa hypoleucos*): 4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), multi yngel, idet 2 ad + 1 juv. blev set 16/6 + 5/7 Vilhelmsborg (BHJ).
- Islandsk Ryle (*Calidris canutus*): 5/10 180 Grund Fjord (FFa).
- Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Brushøne (*Philomachus pugnax*): 29/4 20 Brabrand Sø (KHe), 29/6 50 Begtrup Røn (SH).
- Alkefugl sp. (*Alcidae*): 30/12 958 N + 2808 S Fornæs (RD).
- Lunde (*Fratercula arctica*): 30/12 1 N Fornæs (RD).
- Huldue (*Columba oenas*): 6/4 2 Moesgård ved Hejrekolonien (SH).
- Skovhornugle (*Asio otus*): 15/6 2 juv. Kasted Mose (SH).
- Isfugl (*Alceda atthis*): 1 par Stubbe Sø (observatøren ukendt), 31/11 1 og 5/12 1 Brabrand Sø (KHe).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 16/3 1 Vrads Station (JB).
- Vendehals (*Jynx torquilla*): 24/5 + 29/5 1 Bryrup (JB) og 28/5 1 Gludsted Plantage (JB).
- Sortkrage (*Corvus corone corone*): 24/8 1 Brabrand Sø (KHe).
- Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 2/11 1 mellem Ørum og Grenå (JY).
- Vandstar (*Cinclus cinclus*): 2/2 8 Aarhus Å, Bodil Mølle-Tarskov Mølle (SH).
- Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 7/12 min 1 Salten Langsø vest (JB).
- Ringdrossel (*Turdus torquata*): 9/5 1 han Brabrand Sø (KHe).
- Grøshoppesanger (*Locustella naevia*): 0-1 par Ørting Mose (SS), 15/5 1 syngende Kasted Mose (SH), maj 1 hørt Grund Fjord (FFa), 10/6 + 15/6 1 syngende Kasted Mose (SH).
- Sivsanger (*Acrocephalus palustris*): 16/5 3 hørt Lading Sø (SH).
- Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava thunbergi*): 16/5 30 Lading Sø (SH).
- Grønsisken (*Carduelis spinus*): 2/2 120 Pinds Mølle (SH).
- Gråsisken (*Carduelis flammea*): 15/5 1 hørt Kasted Mose (SH) og 21/12 50-100 Salten Langsø vest (JB).

Karrhönsgräs (*Carpodacus erythrinus*): 5/6 1 yngende, 6/6 1 ♀ + 6
yngende + 1 hun rast Gjerdild Nordstrand (RD).

Skarv (*Electroplana nivalis*): 21/12 10 Brabrand Gø, Eskelund (KHe).

NOTATED

LITTERATUR

- Laursen, Jørgen Terp 1981: Gråstrubet Lappedykker - Gejrfuglen 17: 78-83.
Laursen, Jørgen Terp 1981: Kærnehider - Gejrfuglen 17: 9-13.
Nielsen, Peter 1981: En ugie i badekarret - Gejrfuglen 17: 89.
Forening, Østjysk Biologisk 1981: Bjerregrav Mose - Gejrfuglen 17: 42-64.
Dybbro, Tommy 1978: Oversigt over Danmarks fugle 1978.
Danmarks dyreverden, bd. 7.

- Søravnen 1-1973: Efterårsrapport 1972 fra Århus amt.
- 2-1973: Lokalrapporten.
- 1974: Lokalrapporten 2: 73.
- 1-1975: Lokalrapporten 1974.
- 2-1975: Lokalrapport 1/1 - 30/6 1975.
- 1-1976: Lokalrapport 1/7 - 31/12 1975.
- 2-1976: Lokalrapport 1/1 - 30/6 1976.

Lokalrapporten 1/7 - 31/12 1976 (duplikeret rapport)

- | | | | | |
|---|-----------------|----|---|---|
| - | 1977 | (- | - |) |
| - | 1978 | (- | - |) |
| - | 1979 | (- | - |) |
| - | 1980, Århus amt | (- | - |) |

Yderligere rapporter er udsolgt: 1/7 - 31/12 1976, 1977 og 1978.