

# LOKALRAPPORT

## 1974

Følgende har ydet bidrag til Årsrapporten for Østjylland, Århus Amt: Carsten Andersen (CA), Michael Anker (MA), Mogens Bang (MB), Claus Bech (CB), Bjarne Bertel (BB), Ulf M. Berthelsen (UMB), Dorste Bloch (DB), Peter Brostrøm (PB), Per Wessel Buchwald (PWB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Hans Christophersen (HC), Dansk Ornithologisk Forening (DOF), Hølge Dethlefsen (HD), Henning Ellgård (HE), Jörn Eskildsen (JE), Westy Esbensen (WE), Anders Færgemann (AF), Jens Gregersen (JG), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaime (JH), Kjeld Hansen (KH), Mogens V. Hansen (MVH), Erik Hørning (EH), Peder Jacobsen (PJ), Jens Kirkeby (JK), Finn Lund Henriksen (FLH), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), Finn B. Mogensen (FBM), Kaj Nissen (KN), Knud Pedersen (KP), Hans Pinstrup (HP), Nina Rehfeldt (NR), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Jan Lyngholm Sørensen (JLS), Torben Sørensen (TS), Peter Thomsen (PT), Ebbe Teibel (ET), Ole Thorup (OT), Jørn Vestergaard Jensen (JV), Østjysk Biologisk Forening (ØBF) og Niels Ågaard (NÅ).

Årets specialarter (1974) udpeget af FO's lokalredaktører til total indsamling var følgende: Sivsanger, Isfugl, Låddenbenet Musvåge, Sortspætte, Dværgmåge, Plettet Rørvagtel og Rørhøg. Heraf må det nok forventes at de 3 førstnævnte ikke er indrapporteret i fuldt omfang. Sortspætte er stort set uden interesse i østjyske sammenhænge, mens vi for de sidste 3 arters vedkommende nok har fået det meste med, men det er nu heller ikke ret meget.

Moesgård var mindre flittigt besøgt end tidligere år, og det samme må vist siges for flere af de andre lokaliteters vedkommende. Kun Norddjursland har tiltrukket sig ekstra opmærksomhed.

Derimod blev Hjelm Fuglestation for alvor en stjerne for vort amt; hvor er vi heldige, at Kjeld Hansens blik i sin tid faldt på dette udsted. I 1974 ringmærkedes 12.400 småfugle i løbet af foråret. Ikke mindst fortjener en Dværgværling at blive nævnt.

Omfanget af årsrapporten er af pladsmæssige hensyn barberet noget i forhold til tidligere sæsoner, men vi håber indholdet alligevel vil give blod på tanden til at fare ud i naturen og meddele os resultatet ved en senere lejlighed. Observationer til forårets lokalrapport skal være mig i hænde senest 15.7 - 1975.

Rapporten er udarbejdet af Ole Thorup med bidrag af Georg Guldvang, Jørgen Laursen og

Peter Thomsen,  
Kaj Munkavaj 42,  
8260 Viby J.

|  |           |       |                                       |
|--|-----------|-------|---------------------------------------|
| <u>Sortstrubet Lom</u> ( <i>Gavia arctica</i> ):     | 19.1      | 1     | Øjesø v. Rønde (GG, JL)               |
| <u>Lom sp.</u> ( <i>Gavia sp.</i> ):                 | 3.4       | 1     | Århus by, trak højt over byen (KP)    |
| <u>Toppet Lappedykker</u>                            | 12.2      | 1     | Kysing Næs (HLL)                      |
| ( <i>Podiceps cristatus</i> ):                       | 13.5      | -     | Brabrand Sø, 71 reder (JG)            |
| <u>Gråstrubet Lapped.</u> ( <i>P. griseigena</i> ):  | 12.2      | 1     | Kysing Næs (HLL)                      |
| april  | 4         | 4     | Fårup Mose, 1 par m. 2 juv (JL)       |
|  | 18.5      | 1     | Brabrand Sø (UMB)                     |
|  | 31.5      | 1     | Øjesø (JL)                            |
|  | 12.6      | 1     | Hattemager Mose v. Søften (MB)        |
|  | 28.6      | 1     | Tranemosen, Samsø (MB)                |
|  | 29.9      | 1     | Alrø (HP)                             |
| <u>Nordisk Lappedykker</u> ( <i>P. auritus</i> ):    | 30.7-24.8 | 1     | Kysing Fjord, ad (TB, GG, HP, OT)     |
| <u>Sorthalset Lapped.</u> ( <i>P. nigricollis</i> ): | 8.5       | 1     | Brabrand Sø (HLL)                     |
|  | 13.5      | 1     | Brabrand Sø (JG)                      |
| <u>Lille Lappedykker</u> ( <i>P. ruficollis</i> ):   | 24.5      | 1     | Brabrand Sø (MB)                      |
|  | 8.8       | 37    | Kysing Fjord (HP)                     |
|  | 5.10      | 45    | Kysing Fjord (ØBF)                    |
|  | 3.11      | 31    | Kysing Fjord (ØBF, TB, OT)            |
|  |           |       | Er de højeste tal fra Kysing i år     |
| <u>Sule</u> ( <i>Sula bassanus</i> ):                | 16.4      | 1     | Fornæs Fyr (HC)                       |
| <u>Storskarv</u> ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ):     | 19.1      | 25    | Ebeltoft Færgeshavn (GG, JL)          |
|  | 18.5      | 5     | Salten Langsø (OT)                    |
|  | 20.5      | 1     | Skanderborg Sø (OT)                   |
|  | 28.5      | 1     | Skanderborg Sø (FC)                   |
|  | 9.6       | 9     | Mossø, Emborg Tange (FC)              |
|  | 13.6      | 10    | Mossø, Emborg Tange (GG)              |
|  | 2.8       | 1     | Kysing Fjord, vestenden (GG, HP)      |
| <u>Hvid Stork</u> ( <i>Ciconia ciconia</i> ):        | 11.4      | 1-2   | Auning (HC, EH)                       |
|  | 15.4      | 1 par | Randers, på rede (HP)                 |
|  | 9.5       | 1     | Gjerrild Stenværk (HC)                |
|  | 15.5      | 1     | Århus (PG)                            |
|  | 22.5      | 2     | Banegårdsplads, Århus, overflyv. (GG) |
|  | maj       | 1     | Hjelm (KH)                            |
|  | 24.6      | 1     | Højbjerg (HE)                         |
|  | 28-29.10  | 1     | Ørby Mose, Samsø medd. K. Lamberg     |
| <u>Sort Stork</u> ( <i>Ciconia nigra</i> ):          | 29.3      | 1     | Gjerrild (HE)                         |
| <u>Skkestork</u> ( <i>Platalea leucorodia</i> ):     | 7.4       | 1     | Kysing Fjord (UMB)                    |
| <u>Sangsvane</u> ( <i>Cygnus cygnus</i> ):           | 4.1       | 5     | Lading Sø (TB)                        |
|  | 21.1      | 10    | Lading Sø (FLH)                       |
|  | 30.1      | 3     | Brabrand Sø (GG)                      |
|  | 20.10     | 1     | Borum Mose (JL)                       |
|  | 3.11      | 2     | Kysing Fjord (TB, OT)                 |
|  | 28.12     | 2     | Kysing Fjord (ØBF)                    |

|  |       |       |  |
|--|-------|-------|--|
| <u>Pibesvane</u> ( <i>Cygnus bewickii</i> ):             | 20.3  | 5     | Kysing Fjord (KP)  |
|  | 30.3  | 51    | Moessgård (PWB,HP)   |
|  | 3.4   | 200   | Århus Banegård (JK)  |
|  | 4.4   | 4     | Viby (PT)  |
|  | 5.4   | 30-40 | Viby (GG)  |
| <u>Sangsvane/Pibesvane</u> :                             | 19.3  | 23    | Moessgård (OT)   |
| <u>Grågås</u> ( <i>Anser anser</i> ):                    | 2.2   | 5     | Kysing Fjord (DOF)   |
|  | 3.2   | 2     | Brabrand Sø (HLL)  |
|  | 4.2   | 1     | Brabrand Sø (HLL)  |
|  | 16.2  | 7     | Gl. Ry (TB)  |
|  | 18.2  | 2     | Brabrand Sø (KP)   |
|  | 2.3   | 1     | Højbjerg (JL)  |
|  | 10.3  | 18    | Brabrand Sø (OT)   |
|  | 19.3  | 7     | Moessgård (GG,OT) desuden 1 eks.set<br>8.3, 20.3, 25.3 og 27.3 (TB,GG,HLL)           |
|  | 20.3  | 1     | Kysing Fjord (KP)  |
|  | 29.3  | 1     | Fornæs (OT)  |
|  | 9.4   | 13    | Salten Langsø (OT)   |
|  | 13.4  | 2     | Kysing Fjord (HP)  |
|  | 24.5  | 2     | Bjerregrav Mose (TB,JH,PJ,OT)  |
|  | 31.5  | 24    | Syddjursland (JL)  |
|  | 27.6  | 1     | Kysing Fjord (NÅ)  |
|  | 9.7   | 2     | Begtrup Røn (JH)   |
| <u>Sædgås</u> ( <i>Anser fabalis</i> ):                  | 18.10 | 1     | Hasenøre (JH)  |
| <u>Grå Gås sp.</u> ( <i>Anser sp.</i> ):                 | 21.4  | 3     | Moessgård (GG,FLH)   |
| <u>Knortegås</u> ( <i>Branta bernicla</i> ):             | 19.5  | 190   | Samsø (PG)   |
| <u>Kanadagås</u> ( <i>Branta canadensis</i> ):           | 15.4  | 1     | Grenå (HC)   |
| <u>Gravand</u> ( <i>Tadorna tadorna</i> ):               | 15.3  | 300   | Kysing Fjord (PWB)   |
|  | 17.11 | 1     | Kysing Fjord (CA,PB,FBM)   |
|  | 30.11 | 3     | Alrø (FC,JE)   |
| <u>Knarand</u> ( <i>Anas strepera</i> ):                 | 4.5   | 1 par | Kysing Fjord (DOF)   |
| <u>Atlingand</u> ( <i>Anas querquedula</i> ):            | 9.4   | 1 par | Kysing Fjord (NÅ)  |
|  | 2.8   | 1 par | Kysing Fjord (HP)  |
| <u>Pibeand</u> ( <i>Anas penelope</i> ):                 | 1.5   | 2     | Brabrand Sø (GG)   |
|  | 2.10  | 5     | Brabrand Sø (GG)   |
| <u>Hvidejet And</u> ( <i>Aythya nyroca</i> ):            | -     | 1     | Skovmøllen, ad han, undsluppet fan-<br>genskabsfugl (flere observatører)             |
| <u>Bjergand</u> ( <i>Aythya marila</i> ):                | 27.2  | 1     | Brabrand Sø, hun (GG)  |
| <u>Hvinand</u> ( <i>Bucephala clangula</i> ):            | 27.6  | 31    | Tange Sø (NÅ)  |
| <u>Stor Skallesluger</u><br>( <i>Mergus merganser</i> ): | -     | 1     | Brabrand Sø, en ad han blev set hele<br>sommeren, kunne ikke flyve (MB,JG,GG,<br>JL) |
| <u>Lille Skallesluger</u> ( <i>M. albellus</i> ):        | 19.1  | 1     | Stubbe Sø, han (GG,JL)   |
|  | 23.2  | 1     | Brabrand Sø, hun (PG)  |
|  | 23.2  | 16    | Kysing Fjord, vinterens maksimum<br>(UMB, PWB,ØBF m.fl.)                             |

|   |               |     |   |
|---|---------------|-----|---|
|   | 5.12          | 2   | Kysing Fjord, vinterens første (OT)   |
|   | 28.12         | 4   | Kysing Fjord (ØBF)  |
| <u>Konqøørn</u> ( <i>Aquila chrysaetos</i> ):     | 8.12 og 15.12 | 1   | Munklinde Mose (MVH)  |
| <u>Musvåge</u> ( <i>Buteo buteo</i> ):            | -             | -   | Følgende iagttaget ved Moesgård, kun medtaget antal over 50:<br>23.2 80, 12.3 110, 13.3 260, 14.3 340,<br>19.3 160, 30.3 60. Ialt foråret 1500-<br>2000. (flere observatører) |
|   | -             | -   | Følgende iagttaget ved Gjerrild:<br>24.3 600, 28.3 175, 29.3 165, 6.4 316,<br>7.4 261, 9.4 1192, 20.4 155, 21.4 190.<br>(flere observatører)                                  |
|   | 28.3          | 44  | Grenå Strand (JLS, OT)  |
|   | 4.4           | 44  | Århus By (KP)   |
|   | 13.4          | 650 | Anholt (DOF)  |
| <u>Låddenbenet Musvåge</u> ( <i>B. lagopus</i> ): | 14.3          | 5   | Moesgård (TB, GG)   |
|   | 15.3          | 1   | Moesgård (GG)   |
|   | 31.3          | 1   | Grenå Strand (JLS, OT)  |
|   | 4.4           | 1   | Århus (KP)  |
|   | 5.4           | 1   | Moesgård (HLL)  |
|   | 6.4           | 1   | Brabrand Sø (HLL)   |
|   | 9.4           | 31  | Gjerrild (HC)   |
|   | 13.4          | 1   | Anholt (DOF)  |
|   | 9.6           | 1   | Kasted Mose (TB) oversomrende eks. ?  |
|   | 10.10         | 1   | Brabrand Sø (JL)  |
|   | 20.10         | 2   | Hasenøre (OT, NÅ)   |
|   | 17.11         | 1   | Moesgård (TB, JH, OT)   |
|   | 26.11         | 1   | Pinds Mølle (OT)  |
| <u>Rød Glente</u> ( <i>Milvus milvus</i> ):       | 25.3          | 1   | Moesgård, sub-ad (HD, GG, JL)   |
|   | 21.4          | 1   | Salten Langsø (PWB)   |
|   | 27.4          | 1   | Gjerrild Nederskov (ØBF)  |
|   | 19.5          | 1   | Fornæs (HC)   |
|   | 19.5          | 1   | Rugård s.f. Grenå (DB, NR)  |
| <u>Sort Glente</u> ( <i>Milvus migrans</i> ):     | 10.5          | 1   | Moesgård (JH)   |
|   | maj           | 1   | Hjelm (KH)  |
| <u>Glente sp.</u> ( <i>Milvus sp.</i> ):          | 12.5          | 1   | Skanderborg (HP)  |
|   | maj           | 1   | Hjelm (KH)  |
| <u>Havørn</u> ( <i>Haliaeetus albicilla</i> ):    | 30.1          | 1   | Fårup Sø, Vejle Amt, juv (WE, AF)   |
|   | 17.3          | 1   | Moesgård, juv (HP)  |
|   | 28.12         | 1   | Kysing Fjord, sub-ad (ØBF)  |
| <u>Hvepsevåge</u> ( <i>Pernis apivorus</i> ):     | 10.5          | 50  | Gjerrild (HC)<br>Ellers noteret fåtalligt maj og aug-<br>sept. (HLL, JL, KP, KH)  |
| <u>Rørhøg</u> ( <i>Circus aeruginosus</i> ):      | 1.5           | 1   | Brabrand Sø (ES)  |
|   | 4.5           | 1   | Kysing Fjord (DOF)  |
|   | 9.5           | 1   | Gjerrild (HC)   |
|   | 13.5          | 1   | Brabrand Sø (JG)  |
|   | 24.5          | 1   | Moesgård (PG)   |
|   | 2.9           | 1   | Brabrand Sø (FC, NÅ)  |
|   |               |     | Casuden er arten set på Hjelm i maj (KH)  |

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| <u>Blå Kærhøg</u> ( <i>Circus cyaneus</i> ):  | 28.3     | 1 | Gjerrild (TB, JH)   |
|   | 9.4      | 1 | Gjerrild (HC)   |
|   | 20.4     | 5 | Helgenæs (JL)   |
|   | 21.4     | 3 | Gjerrild (KP)   |
|   | 27.4     | 5 | Gjerrild (ØBF)  |
|   | 3.5      | 1 | Rønde (PJ, PT)  |
|   | 9.5      | 1 | Gjerrild (HC)   |
|   | 1.10     | 1 | Skanderborg (FC, FLH)   |
|   | 3.10     | 2 | Hasenøre (OT, NÅ)   |
|   | 9.10     | 1 | Brabrand Sø (JL)  |
|   | 7.11     | 1 | Salten Langsø (OT)  |
|   | 30.11    | 1 | Kysing Fjord medd til OT af ??<br>Desuden set maj på Hjelm (KH) |
| <u>Hedeheg</u> ( <i>Circus pygarcus</i> ):    | maj      | - | Hjelm (KH)  |
| <u>Duehøg</u> ( <i>Accipiter gentilis</i> ):  | 24.3     | 6 | Gjerrild, trak; hele foråret ca.15.<br>(HC)                     |
|   | 28.3     | 1 | Gjerrild (TB)   |
|   | 29.3     | 1 | Fornæs, ud over havet (OT)                                      |
|   | 4.4      | 1 | Brabrand Sø (KP)  |
|   | 19.4     | 1 | Moesgård (ØBF)  |
|   | 21.4     | 2 | Gjerrild (KP)   |
|   | 27.4     | 1 | Fornæs (ØBF)  |
|   | 7.5      | 1 | Brabrand Sø (JL)  |
|   | 2.8      | 1 | Borum Mose (JL)   |
|   | 5.10     | 1 | Ellemandsbjerg (TB, JH)   |
|   | 6.11     | 1 | Norsminde (OT)  |
| <u>Spurvehøg</u> ( <i>Accipiter nisus</i> ):  | - ca.100 |   | Moesgård, trak i foråret (fl.observ.)                           |
| <u>Fiskeørn</u> ( <i>Pandion haliaetus</i> ): | 19.3     | 1 | Moesgård, tidligt (JL, OT)                                      |
|   | 28.3     | 1 | Gjerrild (TB)   |
|   | 30.3     | 1 | Salten Langsø (TB)  |
|   | 30.3     | 1 | Moesgård (GG, JL, HP)   |
|   | 3.4      | 1 | Århus (KP)  |
|   | 3.4      | 1 | Hjelm (KH)  |
|   | 3.4      | 1 | Århus Midtby (JK)   |
|   | 5.4      | 1 | Hjelm (KH)  |
|   | 6.4      | 2 | Gjerrild (DOF)  |
|   | 6.4      | 1 | Moesgård (HP)   |
|   | 10-15.4  | 2 | Anholt (DOF)  |
|   | 20.4     | 1 | Sangstrup Klint (TB)  |
|   | 21.4     | 3 | Gjerrild (KP)   |
|   | 3.5      | 1 | Stavnsfjord, Samsø (FLH)  |
|   | 4.5      | 1 | Moesgård (MØ)   |
|   | 24.5     | 1 | Moesgård (PG)   |
|   | 29.6     | 1 | Salten Langsø, det sædvanlige over-<br>somrende eks.            |
|   | 31.8     | 4 | Salten Langsø (HP, GG)  |
|   | 20.8     | 1 | Skanderborg (NÅ)  |
|   | 21.8     | 1 | Brabrand Sø (NÅ)  |
|   | 31.8     | 2 | Salten Langsø (GG, HP)  |
|   | 31.8     | 1 | Juulsø (GG)   |
|   | 8.9      | 1 | Lange Sø (DOF)  |
|   | 20.9     | 2 | Salten Langsø (HP)  |
|   | 5.10     | 1 | Ellemandsbjerg (TB, JH)   |
|   | 26.10    | 1 | Lystrup Å (HE)  |

|   |         |        |                                    |
|---|---------|--------|------------------------------------|
| <u>Vandrefalk</u> ( <i>Falco peregrinus</i> ):            | 24.3    | 1      | Gjerrild (HC)                      |
|   | 28.3    | 1      | Pinds Mølle (NÅ)                   |
|   | 9.4     | 1      | Gjerrild (HC)                      |
|   | 11.4    | 1      | Anholt (DOF)                       |
|   | 20.4    | 1      | Gjerrild (HC)                      |
|   | 6.10    | 1      | Alrø (ET)                          |
| <u>Lærkefalk</u> ( <i>Falco subbuteo</i> ):               | 9.5     | 1      | Stubbe Sø (HC)                     |
|   | 13.5    | 1      | Gedved (HP)                        |
|   | 22.5    | 1      | Gedved (HP)                        |
|   | 24.5    | 1      | Moegård (PG)                       |
|   | 26.5    | 1      | Gedved (HP)                        |
| <u>Aftenfalk</u> ( <i>Falco vespertinus</i> ):            | 29.7    | 1      | Århus by, hun (FC,ES)              |
| <u>Aftenfalk/Lærkefalk</u> :                              | 5.5     | 1      | Salten Langsø (TB)                 |
|   | 18.5    | 1      | Salten Langsø (HP)                 |
|   | 16.6    | 1      | Salten Langsø (OT)                 |
| <u>Dværøfalk</u> ( <i>Falco columbarius</i> ):            | 28.3    | 1      | Gjerrild (TB)                      |
|   | -       | -      | Max. 8 i foråret ved Gjerrild (HC) |
|   | 10-15.4 | 5-10   | Anholt (DOF)                       |
|   | 21.4    | 1      | Norddjursland (KP)                 |
|   | 25.9    | 1      | Brabrand Sø (BB,GG)                |
|   | 27.10   | 1      | Stilling (HP)                      |
| <u>Tårnfalk*</u> ( <i>Falco tinnunculus</i> ):            | -       | ca.15  | Moegård i foråret (GG)             |
|   | 24.3    | 8      | Gjerrild, trak (HC)                |
| <u>Vagtel</u> ( <i>Coturnix coturnix</i> ):               | 15.6    | 1      | Tilst (OT)                         |
| <u>Trane</u> ( <i>Grus grus</i> ):                        | 14.4    | 1      | Anholt (DOF)                       |
|   | 10.5    | 1      | Gjerrild (HC)                      |
|   |         |        | Desuden set i maj på Hjelm (KH)    |
| <u>Engsnarre</u> ( <i>Crex crex</i> ):                    | 28.3    | 1      | Harlev Mølle (NÅ)                  |
| <u>Plettet Rørvaqtel</u> ( <i>Porzana porzana</i> ):      | 18.5    | 1      | Brabrand Sø, fundet død (UMB)      |
|   | 13.6    | 1      | Brabrand Sø (HLL)                  |
| <u>Vibe</u> ( <i>Vanellus vanellus</i> ):                 | -       | ca.400 | Moegård, trak i foråret (GG)       |
| <u>Lille Præstekrave</u><br>( <i>Charadrius dubius</i> ): | 13.4    | 2      | Hasenøre (HC)                      |
|   | 9.5     | 1      | Stubbe Sø (HC)                     |
| <u>Stenvender</u> ( <i>Arenaria interpres</i> ):          | 4.5     | 1      | Kysing Fjord (DOF)                 |
|   | -       | 1      | Hjelm (KH)                         |
|   | 18.7    | 2      | Hasenøre (JH)                      |
| <u>Trædækker</u> ( <i>Gallinago media</i> ):              | 24.8    | 1      | Brabrand Sø (NÅ)                   |
|   | 3.11    | 1      | Kysing Fjord (TB,OT)               |
| <u>Enkeltbekkasin</u><br>( <i>Lymnocyptes minimus</i> ):  | 28.3    | -      | Kysing Fjord (UMD)                 |
|   | 3.5     | 2      | Stavnsfjord, Samsø (FLH)           |
|   | 1.10    | 1      | Brabrand Sø (FC)                   |
|   | 17.11   | 10     | Kysing Fjord (TB, JH, OT)          |

|   |       |         |   |
|---|-------|---------|---|
| <u>Skovsneppe</u> ( <i>Scolopax rusticola</i> ):                | 26.2  | 1       | Moesgård (PWB)  |
|   | 3.4   | 1       | Århus Å (GG)  |
|   | 3.5   | 2-3     | Mårup Skov, Samsø (FLH)   |
|   | 16.6  | 3       | Lading Sø (OT)  |
|   | 19.10 | 1       | Hasenøre (OT, NÅ)   |
| <u>Lille Regnspøve</u> ( <i>Numenius phaeopus</i> ):            | 11.4  | 1       | Moesgård, ret tidlig (HP)   |
|   | 16.6  | 30      | Alrø (ES)   |
|   | 4.8   | 19      | Hasenøre (JH)   |
| <u>Stor Kobbersneppe</u> ( <i>Limosa limosa</i> ):              | 26.4  | 1       | Brabrand Sø (JL)  |
| <u>Tinksmed</u> ( <i>Tringa glareola</i> ):                     | 12.5  | 7       | Kysing Fjord (NÅ)   |
| <u>Rødben</u> ( <i>Tringa totanus</i> ):                        | 19.5  | 1       | Lading Sø (CB, JS)  |
|   | 21.12 | 6       | Begtrup Røn (JH)  |
| <u>Mudderklire</u> ( <i>Tringa hypoleucos</i> ):                | 21.10 | 1       | Hasenøre (OT, NÅ), det er sent  |
| <u>Sorterå Ryle</u> ( <i>Calidris maritima</i> ):               | 16.4  | 1       | Fornæs Fyr (HC)   |
| <u>Almindelig Ryle</u> ( <i>C. alpina</i> ):                    | 21.12 | 110     | Begtrup Røn (JH)  |
| <u>Krumnæbbet Ryle</u> ( <i>C. ferrugineus</i> ):               | 1.8   | 1       | Brabrand Sø (GG, HP)  |
| <u>Brushane</u> ( <i>Philomachus pugnax</i> ):                  | 13.5  | 7       | Brabrand Sø (JG)  |
| <u>Hættemåge</u> ( <i>Larus ridibundus</i> ):                   | 13.5  | -       | Brabrand Sø, 2625 reder (JG)  |
| <u>Ride</u> ( <i>Rissa tridactyla</i> ):                        | 5.3   | 1       | Århus Havn (UMB)  |
|   | 11.4  | 1       | Fornæs Fyr (HC)   |
|   | 12.10 | 1       | Anholt (OT)   |
|   | 7.12  | 57      | Anholt (DOF)  |
| <u>Sortterne</u> ( <i>Chlidonias niger</i> ):                   | 15.5  | 1       | Brabrand Sø (ES)  |
|   | 18.5  | 1       | Salten Langsø (OT)  |
| <u>Fjordterne</u> ( <i>Sterna hirundo</i> ):                    | 16.6  | 2       | Salten Langsø (JLS, OT)   |
|   | 3.10  | 1       | Kalø Vig (OT, NÅ)   |
| <u>Havterne/Fjordterne</u><br>( <i>S. paradiseae/hirundo</i> ): | 21.5  | 1       | Gedved (HP)   |
|   | 1.8   | 22      | Brabrand Sø (GG, HP)  |
| <u>Splitterne</u> ( <i>S. sandvicensis</i> ):                   | 15.3  | 5       | Kalø Vig (NÅ)   |
| <u>Tajst</u> ( <i>Cephus grylle</i> ):                          | 20.4  | 5-7     | Sangstrup Klint (TB)  |
|   | 27.4  | 4       | Sangstrup Klint (ØBF)   |
| <u>Huldue</u> ( <i>Columba oenas</i> ):                         | -     | ca.75   | Moesgård, trækkende i foråret (fl. obs.)                                    |
|   | 31.5  | 1       | Tølykke Skov (JL)   |
|   | 5.10  | 14      | Hasenøre (JL)   |
| <u>Rindue</u> ( <i>Columba palumbus</i> ):                      | -     | ca.3000 | Moesgård, trækkende i foråret, største dage: 28.3 300, 29.3 400. (GG m.fl.) |
|   | 1.3   | 10000   | Lyngbygård (JL)   |
| <u>Turteldue</u> ( <i>Streptopelia turtur</i> ):                | 19.5  | 1       | Gjerrild (HC)   |

|  |             |     |   |
|--|-------------|-----|---|
| <u>Skovhornugle</u> ( <i>Asio otus</i> ):        | 22.2        | 3-5 | Brabrand Sø (TØ)  |
|  | 7.5         | 1   | Brabrand Sø (GG)  |
|  | 10.5        | 1   | Brabrand Sø (HP)  |
|  | 18.10       | 1   | Viby Ringvej (GG)   |
| <u>Mosehornugle</u> ( <i>Asio flammeus</i> ):    | 31.10-14.11 | 1   | Kysing Fjord (OT)   |
| <u>Natramn</u> ( <i>Caprimulgus europaeus</i> ): | 19.5        | 1   | Brabrand Sø (PWB)   |
| <u>Isefuql</u> ( <i>Alcedo atthis</i> ):         | -           | -   | Set op til flere gange Pinds Mølle og Salten Langsø (JL,OT)   |
|  | 1.1         | 1   | Holten Å (HLL)  |
|  | 7.2         | 1   | Giberå (HLL)  |
|  | 31.3,7.4    | 1   | Stadionsøerne (CB,JS)   |
|  | 11.4        | 1   | Auning (HC,EH)  |
|  | 13.7        | 1   | Møjlgård Skov (TB)  |
|  | 15.9        | 1   | Borum Mose (JL)   |
|  | 30.10       | 1   | Brabrand Sø (JE)  |
| <u>Hærfuql</u> ( <i>Upupa epops</i> ):           | maj         | 1   | Hjelm (KH)  |
| <u>Vendehals</u> ( <i>Jynx torquilla</i> ):      | 4.5         | 2   | Vejrø (FLH)   |
|  | 12.5        | 2   | Mindeparken (JL)  |
|  | 17.5        | 1   | Borum Mose (JL)   |
|  | maj         | -   | Hjelm, 10 ringmærket (KH)   |
|  | 29.6        | 1   | Salten Langsø (TB)  |
|  | 25.7        | 1   | Salten Langsø (TB)  |
|  | 10.9        | 1   | Brabrand Sø, ringmærket (NÅ)  |
|  | 11.9        | 1   | Edisonsvej, Viby (GG)   |
|  | 15.9        | 1   | Niels Bohrsvej, Viby (GG)   |
|  | 17.9        | 1   | Brabrand Sø (FC)  |
| <u>Hedelærke</u> ( <i>Lullula arborea</i> ):     | 8.5         | 1-2 | Hårup Sande (CB,JS)   |
|  | 29.6        | 1   | Salten Langsø (TB)  |
|  | 25.7        | 2   | Salten Langsø (TB)  |
| <u>Landsvale</u> ( <i>Hirundo rustica</i> ):     | 22.3        | -   | Hjelm (KH)  |
|  | 8.4         | 1   | Moesgård (JH,HP)  |
|  | 25.10       | 2   | Skanderborg (HP)  |
| <u>Bysvale</u> ( <i>Delichon urbica</i> ):       | 21.11       | 1   | Århus Rutebilstation (TB), flere svarer set på samme tidspunkt andre steder i landet, skyldes sikkert kraftigt snefald tidligt i alperne. |
| <u>Pirol</u> ( <i>Oriolus oriolus</i> ):         | 23.5        | 1   | Søby Fredskov (ES)  |
| <u>Ravn</u> ( <i>Corvus corax</i> ):             | 31.5        | 1   | Tølykke Skov (JL)   |
|  | 7.9         | 1   | Ringelmose Skov (OT)  |
|  | 26.10       | 1   | Emborg (MA,HE)  |
| <u>Sortkrage</u> ( <i>C. corone corone</i> ):    | 21.3        | 8   | Moesgård (TB,GG)  |
|  | 28.3        | 1   | Moesgård (JL,GG)  |
|  | 29.3        | 1   | Fornæs (OT)   |
|  | 29.3        | 6   | Moesgård (GG,HLL)   |
|  | 30.3        | 1   | Moesgård (GG)   |
|  | 9.5         | 1   | Århus by (NÅ)   |
|  | 30.10       | 1   | Skanderborg (NÅ)  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <u>Gråkrage</u> ( <i>C. corone cornix</i> ):                  | - 5-6000   | Moesgård i foråret, største dage:<br>19.3 560, 21.3 870, 22.3 670, 29.3 880,<br>30.3 460, 5.4 648 (PWB,GG,HLL,OT)  |
| <u>Allike</u> ( <i>Corvus monedula</i> ):                     | 4500-5000  | Moesgård, trækkende i foråret. Største<br>dage: 23.2 877, 8.3. 424, 21.3 500,<br>29.3 430, 30.3 430 (GG,HLL,JL m.fl.)  |
| <u>Halsbånds-allike</u><br>( <i>C. m. soemmeringii</i> ):     | 17.12  | 1 Brabrand Sø (HP)   |
| <u>Nøddekrige</u><br>( <i>Nucifraga caryocatactes</i> ):      | 10.4<br>9.5  | 1 Hjelm (KH)<br>1 Gjerrild (HC)  |
| <u>Blåmejse</u> ( <i>Parus caeruleus</i> ):                   | 28.3   | 80 Moesgård, trækkende (GG,JL)   |
| <u>Vandstær</u> ( <i>Cinclus cinclus</i> ):                   | 14.10  | 1 Pinds Mølle, vinterens første (FC)   |
| <u>Skægmejse</u> ( <i>Panurus biarmicus</i> ):                | 13.5<br>-<br>sept. 5-7<br>6.10   | 2 Brabrand Sø, et par (JG,ES)<br>- Er set i Østjylland i yngletiden<br>(JG,ES,FC)<br>Brabrand Sø, dagligt (FC)<br>4 Kysing Fjord (DOF)   |
| <u>Misteldrossel</u> ( <i>Turdus viscivorus</i> ):            | - ca.30<br>april 50<br>april 50<br>1.10 2<br>3.10 3  | Moesgård, trækkende i foråret (GG,JL)<br>Gjerrild (HC)<br>Grenå Plantage, 25 par (HC)<br>Stautrup (JL)<br>Hasenøre (OT,NÅ)   |
| <u>Ringdrossel</u> ( <i>Turdus torquatus</i> ):               | 3.4<br>10.4<br>10-15.4<br>11.4-19.5<br>13.4<br>26.4<br>3.5<br>3.5<br>4.5<br>7.5<br>9.5<br>9.5<br>2.9<br>3.10 | 1 Brabrand Sø (MB)<br>1 Hjelm, ringmærket (KH)<br>10-25 Anholt (DOF)<br>34 Norddjursland, ialt (HC)<br>1 Hasenøre (HC)<br>1 Brabrand Sø (JL)<br>1 Brabrand Sø (JL)<br>1 Stavnsfjord, Samsø (FLH)<br>1 Vejro (FLH)<br>1 Vejlbym Idrætscenter (TB,JH)<br>1 Stubbe Sø (HC)<br>14 Gjerrild (HC)<br>3 Helgenæs (JL)<br>2-3 Hasenøre (OT,NÅ) |
| <u>Stenpikker</u> ( <i>Oenanthe oenanthe</i> ):               | 19.5   | 113 Gjerrild (HC)  |
| <u>Grønlandsk Stenp.</u> ( <i>O.o.leucorrhoea</i> ):          | maj  | 1 Hjelm (KH)   |
| <u>Sortstrubet Bynkefugl</u><br>( <i>Saxicola torquata</i> ): | 31.10  | 1 Kysing Fjord (OT)  |
| <u>Husrødstjert</u> ( <i>Phoenicurus ochruros</i> ):          | 13.4<br>17.5   | 1 Anholt, han (DOF)<br>1 Gjerrild Stenværk (HC)  |
| <u>Blåhals</u> ( <i>Luscinia svecica</i> ):                   | 8.5<br>maj<br>20.9   | 1 Botanisk Have, han (PG,KP,TS)<br>- Hjelm, 3 ringmærket (KH)<br>1 Dyngby Strand (ET)  |

|  |              |       |   |
|--|--------------|-------|---|
| <u>Nattergal</u> ( <i>Luscinia luscinia</i> ):                   | 15.5         | 15    | Mørke Kær, syngende (HC)  |
|  | 21.5         | 12    | Auning, syngende (HC)   |
|  | maj          | -     | Hjelm, 3 ringmærket (KH)  |
|  | maj-juni     | 1 par | Minddeparken (JL)   |
|  | 8.6          | 2-3   | Skjoldhøjkollegiet (OT)   |
| <u>Græshoppesanger</u> ( <i>Locustella naevia</i> ):             | 16.5         | 1     | Brabrand Sø (GG)  |
|  | 18.5         | 1     | Funderholme (DOF)   |
|  | 5.6          | 3-4   | Bjerregrav Mose (DOF)   |
|  | 12.6         | 1     | Bjerregrav Mose (ØBF)   |
|  | 16.6         | 1     | Lading Sø (OT)  |
| <u>Savisanger</u> ( <i>L. luscinoides</i> ):                     | 17.5         | 1     | Brabrand Sø (KN)  |
| <u>Drosselrørsanger</u><br>( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ): | 14.6         | 1     | Brabrand Sø (PG)  |
| <u>Munk</u> ( <i>Sylvia atricapilla</i> ):                       | jan-marts    | 1     | Niels Bohrsvej, Viby (GG)   |
|  | dec 73-april | 1     | Fenrisvej, Århus V (MB,OT)  |
|  | 7.12         | 1     | Højbjerg, syngende (NÅ)   |
| <u>Rødtoppet Fuglekonge</u><br>( <i>Regulus ignicapillus</i> ):  | 10.3         | 1     | Forstbotanisk Have (NÅ)   |
|  | 10.4         | 1     | Hjelm (KH)  |
| <u>Broget Fluesnapper</u><br>( <i>Muscicapa hypoleuca</i> ):     | 10.4         | 1     | Vejlby (NÅ) Tidligt.  |
| <u>Lille Fluesnapper</u> ( <i>M. parva</i> ):                    | maj          | -     | Hjelm, 2 ringmærket (KH)  |
| <u>Mærkpiber</u> ( <i>Anthus campestris</i> ):                   | 10.4         | 1     | Anholt (DOF) Tidligt.   |
|  | 19.5         | 2     | Fornæs (HC)   |
|  | 5.10         | 1     | Ellemandsbjerg (TB,JH)  |
| <u>Bjergvipstjert</u> ( <i>Motacilla cinerea</i> ):              | 26.1         | 1     | Funder Å (DOF)  |
|  | 23.2         | 2     | Giberå (MB)   |
|  | 17.3         | 1     | Pinds Mølle (DOF)   |
|  | 31.3         | 1     | Giberå (HLL)  |
|  | 9.4          | 1     | Gjerrild (HC)   |
|  | 10.4         | 2     | Gjerrild (HC)   |
|  | april        | 6     | L yngbygård Å, 1 par m. 4 juv (JL)  |
|  | maj          | 4     | Tarskov Mølle, 1 par m. 2 juv (JL)  |
| <u>Silkehale</u> ( <i>Bombycilla garrulus</i> ):                 | 1.4          | 15    | Viby, sidste i foråret (GG,JLN m.fl.)   |
|  | 20.10        | 5     | Hasenøre, første i efteråret (OT,NÅ)<br>Stor invasion i efteråret, eks.700<br>nov-dec i Viby (JL)   |
| <u>Stor Tornskade</u> ( <i>Lanius excubitor</i> ):               | -            | -     | Der er set mange fugle både forår og<br>efterår.<br>Brabrand Sø: 3.2, 8.2, 16.2, 23.2,<br>27.2 2, 14.3, 3.4 3, 16.10 2, 30.10<br>og 22-30.12 2 stk.<br>Moesgård: 16.2, 22.2, 2.3, 26.3, 29.3,<br>31.3, 9.4 og 19.4 (flere observatører)<br>Desuden: |
|  | 2.2          | 1     | Kysing Fjord (UMB)  |
|  | 3.3          | 1     | Ålsø (UMB)  |
|  | 3.3          | 1     | Stubbe Sø (OT)  |

|         |     |                              |
|---------|-----|------------------------------|
| 22-26.3 | 4   | Hjelm, ringmærket (KH)       |
| 23.3    | 1   | Salten Langsø (HP)           |
| 28.3    | 1   | Gjerrild (TB)                |
| 29.3    | 3-4 | Gjerrild Nordstrand (JLS,OT) |
| 30.3    | 1   | Gjerrild Nordstrand (OT)     |
| 6.4     | 1   | Salten Langsø (FLH)          |
| 3.10    | 2   | Hasenøre (OT,NÅ)             |
| 3.10    | 1   | Femmøller (OT,NÅ)            |
| 5.10    | 1   | Sletterhage (TB,JH)          |
| 5.10    | 1   | Kysing Fjord (ØBF)           |
| 20.10   | 1   | Borum Mose (JL)              |
| 30.10   | 1   | Stilling (NÅ)                |
| 3.11    | 1   | Kysing Fjord (TB,OT)         |
| 7.11    | 2   | Salten Langsø (OT)           |
| 1.12    | 1   | Sminge (PJ)                  |
| 23.12   | 1   | Voldby Mose v. Hammel (OT)   |

|   |          |       |                                 |
|---|----------|-------|---------------------------------|
| <u>Rødrygget Tornskade (L. collurio):</u> | 31.5     | 1 par | Tølykke Skov (JL)               |
|   | -        | 1 par | Hattemager Mose, Søften (MB)    |
|   | 26-30.6  | 2 par | Midt- og Nordsø (MB)            |
|   | 13.7     | 1 par | Albøge, m. pull (TB)            |
|   | juli-aug | 1 par | Brabrand Sø, ynglade (GG,HP,NÅ) |

|                                 |          |                                       |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <u>Stær (Sturnus vulgaris):</u> | ca. 4000 | Moegård, trak i foråret, største dag: |
|                                 | 5.4      | 2325 (HLL)                            |

|  |      |    |                   |
|--|------|----|-------------------|
| <u>Kærnebider (C. coccothraustes):</u> | 17.3 | 24 | Stilling Sø (DOF) |
|  | 29.3 | 2  | Moegård (GG)      |
|  | 30.3 | 4  | Moegård (GG)      |

|   |       |     |                           |
|---|-------|-----|---------------------------|
| <u>Bjergirisk (Carduelis flavirostris):</u> | 30.1  | 200 | Brabrand Sø (GG)          |
|   | 15.3  | 4   | Moegård (GG)              |
|   | 17.10 | 100 | Begtrup Røn (JH)          |
|   | 30.11 | 125 | Niels Bohrsvej, Viby (GG) |

|                                    |      |   |                          |
|------------------------------------|------|---|--------------------------|
| <u>Gulirisk (Serinus serinus):</u> | 13.6 | 1 | Jydsk Væddeløbsbane (JV) |
|------------------------------------|------|---|--------------------------|

|  |      |   |                    |
|--|------|---|--------------------|
| <u>Karmindompap (Carpodacus erythrinus):</u> | 10.5 | 1 | Gjerrild, han (HC) |
|--|------|---|--------------------|

|   |     |   |                              |
|---|-----|---|------------------------------|
| <u>Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):</u> | 9.5 | 2 | Gjerrild Fyr, trækkende (HC) |
|---|-----|---|------------------------------|

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <u>Bog/Kvækerfinke (Fringilla sp.):</u> | 11-12000 | Moegård, ialt i foråret (GG,HLL, JL). Største dage: |
|   | 28.3     | 2000, 29.3 4000, 30.3 1600, 5.4 1642.               |

|                                       |      |   |                          |
|---------------------------------------|------|---|--------------------------|
| <u>Hortulan (Emberiza hortulana):</u> | maj  | 8 | NØ-Djursland ialt (HC)   |
|                                       | maj  | - | Hjelm, 5 ringmærket (KH) |
|                                       | 19.5 | 1 | Moegård (NÅ)             |

|  |       |    |                 |
|--|-------|----|-----------------|
| <u>Snespurv (Plectrophenax nivalis):</u> | april | 40 | Veggerslev (HC) |
|--|-------|----|-----------------|

Desuden er følgende sjældne iagttagelser gjort og skal for SU: Albatros ved Anholt i foråret, Sydlig Nattergal 12-16.5 Højbjerg og Sandterne 3.10 ved Hasenøre.