


LOKALRAPPORT

1.1-30.6 1975



O.J.

Følgende har givet bidrag til lokalrapporten: Christian Andersen (CA), Michael Andersen (MAN), Michael Anker (MA), Henrik Brandt (HB), Per W. Buchwald (PWB), Torben Høgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Henning Elgård (HF), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH), Steen G. Hansen (SGH), Finn Lund Henriksen (FLH), Jørn Holm (JHC), Vagn Jacobsen (VJ), Peder Jacobsen (PJ), Preben Veber Jensen (PVJ), Jens Kirkeby (JK), Kaj Nissen (KN), Klaus M. Olsen (KMO), Thomas M. Pedersen (TFP), Bo Rasmussen (BR), Søren Skriver (SS), Freddy Møller Sørensen (FMS), Peter Thomsen (PT), Ole Thorup (OT), Niels Aagaard (NÅ), Østjysk Biologisk Forening (ØBF) og Dansk Ornithologisk Forening (DOF).

I rapporten er nævnt observationer af fugle, der skal godkendes af SU (Sjældenhedsudvalget). Det drejer sig om følgende fugle: Jagtfalk, Damklire, Corthovedet Næge, Spurveugle og Pungmejse.

Hvorledes skal man læse rapporten, og hvormed kan man udlede af den?

For det første er ikke alle arter og observationer taget med. Kun arter, som kan forventes at have interesse, er med. Det siger sig selv, at Gråspurv ikke er med i rapporten, det kan derimod for andre arters vedkommende være mere vanskeligt, at afgøre om de skal tages med.

Hvis vi f.eks. ser på Ringdue, så skal nogle observationer med og andre ikke. Trækobservationer og større flokke om vinteren skal med, derimod er spredte iagttagelser af nogle få Ringduer helt uden værdi.

Alle observationer af de mere interessante arter er taget med, dog i nogle tilfælde er de kun nævnt summarisk, f.eks. er Låddenbenet Musvåge kun nævnt med antal observationer og antal fugle, det er af pladsmæssige grunde.

Vi håber, at der er rigtigt mange, der vil sende iagttagelser ind til lokalrapporten. Rapporten bliver bedre desto flere, der sender deres observationer ind. Iagttagelser fra 1 juli til 31 december 1975 skal være indsendt senest 1 februar 1976 til Peter Thomsen, Kaj Munksvej 42, Viby J.

Lokalrapporten er udarbejdet af Peder Jacobsen.

Sortstrubet Lom (<i>Gavia arctica</i>)	13.3	1	Hassensør (BR)
Rødstrubet Lom (<i>G. stellata</i>)	20.6-5.7	1	Ved Hjelm (KH)
Toppet Lappedykker (<i>Podiceps cristatus</i>)	28.3	75 par	Stubbe Sø (BR)
	31.3	50	Brabrand Sø (BR)
	1.6	70 par	Emborg Tange (FC)
Gråstrubet Lappedykker (<i>P. griseigena</i>)	22-24.3 apr	1	Ved Hjelm (KH) Gyllingnæs halvøen 10-15 rastende. (NÅ)
	6.5	1	Brabrand Sø (GG)
	14.5	1	Eorumnose (JL)
	-	1 par	Fårupnose (JL)
	-	1 par	Hassensør (BR)
	-	1 par	Amstrup Sø (NÅ)
Nordisk/Sorthalset Lappedykker (<i>P. auritus/nigricollis</i>)	25.2 21.4	1 1	Brabrand Sø (PWB) Kalsemade Rev (NÅ)
Sorthalset Lappedykker (<i>P. nigricollis</i>)	23.4 1.6	? 60 par	Brabrand Sø (GG) Emborg Tange (FC)
Lille Lappedykker (<i>P. ruficollis</i>)	12.1 22.2 25.2 forår 2.6	5 4 1 2-3 2	Kysing Fjord (DOF) Mossø (FC) Brabrand Sø (OT) Hassensør (BR) Skanderborg Sø (FC)
Hvid Stork (<i>Ciconia ciconia</i>)	30.4 13.5 22.5	1 1 1	Gylling Næs (NÅ) V.Ringgade, Århus (CA,MAN) Skødstrup (JK)
Sangsvane (<i>Cygnus cygnus</i>)	dec-mar 16.2 22.2	6-7 14 4	Ebeltoft Vig (BR) Ebeltoft Vig (BR) Salten Langsø (FHE)
Pibesvane (<i>C. bewickii</i>)	9.3 25.3	3 2	Moesgaard (TB) Bjerregrav Mose (NÅ)
Grågås (<i>Anser anser</i>)	21.2 24.3 31.3 11.4 12.4 19.4 22.3-1.7	1 8 8 2 4 2 ialt 70	Tollykke Skov (BR) Skanderborg Sø (FC) Moesgaard (GG) Kysing Fjord (PWB) Moesgaard (GG) Moesgaard (JL) Hjelm (KH)

Sædgås (<i>A. fabalis</i>)	21.4	1	Gylling Næs (NÅ)
Knortegås (<i>Branta bernicla</i>)	4.4 5.5	1 75	Alre Langør, Samsø (FLH)
Kanadagås (<i>B. canadensis</i>)	16.5	1	Hjelm (KH)
Krikand (<i>Anas crecca</i>)	19.4 foråret	100 4 par	Kysing Fjord (NÅ, FC) Hassensør (BR)
Atlingand (<i>A. querquedula</i>)	1.5 14.5	1 1 par	Brabrand Sø (TB) Brabrand Sø (FC)
Knarand (<i>A. strepera</i>)	12.3	1 par	Ranten-Dystrup Sø (TB, OF, FJ)
Skeand (<i>A. clypeata</i>)	19.4	1 par	Kysing Fjord (NÅ, FC)
Troldand (<i>Aythya fuligula</i>)	23.2	200	Brabrand Sø (TB)
Hvinand (<i>Bucephala clangula</i>)	jan-maj 2.6 16.6	1000 1 1	Ebeltoft Vig (BR) Amstrup Sø (NÅ) Kalsemade Rev (NÅ)
Stor Skallesluger (<i>Mergus merganser</i>)	vinter 23.2 overs. overs.	40 25 2 2	Stubbe Sø (BR) Brabrand Sø (TB) Stubbe Sø (BR) Brabrand Sø (GG)
Lille Skallesluger (<i>M. albellus</i>)	2.1 12.1 16.2 26.2 23.3 28.3	4 8 5 1 1 2	Kysing Fjord (PWB) Kysing Fjord (DOF) Kysing Fjord (DOF) Brabrand Sø (GG) Hjelm (KH) Stubbe Sø (BR)
Kongeørn (<i>Aquila chrysaetos</i>)	12.3	1	Ørnereden, Århus (THP)
Musvåge (<i>Buteo buteo</i>)	- 9.3 19.4	- 200 140	Kun få trækkende ved Moes- gaard, vel ikke mere end 6-700 ialt. Største dag 16.3 med 228 trækkende. Gjerrild Nederskov- rastenøe (MA, HE) Gjerrild (GG)

Blåbenet Musvåge (<i>B. lagopus</i>)	-		1.2-3.5 ialt 19 fugle iagtaget. Iagttagelserne er gjort 13 forskellige steder i amtet og største samlede antal var :
Rød Glente (<i>Milvus milvus</i>)	20.4 25.4 25.4 25.4 30.4 28.5 5.6	1 1 1 1 1 1 1	Trustrup (MA,HE) Nord-Djursland (FC) Gjerrild (NÅ) Moesgaard (JH) Gylling Møse (NÅ) Sondrup Plantage (NÅ,OT) Brabrand Sø (VJ)
Sort Glente (<i>Milvus migrans</i>)	15.5	1	Hjelm (KH)
Havørn (<i>Haliaetus albicilla</i>)	8.3 9.3	1 1	Fannerup (MA,HE) Gjerrild Nederskov (MA,HE) Der er tale om to forskellige ørne, den første var en juv. og den anden en næsten udfarvet fugl.
Hvepsevåge (<i>Fernis apivorus</i>)	maj-jun		Hjelm- ialt 100-150 trækkende. Første 30.4 (KH)
Rørhøg (<i>Circus aeruginosus</i>)	19.4-3.6 2.5-1.7	25-30	Iagttagelse af 14 fugle på 11 forskellige steder i amtet. Trækkende ved Hjelm (KH)
Blå Kørhøg (<i>C. cyaneus</i>)	19.4 19.4	1 1	Gjerrild Tårn (ØBF) Moesgaard (JL)
Hedehøg (<i>C. pygargus</i>)	17.5	1	Voel (TB)
Duehøg (<i>Accipiter gentilis</i>)	1.6 23.6	1 1	Salten Langsø (FC) Salten Langsø (TB, JH)
Spurvehøg (<i>A. nisus</i>)	19.4	30	Moesgaard - kun 50-100 trækkende i foråret (GG) Fornæs (GG)
Fiskeørn (<i>Pandion haliaetus</i>)	31.3 3.4 24.4 25.4	2 2 1 1	Moesgaard (GG) Gjerrild (PVJ) Hjelm (KH) Moesgaard (JL)

	2.5	1	Hjelm (KH)
	10.5	1	Emmedsbo Plantage (PMS, JV)
	11.5	1	Hjelm (KH)
	24.5	1	Glenstrup Sø (TB, TB, HMC)
	17.6	1	Hjelm (KH)
	22.6	1	Alrø (JHC)
Jagtfalk (<i>Falco rusticolus</i>)	20.4	1	Fornæs - rastende (KA, HE)
Vandrefalk (<i>F. peregrinus</i>)	10.2	1	Botanisk Have (TB)
	19.2	1	Viby (GG)
	10.4	1-2	Moesgaard (JL)
Lærkefalk (<i>F. subbuteo</i>)	15.5	1	Hjelm (KH)
	7.6	1	Hjelm (KH)
Dværgfalk (<i>F. columbarius</i>)	19.4	1	Moesgaard (JL)
	10.5	1	Emmedsbo Plantage (PMS, JK)
Aftenfalk (<i>F. vespertinus</i>)	29.4	1	Syd for Ebeltoft (BR)
Trane (<i>Grus grus</i>)	25.4	1	Stubbe Sø (BR)
Engsnarre (<i>Crex crex</i>)	14-26.5	1	Brabrand Sø (fl. obs.)
Lille Præstekrave (<i>Charadrius dubius</i>)	14.5	2	Brabrand Sø (FC)
	23.5	1	Brabrand Sø (PWB)
	2.6	1 par	Hylken (FC)
	2.6	1 par	Harndrup (FC)
Hjejle (<i>Pluvialis apricaria</i>)	-	4200	Det maksimale tal for Alrø (N)
Stenvender (<i>Arenaria interpres</i>)	30.4	3	Alrø (NÅ)
	1.5	1	Alrø (NÅ)
Enkeltbekkasin (<i>Limnocyptes minimus</i>)	7.1	1	Fredensvang Runddel, Århus (NÅ)
	9.3	1	Jyllands Allé, Århus (NÅ)
	16.3	1	Lystrup Ådal (HB)
Skovsneppe (<i>Scolopax rusticola</i>)	16.3	1	Viby (PT)
	21.3	1	Hjelm (KH)
	24.3	1	Storskoven, brabrand Sø (FC)
	27.3	1	Trak over Fiskerihavnen (MA, H)
	6.4	1	Viby (JL)
	10.4	1	Moesgaard (JL)

Stor Kobbersneppe (<i>Limosa limosa</i>)	17.4 18.4 4.5 11.5	1 1 1 11	Brabrand Sø (PWE) Brabrand Sø (GG) Splidholm, Gylling (NÅ) Hassensør (BR)
Lille Kobbersneppe (<i>L. lapponica</i>)	- 5.5	1500 500	Alrø, forårets max. (NÅ) Langør, Samsø (FIH)
Svaleklire (<i>Tringa ochropus</i>)	21.6	1	Edslev (FC)
Damklire (<i>T. stagnatilis</i>)	2.6	1	Kalsemade Rev (NÅ, OT)
Temmincksryle (<i>Calidris temminckii</i>)	14.5 23.5	1 1	Brabrand Sø (FC) Kalsemade Rev (NÅ)
Alm. Ryle (<i>C. alpina</i>)		7200 1200	Alrø, forårets max. (NÅ) Søby Rev, max. (NÅ)
Sandløber (<i>C. alba</i>)	30.4 16.5 23.5	7 1 1	Alrø (NÅ) Hjelm (KH) Kalsemade Rev (NÅ) Sandløber er ikke alm. om foråret i Østjylland.
Sorthovedet Håge (<i>Larus melanocephalus</i>)			1 han 27.4-12.5. Hjelm (KH) Favde skrabet redeskål og hævdede territorie. Gjorde ivrige parringsforsøg over- for en Stormmåge 2.år, men uden resultat.
Dværgmåge (<i>L. minutus</i>)	6.5 12.5 20.5	1 1 1	Søby Rev (NÅ) Kalsemade Rev (NÅ) Alrø (NÅ)
Sortterne (<i>Chlidonias niger</i>)	14.5	1	Kalsemade Rev (NÅ)
Tejst (<i>Cepphus grylle</i>)	12.4 21.3-5.6	8 11	Sangstrup Klint (DOF) Hjelm (KH) Hjelm, 4 ynglepar (KH)
Huldue (<i>Columba oenas</i>)	26.3 5.4 24.4 -	1 1 7	Hjelm (KH) Kysing Fjord (GG) Hassensør (BR) Moesgaard, 50-60 trækkende, største tal 31.3 med 12 Huldu
Ringdue (<i>C. palumbus</i>)	vinter 31.3	350 1100	Tollykke Skov (BR) Moesgaard, max. (GG)

Turteldue (<i>Streptopelia turtur</i>)	8.5	1	Kasted Mose (EB)
Slørugle (<i>Cyto alba</i>)	17.4	1	Hornslet (PWE)
Spurveugle (<i>Glaucidium passerinum</i>)	24.1	1	Stadion Haller, Århus (VA) Ramt af bil.
Kirkeugle (<i>Athene noctua</i>)	4.6	1	Bjerregrav Mose (GBF)
	9.6	1	Ormslev (CG)
Natugle (<i>Strix aluco</i>)	27.5	1	Hjelm (KH)
Skovhornugle (<i>Asio otus</i>)	8.2	1	Kysing Fjord (FLH)
	25.2	11	Brabrand Sø (OT)
	6.5	1	Hjelm (KH)
	25.5	1	Brabrand Sø (EB, JH)
	15.6	2	Brabrand Sø (EB, JE)
Mosehornugle (<i>A. flammeus</i>)	8.2	1	Kysing Fjord (FLH)
	16.3	3	Dystrup Ådal (EB)
	22.4	1	Kysing Fjord (PWE)
	28.4	1	Gylling Næs (NÅ)
Nattravn (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	30.5	1	Hjelm (KH)
Isfugl (<i>Alcedo atthis</i>)	16.3	1	Botanisk Have (KH)
	12.4	1	Rampton-Dystrup Søer (ICE)
Vendehals (<i>Cynx torquilla</i>)	30.4	1	Kasted Mose (EA)
	11.5	1	Tollykke Skov (BR)
	26.4-18.5	17	Totaltal for Hjelm (KH)
Hedelærke (<i>Lullula arborea</i>)	16.3	1	Moesgaard (PT)
	26.3	1	Hjelm (KH)
	14.5	1	Hjelm (KH)
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	-		Ynglepar i Søby Fredskov og Kalsemade Skov (NÅ)
Ravn (<i>Corvus corax</i>)	8.2	1	Hansted Å (NÅ)
	28.2	1	Hedensted (NÅ)
	12.3	1	Tollykke Skov (BR)
	29.3	1	Hjelm (KH)
	-	1 par	Fløjstrup Skov (NÅ, FC)
	-	1 par	Gyllingnæs Skov (NÅ)

Sortkrage (<i>C. corone corone</i>)			10 iagttagelser i amtet med ialt 14 fugle.
Pungmejse (<i>Remiz pendulinus</i>)	14.5	1	Et sted i amtet er han under redebygning, forlod stedet 14 dage senere. (PWB)
Skægmejse (<i>Panurus biarmicus</i>)	maj 2-5 jun 4	par 4	Brabrand Sø (PC) Hallandsbjerg Holme, Randers Fjordå (FS)
Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)	13.2 29.4 1.5 11.5	1 2 2 1	Ahl Plantage (BR) meget tidligt Hjelm (KH) Hjelm (KH) Hjelm (KH)
Stenpikker (<i>Cenanthe oenanthe</i>)	jun	2 par	Brandrupdam (JK)
Husrødstjert (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	-		Nye ynglepar - 2 par på Lystrupvej, Århus og 1 par Viby industri kvarter (JK, CT)
Sortstrubet Bynkefugl (<i>Saxicola torquata</i>)	8.3	1	Lystrup Ådal (SS, LM, HS)
Blåhals (<i>Luscinia svecica</i>)	9.5-7.6		Hjelm, 9 ringm. (KH)
Græshoppesanger (<i>Locustella naevia</i>)	6.5-15.6		Brabrand Sø, mange iagttagelse af mindst 3 forskellige fugle
	7.5	1-2	Nørreå v. Fladebro (PVJ)
	10.5	1	Hjelm (KH)
	19.5	1	Hjelm (KH)
	21.5	1	Hjelm (KH)
	4.6	1	Bjerregrav Mose (ØBF)
Drosselrørsanger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	-		Et ynglepar et sted i amtet.
Munk (<i>Sylvia atricapilla</i>)	jan-apr feb	1 1	Marielund, Århus (PWB) Ebeltoft (BR)
Høgesanger (<i>Sylvia nisoria</i>)	15.5 29.5	1 1	Pannerup-Elev Mose (TB) Hjelm (KH) Ynglede i 1974 på Hjelm (KH)
Rødtoppet Fuglekonge (<i>Regulus ignicapillus</i>)	19.4 16.5	1 1	Fornæs (ØBF) Forstbotanisk Have (TB, SH) Apr-jun 10 ringmærket på Hje

Lille Fluesnapper (Muscicapa parva)	9.5-5.6		8 iagtaget på Hjelm (KH)
Rødstrubet Piber (Anthus cervinus)	12.5	1	Viby (PT)
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)	-		Der synes at være flere ynglepar end sidste år, flere lokaliteter med 2 par.
Silkehale (Bombycilla garrulus)			Småflokke er i vinter set over det meste af Århus by, de sidste set 29.4
Stor Tornskade (Lanius excubitor)	jan-apr		Virkelig mange iagtagelser i vinter, 39 observationer, hver dog en del må være gengangere
Rødrygget Tornskade (L. minor)	15.6 23.6 - - -	1 par 1 1 par 1 par -	Brabrand Sø (TB, JH) Katrinedal (TB, JH) Amstrup (NÅ) Søby Fredskov (NÅ) 26 ringm. Hjelm (KH)
Bjergirisk (Carduelis flavirostris)	2.2 2.2 1-10.2 16.2 25.2	20 75 10 45 5-10	"Huset", Århus (OP) Brabrand Sø (GG) Viby (GG) Kysing Fjord (OT, TB, JH) Brabrand Sø (OP)
Gulirisk (Serinus serinus)	13.5 -	1	Hjelm (KH) Forstbotanisk Have, en syngende han iagtaget fra medio maj til medio juni. I kortere tid sang en anden han samme sted.
Karminømpap (Carpodacus erythrinus)	26.5 2.6 8.6	1 1 1	Hjelm (KH) Hjelm (KH) Hjelm (KH)
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus)	12.4	2	Gjerrild Nederskov (BR)
Hortulan (Emberiza hortulana)	16.5 4.5-8.6	1	Søby Fredskov (NÅ) Hjelm, ialt 35-37 (KH)
Snespurv (Plectrophenax nivalis)	12.1 5.2 16.2 5.3 22-30.3	3 10 3 6 20-25	Kysing Næs (OT, TB, JH) Alrø (PWB) Kysing Næs (OT) Ved Ebeltoft Færgeshavn (BR) Hjelm (KH)