

Så er det atter tid for en lokalrapport over Østjyllands fugleliv. Denne rapport omhandler iagttagelser gjort i 1978. Det skal beklages at en i Sørvæn 2:78 lovet halvårsrapport ikke udkom. Det skyldtes ganske enkelt, at materialet var for lille. Vi har derfor samlet alt materialet fra 1978 i en rapport.

Trods manglen af udkomne lokalrapporter er materialet til stadighed vokset. Der kræves så megen tid at skulle behandle og renskrive stoffet, at det bliver næsten en uoverkommelig opgave for kun 2-3 mand. Vi ser således gerne at Rapportgruppen bliver udvidet med et par m/k. Materialet er denne gang indløbet fra så godt som hele amtet. Glædeligt at også Samsø er kommet med.

I 1978 var det vadefuglene som optog os mest. Gennem de månedlige tællinger fik Vadefuglegruppen samlet et godt materiale om denne fuglegruppes forekomst. Dette materiale er også tilgået Rapportgruppen, hvilket er medvirkende til en meget grundig behandling. Nogle vil måske synes, at der er knyttet for mange kommentarer til dette afsnit, men det må de så finde sig i denne gang.

Fremover beder vi bidragsyderne om at udfylde nogle skemaer, som skulle være en hjælp for dem, som behandler materialet. Skemaerne er ganske enkle. Et eksempel på udfyldelsen af et sådant skema er vist. På alle sine skemaer skriver man fulde navn, da forkortelser kan være årsag til forviklinger. Man bør i øvrigt angive om det drejer sig om iagttagelser af trækkende fugle.

Art: Gravand	Observatør: Hans Hansen		
Dato	Antal	Lokalitet	Bemærkninger
25/2	5 N	Kysing Næs	
25/2	65	Kysing Fjord	

Systemet med I-arterne kører stadig, og du vil på vedlagte liste finde alle de arter vi ønsker alle oplysninger om. Det er i øvrigt op til dig selv, hvor meget du gider sende ind, men jo mere vi får, des bedre bliver lokalrapporten.

Arbejdsbyrderne i denne rapport er fordelt således:

Kommentarer til lommer-vandhøns, samt afsnittet måger-spurvefugle:
Niels Aagaard.

Sammenstilling af afsnittet lommer-vandhøns: Carsten J Andersen.

Indledning, kommentarer til lommer-vandhøns, samt afsnittet om vadefugle: Allan Janniche.

Bidragsydere:

Niels Aagaard (NA), Lars Abrahamsen (LA), Christian Andersen (ChA), Carsten J Andersen (CJA), Leif Brauer (LB), Per W Buchwald (PWB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Henning Elgaard (HE), Jens Gregersen (JG), Georg Guldvang (GG), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH), Steen Kjærlund Hansen (SKH), Hans Henrik Høj (HHH), Allan Janniche (AJ), Lars P Johansson (LPJ), Else Juul (EJ), Helle Kousholt (HK), Jan Drachmann Kristensen (JDK), Jan Lundgaard Kristensen (JLK), Henning Lykke Larsen (HLL), Finn B Mogensen (FBM), Peter Nielsen (PN), Stig Bachmann Nielsen (SBN), Claus Petersen (CP), Niels Anton Petersen (NAP), Michael Brinch Petersen (MBP), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pinstrup (HP), Gert Rosenlund (GR), Søren Skrivers (SS), Peter Thomsen (PT), Ole Thorup (OT), Mogens Wedel-Heinen (MW-H), Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Vadefuglegruppen (VF), og Østjysk Biologisk Forening (ØBF).

Sortstrubet lom (*Gavia arctica*): 21/11 3 trk. S Fornæs (HLL).

Is-/Hvidnæbbet lom (*Gavia immer/adamsii*): 22/12 skulle ? trækkende ex. være iagttaget ved Fornæs (RD).

Rødstrubet lom (*Gavia stellata*): Materialet begrænser sig til 1 forår iagttagelse samt 2 efterårsiaagttagelser.

24/3 1 trk. S Fornæs (JRR).

15/11 1 trk. S Kysing Næs (HLL), og 21/11 2 trk. S Fornæs (HLL).

Lom sp (*Gavia*): Er truffet på de sædvanlige lokaliteter og i antal som ligger omkring det normale.

Forår: 15/3 1 trk. N Århus Havn (CA) og 16/3 1 trk. N Moesgård (CA).

Efterår: 21/11 15 Fornæs (HLL), 22/11 37 Fornæs (RD) og 24/11 32 Fornæs (RD).

Toppet lappedykker (*Podiceps cristatus*): Skønt denne art er ret så maritim uden for yngletiden, foreligger der en del vinteriaagttagelser fra Brabrand Sø: 14/1 1 (AJ), 22/1 4 (AJ), 26/1 1 (AJ), 7/12 2 (AJ), 10/12 1 (AJ), 14/12 1 (AJ) samt 17/12 1 (NÅ, HK). Af større koncentrationer er meldt: 12/3 56 Alrø (AJ), 7/5 60 Julsø (NÅ, HK), 12/7 57 Horskær (LPJ), 16/7 128 Mellem Randers- og Mariager Fjord (LPJ), 20/8 287 Mellem Randers- og Mariager Fjord (LPJ), 5/9 582 Horskær (LPJ) og 4/11 1 Salten Langsø (LPJ). Eneste trækobservation var 29/3 1 trk. N Fornæs (NÅ, HK).

Gråstrubet lappedykker (*Podiceps griseigena*): Mange iagttagelser fra foråret. Iagttagelserne fra maj-august angiver ynglefuglene. 12/3 5 Alrø (AJ), 25/3 2 Tranemosen, Samsø (IP), 20/4 1 Mossø (HP), 1 Brabrand Sø (AJ), 6/4 1 Brabrand Sø (CJA, FBM), 16/4 2 Amstrup-Martensøer (HP), 19/4 1 Ralværket/Hassenøre (JRR), 21/4 2 ved Ralværket n.f. Randers (JRR), 4/5 1 Bjerregrav Mose (EJ), 15/5 3 Røstrup Sø (HP), 20 1 Galten Sømose (NÅ, HK), 21/5 2 Galten Sømose (NÅ, HK), 17/6 1 Kysing Fjord (AJ, HP), 20/6 1 Amstrup Mose (AJ, HP), 23/7 2 ad. og 2 juv. Tranemosen, Samsø (LB), 29/7 2 store juv. Galten Sømose (NÅ, HP), 30/8 1 ad. og 1 juv. Kysing Fjord (AJ, LPJ, HP), 21/11 1 n. Fornæs (HLL).

Nordisk lappedykker (*Podiceps auritus*): Meget sjælden gæst i Østjylland dog denne ene iagttagelse: 24/11 1 Fornæs (RD).

Forthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*): En del observationer fra kolonien i Mossø. Blandt Kysing Fjord fuglene findes sikkert en del gangere.

23/4 4 Mossø v. Klostermølle (KH), 25/4 2 Mossø v. Fuldbro Mølle (HP), 21/5 2-3 Mossø, Emborg Odde (HP), 28/5 15 Mossø, Emborg Odde (HP), 30 8 Mossø, Emborg Odde (HP), 5/6 8 Mossø, Emborg Odde (HP), 17/6 par med 1 pull. Mossø, Emborg Odde (HP), 15/8 1 Kysing Fjord (AJ, LPJ), 23/8 3 Kysing Fjord (AJ, LPJ), 26/8 4 Kysing Fjord (LPJ, HP), 3/9 4 Kysing Fjord (AJ).

Lille lappedykker (*Podiceps ruficollis*): Fra følgende lokaliteter foreligger der vinteriaagttagelser:

Emborg Bro v. Gudenåen max. 15 ex. 19/2 (AJ, NAP), 1 22/1 Mossøslund v. Randers (JRR), 21 11/11 Kysing Fjord (PWB) og 1 15/11 Brabrand Sø (SBN). Udover vinteriaagttagelserne skal kun nævnes en flok på 36 ex. 23/8 Kysing Fjord (AJ).

Stormfugle (*Procellariidae*): Østjylland er ikke kendt for sine iagttagelser af stormfugle, så at hele 4 arter har vist sig i efteråret 1978 må siges at være fantastisk. To arter falder i midten af september og oktober hvor to kraftige vestenstorme bragte et stort antal ind til de jyske vestkyst. De to arter som iagttoges i november syntes at måtte

have opholdt sig i Kattergat et stykke tid, idet der ikke omkring iagttagelsestidspunktet var storme af navnneværdig karakter. Fuglene i oktober kan være kommet ind i Kattergat langs den svenske vestkyst og er således iagttaget her i Østjylland på vej ud af Kattergat i november.

Kallemuk (*Fulmarus glacialis*): 26/11 2 Fornæs (RD).

Almindelig skråpe (*Puffinus puffinus*): Henvises til appendix.

Sodfarvet skråpe (*Puffinus griseus*): Ca. 17/9 1 Vorsø (Jens Gregersen).

Stor stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*): Ca. 20/10 1 Kysing Fjord (Lars Abrahamsen).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*): Først ankomne fugle til Vorsø-kolonien, ynglefugle bestanden på Vorsø, trækiagttagelser og indlands iagttagelser fra søerne, specielt i det midtjyske.

Alrø: 8/1 2 (AJ) og 26/1 15 (AJ). Ynglebestanden på Vorsø: 800-900 par (Jens Gregersen).

Trækiagttagelser: Kysing Næs: 7/1 2 N+9 S (AJ), 28/1 1 trk. (AJ), 3/11 1 juv. trk. (HLL), 15/11 1 juv. trk. (HLL). Moesgård Strand: 2/4 1 S, 1/4 1 N og 20/5 5 S. Desuden 21/11 2 ad. S Fornæs (HLL).

Indlands obs: Mossø: 21/5 24 (FC), 21/5 26 (HP), 28/5 10 (HP), 30/5 6 (HP), 5/6 5 (HP) og 18/6 11 (HP). Desuden 28/5 2 Skanderborg Sø (HP), 15/6 2 Stilling Sø (HP) og 17/6 2 Stilling Sø (HP).

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*): Henvises til appendix.

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): Trækiagttagelser, ynglefugle og efterårets maksimum for en række lokaliteter.

Trækobs: Moesgård Strand: 12/3 1 NØ, 22/3 2 N, 1/4 1 N, 2/4 1 N, 9/4 1 N, og 15/4 1 N. Total: 7 trækkende ex. Kun kolonien i Marselisborg Skov optalt: 30/3 6 reder (NA, HK). Efterårs maksimum: 20/8 204 Mariager Fjord (AJ), 9/9 28 Brabrand Sø (AJ), 15/10 60 Stavns Fjord (LB), 3/9 70 Kysing Fjord (AJ) og 29/7 28 Alrø (CJA).

Stork sp (*Ciconiidae*): 28/5 2 N Salten Langsø (HP), sandsynligvis sort stork.

Hvid stork (*Ciconia ciconia*): Ynglefugle: Randers: par med 3 unger (JRR, Hr), Hobro: par med 5 unger (HP).

Desuden: 27/5 4 SV Strandvejen, Århus (HLL), 3/6 3 S kanehaven, Samsø (Klaus Malling Olsen, Torben Gross m.fl.), 7/6 2 n.f. Odder (JG) og 28/6 3 Hasselager (medd. HK).

Sort stork (*Ciconia nigra*): 19/8 2 formentlig ved Gjerlev (Per Hald).

Knopsvane (*Cygnus olor*): Af iagttagelserne skal kun nævnes de største tal fra de pågældende lokaliteter: Kysing Fjord 16/10 1144 (AJ), Mariager Fjord 11/11 1050 (AJ), Randers Fjord 4/6 571 (JRR) og Ramten Sø 24/3 40 (JRR).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): Randers Fjords udløb: 14/1 158 ad. og 12 juv. (JRR), 21/1 175 (ca. 10 % juv.) (AJ), 31/1 84 (JRR), 18/2 150 (JRR), 11/11 119 ad. og 1 juv. (JRR), 11/3 330 ad. og 20 juv. (AJ), 27/3 27 (JRR) og 16/12 91 ad. og 2 juv. (JRR).

Mariager Fjord: 26/3 86 (JRR), 11/11 10 ad. (AJ), 16/12 125 ad. og 12 juv. (AJ), Kysing Fjord: 7/1 2 ad. (AJ), 29/11 2 ad. (AJ) og 1/12 6 v (CA).

Brabrand Sø: 22/3 3 ad. (AJ) 29/11 2 ad. (AJ). Moesgård Strand: 6/3 1 S, 12/3 1 N, 28/3 1 N og 6/4 66 Ø. Stavns Fjord: 22/3 3, 24/3 3, 17/10 24 VSV og 28/10 2 (alle LB). Salten Langsø: 18/2 13 (SS) og 19/2 5 ad. og 4 juv. (AJ). Mossø: 19/2 5 (HHH), 19/2 7 ad. (AJ), 19/3 9 Klostermølle (EJ) og 2/12 13 (HHH). Desuden: 18/2 2 ad. Begtrup Røn (AJ), 12/3 2 ad. og 4 juv. Glenstrup Sø (JRR), 19/3 26 Øer, 5/4 4 NØ Rosmus (SKH), 14/11 4 og 1/12 6 v Århus C (SBP).

Grå gås sp. (Anser sp.): 3/3 2 Spangsbæk (NÅ, HK), 5/3 12 Fussing Sø (JRR), 6/3 2 N Mossø, 9/3 6 N Åby Enø (AJ), 11/3 7 N Moesgård Strand (HP), 12/3 9 Moesgård Strand (HLL, JL), 19/3 1 V Panders Fjord (JRR), 25/3 1 Ø Gudeni v. Panders (JRR) og 27/3 2 V Moesgård Strand (HP).

Grågås (Anser anser): Specielt i forårsmånederne er arten vist repræsenteret på diverse lokaliteter. De første er truffet endog ret så tidligt 29/1 2 S Silistria Århus og 30/1 8 Vorsø (WC).

Herefter følgende forårsiagttagelser: Brabrand Sø: 5/3 2 (AJ), 15/3 1 V (AJ) og 1/4 3 (AJ). Kysing Fjord: 6/3 3 N og 17 rast (AJ), 16/3 1 (AJ) og 1/4 12 (AJ). Moesgård Strand: 12/3 10 (HLL, JL), 27/3 2 (AJ), 30/3 9 (PNN), 11/4 1 (HLL) og 15/4 5 N (SS). Alrø: 12/3 2 (AJ) og 26/3 4 (HP). Skanderborg Sø: 6/4 21 (HHH) og 11/5 23 (HHH). Nystrup Rampe Søer: 29/3 1 (NÅ, HK), 8/4 1 (HP), 16/4 6 (HP) og 29/4 1 (HP, SBP). Øvrige: 5/3 4 Viby, 8/4 1 N Gjerrild Stenværk (SBP), 2/4 12 Stubbe Sø (SBP), 7/5 10 Lindholm Hoved (EJ), 22/5 11 Pinds Mølle (PRK) og 29/5 15 Emborg Tange (HP).

Efterår: Kysing Fjord: 9/7 2 (AJ), 8/8 1 (AJ), 13/8 6 (OF), 15/8 6 (AJ), 26/8 5 (AJ) og 3/9 1 (AJ). Alrø: 15/7 28 (LPJ), 17/7 43 (SS), 19/7 50 (LPJ), 26/7 52 (AJ) og 29/7 14 (CA). Øvrige: 2/7 1 Horsker (LPJ), 26/7 22 Skanderborg Sø (HHH), 9/8 50 Ø Brabrand Sø (HLL), 28/9 3 V Risskov (HLL), 30/9 260 Hassenøre (HE, GR) og 14/10 5 Haraldslund Skov, Hinnerup (PN).

Sædgås (Anser fabalis fabalis): Moesgård Strand: 6/3 6 S (SS), 11/3 6 (SS) og 28/3 4 N (AJ). Øvrige: 19/3 14 Mossø (EJ) og pr. marts 5 Pestr Røn.

Efterår: 23/9 50 Risskov (SS), 27/11 10 NNV Stavns Fjord (LE), 23/12 25 Fornæs (RD) og 27/12 35 Sø Brabrand Sø (CJA).

Knortegås (Branta bernicla): Sødringholm: 7/1 170 (JRR), 22/1 900 (AJ), 11/11 93 lysbugede (AJ) og 16/12 ca. 350 lysbugede (AJ). Mariager Fjord: 16/12 75 lysbugede (AJ) og 16/12 1000-1100 v. Als Odde (AJ). Stavns Fjord: 20/4 85 (LB), 21/4 25 (LB), 22/4 24 (LB), 28/4 100 (SC), 13/10 9 (LB) og 16/10 3 (LB). Kysing Fjord: 12/10 1 (LPJ), 13/10 2 juv. (SS), 15/10 2 mørkbugede (DOF) og 28/10 1 (LH). Horsker: 3/10 6 S, 10/10 55 og 14/10 11 3 (alle LPJ). Desuden: 12/10 6 Moesgård Strand (SBP), 21/11 19 Alrø (LPJ) og 31/11 5 Lerdrup Vig (LPJ).

Knortegås (Branta bernicla):

Kanadagås (Branta canadensis): Disse iagttagelser foreligger: 24/2 1 S Yding (HP) og 17/12 1 Brabrand Sø (NÅ, HK).

Gravand (Tadorna tadorna): Vinterobs (jan-feb og dec) samt store koncentrationer og fugle på udsædvanlige lokaliteter efter årstiden.

7/1 200 Mariager Fjord (JRR), 7/1 240 Sødringholm (JRR), 8/1 10 Alrø (AJ), 14/1 110 Sødringholm (JRR), 15/1 10 Stavns Fjord (LB), 21/1 6 Sødringholm (AJ), og 26/1 45 Alrø (AJ). 11/3 192 Mariager Fjord (JRR), 16/7 520 Mariager Fjord (AJ), 16/10 495 Mariager Fjord (AJ), 11/11 1170 Mariager Fjord (AJ), 11/11 436 Sødringholm (AJ), 16/12 970 Mariager Fjord (AJ, NAP) og 16/12 323 Sødringholm (AJ, NAP). 12/11 7 Kysing Fjord (LH, SBP) og 17/11 1 Brabrand Sø (HLL).

Gråand (Anas platyrhynchos): Der foreligger store tal fra såvel forår som efterår. De største tal: 7/1530 Kysing Fjord (AJ, NAP), 8/1 510 Fussing Sø (JRR), 19/2 300 Salten Langsø (AJ, NAP), 22/3 377 Brabrand Sø (AJ), 27/3 150 Sødringholm (JRR) og 15/10 1225 Kysing Fjord (DOF).

Krikand (*Anas crecca*): Mange vinterfugle (jan-feb og dec). Forårs-
og efterårsmaksima samt oversomrende fugle.

Kysing Fjord: 7/1 35 (AJ,NAP), 22/1 60 (AJ), 28/1 74 (AJ,NAP), 4/2
54 (AJ), 1/4 240 (AJ), 1/7 20 (LPJ), 15/7 38 (AJ), 13/8 150 (CP),
3/9 60 (AJ), 29/10 115 (AJ), 12/11 98 (LH;SBP) og 17/12 34 (AJ).
Brabrand Sø: 28/4 85 (AJ), 28/7 12 (CJA) og 20/9 35 (AJ). Endvidere:
29/3 11 Ramten-Dystrup Søer (NÅ,HK), 2/4 55 Råby v. Randers Fjros
(JRR), 8/4 35 Stubbe Sø (ØBF) og 2/9 40 Stavns Fjord (LB).

Atlingand (*Anas querquedula*): Observeret på tre lokaliteter.

Brabrand Sø: 7/4 1 par Åby Eng (AJ), 19/4 1 par Døde Å (AJ) og 2/5
1 par + 1 han (AJ). Ramten-Dystrup Søer: 8/4 1 han (HP) og 29/4 1 par
(TB,SBP). Kysing Fjord: 18/8 3 (AJ,LPJ), 23/8 1 (AJ) og 3/9 1 (AJ).

Pibeand (*Anas penelope*): Store tal for vinter, forår og efterår. End-
videre oversomrende fugle fra juni og juli.

Kysing Fjord: 15/1 190 (FC), 28/1 375 (AJ), junimax. 17 (AJ,HP), juli-
max. 16 (AJ,LOJ,HP), 7/10 1000 (CJA), 10/10 (CP) og 4/11 1100 (CJA,SS).
Brabrand Sø hvor arten er uregelmæssig om efteråret: 29/9 1 (SBN) og
9/11 3 (AJ). Desuden: 2/4 282 Sødringholm (JRR) og 9/4 520 Mariager
Fjord (JRR).

Spidsand (*Anas acuta*): Langt det største antal iagttagelser fra KY-
sing Fjord, der strækker sig over hele året. Ellers pænt rapporteret
fra april.

Kysing Fjord: 7/1 3 (SS), 22/1 1 par (AJ), 17/6 2 (AJ,HP), 1/7 1 (AJ,LPJ),
3/9 3 (AJ), 7/10 6 (CJA), 13/10 1 par (CP), 15/10 3 (DOF), 29/10 8 (AJ),
1/11 4 hanner + 15 hunner (CP), 4/11 9 (CJA,SS), 5/11 8 (AJ,LPJ), 11/11
6 (PWB) og 17/12 6 hanner + 3 hunner (AJ,CP). Randers Fjord v Udbyhøj:
2/4 27 (JRR) og 15/4 8 (AJ,JRR). Mariager Fjord: 15/4 1 par og 17/5 1
hun (AJ). Desuden 21/4 2 Stavns Fjord (LB).

Skeand (*Anas clypeata*): Virkelig mange rapporteret gennem hele året.

Brabrand Sø: 3/4 18 (LA,JG), 6/4 2 par (CJA,AJ,FBM), 7/4 2 (FC), 7/4 1
han + 2 hunner (AJ), 14/4 4 par (AJ), 19/4 1 han (NÅ,HK), 19/4 2 hanner
+ 1 hun (AJ), 22/4 2 par (AJ), 28/4 7 hanner + 4 hunner (AJ), 2/5 7 par
(AJ) og 5-6/5 1 han (AJ) samt 9/11 1 (AJ). Kysing Fjord: 7/1 1 par (AJ),
22/1 2 hanner + 3 hunner (AJ), 28/1 1 han + 2 hunner (AJ), 1/4 3 hanner
+ 1 hun (AJ), 15/5 1 par (AJ), 17/6 2 hanner (AJ), 27/6 4 hanner + 4 hun-
ner (AJ), 28/6 2 hunner (AJ,LPJ), 1/7 6 (AJ,LPJ), 2/7 8 (AJ), 3/7 6 (AJ), 4/7 2
(AJ), 6/7 3 (AJ), 9/7 5 (AJ), 15/7 1 (AJ), 25/7 4 (AJ), 6/8 18 (AJ),
8/8 13 (AJ), 13/8 7 (CP), 15/8 35 (AJ), 23/8 17 (AJ), 26/8 8 (AJ), 3/9
2 (AJ), 7/10 7 (CJA), 10/10 11 (CP), 15/10 36 (DOF), 28/10 4 (LH),
29/10 26 (AJ), 1/11 2 hanner (CP), 3/11 6 (CJA), 4/11 8 (CJA,SS), 5/11
3 (AJ), 11/11 10 (PWB), 12/11 10 (LH,SBP) og 17/12 4 hanner + 2 hun-
ner (AJ,CP). Øvrige: 14/2 1 han Universitetsparken, Århus (NÅ,HK), feb.
1 han Stadionsøerne, Århus (NAP), 26/3 2 Barnekold, Stavns Fjord (LB),
29/3 2 par Ramten-Dystrup Søer (NÅ,HK), 1/4 1 han Forstbotanisk Have,
Århus (NÅ,HK), 6/5 1 han trækkende S Moesgård Strand (AJ), 10/5 2
Tåstrup Sø (EJ), 21/6 20 Sorte Sø, Skanderborg (HHH) og 9/9 1 Salten
Langsø (AJ,LPJ).

Taffeland (*Anthya ferina*): Nogle store tal fra Kysing Fjord: 7/1 93
(AJ,NAP), 28/1 75 (AJ,NAP), 15/10 195 (DOF), 4/11 103 (CJA), og 17/12
150 (CP). To store tal fra Brabrand Sø: 7/3 25 (NÅ,HK) og 1/4 46 (AJ).

Troldand (*Anthya fuligula*): De største tal fra Kysing Fjord: 7/1 350 (AJ), 1/11 450 (CP) og 4/11 600 (CJA,SS). Øvrige: 29/1 200 Fussing Sø (JRR), 4/2 170 Glenstrup Sø (JRR), 1/4 74 Brabrand Sø (AJ) og 21/4 238 Udbyøver Sø v Randers (JRR).

Bjergand (*Anthya marila*): Ikke mange obs af denne maritime art. Støret opmærksomhed påkalder kysingfuglen sig.

31/1 1 hun/juv Brabrand Sø (AJ), 5/2 35 S Moesgård Strand (AJ), 26/8 1 hun/juv Kysing Fjord (AJ), 21/11 11 S Fornæs (HLL) og 26/11 993 Fornæs (RD).

Hvinand (*Bucephala clangula*): Maksimum for flere lokaliteter samt sommeragttagelser (maj-juli).

15/1 180-200 Stavns Fjord (LB), 19/2 900 Begtrup Vig (AJ), 6/3 192 Kysing Fjord (AJ), 11/3 316 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR), 3/4 21 Brabrand Sø (AJ), 12/11 200 (LH,SBP), 25/11 150 Stavns Fjord (LB), og 16/12 300-400 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (AJ). Sommeragttagelser: 6/5 1 hun Glenstrup Sø (JRR), 11/6 1 Glenstrup Sø (JRR), 13/6 1 Bjerregrav Mose (AJ). Kysing Fjord: 1/7 3, 2/7 9, 3/7 2, 4/7 6 (AJ), 10/7 8 Brabrand Sø (AJ), Kysing Fjord: 11/7 2, 15/7 2 (AJ), 17/7 3 Brabrand Sø (AJ), 25/7 1 Kysing Fjord (AJ) og 26/7 5 Amstrup Sø (AJ).

Havlit (*Clangula hyemalis*): 1/11 1 hun Kysing Fjord (CP) og 21/11 1 hun S Fornæs (HLL).

Sortand (*Melanitta nigra*): Et par tal fra Sødringholm: 21/1 4000 S (AJ,NAP) og 11/3 3000 rast (AJ).

Ederfugl (*Somateria mollissima*): Kun en obs nær de 1000. 29/1 1000 rast Moesgård Strand (AJ).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): Som sædvanligt mange rapporteret. Glenstrup Sø: 4/2 117 og 12/3 187 (JRR). Fussing Sø: 8/1 11, 5/3 39 og 12/3 28 (JRR). Ramten-Dystrup Søer: 29/3 19 (NÅ,HK) og 8/4 2 (HP). Stubbe Sø: 29/3 25 (NÅ,HK), 8/4 150 (ØBF) og 8/4 173 (LH,OT). Brabrand Sø (maksimum): jan. 14 (AJ), feb. 3 (AJ), marts 38 (AJ), april 12 (AJ), forårets sidste 6/4 6 (AJ), efterårets første 29/11 1 (AJ) og dec. 8 (AJ). Kysing Fjord (maksimum): jan. 30 (AJ), feb. 7 (NÅ,HK), marts 6 (AJ), april 33 (AJ), forårets sidste 2/4 8 (NÅ,HK) og 17/12 7 (AJ,CP). Stavns Fjord. 15/1 3, 23/3 4 og 27/3 5 (LB). Alrø: 26/1 2 (AJ), 12/3 21 (AJ), 28/3 7 (NÅ,HK) og 17/7 1 (SS). Salten Langsø: 29/1 150 (ØBF), 19/2 1 han (AJ) og 19/3 40 (HP). Trækobs fra Moesgård Strand: 11/3 3 N (HP), 24/3 6 NØ (AJ,HP), 27/3 5 N + 2 S (AJ), 11/4 3 Ø (HLL) og 3/12 3 S (AJ,LPJ). Øvrige: 7/1 15 Gudensø (HHH), 1302 3 Tangkrogen, Århus (NÅ,HK), 15/2 1 han Risskov (NÅ,HK), 18/2 30 Randers Fjords udløb (JRR), 24/2 5 Gudenåen v Randersmotorvejen (NÅ,HK), 25/3 6 Gudenåen v Randers (JRR), 29/3 1 par S Fornæs (NÅ,HK), 2/4 4 Randers Fjord v Råby (JRR) og 9/4 7 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR).

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): Traditionelt kun få udenfor Kysing Fjord.

Kysing Fjord: 7/1 8 hanner + 1 hun (AJ,NAP), 15/1 7 hanner + 8 hunner (FC), 22/1 4 hanner + 4 hunner (AJ), 28/1 13 hanner + 1 hunner (AJ,NAP), 4/2 10 hanner + 9 hunner (AJ), 21/2 1 han + 2 hunner (NÅ,HK), 6/3 7 hanner + 4 hunner (AJ), 16/3 3 hanner + 7 hunner (AJ), 1/4 4 hanner + 7 hunner (AJ), 10/10 1 hun (CP) og 17/12 4 hanner + 5 hunner (AJ,CP). Desuden: 3/2 1 han + 6 hunner Mossø (KH) og 28/10 1 Fornæs (RD).

Musvåge (*Buteo borealis*): Fra 2/3 1 i Havn (Ø.B.F.) og med over 50 trakkende fugle. 11/3 114 (Ø.B.F.), 17/3 57 (Ø.B.F.), 24/3 64 (JL), 27/3 101 (AJ), og 9/4 56 (AJ,HP). Totalen ligger på 300-350 fugle. Fra Gjerrild er i rapporten 8/4 170 N (ØBF) og 10/4 10 N (ØBF). Endvidere foreligger 11/3 3 N Havker Skov ved Randers Fjord (JRR), og 9/4 5 N + 1 S Randers Fjord (JRR). Fra efteråret: 3/11 1 SV Kysing Fjord (CJA) og 4/11 13 indtrækkende Kysing Ås (ØBF).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): Fra 1/3 1 i Havn (Ø.B.F.) er der kun indrapporteret 3 fugle, hvilket er meget få. De er fordelt på følgende datoer: 28/3 1 i Havn (Ø.B.F.) og 4/11 2 (Ø.B.F.). Fra resten af amtet foreligger følgende fugle: 1/3 1 i Vindhøj (Ø.B.F.), 7/1 1 Kysing Fjord (Ø.B.F.), 11/1 1 i Havn (Ø.B.F.), 22/1 1 Fornæs (HLL), 29/1 1 i Havn (Ø.B.F.), 27/1 1 i Brabrand Sø (Ø.B.F.), 1/2 1 i Giber Å (AJ,NAP), 10/2 1 i Havn (Ø.B.F.), 12/2 1 i Mariager Fjord (JRR), 13/3 1 Ørting Mose (AJ), 14/3 1 Kysing Fjord (Ø.B.F.), 4/4 1 i Gjerrild (ØBF), 8/4 1 N Djursland (JRR), 12/1 3 i Havn (Ø.B.F.), 15/1 1 i Havn (Ø.B.F.), 3/11 2 Kysing Fjord (CJA), 4/11 1 i Havn (Ø.B.F.), 1/12 1 i Stilling (NÅ,HK), 17/11 1 i Begtrup (AJ), 22/11 1 i Havn (Ø.B.F.), 13/12 1 i Edslev (SBN), 17/12 1 i Aabyhøj (CJA) og 20/12 1 i Havn (Ø.B.F.).

Glente sp. (*Milvus sp.*): 18/3 1 i Havn (Ø.B.F.).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 18/3 1 i Havn (Ø.B.F.). 18/3 1 Brabrand Sø (HLL), 4/4 1 i Moesgård Strand (Ø.B.F.), 10/4 3 i Gjerrild Nederskov (ØBF,JRR), 10/4 2 i Havn (Ø.B.F.), 10/4 1 i Gjerrild Nederskov (HE,GR), og 24/4 1 i Vorskø (ØBF).

Hvendskov (*Circus cyaneus*): 11/3 1 i Havn (Ø.B.F.). Fine trækiagttagelser fra Stavns Fjord. 11/3 1 i Havn (Ø.B.F.). 9/5 1 i Langballe (HP), 9/5 1 i Vorskø (ØBF), 9/5 2 i Moesgård Strand, 20/5 1 i Moesgård Strand, 20/5 1 i Aabyhøj (AJ), 21/5 1 i Lindeløvvej, Hørskø (ØBF), 21/5 100 N Stavns Fjord (LB), 22/5 1 i Aabyhøj (AJ), 22/5 2 i Stavns Fjord (LB), 23/5 1 i Havn (Ø.B.F.), 27/5 2 i Moesgård Strand, 1/6 3 i Stavns Fjord (LB), 17/7 1 i Svinalie (SS), 29/7 1 i Havn (Ø.B.F.), 27/8 1 i Giber Å (AJ,LPJ) og 7/10 1 i Havn (ØBF).

Kærhøg sp. (*Circus sp.*): 1/5 1 i NV Moesgård Strand (GG).

Kærhøg (*Circus cyaneus*): Hørskø: 8/4 1 i brun Stubbe Sø (Ø.B.F.), 8/4 2 i Moesgård Strand (AJ,HP), 10/4 1 i Hørskø (LPJ), 15/4 1 i brun Moesgård Strand (SS,HP), 11/4 3 i Stavns Fjord (LB), 28/4 1 i Stavns Fjord (FC), 29/4 3 i Braherup (FC), 29/4 1 i Østtaup Ramten Sø (SBP,TM), 5/5 1 i brun Moesgård Strand (AJ), 6/5 1 i brun Brabrand Sø (AJ), 7/5 1 i brun Moesgård Strand (Ø.B.F.), 10/5 1 i brun Brabrand Sø (AJ), 14/5 2 i Stavns Fjord (LB), 17/5 1 i brun Sønderhede (AJ), 4/6 1 i Stavns Fjord (LB), 5/6 1 i brun Hjørregrav Sø (JRR), 13/6 1 i brun Kysing Fjord (CP), 15/8 1 i brun Kysing Fjord (AJ,LPJ), 22/8 1 i brun Havn Kysing Fjord (AJ), 24/8 1 i brun Brabrand Sø (AJ), 9/11 1 i brun Brabrand Sø (AJ) og den sidste meget sene: 21/11 1 i Hørskø (LPJ).

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): Hørskø: 18/2 1 i brun Randers Fjord (JRR), 24/2 1 i brun Hørskø Sø (Ø.B.F.), 6/4 1 i brun Gjerrild (Ø.B.F.), 10/4 1 i brun Hørskø Sø (Ø.B.F.), 15/4 1 i brun Randers Fjord (JRR), 16/4 1 i brun Gjerrild (Ø.B.F.), 12/5 1 i brun Hørskø Sø (LPJ), 22/4 1 i brun Hørskø Sø (Ø.B.F.), 27/4 1 i brun Hørskø Sø (HHH), 26/4 1 i Hørskø (LPJ), 28/4 1 i brun Aabyhøj (Ø.B.F.), 5/5 1 i brun Stavns Fjord (FC), 14/10 2 i Stavns Fjord (LB), 15/10 1 i Havn (Ø.B.F.), 15/10 1-2 i brun Kysing Fjord (Ø.B.F.), 20/10 1 i brun Hørskø Sø (AJ), 29/10 1 i brun Knebel, Mols (CHA), 29/10 1 i brun Brabrand Sø (AJ), 29/10 8 brune Mariager Fjord (Ø.B.F.), 1/11 1 i brun Brabrand Sø (AJ), 3/11 1 i brun SV Kysing Fjord (CJA), 3/11 1 i brun Kysing Fjord (AJ), 4/11 1 i brun Salten Langsø (LJ), 4/11 2 i Årker (CJA,SS), 5/11 1 i Vejlbj Nord (SS), 11/11 2 brune Kysing Fjord (PWB), 12/11 1 i Kysing Fjord (LH,SBP), 2/12 1 i brun Brabrand Sø (CJA) og 3/12 1 i brun Moesgård (ØBF)

Spurvehøg (*Accipiter nisus*): Totalen for forårstrækket ved Moesgård Strand blev 107 fugle. Max. blev 9/4 14 N og 11/4 11 N. Ved Gjerrild trak 18 fugle nord 8/4 (ØBF).

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 31/1 1 Brabrand Sø (AJ), 18/2 3 Salten Langsø (SS), 19/2 1 par Salten Langsø (AJ), 26/3 1 Store Varbjerg, Samsø (LB), pr. marts 3 Begtrup Røn (LH), 6/3 1 Fulden (AJ), 24/3 1 Højbjerg (HP), 26/3 1 Brabrand Sø (AJ), 30/3 1 Højbjerg (HP), 29/4 1 Gjerrild (TB,SBP), 26/5 1 Brabrand Sø (AJ), 17/7 1 Hundslund (SS), 26/7 1 Søby (AJ), , 7/10 1 Lysnet Vissing (PN), 7/10 1 Salten Langsø (SS), 7/10 1 Stubbe Sø (DOF), 12/10 1 Åbyhøj (CJA), og 4/11 1 Åkjær (CJA, SS), Desuden er der ofte iagttaget en Duehøg ved Kongsvang i vintermånerne. (FBM). Fra Moesgård Strand foreligger følgende: 24/3 1 N (AJ), 11/4 1 N (SS) og 5/5 1 N (AJ).

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): Forår 9-10 ex. Sommer 1 ex. Efterår lex. Fint forår. Salten Langsøfuglene mangler fra efteråret. Moesgård Strand 4/4 1 N (SBN), 9/4 1 N (AJ,HP), 5/5 2 N (AJ) og 12/5 1? (AJ). Desuden 8/4 1 NØ Gjerrild (ØBF), 21/4 1 Mariager (JRR), 21/4 1 rast Fornæs (HE,GR), 26/4 1 Salten Langsø (KH), 21/5 1 Salten Langsø (medd. HHH), 13/7 1 Skanderborg Sø (HHH), 27/8 1 SV mod Brabrand Sø, Åbyhøj (CJA) og 28/8 1 rast-SV Brabrand Sø (AJ).

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 11/4 1 han N Søsterhøj (HLL).

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 26/4 1 Horskær (LPJ), 19/5 1 Brabrand (CJA) og 25/7 1 Åby Eng (CJA).

Dværgfalk (*Falco columbarius*): 11 forårsfugle og 4 efterårsfugle må siges at være helt pønt. 23/2 1 Skanderborg (HP), 26/2 1 Skanderborg (HP), 5/3 1 hun Pinds Mølle (D.O.F.), 5/3 1 Brabrand Sø (AJ), 13/3 1 Åbyhøj (CJA), 22/3 1 motorvejen Århus-Skanderborg (SS), 8/4 1 NØ og 1 rast Gjerrild (Ø.B.F.), 9/4 1 N Moesgård Strand (AJ,HP), 21/4 1 han Linde v Randers (JRR), 8/5 1 Dråby (SKH), 7/10 3 Øer (D.O.F.) og 16/10 1 brun Sødring Kær (AJ).

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): 30/5 1 hun Brabrand Sø (CJA) og 26/6 1 han Grenå (PN).

Lærke/Aftenfalk (*Falco subbuteo/vespertinus*): 5/6 1 Bjerregrav Mose (JRR) og 8/6 1 Skanderborg (HP).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Nogle trækiagttagelser. Moesgård Strand havde en total på 11 ex. med max. 6/4 3 N. Desuden 29/3 1 S Fornæs (NA,HK), 7/10 5 Øer (DOF) og 3/11 1 S Kysing Næs (HLL).

Vagtel (*Coturnix coturnix*): I juni er fugle hørt på mulig yngelokalitet et sted i Amtet (HP, m. fl.)

Trane (*Grus grus*): Atter har denne art vist sig i Århus Amt: 8/4 1 ad. og 1 juv. omkring Fornæs (HE,JRR,ØBF), 16/4 1 ad. og 1 juv. træs. Gjerrild (HP,HLL) og 16/4 2 N Stavnshoved (JRR). Samme fugle efter alt at dømme.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): Vandrikserne er i den grad overhørt. Kun på een lokalitet har den gjort sig bemærket. Det drejer sig om Brabrand Sø, hvor der året igennem er iagttaget fra 1 til 4 ex. (AJ, TB, SBP, HLL). Det ville være ønskeligt at få alle iagttagelser af denne art indsendt, da der ikke vides meget om dens udbredelse indenfor Amtet.

Blisshøne (*Fulica atra*): Største iagttagelser: Fra Kysing Fjord. 15/10 3000 (D.O.F.) og 4/11 4250 (CJA,SS). Mariager Fjord: 16/12 3-4000 (AJ, NAP).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): Forårets først rapporterede fugl, samt de største koncentrationer. Tydelig kulmination i marts/april. De store tal i maj-juni skyldes en del oversømrende, endnu ikke yngledygtige fugle. Første: 5/3 1 Brabrand Sø (AJ), hvor arten er meget sjælden. De største tal: 11/3 150 Stavns Fjord (VF), og 15/3 60 Horskær (LPJ). Efteråret er ret spændende. Et meget hurtigt gennemtræk i juli og næsten alle Strandskader er væk. Arten ses dog fåtalligt til pr. september. Derefter foreligger kun få og spredte iagttagelser. Kulmination med. juli: 15/7 106 Stavns Fjord (VF), 15/7 150 Alrø Poller & Lerdrup Vig (VF); 15/7 60 Begtrup Røn (VF), 16/7 74 Begtrup Røn (LH), 16/7 121 Mariager Fjord (VF), og 19/7 100 Alrø Poller (LPJ). De sidste blev: 15/10 5 Sæl-vig Bugt, Samsø (LB), 7/11 7 Alrø (LPJ), 11/11 10 Sødringholm (VF), 14/11 1 Alrø (LPJ), og 21/11 5 Alrø (LPJ).

Vibe (*Vanellus vanellus*): De første til normal tid. Forårstrækket kulminerer i marts og overstås næsten i samme måned. Allerede i juni ses de første efterårsflokke. Første: 25/2 5 Kysing Fjord (ØBF). Største: 11/3 2117 Kysing Fjord (VF). Ved Moesgård Strand trak ialt 446 ex. Bedste dag blev 24/3 110 N (fl. obs.). 10/6 143 Tved Øhoved (VF) er de første efterårsfugle. Kulminationen i efteråret ligger i september, men fra ult. aug. til med. nov. ses store koncentrationer på flere lokaliteter, specielt ved Kysing Fjord. De mange fugle i november er en følge af det milde vejr, som prægede denne måned. Kysing Fjord: 26/3 2500 (HP), 16/9 1250 (VF), 7/10 3100 (GG) og 11/11 min. 3000 (PWB). Øvrige: 16/9 900 Tved Øhoved (VF), 19/9 1000 Horskær (LPJ), samt sidste 21/11 250 Alrø (LPJ).

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): De første ses til normal tid (ult. feb.). I materialet ses to kulminationer. Den første i marts er vore egne ynglefugle der tilhører racen *C. h. hiaticula*. Kulminationen i maj drejer sig om Nordlig Præstekrave (*C. h. tundrae*) som er ynglefugl i bl.a. Nordskandinavien. Første: 18/2 1 Sødringholm (VF) og 28/2 9 Århus Havn (NÅ, HK). De største tal: 11/3 40 Alrø Poller & Lerdrup Vig (VF), 19/3 90 Alrø (ØBF), 17/5 50 Sødringholm (VF), og 17/5 23 Mariager Fjord (VF). Efteråret byder ikke på de store tal, faktisk er der usædvanligt få iagttagelser af mere end 10 fugle sammen. Enkelte iagttagelser fra okt. og nov. Max.: 15/7 17 Begtrup Røn (VF). De sidste blev: 15/10 3 Begtrup Røn (VF), 11/11 1 Kysing Fjord (VF) og 19/11 1 Begtrup Røn (VF).

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): Pænt antal rapporteret. Det drejer sig fortrinsvis om fugle på ynglelokaliteter. Brabrand Sø: 28/4 3 Døde Å (AJ), 1/5 1 Døde Å (AJ), 4/5 1 (HLL), 11/6 3 Åby Eng (VF), 13/6 1 Åby Eng (AJ) og 17/7 4 Åby Eng (CJA, FBM). Øvrige: 4 ex. hele sommeren Skanderborg Sø (HHH), 2/6 3 Nim Grusgrav (Vejle Amt) (NÅ, HK) og 15/8 1 rast/SSØ Kysing Fjord (AJ).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): Gennem vadefugletællingerne har vi fået et meget fint materiale, som fortjener at nævnes i sin filde udstrækning. Træktiden om foråret, er efter Dybbro: 1978, pr. april/pr. juni, med kulmination med./ult. maj. Der er ikke mange iagttagelser før vi når hen omkring kulminationstidspunktet, men så er der pludselig mange fugle. Alrø: 19/3 2 (ØBF), 6/4 1 (Per Grøn), 13/5 10 (VF), 15/5 35 (GG) og 10/6 1 (VF), Øvrige: 13/5 5 Horskær (VF), 14/5 2 Stavns Fjord (LB), 17/5 1 Horskær (LPJ), 17/5 180 Sødringholm (VF), 17/5 76 Mariager Fjord (VF), 4/6 2 Stavns Fjord (LB), 10/6 1 Horskær (VF), og 10/6 1 Tved Øhoved (VF). Efteråret viser 3 (4) toppe, så hvornår, den (de) egentlige kulminationsperioder falder, er svært at sige. I aug. er det næsten udelukkende

gamle fugle som ses (l. top). I okt. og nov. er det ungfuglene som dominerer, og dette træk synes at kulminere pr./med. okt. At der stadig er mange fugle med. nov., må bl.a. ses i relation til det milde vejr. Horskær: Første 10/7 1 (LPJ), derefter regelmæssig 15/8-11/11. Kulmination pr. okt., således: 3/10 39 og 10/10 25-30 (LPJ). Sidste: 7/11 3 og 11/11 1 (LPJ). Kysing og Fjord: 6/8 3 (AJ), 15/8 3 (AJ, LPJ), 14/10 1 (HLL) og 15/10 2 (DOF). Stavns Fjord: 29/7 3, 2/9 7 og 15/10 5 (LB). Tved Øhoved: 19/8 20, 16/9 1, 14/10 6 og 16/11 2 (VF). Begtrup Røn: 20/8 3, 15/10 7, og 19/11 3 (VF). Sødringholm: 20/8 325, 17/9 50, 16/10 74 og 11/11 91 (VF). Mariager Fjord: 16/7 10, 20/8 45, 17/9 25, 16/10 30, 11/11 5 og 16/12 6 (VF).

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): En vinteriagttagelse, forårets første og forårets maksimum. 2 juni iagttagelser. Om foråret står næsten alle fuglene på en lokalitet, nemlig Alrø Poller og Lerdrup Vig. 22/1 1 Tved Øhoved (VF), 11/3 10 Gylling Næs (NÅ, HK), 13/5 4500 Alrø Poller og Lerdrup Vig (VF), 10/6 25 Alrø Poller og Lerdrup Vig (VF) og 10/6 10 Horskær (VF). I august tager Hjejlerne igen til i antal. Kulminationen falder i sept./okt., men når vejret er mildt kan der ses mange i november. I efteråret står Hjejlerne mere spredt. 12/9 600 Splidholm (LPJ), 16/9 2500 Horskær (VF), 16/9 1400 Tved Øhoved, 19/9 650 Horskær (LPJ), 14/10 950 Tved Øhoved (VF), 16/10 2328 Mariager Fjord (VF), 11/11 1000 Alrø (VF) og 21/11 850 Alrø. En december-iagttagelse: 16/12 4 Tved Øhoved (VF).

Stenvender (*Arenaria interpres*): Normalt forår med 8 ex. i maj. Ret mange fugle i efteråret, i alt 15 ex. 6/5 1 Tved Øhoved (SKH), 17/5 1 Sødringholm (VF), 22/5 5 Søby Rev (FC), 23/5 1 Alrø Poller (FC), 16/7 2 Mariager Fjords udløb (VF), 26/7 1 trak S Horskær (AJ, LPJ), 6/8 1 Kysing Fjord (AJ), 15/8 2 trak SSØ Splidholm (AJ, LPJ), 20/8 2 Sødringholm (VF), 20/8 1 Alrø Poller (DOF, VF), 31/8 2 Øer (SKH), 5/9 1 juv Horskær (LPJ) og 17/9 3 Mariager Fjords udløb (VF).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Materialet er fra de sædvanlige lokaliteter, nemlig Brabrand Sø og Kysing Fjord. Kulminationen om foråret er med. april. Om efteråret ses to toppe, en med./ult. aug. (gamle fugle) og en i oktober (ungfugle). Brabrand Sø: 14/4 130 (VF), 19/4 140 (AJ) og 8/10 85 (AJ). Kysing Fjord: 1/4 37 (AJ), 23/8 70 (AJ) og 15/10 40 (DOF, VF). Øvrige: 19/11 35 Begtrup Røn (VF).

Enkeltbekkasin (*Limnocryptes minimus*): Kun rapporteret fra de traditionelle steder. Forår 6 ex. Efterår. 23 ex. 2 vinter iagttagelser. Vinter: 7/1 1 Kysing Fjord (AJ) og 16/2 1 Døde Å, Brabrand Sø (VF). Kysing Fjord: 1/4 2 (AJ), 7/10 6 (CJA), 15/10 3 (DOF, VF) og 29/10 5 (AJ). Brabrand Sø v. Døde Å: 10/5 2 (VF), 1/10 1 (AJ), 2/10 2 (AJ), 8/10 4 (AJ) 9/10 1 (AJ, LPJ) og 17/11 1 (VF).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*): Forår 4 ex. og efterår 4 ex. Da det er ret tilfældigt at man løber på denne fyr, siger materialet ikke ret meget om dens forekomst. 18/3 1 Døde Å, Brabrand Sø (HLL), 19/3 1 Salten Langsø (HP), 22/3 1 Brabrand Sø (AJ), 7/4 1 Ruggård, Djursland (SKH), 15/9 1 Lystrup Enge (PWB) 16/11 1 Skødshoved (VF), 25/11 1 Salten Langsø (NÅ) og 3/12 1 Giber Å (LPJ).

Stor Regnspeve (*Numenius arquata*): Et stort antal iagttagelser er rapporteret gennem hele året. Mange iagttagelser af store koncentrationer gennem hele foråret, gør det svært at fastslå, hvornår den egentlige kulmination foregår. I junises de første spever på nedtræk.

Alrø Poller: 11/3 40 (VF), 19/3 130 (ØBF), 28/3 105 (NÅ). Horskær: 15/3 24 (LPJ), 12/4 35 (LPJ), 3/5 108 (LPJ) og 17/5 34 (LPJ). Øvrige: 15, 4 80 Sødringholm (JRR), 24/4 65 trak Brabrand Sø (HLL) og 2/5 78 Stavns Fjord (FC).

Iløbet af juli måned stiger antallet, for at kulminere med./ult. aug. Derefter aftager antallet ret hurtigt, men enkelte efternølere ses. Langt færre Storspøver end om foråret, hvilket skyldes en mere vestlig kurs, som går mod de vestjyske fjorde og vadehavet. 9/7 20 trak Kysing Fjord (AJ,HP) og 20/8 45 Sødringholm (VF) er de største tal. De sidste belv: 11/11 19 Sødringholm og 17/12 2 Sødringholm (VF).

Lille Regnspøve (*Numenius phaeopus*): Et ganske pænt materiale, som giver et nogenlunde billede af artens forekomst i Århus Amt. Stavns Fjords nordlige del synes at være en meget fin rasteplass for denne art, både forår og efterår. En vinteriagttagelse. Forårstrækket er ret koncentreret omkring midten af maj. I juni ses de første spøver på nedtræk.

8/2 1 trak S Brabrand Sø (SBP), 14/5 31 Stavns Fjord (LB), 17/5 5 Sødringholm (VF), 17/5 2 Mariager Fjords udløb (VF), 17/6 1 Stavns Fjord (LB), 28/6 1 Horskær (AJ,LPJ) og 28/6 3 Kysing Fjord (AJ,LPJ).

Efterårstrækket, som forløber i perioden ult. juni/pr. september kulminerer ret tidligt, nemlig allerede med./ult. juli og efter august ses kun få fugle. En enkelt ekstrem sen fugl.

Stavns Fjord: 16/7 75, 19/7 35, 22/7 90, 25/7 29, 31/7 40 og 3/8 10 (alle LB). Kysing Fjord: 9/7 10 trak (AJ,HP), 6/8 1 (AJ), 8/8 1 (AJ), 15/8 1 (AJ,LPJ) og 19/8 1 (VF). Horskær: 12/7 2 (LPJ), 15/7 4 (VF), og 26/7 1 (AJ,LPJ). Øvrige: 8/7 1 S Brabrand Sø (AJ), 15/7 4 Alrø (VF), 19/7 2 Skødshoved (VF), 19/7 2 Tved Øhoved (VF), 26/7 2 Alrø (AJ,LPJ), 26/7 2 Sø Splidholm (AJ,LPJ), 2/8 1 Søby Rev (CJA,FBM), 6/8 1 Søby Strand (CJA) og 14/10 1 Tved Øhoved (VF).

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*): 2 ex. forår og 3 ex. efterår fordelt således: med. april 1 ex. Døde Å, Brabrand Sø (Keld Henriksen), 15/5 1 Kysing Fjord (VF), 9/7 1 trak S Kysing Fjord (AJ,HP) og 2/8 2 Søby Rev (CJA,FBM).

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*): I amtet findes 4 forårstrækket, Stavns Fjord, Søby Rev, Horskær og Alrø Poller/Lerdrup Vig, hvoraf den sidstnævnte er den bedste. Fuglene flytter dog rundt på de tre sidste, afhængig af bl.a. vandstand og forstyrrelser. Ankommer pr. marts og tiltager hurtigt i antal. Kulminationen falder normalt ult. april/pr. maj, Maksimumstal for 3 lokaliteter (Ingen tal fra Søby Rev). Enkelte fugle oversomrende.

13/5 3000 Alrø Poller (VF), 14/5 616 (LB,VF), 24/5 750 Horskær (LPJ), 10/6 50 Alrø Poller (VF) og 15/6 32 Alrø Poller (FC).

Forårsmaksimum.

	Marts	April	Maj
Stavns Fjord	200	600	616
Horskær	5	29	750
Alrø Poller/Lerdrup Vig	800	2000	3000

I efteråret er arten spredt ud over hele Østjyllands kystlinie, men antalmæssigt langt mindre talrig end om foråret. Det er dog stadig Alrø Poller/Lerdrup Vig området der er det bedste. De største tal og sidste iagttagelse.

15/7 50 Alrø Poller (VF), 20/8 100 Alrø Poller (DOF,VF) og 16/10 1 Sødringholm (VF).

Sv. leklire (*Tringa ochropus*): Ingen tydelig kulmination som i foråret 77, hvilket skyldes langt færre fugle er rapporteret.

7/3 1 trak N Norsgade, Århus (SBP), 10/4 1 Brabrand Sø (HLL), 22/4 1 Horskær (LPJ), 28/4 1 Døde Å, Brabrand Sø (AJ), 29/4 1 Ramtan-Dystrup Sø

(TB,SBP), 15/5 1 Kysing Fjord (VF), og 18/6 1 Edslev Grusgrav (FC).

Mange rapporteret fra efteråret. Sikkert flere gengangere ved Kysing Fjord og Brabrand Sø. Kulminationen falder pr. august.

Kysing Fjord: 2/7 1, 3/7 2, 4/7 1, 6/7 1, 9/7 1, 11/7 2 (AJ), 15/7 2 (VF), 6/8 11, 8/8 2, 23/8 1 og 26/8 1 (AJ). Brabrand Sø: 17/7 1 (CJA,FBM) 17/7 3 Åby Eng (AJ), 22/7 1 Åby Eng (CJA,FBM), 27/7 3 (AJ), 5/8 3 (AJ), 9/8 3 (AJ), 16/8 2 (AJ) og 25/8 1 (AJ). Øvrige: 28/7 1 Hasle Eng (NÅ) og 29/8 1 Horskær (AJ,LPJ).

Tinksmød (*Tringa glareola*): Et ganske pænt forårstræk. Ved Brabrand Sø er det flere år siden så store tal er set. Kulmination pr. maj. Lidt sen ankomst med 29/4. Ult. juni ses de første Tinksmøde på nedtræk.

Brabrand Sø: 2/5 1 Døde Å (AJ,HLL), 4/5 6 (HLL), 5/5 3o Døde Å (AJ), 6/5 12 Døde Å (AJ), 9/5 2 (HLL), 10/5 25 Døde Å (AJ), 11/5 2 (HLL), 11/5 5 (SBN), 14/5 2 (HLL), 18/5 10 (HLL) og 20/5 4 Døde Å (AJ). Øvrige: 29/4 2 Kysing Fjord (HP), 13/5 2 Begtrup Røn (VF), 27/6 2 Kysing Fjord (AJ,HP) og 28/6 2 Kysing Fjord (AJ,LPJ).

Efterårstrækket forløber fra ult. juni til med. september med iagttagelser fra hele perioden. I materialet er antydning af to toppe. Første top pr. juli er de gamle fugle og 2. top pr. august er ungfuglene som følger efter. En total mangel på Tinksmøde med./ult. juli ved Kysing Fjord kan synes mærkelig, men skyldes nok en udtørring af engene, hvor de ynder at raste. En enkelt temmelig sen fugl.

Brabrand Sø: 17/7 1 Åby Eng (CJA,FBM), 22/7 3 Åby Eng (CJA,FBM), 23/7 1 Åby Eng (CJA), 27/7 6 Døde Å (AJ), og 9/8 1 Døde Å (AJ). Kysing Fjord: 1/7 6 (AJ,LPJ), 2/7 9 (AJ,HP), 3/7 14 (AJ, HHH,HP), 4/7 14 (AJ), 6/7 5 (AJ), 9/8 1 (PB,SBP,SS), 9/7 9 (AJ,HP), 6/8 15 (AJ), 8/8 3 (AJ), 23/8 6 (AJ), og 3/9 1 (AJ). Øvrige: 16/8 3 Øer (SKH), 31/8 2 Øer (SKH), og en meget sen fugl, 16/10 1 Horskær (LPJ).

Rødben (*Tringa totanus*): En del vinteriagttagelser, hvoraf een er meget stor. I øvrigt ret sen ankomst af vore egne ynglefugle (først omkring pr. april). Hovedtrækket falder i april, men endnu med. maj en større flok, som nok består af ikke yngledygtige fugle.

15/1 1 Stavns Fjord (LB), 21/1 300 Stavns Fjord (VF), 26/1 10 Alrø (AJ), 28/1 3 Begtrup Røn (VF), 30/1 3 Vorsø (FC) og 18/2 1 Begtrup Røn (VF). Større rasttal: 8/4 79 Stavns Fjord (MV-H), 15/4 107 Stavns Fjord (VF) og 17/5 85 Sødringholm (VF).

I efteråret synes der at være to til tre toppe i trækket. Det kan være svært at betegne dem, men det skal forsøges. 1. top i august er gamle fugle. Næste top i oktober falder ret sent til at være ungfugle af vort hjemlige Rødben (*T. t. totanus*). Dette kan dog være et tilfældet. Ellers må det være det Islandske Rødben (*T. t. robusta*). Sidstnævnte passer nok bedst til det store antal i november. En del decemberiagttagelser.

20/8 64 Mariager Fjord (VF), 20/8 100 Sødringholm (VF), 17/9 76 Mariager Fjord (VF), 16/10 229 Mariager Fjord (VF), 11/11 145 Stavns Fjord (VF), 11/11 134 Mariager Fjord (VF), 16/12 51 Mariager Fjord (VF), og 16/12 12 Begtrup Røn (VF), 16/12 22 Tved Øhoved (VF), og 17/12 1 Kysing Fjord (VF).

Sortklire (*Tringa erythropus*): Meget fåtalligt forekommende i foråret, hvor arten nærmest trækker direkte gennem landet mod ynglepladserne uden ophold. Allerede med. juni ses de første på nedtræk.

13/5 1 Begtrup Røn (VF), 17/5 1 Mariager Fjord (VF), 18/5 1 Brabrand Sø (HLL), 13/6 1 Døde Å, Brabrand Sø (AJ), 15/8 1 Alrø Poller (FC), 17/6 2 Kysing Fjord (LPJ,VF), og 20/6 1 Splidholm (AJ,HP).

Efterårsmaterialet viser forskellen mellem de gamle fugles træk (med. juli/med. august) og ungfuglenes træk (ult. august/med. september). Man kunne nok have forventet flere fugle i oktober (pr. november) med det milde vejr som dominerede til langt ind i november.

Kysing Fjord: 1/7 1 (AJ,LPJ), 2/7 1 (AJ,HP), 4/7 2 (AJ,HP), 6/7 1 (AJ), 9/7 1 (AJ,HP), 11/7 2 (AJ), 25/7 7 (AJ,LPJ), 6/8 3 (AJ), 8/8 1 (AJ), 15/8 5 (AJ,LPJ), 19/8 6 (VF), 23/8 6 (AJ), 26/8 2 (AJ,LPJ,HP), 3/9 1 (AJ), og 7/10 2 (CJA,GG,HP). Øvrige: 15/8 3 Horskær (AJ,LPJ), 22/8 1 Horskær

(LPJ), 12/9 1 Horskær (LPJ). Øvrige: 26/7 1 Splidholm (AJ,LPJ), 5/8 1 S Brabrand Sø (NÅ), 20/8 10 Sødringholm (VF), 20/8 7 Mariager Fjord (VF), 0, 29/8 3 Lerdrup Vig (AJ,LPJ).

Hvidklire (*Tringa nebularia*): Heller ikke hos denne art er der forårstræk af dimensioner, om end det er betydeligt større end hos Sortklire. De første ses normalt ult. april og forårstrækket kulminerer pr./med. maj. Kun to større iagttagelser: 4/5 25 Kysing Fjord (LH) og 17/5 25 Sødringholm (VF).

Efterårstrækket starter ult. juni og varer til ind i oktober. Materialet viser tre toppe tydeligt. 1. top er pr. juli med 2. årsfugle og fugle hvis yngel slog fejl. 2. top ult. juli/pr. august er de gamle fugle og sidst 3. top med./ult. august med ungfuglene. Herefter aftager antallet hurtigt, men enkelte fugle ses til langt ind i oktober. De sidste holder endda stand til årets udgang, næsten da.

Kysing Fjord: 6/7 30 (AJ), 25/7 25 (AJ,LPJ), 6/8 40-45 (AJ), 19/8 34 (VF), og 23/8 32 (AJ). Øvrige: 12/7 25 Lerdrup Vig (LPJ), 15/8 39 Horskær (AJ,LPJ), 20/8 35 Sødringholm (VF), 20/8 55 Mariager Fjord (VF), og 16/9 20 Horskær (VF). Decemberiagttagelser: 17/12 1 Horskær (LPJ) og 17/12 3 Kysing Fjord (VF).

Damklire (*Tringa stagnatilis*): En iagttagelse, som er godkendt af SU. 2-4/7 1 Kysing Fjord (HHH,AJ,HP).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): Det er ikke meget, udover Vadefuglegruppens materiale, der er kommet ind om denne art. Specielt foråret er sløjt. Sen ankomst og kulminationen sammenfaldende med (VF) materialet fra med. maj.

De første og de største iagttagelser: 5/5 7 Brabrand Sø (AJ), 6/5 1 Glenstrup Sø (JRR), og 15/5 19 Kysing Fjord (VF). Efteråret ser lidt bedre ud. Materialet antyder to toppe. 1. top med. juli/pr. august er de gamle fugle og 2. top med./ult. august er årsungerne som kommer efter. Efter vadefugletællingerne med september ses ingen. I hvert fald er der ikke indrapporteret iagttagelser. 26/7 29 Begtrup Røn (LH), 6/8 29 Kysing Fjord (AJ), 19/8 32 Kysing Fjord (VF), og 20/8 45 Mariager Fjord (VF).

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*): Et meget fint år. Om foråret optræder arten normalt meget fåtalligt, men visse år ses den i større antal (pr. april/ult. maj), hvilket er tilfældet i 1978. Flest pr./med. maj. Et par vinteriagttagelser. 21/1 1 Alrø (VF), 22/1 3 Tved Øhoved (VF), samt følgende forårsiagttagelser fra Horskær: 19/4 1, 26/4 4, 3/5 70, og 17/5 400 (alle LPJ). I øvrigt: 17/5 1 Mariager Fjords udløb (VF). I efteråret er der virkelig mange fugle. Man fristes til at tro arten har optrådt invasionsagtigt. På Vestkysten synes antallet at have været normalt. I materialet ses to toppe, en top med./ult. august og en ult. oktober/pr. november. Toppen i august udgøres af 85% ungfugle, så hvad toppen i okt./nov. har at gøre er svært at se. Det milde vejr i okt./nov. har nok fået mange fugle til at blive på gode fourageringspladser længere nordpå og først da dårligt vejr har sat ind er trækket udløst. Flere lokaliteter skal fremhæves.

Alrø Poller-Lerdrup Vig: 20/8 3 (VF) 29/8 32 (AJ,LPJ), og 31/10 275 (LPJ). Horskær: 19/7 22, 9/8 3, 15/8 28 (AJ,LPJ), 29/8 4 (AJ,LPJ), 5/9 35, 19/9 12, 10/10 36, 17/10 18, 31/10 550, og 7/11 275 (alle LPJ). Kysing Fjord: 6/8 2 (AJ), 8/8 2 (AJ), 15/8 22 (AJ,LPJ), 23/8 31 (AJ), 3/9 2 (AJ), og 16/9 1 (VF). Sødringholm: 20/8 450 (VF), 17/9 15 (VF). Mariager Fjord: 0/8 100 (VF), og 16/10 61 (VF).

Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*): Første iagttagelse i mange år. 29/10 1 Fornæs (RD).

Sorterå ryle (*Calidris maritima*): En iagttagelse: 22/10 1 Horns (RD).

Dvärgryle (*Calidris minuta*): En forårsiagttagelse: 4/6 3 Bestrup Røn (VF) må være en af de sidste på optrækket.

I efteråret er arten repræsenteret helt pænt. Alle iagttagelser er nok ikke indrapporteret, eftersom en kæmpeinvation fandt sted omkring månedsskiftet august/september. Bl.a. sås 800 ex. på Agsertangen og 1150 på Tipperne i denne periode. De sidste til normal tid.

15/8 1 Kysing Fjord (AJ), 20/8 1 Alrø (DOF, VF), 31/8 24 Øre (SKH), 2/9 1 Stavns Fjord (LB), 3/9 11 Kysing Fjord (AJ), 5/9 3 Horsker (LPJ), 16/12 Kysing Fjord (VF), 16/9 2 Tved Øhoved (VF), 15/10 5 Alrø (VF).

Temmincksryle (*Calidris temminckii*): Et meget sløjt år med kun to iagttagelser. Kysing Fjord: 11/7 1 (AJ) og 6/8 1 (AJ).

Dvärg-/Temmincksryle (*Calidris minuta/temminckii*): 3/9 20 Kysing Fjord (AJ). Velsagtens dvärgryler.

Almindelig ryle (*Calidris alpina*): Et stort materiale. Kun få vinteriagttagelser, trods den milde januar måned. I materialet ses tydeligt to toppe. Første top med. marts/pr. april er Sydlig ryle (C.a. schinzii), hvor iblandt vore egne ynglefugle befinder sig. I maj passerer Nordlig ryle (C.a. alpina) gennem landet, medens vore egne ynglefugle er i sangflugt over engene.

Vinteriagttagelser: 25/1 4 Alrø (AJ), 28/1 3 Bestrup Røn (VF), 18/2 10 Kysing Fjord (VF), 18/2 48 Bestrup Røn og 19/2 10 Sødringholm (VF).

I efteråret sker der ikke rigtig noget før vi når hen i september. I oktober måned kulminerer trækket, men endnu med. november ses mange hvilket må skyldes det meget milde vejr. Flere vinteriagttagelser.

Sødringholm: 17/9 1200 (VF), 16/10 1500 (VF) og 11/11 1072 (VF). Øvrige: 15/10 500 Horsker (VF), 16/10 602 Mariager Fjord og 11/11 760 Mariager Fjord (VF), 29/10 3900 Mariager Fjord (ØBF).

Månedsmaksimum:

	mar.	apr.	maj	sep.	okt.	nov.
Alrø Poller, Lerbæk:	4500	3000	8000		450	300
Horsker	:				500	
Søby Rev	:		500			
Sødringholm	:		6000	1200	1500	1072
Mariager Fjord	:		1475	225	3900	760
December obs:	16/12 3	Mariager Fjord (VF),	16/12 160	Bestrup Røn (VF),		
	16/12 125	Tved Øhoved (VF),	16/12 18	Skødshoved (VF) og	17/12 5	Horsker (VF).

Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*): Som sædvanlig kun iagttaget i efteråret. Dette efterår blev usædvanligt godt for arten. Kulminerer ved månedsskiftet august-september, hvor der bl.a. på Tipperne sås 212 ex. Kysing Fjord: 15/7 4 (VF), 25/7 3 (AJ, LPJ), 6/8 1 (AJ), 15/8 16 (AJ, LPJ) 19/8 20 (VF), 23/8 13 (AJ), 26/8 23 (AJ, LPJ, HP) og 3/9 27 (AJ). Øvrige: 16/8 2 Øre (SKH), 20/8 4 Alrø (DOF, VF), 22/8 4 Alrø (CP), 29/8 6 Lerdrup Vig (AJ, LPJ), 31/8 8 Øre (SKH), og 17/9 1 Mariager Fjords udløb (VF).

Båndløber (*Calidris alba*): Ialt 14 ex. fra efteråret, hvilket er mange. Novemberfuglene må nærmest anses for sene trækfugle, fremfor overvintrende.

19/8 1 Skødshoved (VF), 31/8 3 Øre (SKH), 2/9 4 Kågsør Hage, Samsø (LE), 26/9 3 Horsker (LPJ), 21/11 2 Bønnerup (HLL), og 21/11 1 Gjerrild Nordstrand (HLL).

Brushane (*Philomachus pugnax*): Foråret er som sædvanlig ikke noget at råbe hurra for. De første efterårsfugle ses i juni.

Brabrand Sø: 19/4 2 Døde Å (AJ), 4/5 7 (HLL), 5/5 12 Døde Å (AJ), 14/5 3 (HLL), 20/5 7 Døde Å, og 29/5 2 Vestenden (AJ).

Kysing Fjord: 29/4 2 (HP), 17/6 3 (VF), 27/6 2 (AJ,HP), og 28/6 1 (HP).

Besuden sås 28/6 4s Horskær (AJ,LPJ).

I efteråret rapporteres mange fugle. To kulminationer, hvor kulminationen er/ult. juli er de gamle fugle og med/ult. aug. er ungfuglene som følger. November iagttagelserne er en følge af det milde vejr.

Kysing Fjord: 1/7 11 (AJ,LPJ), 2/7 (AJ,HP), 3/7 11 (HHH,AJ,VF), 4/7 11 (AJ,HP), 9/7 18 (AJ,HP), 11/7 9 (AJ), 15/7 20 (VF), 25/7 27 (AJ), 6/8 12-15 (AJ), 13/8 22 (CP), 15/8 12 (AJ,LPJ), 19/8 10 (VF), 19/8 15 (CP), 23/8 35, 26/8 14 (AJ,LPJ), 3/9 20 (AJ), 16/9 15 (VF), 7/10 4 (GG,HP), 13/10 5 (CP), og 5/11 10 (AJ,LPJ).

Andre: 9/7 1 Skanderborg Sø (HHH), 15/7 1 Begtrup Røn (VF), 16/7 1 Begtrup Røn (LH), 19/7 4 Skødshoved (VF), 25/7 1 Brabrand Sø (CJA), 26/7 1 Begtrup Røn (LH), 29/8 6 Lerdrup Vig (AJ,LPJ) og 31/8 1 Bre (GGH).

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): Ankomst med. marts. Ses næsten kun påinglelokaliteterne. De første var: 11/3 7 Stavns Fjord (VF) og 11/3 22 Havnøhage, Mariager Fjord (JRR). De største antal i foråret blev: 24/3 30 Barnekold, Stavns Fjord (LB) og 26/3 45 Alrø (GG,HP). Allerede i løbet af juli forsvinder klyderne fra Østjylland og ult. aug. er de sidste vist. 12/7 24 Vadegrund, Lerdrup Vig (LPJ), 16/7 42 Mariager Fjord (VF) og 26/8 1 Stavns Fjord (LB) blev den sidste.

S demåge (*Larus fuscus*): Et par indlandsobs. 1/7 1 Kysing Fjord (LPJ) og 9/8 1 Skanderborg Sø (HHH).

Dværgmåge (*Larus minutus*): 6/8 1 juv Kysing Fjord (AJ).

Hættemåge (*Larus ridibundus*): 3440 reder optalt i Brabrand Sø (JG).

Ride (*Rissa tridactyla*): 29/10 75 Fornæs (RD) og 21/11 2 (1 ad + 1 juv) Bønnerup (HLL).

Rovterne (*Hydroprogne tschegrava*): med.juni 1 Mørke Kær (GG).

Fjordterne (*Sterna hirundo*): Alle obs. 21/5 1 Lindholm Hoved, Mossø (DOF), 20/6 3 Skanderborg Sø (HHH), 30/7 1 Brabrand Sø (CJA,FBM), 16/8 2 Brabrand Sø (CJA) og 3/9 1 Knuds- (PN).

Havterne (*Sterna paradisea*): Første obs. og største antal (over 10 ex): 12/4 1, 2/7 14 og 12/7 23 alle Horskær (LPJ).

Hav-/Fjordterne (*Sterna paradisea/hirundo*): Nogle indlandsobs. 8/5 c.40 Ø Åbyhøj (CJA), 22/5 31 Pinds Mølle (FBM), 5/6 20-30 og 12/6 1 Mossø (HP).

Dværgterne (*Sterna albifrons*): Alle obs. 28/5 1 Lystbådehavnen, Århus (NÅ,HK), 19/6 1 Brabrand Sø (JL), 1/7 1 Kysing Fjord (LPJ), 5/7 2 og 12/7 4 Horskær (LPJ) samt 12/7 1 Alrø (LPJ).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): Sidste 26/9 4 Horskær (LPJ).

Alkefugle (*Alcidae*): På 10 obs-dage er godt 2000 trukket forbi Fornæs. Langt de fleste er artsbestemt (se nedenfor) modsat tidligere, hvor alt blev kaldt "Alkefugl sp.". Der kan dog godt, specielt på de store "alke-dage" være smuttet en del Lomvier med i Alketallene. Eneste alkefugl sp. er derfor 21/11 6 N Fornæs. (HLL).

Alk (*Alca torda*): Alle tal er fra Fornæs.: 29/10 140, 11/11 136, 13/11 3, 21/11 227 (alle RD), 21/11 196 N (HLL) (samme?), 22/11 395, 24/11 838, 25/11 249, 26/11 70, 3/12 4 og 9/12 41 (alle RD).

Søkonger (*Plotus alle*): 29/10 1, 11/11 2, 13/11 1 og 26/11 1 alle fra Fornæs (RD).

Lomvie (*Uria aalge*): Kun 24/11 1 og 3/12 1 Begge Fornæs (RD).

Tulst (*Cephus grylle*): 6/3 1 dødfunden Kysing Næs (AJ), 15/5 2 ad Sangstrup Klint (JRR), og så Fornæs : 29/10 2 (RD), 21/11 4 S (RD,HLL) og 26/11 1 (RD).

Lunde (*Fratercula arctica*): 29/10 3, 11/11 1, 22/11 1 og 3/12 1 alle fra Fornæs (RD).

Gøg (*Cuculus canorus*): Den første 9/5 1 Øer (KH).

Slørugle (*Tyto alba*): 27/5 1 Vorskø (JG).

Skovhornugle (*Asio otus*): 2/4 2, 3/4 2 og 6/4 1 Brabrand Sø (AJ).

Mosehornugle (*Asio flammeus*): 3 forårsfugle og 9 efterårs-. Man bemærker specielt flokken på Hassensøre i oktober.

22/3 1 Brabrand Sø (AJ), 1/4 1 Gjerrild Nordstrand (SKH), 22/4 1 Horskær (LPJ).

7/10 6 Øer (DOF), 15/10 1 Stavns Fjord (LB), 31/10 1 Alrø (LPJ), 11/11 1 Fornæs (RB), 11/11 2 trk Fornæs (ØBF), 25/11 1 Stavns Fjord (LB), 28/11 + 17/12 1 Horskær (LPJ) og 16/12 1 Herredsvej, Hasle (CHA).

Mursejler (*Apus apus*): De første og sidste obs.

1/5 1 Randers (SBP,SS,OT) og 7/5 1 N Moesgård (AJ).

25/9 3 Norsgade, Århus (SBP) og 3/10 3 Vennelystparken, Århus (SBP,OT).

Isfugl (*Alcedo atthis*): Alle obs uden for Gudenåen. Specielt bemærkes de to iagttagelser ved saltvand (Splidholm + Moesgård).

29/1 1 Giber Å (AJ), 19/2 1 Botanisk Have, Århus (LH,SBP), 3/3 1 Spangsbæk (HK), 5/3 1-2 Pindes Mølle (DOF), 6/5 1 Glenstrup Sø (JRR), 21/5 2 Salten Langsø (HP), 20/7 1 Åby eng v Brabrand Sø (CJA), 27/8 2 Giber Å (AJ), 19/9 1 med føde i næbbet Splidholm (LPJ), 12/10 1 S langs kysten Moesgård (SBP), 22/10 2 + 1/11 1 + 10/12 1 Døde Å, Brabrand Sø (AJ), 10/12 1 Bodil Mølle (ØBF) og 16/12 1 Grundfør Vandmølle (PN). Sluttelig 17/12 1 Slåen Sø (SBN).

Grønspatte (*Picus viridis*): Set med op til 3 eks. (30/3) ved Moesgård i perioden 30/3-3/5 (NÅ, HK), i efteråret kun set her 24/11 (NÅ, HK). Desuden 14/10 1 (HLL) + 8/11 1 (AJ) Kysing Fjord.

Lille Flagspatte (*Dendrocopus minor*): Særlig meget sjælden på disse kanter. 7/2 1 i Vennelystparken, Århus (SBP).

Sortspatte (*Dryocopus martius*): Spredt sig stadig her i landet. Et par observationer af enkeltfugle i vort amt drejer sig dog nok kun om strejffugle. 4/4 til ind i maj 1 set på Djursland (JDK, JLK) primo oktober 1 set og hørt i Midtjylland (NÅ, HK, OT).

Vendehals (*Jynx torquilla*): 5 eks. fra foråret er normalt, medens et oktober-obs er meget usædvanligt. De sidste Vendehalse er som regel ude af landet med sep, der er meget få obs fra ult. sep-pr. okt.

22/4 1 Estruplund Skov (JRR), 6/5 1 Tved Øhoved (SKH), 6/5 1 hørt Sondrup Plantage (NÅ, HK), 9-10/5 1 Vorskø (FC, JG) og 11/5 1 Norring Enge, Hinnerup (JDK, JLK).

15/10 1 hørt (DOF) er altså meget sen !

Toplærke (*Galerida cristata*): 11/2 4 Randers By (JRR).

Hedelærke (*Lullula arborea*): Eneste obs er 11/3 1 N Moesgård (HP, SS) og 21/5 1 Salten Langsø (HP) ---- det var måske en ide at repetere kendetegnene for denne art, for den må være mere almindelig end det fremgår af de få obs ovenfor ---.

Sanglærke (*Alauda arvensis*): Ved Moesgård er ialt 8499 ex noteret trækkende. Dette tal ibefatter en fornem Moesgård-rekord på ialt 6000 N-trækkende fugle d. 11/3 (!) --- andre større dage sammesteds var 24/3 200, 27/3 663, 28/3 200, 1/4 237 og 2/4 475.

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): 1/1 20-25 trk S over Kysing Fjord (AJ), 29/10 12 Mariager Fjord (ØBF) og 4/11 8 Kysing Fjord (CA, SS).

Landsvale (*Hirundo rustica*): De første var 21/4 1 Kalsemade Rev (AJ) og 22/4 1 Brabrand Sø (AJ). I løbet af maj er ialt 268 noteret trækkende ved Moesgård.

De sidste var 15/10 1 Nordby, Samsø (LB), 16/10 1 Sødning (AJ) og til allersidst 17/10 1 Skanderborg (AJ).

Bysvale (*Delichon urbica*): De første 2/5 1 Brabrand Sø (AJ) og derefter først 6/5 flere steder bl.a. 50 trk ved Moesgård (NÅ, HK, PN m.fl.)

Digesvale (*Riparia riparia*): Den første 5/5 1 Moesgård .

Pirol (*Oriolus oriolus*): Et ynglepar Søby Fredskov (LPJ). Desuden 4/6 2 mellem Vesborg Fyr og Brattingsborg, Samsø (LB), 10/6 3 (2 han+1 hun) Vorsø (FC) og 17/6 2 Vorsø (ØBF).

Ravn (*Corvus corax*): Ved Moesgård ses yngleparret fra Fløjstrup ret ofte. A mere "trækagtig karakter" er set 30/3 1 N og 9/4 2 N (AJ) altså ved Moesgård. Fra foråret desuden, 12/3 2 Hadsten (TB,SBP,OT) og 7/5 1 ved Framlev (CHA).

I sommertiden: 4/7 6 (velsagtens hele familien) Fløjstrup (CJA), 26/7 1 ad Lerdrup (AJ) og 15/8 3 Fløjstrup (AJ).
I det sene efterår: 4/11 min. 2 Dørup (AJ), 12/11 1 Kysing Fjord (LH, MBP,SBP) og 22/12 2 Vejlbj Nord (SS).

Sortkrage (*Corvus corone corone*): Ved Moesgård: 6/3 3 N (SS), 11/3 1 N (HP) og 2/4 1 N.

Desuden: 29/3 1 Ramten (NÅ,HK), 6/5 1 Sondrup (NÅ,HK), 9/7 + 11/7 1 Kysing Fjord (AJ) samt 11/11 1 Lystrup Enge (PWB).

Vandstær (*Cinclus cinclus*): I foråret normalt antal noteret fra 10-12/3 på følgende lokaliteter: Glenstrup Sø, Norring Vesterskov, Grundfør Vandmølle, Lilleådal, Gibe Sø, Giber Å, Lystrup Å (14/3 10 ex), Pinds Mølle, Spangsbæk ved Odde (3/3 4 ex), og Pinds Mølle ved Gudenåen. (SKH,NÅ,HK,FC,DOF,JRR,SDE,PN). I efteråret ret fåtallig. Første obs. 21/10 1 Gibe Å (NÅ,HK), derefter 1 ved Grundfør Vandmølle, Vejlbj Nord, Giber Å, Århus Å (10/12 9 ex.) og Glåen Sø (NÅ,HK,ØBF,PN,SBN,CJA,LH,MBP,SBP,SS).

Skægmejse (*Panurus biarmicus*): Eneste rapporterede obs var 26/5 1 ad han Brabrand Sø v Døde Å (AJ).

Misteldrossel (*Turdus viscovorus*): Træktal fra Moesgård Strand : 11/3 4 N, 24/3 2 N, 25/3 5 tf, 28/3 1 N, 2/4 2N, 6/4 1 N og 3/5 1 rst (NÅ,AJ,HK,HP,SS m.fl.).

Øvrige obs.: 11/3 3 Havkær v Mariager Fjord (JRR), 12/3 3 Glenstrup Sø (JRR), 18/3 1 Brabrand Sø (AJ), 28/3 2 Resebro, Silkeborg (FC), 30/3 1 syngende Moesgård Skov (SBN), 8/4 6 NØ Gjerrild Fyr (ØBF), 12/5 1 Glenstrup Sø (FC), 2/9 6 Brattingsborg Samsø (LB), 16/10 2 Slten Langsø (AJ), 2/11 1 Brabrand Sø (HLL) og 4/11 2 Salten Langsø (AJ). Sødrieholm

Sjagger (*Turdus pilaris*): På forårstræk ved Moesgård blev ialt 17 ex observeret. Støste tal fra foråret var 30/4 400 Skørping (PN). I efteråret sås og hørtes mange rundt omkring. Fra med. okt (14/10) til med. dec (11/12) sås småflokke på op til 25 ex overalt. Kun enkelte lidt større flokke er meldt, 29/10 80 Mariager Fjord (ØBF) og 3/12 75 Mindeparken, Århus (NÅ,HK).

Vindrossel (*Turdus iliacus*): Vinter-obs: 3/1 410 Gibe Å (AJ), 13/2 1 Moesgård (NÅ,HK) - måske den første, tidlige forårgæst. I efteråret gik et meget stort nattetræk over landet midt i okt. På de bedste aftner hørtes 2-3000 pr time, ud på natten aftagende til 500/time. To obs fra dec.: 10/12 25 Mindeparken (SBN) og 12/12 1 Århus Seminarium.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): Eneste obs 30/4 1 han Langør Samsø (FC).

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): Alle obs. 6/5 2 (par) Åby Eng (AJ), 6/5 1 han Moesgård Strand (AJ), 10/5 2 (Par) Århus Havn (NÅ,HK), 17/5 10 han + 6 hun Mariager Fjord (AJ), 24/5 1 Horskær (LPJ), 6/7 1-2 Aarhus Skøjtehal, Århus Nord (NÅ), 15/7 3 + 26/8 3 + 28/8 13 + 3/9 12 Kysing Fjord (AJ), 15/8 4 + 29/8 2 Splidholm (AJ), 29/8 5 Alrø (AJ) og 29/8 3 Gylling Næs (AJ).

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*): Atter en iagttagelse af denne lille labre fugl, mon ikke den er noget overset ?
28-29/10 1 Stavnsfjord, Samsø (LB).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): Den første 10/5 1 Brabrand Sø (AJ).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): Ingen optælling på Århus havn. Alle obs.: 8/4 1 rst Gjerrild Fyr (ØBF), 10/4 1 Teknisk Skole, Århus Nord (CHA), 12/4 1 par Øer (SKH), maj 1 sy Skanderborg (HHH), 9/5 1 sy Øer (KH), 10/6 1 sy Vestre Ringgade, Århus (HHH), 10/6 1 sy Dania, Mariager Fjord (HP), 8/7 1 Lystrupvej, Århus (SS), 9/7 1 par Norsgade, Århus

Nattergal (*Luscinia luscinia*): Op til 50 sy Bjerregrav Mose, 21/5
10-15 sy Kasted Mose (ØBF), 26/5 15 sy Brabrand Sø (TB,SBP), 13/6
50-55 sy Bjerregrav Mose (HP) og 17/6 min. 5 sy Vorsø (ØBF).

Grashoppesanger (*Locustella naevia*): I Bjerregrav Mose er flg hørt :
11/5 sang 2 (JRR), 13/6 5 sy + 22/6 1 sy (regn) (AJ,HP).
Desuden pr.juni 1 sy Tåstrup Sø (mdl medd).

Drosselrørsanger (*Accrocephalus arundinaceus*): Virkelig mange i år,
mindst 6 forskellige ex. Ved Brabrand Sø hørtes 1 sy samme sted fra
20/5 til 20/6 (FC,JG,AJ,HP), desuden hørtes 1 sy ved en anden del af
søen 9/6 (AJ), Desuden ult.maj 1 sy Kysing Fjord (mdt medd), maj/juni
1 sy Øer (Bo Rasmussen), pr.juni 1 sy Mørke Kær (mdt medd) og 13/6 1 sy
Bjerregrav Mose (AJ,HP).

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): 13/6 40-45 synende Bjerregrav Mose
(HP).

Munk (*Sylvia atricapilla*): I åen i år et par vinterobs. 12/2 1 han Dyre-
havevej, Århus (AJ) og 29/11 1 Norring ved Hinnerup (JDK,JH).

Tornsanger (*Sylvia communis*): Første 6/5 Moesgård (AJ).

Gårdesanger (*Sylvia serruca*): Første 3/5 Moesgård (NÅ,HP).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): Første 23/4 1 synende Klostermølle:
(KH).

Gransanger (*Ph. collybita*): Første 30/3 2 Brabrand Sø (AJ).

Skovsanger (*Ph. sibilatrix*): Første 9/5 1 Vorsø (FC).

Grå fluesnapper (*Muscicapa striata*): Første 5/5 i Brabrand Sø (AJ).

Brogæt fluesnapper (*Muscicapa hypoleuca*): Første 5/5 1 Brabrand Sø (AJ).

Hvidhalsæt fluesnapper (*Muscicapa albicollis*): I åen i år er denne sjæld-
ne art set i amtet. 15/5 1 han Lisbjerg Skov (CA,SB,SBP).

Lille fluesnapper (*Muscicapa parva*): Også en "småsnapper" er set i år.
Men ikke det er første gang alle 4 arter fluesnapper er set samme år i
Århus Amt?
4/6 1 Vesborg Fyr, Samsø (Klaus Malling Olsen).

Skovpiber (*Anthus trivialis*): Første 6/5 1 trk. Moesgård (AJ).

Skærpiber (*Anthus colinetta littoralis*): Nok en noget overset art. Kan
formentlig ses på fleste steder ved kysten fra okt.-marts. Alle obs.
nevnes. Se endvidere appendix.
15/2 1 Frå Strand, 17/2 1 Risskov, 19/2 2 Risskov Strand, 29/3 7 Fornæs
(alle NÅ,HK) samt 3/11 1 Kysing Næs (HLL).

Hvid vipstjert (*Motacilla alba*): De første 12/3 1 Hinnerup og 12/3 1 Al-
rø (begge PN).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): Et par vinteriagttagelser, forårs-
træk med.-ult. marts, flere ynglefund (april-juni), efterårstræk sept.
okt og efter pr. nov. isen vinteriagttagelser (eller sent træk?).
Vinter: 4/1 1 Børup Mølle (AJ) og 3/2 1 Brabrand Sø (JG).
Forår: 18/3 1 N, 22/3 2N, 22/3 1 N Moesgård (AJ m.fl.), 22/3 1 Bilistria
Marselisborg Skov (AJ) og 23/3 1 Brabrand Sø (AJ).
Ynglefugle: Russins Ø, Grundfør Vml., Giber Å, Lyngbysgård Å (BN,AJ,NÅ,
HK,JRR).
Efterår: 2/10 1 Giber Å (SRP), 6/10 1 S Norsgade, Århus (SRP).
Vinter: 11/11 1 Sinds Mølle (fl), 20/11 2 Grundfør (PN) og 10/12 1 Tar-
skov (SRP).

Gul vipstjert (*Motacilla flava*): De første 8/4 2 NÅ Gjerrild Vyr (SSS)-
marer tidligt.

Vordlig gul vipstjert (*M.f. thunbergii*) er vist nok ret fåtallig i om-
rødet, hovedtrækket går længere østpå. En enkelt større obs.: 22/5 1
Stavnsfjord (LB).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*): Enkelte spredte obs. Arten har været
en mangelvare de sidste par år hertilands.

12/1 2 Foldby (JDK,JLK), 13/1 3 Skanderborg (HHH), 30/1 8 Vorsø (SSS),
20-21/2 35 Ingerslevs Boulevard, Århus (SBN), 11/3 13 N. Woessgård (NA,
HK), 24/3 65, 26/3 50 og 28/3 25 Højbjerg (HP).

1/10 2 Vennelyst-Parken (SBP), 1/12 8 Strandvejen, Århus (SBP), 2/12 3
Woessgård Strand (NA, HK) og 25/12 9 Byhøj (CJA).

Rød tornskade (*Lanius excubitor*): Ialt 11 obs. (6 forår, 5 efterår) er
ikke imponerende. Alle fugle er set enkeltvis.

Forår: 13/2 (NA, HK), 6/3 (SS) og 19-28/3 (AJ).

Efterår: 24/3 Løvenholm Skovene (JRR), 28/3 Kalø Vig (JRR), 8/4 Gjerrild
Vyr (SSS), 13/10 Hassenøre (MPJ), 16/10 Stavnsfjord (LB), 4/11 Søften
Vorsø (AJ), 25/11 Herring Vesterskov (JDK, JJK) og 26/11 Hårved Bro v.
År (PK).

Rødbrøstet tornskade (*Lanius collurio*): Forårstræk: 16/5 1 Vorsø (SSS),
23/5 1 Rassingø (JRR), 24/5 1 Tåstrup Sø (AJ), 1/6 1 Botanisk Have, År-
hus (NA, HK) og 11/6 1 Dybdal Skov, Hinnerup (PN).

Vinterfund: Grundfør Vandmølle: 19/5-24/6 bl.a. set ved rede (SSS), Kysing
Fjord: set med 3 unger til 3/9 (CP, AJ, SS, HLL).

Efterårstræk: 25/7 1 Vejlbj Nord (SS), 16/8 2 juv. (LJA) og 30/8 1 juv.
Løse Brabrand Sø.

Rødbibber (*Carduelis coccythraustes*): En art, vi gerne vil vide mere om.
Alle obs.: 19/2 2 Botanisk Have, Århus (LH, SBP), 19/2 1 Vennelystparken
(HH, SBP), 1/4 1 Forsthaven, Århus (NA, HK), 3/5 1 Woessgård Skov (NA, HK),
9/5 1 Botanisk Have, Århus (NA, HK) og 28/5 1 Risskov (NA, HK).

Rødsiskan (*Carduelis spinus*): Fåtalig i vinteren 77/78. Kun meldinger
fra Brabrand Sø: 2/1 1, 26-27/1 40, 16/2 3, 18/3 8 og 27/3 9 (alle AJ).

Talrig i efteråret. De første sås 6/10 33 trk. S. Norssgade, Århus (SBP).
Efter (antal over 50) 3/11 56 SV Kysing Fjord (CJA), 24/11 170, 2/12
120 Woessgård Strand (NA, HK), 10/12 50 Marselisborg Skov (NA, HK), 10/12
120 Dybdal Skov, Hinnerup (PN) og 27/12 50 Mindeparken, Århus (SBP).

Rødnirisk (*Carduelis cannabina*): En enkelt vinterobs: 16/12 5-10 Brabrand
Sø (SS).

Rødvirrick (*Carduelis flavirostris*): Alle obs. fra vinter/forår: 2/1
265 Brabrand Sø (AJ), 7/1 3 Kysing Fjord (AJ), 26/1 41 Brabrand Sø (AJ),
28/1 2 Kysing Fjord (AJ), 28/1 5 Kysing Væs (AJ), 31/1 15 Randers Fjords
udløb (JRR), 6/2 2 Mindeparken (SBN), 7/2 370 Århus Domkirke (SBP), 9/3
min. 50 Århus Domkirke (SBP), 21/3 24 Dejret, Mols (SKH) og 15/4 20 År-
hus Havn (NA, HK).

I efteråret optrådte arten ret talrigt, fra ult. okt. sås flokke på 10-
20 ex. på alle strandengs lokaliteter. Vi nævner kun den første og de to
største flokke (over 60 ex.): 16/10 15 mellem Mariager og Randers Fjords
udløb, 16/12 ca. 175 sammesteds og 16/12 110 ved Mariager Fjord (alle AJ
I overnatningspladsen på Århus Domkirke har CJA talt op regelmæssigt.

(Ialt 24 dage i nov.-dec.). De første fugle kom her 8/11 (10 ex.). I lø-
bet af måneden steg antallet. D. 20/11 var her 110 ex. og 29-30/11 top-
nede antallet med 160 ex. I hele december svingede antallet omkring 100

Gråsisken (*Canduelia flammea*): Ikke ligefrem sidsourivende hvad denne art kan præstere. Kun 4 obs. og antalsmæssigt er det også meget sløjt. 14/1 4 Randers Fjords udløb (JRR), 11/4 1 trk. Moesgård Strand, 4/11 55 Salten Længsø (AJ) og 25/12 6 Norring v. Hinnerup (JJK, JIK).

Lille korsnæb (*Loxia cupvirostra*): Det er ikke mange iagttagelser af denne art som indrapporteres, kun 4 obs. fra hele 1978. 15/1 2 Tussingø (JRR), 11/3 1 hun Sødringholm Skov (AJ), 21/4 11 næst Fornæs (JFF) og 18/7 3 Salten Længsø (SS).

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*): En enkelt tillig observation og ellers mangel på de store flokke i efteråret. 9/9 125 Salten Længsø (AJ).

Hortulan (*Emberiza hortulana*): En enkelt obs. af denne sjældne, men vel nok årlige forårsgæst. 11/5 1 Norringene v. Hinnerup (JJK, JIK).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*): Første halvår kun 17-18 fagle rapporteret. Efteråret første til normal tid, ult. september. Fra ult. oktober og året ud ses virkelig mange:

26/1 11 Alrø (AJ), 22/3 1 Moesgård Strand, 28/3 3 Alrø, Faldkrog (NÅ, HK) og 11/3 1 han Sødringholm (AJ).

Efterårstræk: 20/9 1 Splidholm (Ebbe Teibel, Wittrup Jensen), Fornæs: 29/10 590 (RD), 11/11 11 (ØBF) og 21/11 2 (HLL), Mariager Fjord: 16/10 1 hørt ved udløbet (AJ), 29/10 127 (ØBF) og 16/12 50 udløbet (AJ). Desuden: 11/11 2 Sangstrup Klint (ØBF).

Appendix:

Almindelig skråpe (*Puffinus puffinus*): 11/11 4 N Fornæs (RD). Skal foreligges S.U.