

LOKALRAPPORTEN 1980 ÅRHUS AMT



INDHOLD.

Indledning(Niels Aagaard)	side 3
Udbredelse og forekomst (Allan Janniche)	side 3-4
Specialundersøgelser (Allan Janniche)	side 5-6
Retningslinier (Niels Aagaard)	side 6
Bidragssydere	side 7
Artsgennemgang	side 8-59
lommer-hejre (allan janniche)	side 8-13
andefugle (jørgen franck)	side 13-26
rovfugle (jørgen axelsen)	side 26-33
hønsefugle, traner, vandhøns (niels aagaard)	side 33
vadefugle (henning lykke larsen, niels aagaard)	side 34-43
måge-alkefugle (niels aagaard)	side 43-46
duer, gøge, ugler, skrigefugle, spætter (hans christian andersen)	side 46-49
lærker, svaler, spurvefugle (hans henrik høj)	side 50-59
Appendix I	side 60
Appendix II	side 60-61
Appendix III (Niels Aagaard)	side 61-68
Appendix IV (Rapportgruppen)	side 68-70
Litteratur	side 71

Redaktion:

Niels Aagaard
 Hans Christian Andersen
 Jørgen Axelsen
 Jørgen Franck
 Hans Henrik Høj
 Allan Janniche
 Henning Lykke Larsen

Renskrivning og layout:

Allan Janniche

Tegninger:

Grethe Axelsen

INDLEDNING.

Hermed foreligger så lokalrapporten for Århus Amt 1980. Større end nogen sinde på grund af stor aktivitet og stor indsendelseslyst. Begge dele må dog gerne stige endnu en tand. Vi er nu 7 personer i lokalredaktionen og den samlede arbejdsevne rækker til en endnu større rapport for 1981. I den forbindelse vil vi byde de nye, Hans Christian Andersen og Jørgen Axelsen velkommen i folden, vi håber, I står for mosten og bliver glade for sliddet.

Selve indholdet i rapporten er ikke væsentligt ændret. Mystiske og sjældne iagttagelser, der (endnu) ikke er godkendt af Sjældenhedsudvalget er flyttet i appendix I og II, og i appendix III har vi samlet gamle obs. fra 1979 (enkelte endnu ældre obs. kommer med i 1981-rapporten). Vi har indført de nye aldersbetegnelser, der går efter kalenderåret (1K, 2K, 3K....., DOFT 74, 1980), og så har vi forsøgt at angive arternes hyppighed med bestemte udtryk (se nedenfor).

VIGTIGT, VIGTIGT. Selv om vi nu helt er gået over til at lave helårsrapporter, vil vi gerne ha' jer til at meddele sjældenheder o.lign. til os hurtigst muligt, dels til brug for rubrikken Siden Sidst i FUGLE, dels for at andre kan få glæde af de spændende iagttagelser. Dette kan gøres enten skriftligt til Rapportgruppen, Viborgvej 29, 8000 Århus C, eller - lettest - telefonisk til Niels Aagaard (tlf. 06-124151), der indsamler Siden Sidst-materialet. Sammesteds kan man jo så selvfølgelig også få at vide "hvor det sker".

Ellers er kun at minde om, at iagttagelser fra 1981 skal være indrapporteret senest 1. februar 1982.

UDBREDELSE OG FOREKOMST

Som noget nyt for vor lokalrapport, har vi indført et indledningsafsnit, der fortæller om den enkelte arts udbredelse og forekomst i Århus Amt. Det har af naturlige grunde kun været muligt at udarbejde disse indledningsafsnit for de arter, hvor materialet har været stort (I-arterne) og de sjældnere arter, hvor det må antages at alle iagttagelser er indsendt.

De i rapporten givne udbredelser er ikke alle tydeligt udtrykt.

i ord. For et stort antal af de fuglearter, som træffes i Århus Amt, er der tale om to former for udbredelse, 1. som ynglefugl og 2. som træk- og vintergæst. For ynglefuglenes udbredelse er lokaliteten og antallet af par nævnt. Det er jo iøvrigt nyt med ynglefugleindrapportering i større omfang, men forhåbentlig vil disse oplysninger ekspandere endnu kraftigere i 1981-rapporten. Udbredelsen for træk- og vintergæster er sværere at beskrive og det er kun gjort for nogle få arter, f.eks. flere af andefuglene.

Fuglenes forekomst er beskrevet ved angivelse af det tidspunkt indenfor hvilket de opholder sig i Århus Amt. Det er gjort ved angivelse af måned eller årstid, f.eks. forår.

Den talmæssige forekomst (hyppighed) har vi fra og med denne rapport søgt at beskrive med 6 forskellige betegnelser, der hver for sig dækker over et antal, henholdsvis ynglepar eller individer for træk- og vintertiden. Hyppighederne er opstillet som følger:

Meget sjælden	1-2	par eller individer (på træk)
Sjælden	3-10	-
Fåtalig	11-100	-
Ret almindelig	101-1000	-
Almindelig	1001-10.000	-
Meget almindelig	over 10.000	-

Da det er første gang vi prøver dette i lokalrapporten, vil der være nogle fejl, ligesom der ikke altid er noget system i indledningsafsnittet. Vi har diskuteret disse forhold i rapportgruppen, men er endnu ikke kommet til et helt klart mål, f.eks. omkring hyppighederne. I almindelighed må det siges at hyppighederne dækker over det indkomne materiale, trods det, at flere arter helt tydeligt optræder i større antal end nævnte hyppighed. I andre tilfælde er der fremsat formodninger om arternes hyppigheder.

De her anvendte udbredelser og forekomster vil være mere relevante i specialartikler om de enkelte fuglearters optræden i Århus Amt. Med de efterhånden mange udgivne lokalrapporter er det aktuelt at begynde, at lave specialartikler til Søravnen. Det kan forventes at den første måske bringes i efterårsnummeret af Søravnen 1981.

SPECIALUNDERSØGELSER.

Da et stort antal fugle- og naturinteresserede har specielle interesser i bestemte arter eller naturlokaliteter, bør lokalrapporten være stedet hvor projekterne nævnes med en kort omtale.

Naturlokaliteter:

Vandhuller, moser og søer i Århus Kommune.

I 1980 intensiveredes en undersøgelse af vådlokaliteter i Århus Kommune og i feb. 1981 udkom del I, omhandlende det indsamlede datamateriale. I løbet af sommeren/efteråret 1981 påregnes del II (konklusionen) at udkomme. Undersøgelsen blev foretaget af Peter Skriver og Søren Skriver. Del I kan for kr. 40,- rekvireres hos Peter Skriver, Marstrandsgade 3, 8000 Århus C, tlf. 06-137974. Denne undersøgelse er kun omtalt i forbindelse med Lille Lappedykker

Kysing Fjord (Norsminde Fjord).

Østjysk Biologisk Forening behandler i øjeblikket et meget stort materiale om de naturhistoriske forhold i fjorden. Indsamlingen er ført frem til og med 1978. Det er meningen, at offentliggørelsen skal ske i bogform. Med hensyn til det ornithologiske afsnit, søges materialet ført up to date med et appendix over de mere usædvanlige iagttagelser.

Moesgård Strand.

I 1980 blev den anden selvstændige rapport omhandlende fugletrækket ved Moesgård Strand udsendt. Den store interesse for fugletrækket på lokaliteten har været baggrund for udgivelsen, der isøvrigt fremover påregnes som årlig. Rapporten kan erhverves hos redaktøren Hans Pinstrup, Kjeldsensgade 13, 8700 Horsens, tlf. 05-611173 eller Giro 5.01.47.43. Østjysk Biologisk Kartotek v/ Allan Janniche Langenæs Alle 72, 8000 Århus C.

Materiale til 1981-rapporten sendes til redaktøren senest 1.sept.81

Lading Sø og Skivholme Skov.

Alle iagttagelser af fugle indsamles af: Bjørn Holmskjold, Skyttehusvej 20, 8464 Galten, tlf. 06-954019.

Bjerregrav Mose.

Alle iagttagelser af fugle, padder, krybdyr, pattedyr, planter, mv. indsamles af: Østjysk Biologisk Forening, Postbox 169, 8100 Århus C. Materialet bedes indsendt senest 1. september 1981. Udgives i temanutnummer af foreningens tidsskrift Gejrfuglen.

Brabrand Sø.

Alle iagttagelser af fugle indsamles af: Allan Janniche, Langenæs Alle 72, 8000 Århus C, tlf. 06-112174.

Artsundersøgelser:

Rørhøg: Til en specialartikel ønskes alle oplysninger om artens yngleforhold i Århus Amt fra årene 1976-81. Desuden ønskes alle ikke offentliggjorte (i lokalrapporterne) iagttagelser af arten fra træk- og sommertiden i samme periode. Artiklen skal søge at belyse artens yngle- og trækforhold i amtet. Offentliggørelsen vil ikke som nævnt i artsgennemgangen kunne forventes i efterårsnummeret af Søravnen, men er udsat til forårsnummeret i 1982. Alt materiale bedes være lokalredaktørene i hænde senest 15. november 1981. Materialet behandles af en eller flere af lokalredaktørene.

Ønsker man at gøre opmærksom på en indsamling omkring en lokalitet eller fugleart i amtet, eller noget som berører amtet, så send os et par linier så vi kan bringe det her i rapporten - stedet hvor aktive feltornithologer mødes!

RETNINGSLINIER.

I det mindste fire regler SKAL overholdes af alle bidragsydere til vores lokalrapport.

1. Observationerne skal opføres artsvis.
2. Der må kun skrives på den ene side af papiret.
3. Ved indsamlingsarterne skal alle enkeltiagttagelser nævnes og
4. Iagttagelserne skal være os i hænde senest 1/2 1982, -83, -84 ect

Desuden BØR man overholde følgende:

1. Hver enkeltiagttagelse noteres i rækkefølgen: art-dato-antal-køn -alder-opførsel mv-lokalitet-evt. med-observatør.
2. Ved sjældne arter vedlægges en kort beskrivelse af sete kendetegn samt iagttagelsesomstændighederne (lys, afstand, kikkert mv).
3. Ved iagttagelser af alle SU-arter samt storke, ørne, glenter,

Hedehøg, Fiskeørn, falke (÷Tårnfalk) og Trane noteres klokkeslet så præcist som muligt.

Principielt bør alle iagttagelser indsendes, også de almindelige fugle. Kan Du ikke overkomme det bør i det mindste følgende indsendes: Alle obs. af indsamlingsarter, alle første- og sidste iagttagelser af trækfugle samt andre interossante iagttagelser (f.eks. større flokke).

BIDRAGSYDERE.

Niels Aagaard (NÅ), John Andersen (JoA), Jørgen Axelsen (JAx), Kim Biledgård, Horsens (KB), Lars Borup (LAB), Henrik Brandt (HB), Leif Brauer, Værløse (LB), Per Delphin (PD), Henning Ettrup (HE) og (HEt), Finn Frandsen (FF), Jørgen Franck (JF), Lars Lund Hansen (LLH), Lars N. Hansen (LNH), Per Henriksen (PH), Hans Henrik Høj, Skanderborg (HHH), Erik Hørning (EH), Allan Janniche (AJ), Bjarke Huus Jensen (BHJ), Marian Würtz Jensen (MWJ), Svend Møller Jensen, Hinnerup (SMJ), Lars P. Johansson (LPJ), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Terp Laursen (JTL), Martin Seeberg Lembe, Sønderborg (MSL), Pia Morsing (PM), Peter Nielsen, Ryomgård (PN), Stig Bachmann Nielsen (SBN), Jesper Juel Pedersen (JJP), Claus Quist Petersen (CP), Hans Pinstrup, Horsens (HP), Jean Rasmussen (JR), John R. Rasmussen, Randers (JRR), Marianne Rasmussen (MR), Per E. Rasmussen, Randers (PER), Søren Skriver (SS), Eigil Thomasen (ET), Jesper Tofft (JT), Niklas Tångeberg (NT). Endvidere er benyttet ekskursionsreferater fra Dansk Ornithologisk Forening (DOF), og Østjysk Biologisk Forening (ØBF) samt observationer offentliggjort i Gejrfuglen (Gf) og i rapporten Moesgård 1980, foråret (MS).



ARTSGENNEMGANG.

Lom sp. (Gavia sp.)

21/3 1 N Moesgård Strand (MS), 3/4 2 trk. Fornæs (DOF), 1/5 1 NV Anholt (NÅ). Kysing Næs: 5/10 1 S (PH, BHJ), 18/10 3S+2N (PH, BHJ) og 1/11 1 trk. (HLL).

Sortstrubet Lom (Gavia arctica).

4 iagttagelser af 17 fugle: 3/4 12 trk. og 4/4 3 trk. Fornæs (DOF), 2/5 1 Lushage, Samsø (LB) og 9/11 1 død Skæring Strand (PH, BHJ).

Islom/Hvidnæbbet Lom (Gavia immer/adamsii).

Se Appendix I.

Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii).

Se Appendix I.

Rødstrubet Lom (Gavia stellata).

4 iagttagelser af 7 fugle: 3/4 2 trk., 5/4 3 trk. og 6/4 1 trk. ved Fornæs (DOF) samt 21/12 1 Kysing Fjord (Keld Henriksen).

Lappedykker sp. (Podiceps sp./Tachybaptus ruficollis).

28/9 3S Kysing Næs (HP).

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus).

Ret almindelig yngletrækfugl (marts-okt./nov.). Fåtalig vintergæst (dec.-feb.).

Ynglefund med antal par: Mossø, Emborg Odde 65 (Gf), Brabrand Sø 30 (AJ), Tåstrup Sø 2 (AJ), Astrup Mose 2 (AJ), Lading Sø 6-7 (Bjørn Holmskjold), Nørre Sø 3 (Gf), Øje Sø 3 (Gf), Ryomgård min. 2 (JJP). Yngler desuden i følgende søer: Fussing Sø, Skanderborg Sø, Ramtan-Dystrup Søer, Stubbe Sø, Glenstrup Sø, Knud Sø og Salten Langsø.

Vinterobs: Brabrand Sø: 1/1 1, 3/1 1 (AJ) og 21/12 1 (NT). Salten Langsø: 2/11 50, 8/11 20, 9/11 45, 16/11 3, 19/11 18 (HP) Skanderborg Sø: 1/12 4 og 2/12 2 (HHH). 2/11 25 Knud Sø (NÅ). Ankomst: 2/3 2 Alrø -saltvand-(AJ) og 10/3 1 Brabrand Sø (AJ). Maksimumstal: Mossø 20/7 14lad+93juv og 26/10 87 (HHH). Brabrand

Sø: 21/4 61 og 16/8 120ad+juv+pullus (AJ). 27/9 61 Tjele Langsø, Va (JRR).

3 trækigttagelser: 3/4 1, 4/4 1 Fornæs (DOF) og 13/9 1S Kysing Næs (HP).

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps griseigena*).

Fåtalig yngletrækfugl (april-aug./nov.). Sjælden træk- og vintergæst (aug./nov.-marts-maj).

Ynglefund med antal par: Tranemosen, Samsø 1; min. 1pull. (LB, AJ, LPJ, HHH), Riis Sø 1 (JR), Amstrup Mose 1 (AJ, JR), Rønbækskolen, Hinnerup 2; ingen ynglesucces (SMJ) og Udbyover Sø 2-3 (JRR).

Alle iagttagelser nævnes: Brabrand Sø: 10/3 1 (AJ), 12-13/3 1 (AJ, HLL), 19/3 1, 31/3 1 (AJ), 1/5 1 (AJ, SBN), 1/5 2 (HLL) og 21/10 2 (LAB). Tranemosen, Samsø: bl.a. 5/4-23/5 2 (LB), 24/5 5 (AJ, HHH), 25/5 3 (LB), 29/6 4; 2par (LB), 13/7 1ad+1pull (LPJ) og 22/11 1 (LB). Rønbækskolen, Hinnerup: 2/4 1; 1. dag søen var isfri, 5/4 2, 15/4 3, 17/6 4; 2par og 26/9 1 (SMJ). Amstrup Mose: 13/4 2 (AJ), 18/4 1 (AJ, JR) og 20/4 1 (AJ). Øvrige: 22/3 1rast Moesgård Strand (MS), 3/4 1, 4/4 1 Fornæs (DOF), 14/4 1 Hattomager-skoven (SMJ), 27/4 2 lille mose mellem Gassum og Dyrby (JRR), 3/5 3 Glenstrup Sø (JRR), 9/5 1 Ramten-Dystrup Søer (NÅ), 11/5 5 Kysmose v/ Mundelstrup (AJ), 11/5 2 tørvegrav v/ Mundelstrup (AJ) 25/5 2 Riis Sø (JR), 1/6 1 Gammelose v/ Galten (AJ), 7/6 3 Udbyover Sø (JRR), 6/7 2ad Kysing Fjord (AJ) og 28/9 1S Kysing Næs (HP).

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*).

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

1 fund: 14/9 1 Kysing Fjord (DOF).

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*).

Ret almindelig, men meget spredt forekommende yngletrækfugl (april-sep./okt.).

Ynglefund med antal par: Mossø, Emborg Odde 130-150 (GF) og Vrads Sande 1 (JAx).

Alle iagttagelser nævnes: Mossø, Emborg Odde: 13/4 6par (HHH), 4/5 8 (DOF), 25/5 4 (KB), 1/6 1, 6/7 5 (DOF), 20/7 4par+3par med 1pullus+4ad (HHH), 22/7 2+1ad med 1juv (HHH), 2/8 15 (BHJ), 14/9 1 (HHH). Mossø, Fuldbro Mølle: 4/5 25 (GG), 15/5 2 (HP). Mossø, ikke stedangivelse: 10/5 12 (EH) og 24/5 8 (LPJ). Kysing Fjord:

24/7 3, 26/7 2 (JF,GG,HP), 30/7 2, 2/8 1, 3/8 1 (JF,AJ,HLL), 4/8 2, 8/8 2, 6/9 1 (GG,HP), 14/9 2 (DOF,JF), 5/10 2 (PH,BHJ), 11/10 1 (JF,GG,HP), 12/10 1 (DOF,JF,PH,BHJ,HP). (Hvor intet nævnt, alle JF). Brabrand Sø: 12/4 3 (AJ), 17-18/4 1 (AJ) og 21/4 1 (AJ,LPJ, SBN). Øvrige: 13/5 2 Tåstrup Sø (AJ), 26/5 1 Løvenholm Skov (LPJ) og 10/10 1 Gammellose, Galten (AJ).

Vrads Sande: 12/5 1, 21/5 1 og 14/6 1 med 1 pullus (JAX).

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis).

Ud fra 15-20 indrapporterede ynglefund, må arten betragtes som: Fåtalrig yngletræk- og ynglestandfugl (marts/april-okt./nov. - nov./dec.-marts borttræk til åbent vand; åsystemer, saltvand).

Specialundersøgelser vil vise, at artens hyppighed som ynglefugl er større. En vandhulsundersøgelse i Århus Kommune 1980 af 1345 vådlokaliteter (i størrelse fra branddam til Brabrand Sø) gav 36-43 ynglepar af Lille Lappedykker. Denne undersøgelse kan ikke overføres på hele Århus amt, men den viser artens hyppighed med sikkerhed kan antages at være, ret almindelig-almindelig. Kun 4 af de rapporterede ynglefund indgår i omtalte "vandhulsundersøgelse".

Alle iagttagelser nævnes. Sikre ynglefund med optrukken understregning, mulige med stiplede understregning.

Brabrand Sø: 1/2 1, 12/2 2 (AJ), 16/2 1 (PM,ET), 18/2 2 (HLL), 18/2 3 (AJ), 20/2 1, 22/2 2 (HLL), 22/2 3 (AJ), 23/2 1 (AJ), 1/3 1 (AJ,LPJ), 3-5/3 1 (AJ,LPJ), 30/3 1, 31/3 2 (AJ), 2-3/4 1 (JoA, HLL,MR), 10/4 1s. Åby eng, 12/4 3, 15/4 1s. Åby eng, 16/4 1s. vestenden, 18/4 1 (AJ), 29/4 1 (AJ,HLL,JR), 1/5 1 (AJ,SBN), 11/5 1 (HP), 29/7 1 juv (PH,BHJ), 1/9 2 (AJ), 29/9 1 (HLL), 12/10 1 (HLL), 21/10 1 (LAB), 10/11 3 (AJ), 15/11 2 (HLL), 19/11 1 (AJ), 30/11 2 (AJ,HLL), 4/12 1 (HLL) og 7/12 1 (AJ). Kysing Fjord: 13/1 1 (H+JE), 23/2 1 (JF), 5/4 1 (JF,LPJ), 6/7 1 (AJ), 19/7 1, 22/7 2 24/7 2 (JF), 26/7 2 (JF,GG,HP), 27/7 1 (PH,AJ,BHJ), 1/8 1, 2/8 5, 3/8 4, 7/8 8, 9/8 17, 10/8 5 15/8 14 (JF), 23/8 4 (GG,HP), 24/8 2, 6/9 5 (JF), 6/9 13 (GG,HP), 11/9 17 (JF), 14/9 17 (DOF), 18/9 19 (JF), 4/10 20 (HHH), 5/10 40 (PH,BHJ), 11/10 46 (JF), 11/10 48 (HP), 12/10 20 (DOF,HP), 12/10 22 (PH,BHJ), 18/10 19 (JF), 18/10 20 (PH,BHJ), 19/10 24 (JF), 19/10 26 (PH,BHJ), 20/10 8, 22/10 2, 23/10 1, 24/10 4, 25/10 3, 9/11 2 (JF). Kasted Mose: 12/5 1 (CP), 6/6 2s., 7/6 1s. (NÅ) og 9/9 4 (JAX). Vrads Sande: 6/4 2, 8/4 3, 20/4 2, 4/5 1 og 21/5 1 (JAX). Udbyover Sø: 2/5 3, 7/6 2

ad, 10/8 1par med 3 pullus, 28/9 2ad (JRR). Kongslund v/ Randers: 29/3 1, 27/5 1 og 9/6 1 (JRR). Ramten-Dystrup Søer: 7/4 1 (HP), 9/5 1 (NÅ), 17/8 2ad med 3pullus (EH). Mossø: 10/1 3 (JR), 27/1 4 Vilholt Mølle (HHH), 3/2 3 Voervadsbro (DOF), 7/12 2 Emborg Bro (DOF). Salten Langsø: 5/1 1 Salten Å (DOF), 19/1 1 (LNH), 23/2 2 (SS) og 10/3 1 (LPJ). Hattemagerskoven v/ Hinnerup: 3/4 1, 5/4 1 13/4 2, 14/5 1 (SMJ). Rønbæksøen, Hinnerup: 5/4 2 og 26/9 1 (SMJ). Sorte Sø, Skanderborg: 8/4 2; 1par og 27/7 1 (HHH). Gudenaå v/ Randers: 29/3 2 og 14/12 2 (JRR). Vejlby Nord, Risskov: 23/3 10-15 og 16/12 3 (LNH). Fornæs: 5-6/4 1rast (DOF). Øvrige: 4/1 5 Stubbe Sø (LNH), 26/4 1h. Lille Sø, Djursland (ØBF), 3/5 1 Glenstrup Sø (JRR), 25/5 4 Kolsig Kær v/ Ommestrup (PN), 20/6 4ad Bjerregrav Mose (JRR), 30/6 1h. Bogens Sø (LPJ), 27/7 1 med 1pul. Fuglsø (HEt), 6/8 1ad Kysmose v/ Mandelstrup (PH, BHJ), 28/9 1par + 1par med 2juv Hassensør (JTL), 10/10 2 Galten Sømose (AJ) og 2/11 4 Veng Sø (NÅ).



Skarv (Phalacrocorax carbo).

2 former forekommer i Østjylland. Der foreligger ikke racebestemmelser, men man kan antage at; Alle indlandsiagttagelser drejer sig om Mellemskarv (P. c. sinensis) på forageringstræk eller omstrejfende, ikke yngledygtige individer. Ligeledes alle saltvandsiagttagelser, mod nord til ihvertfald til Kalø, Begtrup og Ebeltoft Vige, mod øst til Samsø med omliggende farvand, i tiden marts-sep./okt. Storskarv (P. c. carbo) kan oversøes, men i mangel af sikre bestemmelser udelades dette mulige forhold.

I tiden okt.-marts trækker Storskarven til overvintring i indre danske farvande og disse iagttages på trækstederne langs kysterne. Mellemskarvens overvintring i danske farvande er dårlig kendt, men muligheden for overvintring i det ovenfor omtalte fourageringsområde kan ikke udelukkes.

Alle indlandsiagttagelser (IL) og flere trækiagttagelser nævnes. Kysing Fjord ("IL"): 26/7 2 (HP), 27/7 1 (AJ) og 12/10 13S-SØ (HP). Skanderborg Sø (IL): 26/4 1, 30/5 43, 25/6 11, 9/7 7 og 19/7 127! (HHH). Mossø (IL): 18/4 6 (HHH), 22/4 1 (NÅ), 4/5 6 (DOF), 10/5 12 (EH), 15/5 8 (HP), 16/5 2, 24/5 4 (LPJ), 25/5 24 (KB), 1/6 10 (DOF), 5/6 12 (JR), 2/7 13 (HHH), 6/7 5 (DOF), 10/7 1, 20/7 9 og 22/7 10 (HHH). Brabrand Sø (IL): 22/4 12SV (AJ), 22/5 2 (HHH), 30/5 2SØ (PM,ET), 31/5 1 (LPJ), 20/6 1juv (HLL), 5/7 3ad+1juv (AJ), 8/7 1ad+1juv (HLL), 13/7 3rast+1trk., 23/7 1, 25/7 1 (AJ), 25/7 2 (HLL), 27/7 2 (AJ) og 17/8 1juv (AJ,HLL). Fussing Sø (IL): 20/5 2, 7/6 2 (PER), 16-17/6 1 (JRR,PER), 24/8 2, og 19/9 15 (PER). Stubbe Sø (IL): 25/7 2 (HLL), 2/11 1 (LNH) og 10/11 3 (SS). Fornæs: 31/3 6, 1/4 4, 3/4 1, 4/4 19, 5/4 159 og 6/4 39, ialt 228 trk. (DOF). Moesgård Strand: 29/3 2N, 30/3 3N+1S, 5/4 1S og 12/4 1N+2S-rast (MS). Stavns Fjord, Samsø: Set ved næsten hvert besøg i tiden 3/4-23/11 (LB,AJ,JRR). Øvrige: 16/2 1 Egehoved, Alrø (AJ), 24/2 7 Alrø, 24/2 7trk. Horskær (AJ), 26/4 3trk. Kysing Næs (GF), 3/5 7 Anholt (NÅ), 10/8 1 Mørke Kær -(IL),(PN), og 10/8 1 Møllegrund, Randers Fjord-(IL),(JRR).

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*).

Megget sjælden og uregelmæssig gæst.

1 fund: 6/4 1trk. Fornæs (DOF).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*).

Fåtalig vintergæst (dec.-feb.). Ingen ynglefund rapporteret. Alle vinteriagttagelser og trækiagttagelser samt enkelte større tal nævnes.

Brabrand Sø: 1/1 10, 2/1 7, 3/1 8, 4/1 0, 12/1 4, 15/1 10, 16/1 5, 17/1 10, 19/1 6, 26/1 12, 1/2 11, 4/2 2, 6/2 8 (AJ), 8/2 1 (LPJ), 12/2 11, 13/2 7, 15/2 10, 18/2 10, 20/2 12, 22/2 10, 23/2 3, 27/2 4, 29/2 6, 1/9 43, 5/10 29, 26/11 17, 21/12 12 (AJ), 21/12 4 (NT), 25/12 11, 26/12 14 (AJ), 26/12 13 (NT) og 27/12 13 (AJ). Kysing Fjord: 6/1 5 (AJ), 27/1 21 (SS), 16/2 1, 23/2 1 (H+JE), 6/12 18 (JF), 14/12 14 (DOF), 26/12 29 og 28/12 26 (JF).

Moesgård Strand: Ialt 20 trk. i foråret, flest 29/3 6 (MS).
 Fornæs: 31/3 3, 1/4 2, 5/4 2, 6/4 1, ialt 8 trk. (DOF). Stavns
 Fjord-området, Samsø: Mindre koncentrationer end foregående år,
 under 20 individer som max. (LB). Hørskær: 8/1 1, 27/1 1 (AJ),
 16/4 4 ynglepar i nærliggende skov (LLH), 8/12 2, 14/12 2 og
 21/12 2 (LPJ). Mariager Fjord v/ Pletten: 22/6 52 og 17/8 62
 (JRK). Kolindsund: jan.-feb. og dec. 1-2 dgl. (JJP). Ørbæk: jan.
 -feb. og dec. 1-2 dgl. (JJP). Skanderborg Sø: 1/12 1 og 2/12 2
 (HHH), Mossø: 10/1 1 (JR) og 13/1 1 (??). Øvrige: 1/1 1 Hårvad-
 bro (SMJ), 6/1 1 Odder Å (AJ), 8/1 1 Søby Strand (AJ), 12/1 8
 Salten Langsø (ØBF), 19/1 3 Vosnæsgård (SS), 29/1 1 Ajstrup
 Strand (FF), 26/4 2 trk. Kysing Næs, 26/4 1 trk. Jernhatten, 26/4
 1 trk. St. Sjørup, 26/4 2 trk. Udbyhøj (GF), 4/12 2 Hattemager-
 skov v/ Hinnerup (SMJ) og 22/12 2 Kasted Mose (LLH).

Rørdrum (*Botaurus stellaris*).

Meget sjælden gæst.

2 fund: dec. 1 Brabrand Sø (medd. AJ) og 27/12 1 Kysing Fjord
 (BHJ).

Hvid Stork (*Ciconia ciconia*).

Fåtalig træk- og sommergæst (ult. marts-pr. aug.).

Et stort antal iagttagelser, hvor det synes klart, at vi kan føl-
 ge flere af fuglene på deres vej gennem Århus amt. Hvor dette er
 muligt, er disse adskilt fra de øvrige iagttagelser.

30/3 1N Moesgård Gods (iflg. Århus Stiftstidende), ca. 10/4 1rast
 Åby eng, Brabrand Sø (medd. Erling Sørensen), 13/5 2N Brabrand Sø
 (HLL, Willy Møller), 17/5 1 trk. Brabrand Sø (PH), 21/5 1 Århus
 (FC), og 13/7 2 på rede Hobro (NÅ).

Flok I: 15/5 1 Kolindbro (PN), 22/5 2 Kolind (JJP), 31/5 1 Kolind-
 bro (PN), ult. maj 3 Kolind (JJP), 20/6 1 Ryomgård By (PN) og
 ult. juni-pr. juli 3 Kolind (JJP).

Flok II: 23/6 1rast Haraldslund (SMJ) og 24/6 1S-søene N Bra-
 brand Sø (JTL).

Flok III: 3/8 5 Boes v/ Mossø (BHJ) og 4/8 5 Assedrup v/ Odder
 (iflg. Århus Stiftstidende).

Svane sp. (*Cygnus sp.*).

Mariager Fjord: 25/11 ca. 400 Pletten og 3/12 ca. 300 Ajstrup
 Bugt (MWJ).

Knopsvane (Cygnus olor).

En del større flokke er glædeligt nok indrapporteret.

Knopsvanen må nok ud fra disse tal betegnes som værende ret almindelig ved amtets fjordsystemer. For ynglefuglene er tallene jo meget beskedne, men arten må nok også her siges at være ret almindelig. Observationerne i denne rapport siger intet om vore søer og vandhuller som må formodes at rumme en pæn bestand.

Kysing Fjord: 6/1 87ad+13juv (AJ), 17/5 153, 23/6 167 (JF) og 12/10 123 (HP). Ynglefuglene talte 5 par med 6,4,3,3,2 pullus. Alt i alt et godt år for arten ved fjorden. Søby Strand: 28/12 149ad+30juv (AJ), Alrø Poller og Lerdrup Vig: 20/1 77ad+13juv, 24/2 116 ad+13juv, 9/3 169ad+16juv (AJ), 4/10 100 (MWJ), og 28/12 242ad+64 juv (AJ). Samsø, Stavns Fjord: 17/12 ca. 100 (MWJ). Samsø, Hesselholm: Ynglefugle ialt 6 par med hhv. 7(3polske),5,4,3,1,1 pul. (LB). Mariager Fjord v/Hadsund: 23/11 265 og 13/12 250 (JRR). Mariager Fjord, Ajstrup Bugt: 8/6 190, 25/10 820, 23/11 670 og 30/12 1010 (JRR). Mariager Fjord: 27/2 700, heraf 180 v/ Dania (NÅ). Randers Fjord: 9/3 309 og 22/11 92 Råby Odde, 28/9 108 Møllegrund og 14/6 227 Møllerup (JRR).

Sangsvane (Cygnus cygnus).

En hel del er indrapporteret fra mange lokaliteter.

Sangsvanens udbredelse i amtet er ud fra disse tal stærkt koncentreret omkring de nord/nordøstlige egne med meget store tal fra særligt Mariager Fjord samt ret pæne tal fra Kolind. Arten må nok betragtes som værende ret almindelig i amtet.

Brabrand Sø: 11-13/2 2ad Åby eng, 10/3 2ad, 12/3 8ad, 13/3 9ad (AJ) 13/3 8 (PH,BHJ), 14/3 8 (PH,BHJ), 15/3 9ad, 19/3 9ad (AJ), 19/3 7 ad (HLL), 20/3 8 (LPJ), 21/3 5 vestenden (NÅ), 22/3 8 (PH,BHJ), 23/3 10 (LPJ), 23/3 6 (HHH), 24/3 13ad (AJ), 25/3 5 (CP), 26/3 13 ad (NÅ,AJ), 26/3 9 (HLL), 27/3 10ad (AJ), 28/3 19ad (HLL), 30/3 9 ad overflyvende mod Ø (AJ), og sidste i foråret 2/4 1 (HLL). Efteråret og vinteren noget svagere repræsenteret. 10/11 3ad+1juv rast +3juv overflyvende, 19/11 2ad+3juv, 30/11 2ad overflyvende (AJ) samt 6/12 3ad (PM,ET). Salten Langsø: 19/1 8 (LNH), 3/2 5Ø (CP), 1/3 15 (SS), 2/3 3 (DOF), 3/3 11 (LPJ) samt en enkelt obs. fra efteråret 16/11 12 (LNH,HP). Klostermølle: 3/2 3 (DOF), Gudensø: 2/3 3 (DOF), Vissing Kloster: 3/3 12 (LPJ). Frederiks Alle, Århus: 6/12 3adNØ (HLL). Horsker: 27/3 2 (LPJ). Samsø, Hesselholm: 4/10 7 SSV (LB). Kysing Fjord: 27/1 7 (SS), 16/2 3 (JF), 4/10 14 (HHH), 5/10


1N Kysing Næs (PH,BHJ), 30/11 4 og 6/12 3 (JF). Kasted Mose: 3/3 4 (JoA,MR), Hevring: 22/2 10 og 22/10 8 (JoA,MR). Mørke Kær: 21/5 3 (PN) - meget sen forekomst -. v/ Trustrup: 31/3 2 (PN). Stubbe Sø: 10/11 (SS). Løgten Bugt, Kalø Vig: 9/12 8 (MWJ). Kolind: 5/11 17ad+4juv, 6/11 21ad+7juv, 7/11 27ad+7juv, 12/11 26ad+1juv og med. nov.-31/12 2ad (JJP). Randers Fjord, Råby Odde: 9/3 11 (JRR). Gudenåen, Randers: 14/12 40 (JRR). Mariager Fjord: 26/1 32 (BH) og 27/2 180 (NÅ) Saltværket, 12/12 5 v/ Mariager (MWJ), 3/12 2 Ajustrup Bugt (MWJ), 13/12 529 og 28/12 420 øst f. Havnø (JRR) samt 26/1 7ad+3juv (EH) og 27/2 520 (NÅ). Sødringholm, Randers Fjords udløb: 21/11 5 og 24/11 100S (MWJ).

Pibesvane (*Cygnus bewickii*).

Mange flere iagttagelser end sidste år, alle fra den sydlige del af amtet.

Pibesvanen optræder udelukkende på trækket. Alle iagttagelser falder derfor naturligt nok, om foråret fra ult. marts til pr. april og om efteråret fra fra ult. okt. til ult. nov. Arten må nok karakteriseres som værende fåtallig forekommende i amtet.

Kysing Fjord: 9/3 8ad (JF/HHH), 31/3 7ad, 3/4 2ad+3juv (JF). Efterårsiagttagelser fra fjorden. 18/10 6ad, 22/10 9ad+4juv, 24/10 6ad, 25/10 2ad+1juv og den sidste 2/11 1ad (JF). Brabrand Sø: En forårs- og en efterårsiagttagelse. 2/4 2ad (HLL) og 24/11 1ad (AJ). Moesgård: En flok. 5/4 260 (MS).



Grå gås sp. (Anser sp.).

29/3 10ØNØ Alrø (AJ), 7/4 1V Randers Fjords udløb (JRR), 27/9 1 Glenstrup Sø (JRR) og 18/12 9SV, muligvis sædgæs (AJ).

Grågås (Anser anser).

Dejligt at se hvor mange der er observeret i 1980.

Grågåsen optræder hovedsageligt i amtet forår og sommer, enkelte iagttagelser fra efteråret. Arten kan karakteriseres som værende fåtallig til ret almindelig som træk- og rastefugl. Som ynglefugl er den sjælden, måske fåtallig (Ynglefund er understreget). Vi starter i den sydlige del af amtet: Alrø: Første iagttagelse 2/3 9 (AJ,LPJ), 9/3 4rast+7trk. (AJ,LPJ), 16/3 14 (HHH,AJ,LPJ), 29/3 1 (HHH,AJ), 20/4 2 (HP), 20/7 34 (LPJ), 26/7 37 (PH,BHJ), og 27/7 50 til jægerne (LPJ). Gjerrild Nordstrand: 7/4 10 (HP). Lerdrup Vig: 2/3 5 og 9/3 2rast+2N (LPJ). Horskær: 9/3 3NØ (LPJ), 9/3 2NØ (AJ), 22/3 7+3 Splidholm (LPJ), 27/3 1 (LPJ), 29/3 2 (AJ), 3/4 2, 10/4 2 (LPJ), 13/4 3N (AJ), og 26/10 1 (LPJ). Søby Rev: 24/2 4 til overnatning på havet (AJ,LPJ), 16/4 5 og 20/6 3 (LLH). Astrup Mose: 13/4 4, 10/5 2 (AJ,LPJ), 16/5 1par med 10 pullus (LPJ) og 11/7 2 (HHH). Hov Røn: 25/7 2 (HLL). Stavns Fjord, Samsø: 25/5 6 (HHH,AJ) og 23/7 17 (JTL). Hesselholm, Samsø: 19/7 5-30, 20/7 71, 21/7 ca. 40, 22/7 58, 23/7 27, 24/7 27, 25/7 29, 28/7 12, 29/7 14, 30/7 14, 31/7 14, 1/8 6, 2/8 enkelte, 3/8 22S+8Ø, 6/8 7, og 7/8 13V (LB). Kysing Fjord: 9/3 5, 22/3 4, 29/3 12 (JF), 5/4 4 (CP), 6/4 2, 12/4 2 (JF), 12/4 4 (AJ), 12/4 2N: Kysing Næs (PH,AJ, BHJ), 27/4 2, 1/5 1, 4/5 1 (JF), 25/5 2 (PH,BHJ), 22/6 1, 13/7 11, 24/7 9 (JF), 26/7 1 (JF,GG,HP), 3/8 3 (JF) samt 29/9 1 (LPJ). Skanderborg Sø: 16/3 2 (HP), 23/3 2 (GG), 29/3 2, 7/4 2 (HP), 26/4 31 (HHH) og 19/7 14 (HHH). Mossø: 16/3 50 (CP), 30/3 2, 12/4 3 (JR) 13/4 11 Emborg Odde (HHH), 2/5 3 (JR) og 4/5 Emborg Odde (DOF). Endvidere 1 ynglepar med 8juv Emborg Odde (ØBF). Vesterrose, Skanderborg: 6/6 1par med 5pullus (HHH). Salten Langsø: 10/3 2 (LPJ) og 4/5 2 (DOF). Brabrand Sø: 21/3 2 (NÅ), 24/3 2 (AJ), 25/3 2-4 (CP), 26/3 2 (NÅ,AJ), 27/3 4 (AJ), 28/3 2 (HLL), 31/3 1 (AJ), 12/4 1V, 22/4 3ØNØ, 17/5 4N (AJ) og 30/5 1 (JR). Vrads Sande: 3/4 2, 5/4 2 og 20/4 2 (JAx). Hjelm: 15/6 32 i fældning, 16/6 32, 17/6 49, 18/6 52 og 19/6 52 (KH), Moesgård Strand: Ialt 74trk. flest 21/3 34Ø (MS). Bjerregrav Mose: 13/4 4ad, 1/5 5ad og 20/6 1ad (JRR). Udbyover Sø: 2/5 1, 7/6 1 og 10/8 6 (JRR). Enkelte obs fra nogle få lokaliteter (i spredt orden!): 2/3 3 Klosterkær enge

Mossø (DOF), 10/3 2 Vissingkloster (LPJ), 1/6 5 Lindholm Hoved,
 Mossø (DOF), 4/9 1 Kasted Mose (JAX), 16/3 18 Ryomgård Skov (PN),
 12/4 16 Stubbe Sø (JTL), 15/4 6 mose v/ Stubbe Sø (NÅ), 28/3 1
 Randers Fjord (JRR), 4/4 40 Helgenæs (JTL), 2/5 7 trk. Anholt
 (medd. ??), og til slut 13/4 1 Hevring (JoA,MR).

Sædgås (Anser fabalis fabalis).

Enkelte iagttagelser af denne art igen i år.

Sædgåsen er efter disse tal sjælden-fåtalig i amtet.

3/2 40 Brabrand Sø (CP), 2/3 4NØ Kysing Fjord (JF), 8/4 3 Hev-
 ring (JoA,MR), 28/9 13S Kysing Næs (HP) samt en enkelt iagttagel-
 se fra artens faste rastestedsplads, uden dato. 28 rastende Tjele Gods
 (JRR).

Kortnæbbet Gås (Anser fabalis brachyrhynchus).

Sædgåsens fætter er blevet observeret en enkelt gang i amtet i
 1980: 27/9 10S Kysing Næs (HP).

Knortegås (Branta bernicla).

2 former i Østjylland.

Lysbuget Knortegås (B. b. hrota).

Kun fra formens faste rastestedsplads. Lysbuget Knortegås er en stor
 sjældenhed udenfor Mariager og Randers Fjorde, hvor den tilgæn-
 gæld er ret almindelig.

13/12 2107 og 28/12 22 Mariager Fjord v/ Pletten (JRR).

Mørkbuget Knortegås (B. b. bernicla).

Flere ret store flokke observeret. Mørkbuget Knortegås er ret
 almindelig ved det meste af amtets kyster, særligt i efteråret.
 Horskær: 5/3 2 (AJ) og 3/4 1 (LPJ). Kysing Næs: 12/4 1 (PH,AJ,
 BHJ), 5/10 1 (PH,BHJ) og 18/10 7S+28 (BHJ). Kysing Fjord: 16/5
 200NØ og 23/11 1 - temmelig sen - (JF). Mossø: 16/5 ca. 190-200Ø
 (LPJ). Mon ikke det skulle være de samme som dem fra Kysing Fjord
 tidspunktet passer fint til det. Vrold,Skanderborg: 19/5 200SØ
 (GG). Samsø: 5/4 150 Grønhoved, 7/4 210 mellem Hesselholm og Lang-
 ør Kirke, 3/5 85 Grønhoved, 21/9 2ad+2juv og 4/10 1 Issehoved (LB)
 Randers Fjord: 28/9 17 (JRR).

Knortegås (ikke bestemt til form).

Randers Fjord: 25/10 26S og 14/12 180 (JRR). Desuden 31/5 3N -
 formodede Knortegæs - Brabrand Sø (AJ).

Bramgås (*Branta leucopsis*).

Igen i år en enkelt iagttagelse og endda af oversomrende fugle.
17-19/6 2rast i flok med Grågås (KH).

Kanadagås (*Branta canadensis*).

Ses nu årligt i amtet. Disse, vor fauna tilførte fugle må heldigvis endnu betragtes som værende sjælden-fåtalig i amtet.

16/2 17N Kysing Fjord (H+JE), 22/2 4 Hevring (JoA,MR), 15/3 10 Egens Vig (JoA,MR), 28/3 9 Brabrand Sø (HLL), 1/5 1 Salten Langsø (DOF) samt 25/12 10 Fussing Sø.

Gravand (*Tadorna tadorna*).

Talrig art på de fleste lokaliteter i amtet.

Gravanden er ligesom Knopsvanen stærkest knyttet til vore kyster i trækperioden, arten er ret almindelig-almindelig, i hvertfald i forårs-, efterårs- og til dels vinterperioden.

Kysing Fjord: 16/2 2 (H+JE), 23/2 10 (H+JE), 2/3 58 (JF), 16/3 45 (JF), 9/4 100 (NÅ), 20/4 101 (JF), 23/8 25juv (JF), 11/10 7 (HP), og 23/11 5 (JF). Ynglefuglene ved fjorden talte 4 par med ialt 25 pullus. Alrø Poller/Lerdrup Vig: 16/2 23, 24/2 82 (AJ), 24/2 92 (LPJ), 1/3 90 (HP), 2/3 190, 9/3 203+44 på Alrø iøvrigt (AJ), 23/3 40, 20/4 20 (HP) samt en vinteriagttagelse herfra, hvad der ikke er så sjældent, 28/12 50 (AJ). Horskær: 27/1 4N, 16/2 2 (AJ), 24/2 7 (AJ,LPJ). Årets første fugle er fra denne lokalitet, den 27/1. Stavns Fjord,Samsø: 16/12 200 Brokold (LB), april-maj 60-100 Hesselholm. Ynglefugle ved Hesselholm; 2-3par med en samlet ungeproduktion på 29-42pullus. Brabrand Sø: 8/3 7 (HHH), 21/3 3 vestenden (NÅ), 26/3 13 (NÅ), samt to for søen meget sene og ret sjældne vinterfund; 21/12 1 (AJ) og 23/12 1 (HLL). 1 ynglepar. Randers Fjords udløb: 9/3 260, 7/4 50, 2/5 50, 21/6 144, 16/8 70, 28/9 608 og 25/10 781 (JRR), nogle virkelig store tal fra sept./okt. Råby Odde,Randers Fjord: 9/3 87 og 7/4 26 (JRR). Kare Holm,Randers Fjord: 26/4 74 (EH,JRR). Ajstrup Bugt,Mariager Fjord: 8/6 64, 17/8 105, 25/10 1030, og 30/12 293 (JRR), her er okt. og dec. to fine mdr. Mariager Fjord v/ Pletten: 13/12 295 (JRR). Sødriholm: 21/11 200 og 24/11 20 (MWJ). Glenstrup Sø: 3/5 59 (JRR). Herefter nogle lokaliteter spredt rundt i amtet med enkelte iagttagelser: 27/2 8 Hadsund (NÅ), 2/3 2 Gudensø (DOF), 29/3 8 Hattemagerskov (SMJ), 1/4 2 Kolind (JJP), 15/4 17 Ramten-Dystrup Søer (NÅ), 29/4 10 Kalø (JJP), 11/5 12 Kalø (JJP), samt 7/6 50 Søbygård Sø (JTL).

Gråand (*Anas platyrhynchos*).

Arten er jo som bekendt konstant på selv de mindste lokaliteter med lidt vand. Derfor kun større koncentrationer nævnt.

Gråanden optræder som regel i større koncentrationer forår, efterår og vinter, dog kan større flokke observeres i sommermånederne. Det drejer sig da som regel om hanner i fældning. Gråandens statur må nok sige at være almindelig i hele amtet.

Kysing Fjord: 6/1 760 (AJ), 2/2 800 (JF), 16/3 850 (HP), 23/8 750 (HP), 20/9 600 (PM,ET), 11/10 1000 (HP), 16/11 790 og 28/12 1110 (JF). Brabrand Sø: 2/2 ca. 140 (PM,ET), og 27/3 389 (AJ). Skanderborg Sø: 31/10 500, 9/11 610 og 1/12 500 (HHH). Nogle større flokke fra lokaliteter med få iagttagelser: 9/3 330 Randers Fjords udløb (JRR), 29/3 457 Alrø (AJ), 9/11 1200 Salten Langsø (HP) og 25/12 2730 Fussing Sø (JRR).



Krikand (*Anas crecca*).

Ligesom Gråand er denne art repræsenteret ved selv de mindste vandhuller og materialet er så stort at det ikke vil være muligt at offentliggøre det hele, derfor vil vinteriagttagelser og større tal kun blive nævnt.

Ret almindelig trækgæst i amtet. Meget sjælden-sjælden ynglefugl, som regel oversommende individer.

Kysing Fjord: 12/1 25 (JF), 26/1 8 (HEt), 27/1 25-30 (SS), 28/1 15 (CP), 29/1 1par (FF), 2/2 14 (JF), 26/12 38 (JF) og 28/12 5 (H+JE). Ret normalt for vinteren, herefter større tal fra fjorden 30/3 89, 5/4 157 (JF), 23/8 225, 6/9 200 (HP), 11/10 200 (JF,HP), 8/11 171 (JF) ligeledes ret normalt for trækperioden. Brabrand sø: 15/1 1han (AJ), 2/2 1 (PM,ET), 12/2 1han (AJ,HLL), 31/3 78 og 29/4 77 (AJ). Af vinterobs. kan endvidere nævnes 4/12 3 Kasted Mose (LLH). Størr tal fra amtet: 13/4 44 Bjerregrav Mose (JRR), 18/4 38 Horskær (AJ)/ 27/4 80 Alhale,Alrø (KB), 2/5 103 Råby Odde,Randers Fjord (JRR), 21/6 88 Råby Odde,Randers Fjord (JRR), 31/10 110 Skanderborg Sø (HHH), og 9/11 100 Salten Langsø (HP).

Atlingand (*Anas querquedula*).

Udpræget mose og vandhulsart, kun få iagttagelser.

Atlinganden er sjælden-fåtalig i amtet, hvor den optræder meget konstant f.eks. ved Brabrand Sø.

Brabrand Sø: 11/4 2han+1hun (AJ,JR), 12/4 2han+1hun, 15/4 1han+1hun, 16/4 2han+1hun, 21/4 1han (AJ), 22/4 2 (PM,ET), 29/4 1 (AJ,PM,JR,ET), 2/6 3 (JR) og 29/7 1 (PH,BHJ). Udover Brabrand sø i foråret er arten konstanteret på følgende lokaliteter: 13/4 1par Astrup Mose (AJ), 18/4 1par Horskær (AJ,JR), 1/5 og 15/5 1 Kolindbro (PN,JJP), 3/5 2 Flakket,Anholt (NÅ) og 24/5 2han+1hun Møgelmosen,Samsø (HHH,AJ). I efteråret to iagttagelser, som sandsynligvis er den samme fugl, 6/9 og 14/9 1 Kysing Fjord (DOF,GG,HP).

Knarand (*Anas strepera*).

En del iagttagelser af denne ret nye art i den danske fauna.

Knaranden er meget sjælden som trækgæst og på det nærmeste helt usandsynlig som ynglefugl her i amtet.

Kysing Fjord: 1/5 1par (JF), 7/8 1hun (JF), 11/10 1han (HP) og 19/10 1 (JF,PH,BHJ) samt en enkelt 27/8 1hun Kare Holm (EH).

Pibeand (*Anas penelope*).

Større koncentrationer af denne art, hovedsagelig fra vore fjorde. Først vinteriagttagelserne, dernæst fugle set i større koncentrationer.

Arten er som sagt nært knyttet til fjordene i amtet, der er kun søerne omkring Skanderborg der har nogle lidt store tal. Arten må nok karakteriseres som værende almindelig.

Kysing Fjord: Mange iagttagelser fra vintermdr. 11/1 45 (JF), 13/1 10 (H+JE), 15/1 30 (HLL), 17/1 17 (PM,ET), 26/1 5 (PM,ET,HEt), 27/1 1 (SS), 28/1 10 (CP), 29/1 8 (FF), 16/2 (PM,ET), 23/2 2 (H+JE), 24/2 3 (JF), 6/12 119 (JF), 28/12 30 (H+JE) og sluttelig 30/12 12 (LPJ). Herefter max.-tal for de øvrige måneder. 29/3 135 12/4 171, 1/5 78 (JF,CP), en del iagttagelser fra sommermånederne hvilket er bemærkelsesværdigt. 22/6 1 (JF), 6/7 2 (AJ), 13/7 1, 19/7 5, 24/8 52 (JF), 28/9 1900! (LPJ), 4/10 1500! (HHH) og til sidst 8/11 402 (JF). Råby Odde, Randers Fjord: 7/4 304, og 2/5 77 (JRR). Randers Fjord v/ Møllegrund: 28/9 64 (JRR). Randers Fjords udløb: 7/4 270 og 28/9 88 (JRR). Hesselholm, Samsø 20/9 205 (LB). Ajstrup Bugt, Mariager Fjord: 25/10 840 (JRR). Alrø: 29/3 69 (AJ) samt en sommeriagttagelse 12/6 3 (FC). Brabrand Sø: I perioden fra 2/1-29/2 blev der observeret 1han+1hun (dog kun 3/1-15/1) (AJ,HLL). Endvidere op til 15 i perioden fra 1/3-7/4 (AJ,m.fl.) Skanderborg Sø: 30/5 1han og 9/11 54 (HHH). Salten Langsø: 2/11 50 (GG,HP). Endvidere: 16/3 8 Søby Rev (LPJ), 3/4 6 Horskær (LPJ) 17/8 1 Astrup Mose (LPJ) 5/4 3 Hattemager Skov (SMJ) og 27/9 2 Glenstrup Sø (JRR).

Spidsand (*Anas acuta*).

Ret så mange observationer af arten i amtet.

Spidsanden er fåtallig i hele Århus amt.

Kysing Fjord: To vinterobs. 19/1 og 20/1 1par (JF) samt 28/1 1 par (CP). De første forårsiagttagelser stammer fra 9/3 1par (JF), 29/3 2par, og 13/4 2par (JF). Efteråret startede i juli, 27/7 2 (AJ), 9/8 2, 24/8 9, 11/9 12, 11/10 56, 2/11 36 og sidste obs. 23/11 8 (JF). Kysing Næs: 13/9 26S (HP). Alrø: 2/3 3 (LPJ), 27/3 1par (LPJ), 29/3 4par (HHH,AJ). Brabrand Sø: 10/4 1hun (HLL) og 23/11 1 (JR). Randers Fjord, Råby Odde: 9/3 22 (JRR). Endvidere: 20/9 og 21/9 4 Hesselholm, Samsø (LB), 20/4 6 Horskær (LPJ) og 19/9 Grenå (PH,BHJ).

Skeand (*Anas clypeata*).

I forhold til mange af de andre andearter forholdsvis få oplysninger:

Arten er pænt fordelt over hele amtet, hvor den vel nærmest efter de foreliggende oplysninger (tal) må karakteriseres som værende fåtallig.

Kysing Fjord: 15/3 1han, 31/3 5 (JF), 5/4 6 (LPJ,CP), 14/5 3han (CP), 22/6 1han (JF), 27/7 30 (AJ), 23/8 45 (GG,HP), 6/9 65 (GG,HP), 25/10 77 og 2/11 42 (JF). Brabrand Sø: 12/4 2par+1 (AJ), 17/4 4par (PM,JR,ET), 21/4 1 (SBN), 29/4 1han (LPJ), 20/6 1 (PH, BHJ), 23/7 7, 14/8 5 (AJ) og 2/9 1 (PM,ET). Sorte Sø, Skanderborg: 8/4 6han+3hun, 12/4 5han+3hun, 20/6 og 24/6 3han+1hun (HHH). Endvidere er Skeanden observeret: 23/5 1par Bjerregrav Mose, 7/6 1 par Udbyover Sø (JRR), 15/4 1par Tåstrup Mose (AJ), 1/5 1par Astrup Mose (HHH), 26/5 1par Ramten-Dystrup Søer (LPJ), 14/4-17/4 1par Hattemager Skov (SMJ), 1/5-8/5 2 Kolind (PN,JJP) og til sidst 20/7 1hun Horsker (LPJ).

Rødhovedet And (*Netta rufina*).

Mose v/ Thorsager: 1par, sandsynligvis fangenskabsfugle da de var meget lidt sky (JTL). Arten er meget sjælden i amtet.

Taffeland (*Aythya ferina*).

Denne art er temmelig dårligt repræsenteret i forhold til mange af de andre ret almindelige arter.

Arten må betegnes som værende fåtallig i amtet med undtagelse af Kysing Fjord hvor den er ret almindelig.

Kysing Fjord: 20/1 125 (JF), 16/2 ca. 40 (PM,ET), 24/2 62, 15/3 151, 3/4 61, 23/6 15, 13/7 6, 15/8 33, 11/9 138, 18/9 182 (JF), 11/10 400 (JF,GC,HP), 2/11 176, 8/11 414, 6/12 221 og 26/12 347 (JF). Et ret normalt år for arten. Brabrand Sø: max. for søen 19/3+26/3 13 (AJ), hvilket var under normalen. Der belv endvidere observeret Taffeland: 27/1 30 Århus Havn (NÅ), 4/2 21 Århus Havn (NÅ), 27/2 25 Dania, Mariager Fjord (NÅ), 1/3 50 Alrø (HP), 29/3 7 Gudenåen v/ Randers (JRR), 4/4 3 Kolind (JJP), 15/4 12 (NÅ) og 17/4 13 (HP) ved Ramten-Dystrup Søer, 29/4 3 Mose syd f. Auning (EH,JRR), 7/6 7 Udbyover Sø (JRR), samt sidste 14/12 3 Gudenåen v/ Randers (JRR).

Troldand (*Anthya fuligula*).

Denne art er også kun indrapporteret i ret minimale tal og kun fra få men helt sikre lokaliteter.

Troldanden er ret almindelig for amtet, dog fåtallig som oversomrende.

Kysing Fjord: 17/1 350 (PM,ET), 26/1 300 (HEt,PM,ET), 2/2 375, 23/3 431, 3/4 254, 1/5 16 samt oversomrende i de tre sommerdr. 23/6 24, 13/7 38, 7/8 10, 6/9 2, 18/9 4 (JF), 11/10 61 (JF,GG,HP), 2/11 34, 8/11 258, 23/11 294, 6/12 343 og 26/12 460 (JF). 1980 må nok betragtes som værende under middel for fjordens vedkommende. Brabrand Sø: Max.-tal for foråret 26/3 118 og vinteren 26/12 40 (AJ), hvilket nok må betragtes som værende normalt for denne lokalitet. Århus Havn: 27/1 290, 4/2 655 og 14/12 24 (NÅ). Ret pænt antal den 4/2. Udover disse lokaliteter er arten observeret på en række andre lokaliteter: 10/3 25 Gudenaen v/ Randers (JRR), 6/4 20 Tranemosen, Samsø (LB), 11/4 2 Kolind (JJP), 7/4 8 og 15/4 25 Ramten-Dystrup Søer (HP og NÅ), 2/5 18han+10hun Udbyover Sø (JRR), 27/5 rede med 11 æg Emborg Odde, Mossø (ØBF) og 25/12 251 Fussing Sø (JRR). Fire iagttagelser af oversomrende individer: 7/6 30-40 Søbygård Sø (JTL), 7/6 5 Søbyvad Mølle (JTL), 16/6 5han Fussing Sø (JRR) og 22/7 2 v/ Fuglsø (HEt).

Bjergand (*Aythya marila*).

En maritim art med få observationer.

Arten må nok siges at være meget overset, den er særlig på havet ud for amtet ret almindelig.

Kysing Fjord: 20/1 1han (KB), 16/2 3 (H+JE), 23/2 1 (H+JE), 14/12 1hun og 26/12 1hun (JF). Alrø: 24/2 375 (LPJ), 340 (AJ), 1/3 70 (HP), 2/3 197 (LPJ), 206 (AJ), 27/3 1han (LPJ) samt fra: 9/2 3 Skæring Strand (SS), 16/2 1 Horskær (AJ,LPJ), 24/2 1hun v/ Søby Fredskov (AJ,LPJ), 24/2 350-400 Århus Havn (SS) og til slut to indlandsiagttagelser, dog fra den samme lokalitet: 2/11 40 (LNH) og 10/11 25-30 (SS) Stubbe Sø.

Hvinand (*Bucephala clangula*).

Ret godt med ret fine tal fra amtet i år.

De store tal fra Mariager Fjord og Alrø gør, at arten må betragtes som værende almindelig i amtet, men på de øvrige lokaliteter er den kun ret almindelig og direkte sjælden som sommergæst.

Kysing Fjord: 26/1 30 (HEt,PM,ET), 24/2 80, 23/3 103, 5/4 57 (JF)

i sommermdr. fire obs. 13/7 1, 20/7 5 (JF), 26/7 + (HP) og 7/8 2 (JF), derefter først 11/10 8, 12/10 22, 8/11 53 og 14/12 32 (JF). Randers Fjord: 9/3 290 Råby Odde, 7/4 83 og 22/11 13 Møllegrund, 25/10 27 udløbet (JRR). Ajstrup Bugt, Mariager Fjord: 23/11 150 og 30/12 1030 (JRR). Mariager Fjord v/ Pletten: 28/12 48 (JRR). Alrø: 20/1 500-600, 16/2 ca. 540, 24/2 835 (AJ), 1/3 200 (HP), 9/3 490 (AJ), 23/3 50 og 20/4 5 (HP), også meget store tal herfra. Øvrige kystobservationer: 26/2 60 Skæring Strand (JTL), 4-5/4 25 Hesselholm, Samsø (LB), 18/5 1han+4hun Begtrup Røn (LNH), 7/7 2 Anholt, Flakket (MSL). En del indlandsobservationer, ud fra hvilket man må formode dette er normalt for arten. Brabrand Sø: 21/3 20, 26/3 2 (NÅ), 30/3 5 (NÅ), 10han+7hun (AJ), 1/5 1hun og 26/10 9 (HLL) samt enkelte iagttagelser fra den 5/4 1han Gudenaen v/ Ulstrup (SBN), 15/4 2 Stubbe Sø (NÅ) og 26/10 26 Mossø (HHH).

Havlit (*Clangula hyemalis*).

Få iagttagelser fra amtet. Ud fra disse tal må Havlitten betragtes som værende meget sjælden.

5/1 1hanN Horskær (LPJ), 8/1 1hanN Horskær og 24/2 1han oliedød Splidholm (AJ, LPJ).

Fløjlsand (*Melanitta fusca*).

Ligeledes få iagttagelser af denne art, hvoraf de to repræsenterer indlandsiagttagelser.

Arten opholder sig ret langt til havs og derfor nok meget overset, ud fra tallene er arten meget sjælden.

9/3 2rast Moesgård Strand (HHH), 19/3 1han De tre Broer, Brabrand Sø (AJ) og 19/3 3han Kysing Fjord (JF).

Sortand (*Melanitta nigra*).

Få iagttagelser der formodentlig ikke er repræsentative for arten i amtet. Ligeledes en fugl der går ret langt til havs, derfor overset. Artens status ud fra tallene er meget sjælden.

20/1 2han+2hun Kysing Næs (KB), 26/1 1han Norsminde Havn (HEt, JF), 9/3 7S Moesgård Strand (HHH), 9/3 3rast+ldød Kysing Næs (HHH), 29/3 1 Alrø (HHH) og 25/10 7 Issehoved, Samsø (LB).

Ederfugl (*Somateria mollissima*).

Kun to iagttagelser foreligger. Ederfuglen er almindelig i amtet, hvad de to tal jo også siger.

23/3 800 Alrø (HP) og 17/6 2000 Hjelm (KH).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*).

Helt kolosal mange iagttagelser af arten fra en del lokaliteter. Brabrand Sø med langt de fleste iagttagelser fra amtet. Alle iagttagelser nævnes.

Brabrand Sø: 1/1 35, 2/1 36, 3/1 29, 4/1 11, 12/1 10, 15/1 45, 16/1 14, 17/1 32, 19/1 20, 26/1 22, 29/1 22, 1/2 22, 2/2 7, 4/2 17, 6/2 31, 12/2 32, 13/2 24, 15/2 25, 16/2 18, 18/2 13, 20/2 31, 22/2 41, 23/2 44, 24/2 10, 27/2 36, 28/2 46, 1/3 57, 3/3 27, 4/3 28, 5/3 38, 6/3 37, 8/3 55, 9/3 40, 10/3 34, 12/3 47, 13/3 38, 15/3 55, 16/3 25, 19/3 44, 20/3 39, 21/3 33, 22/3 20, 23/3 12, 24/3 47, 25/3 50, 27/3 50, 28/3 68, 29/3 67, 30/3 31, 31/1 48, 3/4 16, 8/4 16, 9/4 8, 10/4 17, 11/4 4, 15/4 3, 16/4 4, 17/4 7, 18/4 5, 22/4 1, 1/5 1, 9/11 2, 10/11 12, 26/11 13, 29/11 14, 30/11 6, 6/12 7, 7/12 8, 21/12 18, 25/12 2, 26/12 4 og 27/12 3 (LAB, H+JE, PH, HHH, AJ, LPJ, JTL, HLL, PM, SBN, CP, JR, ET, NÅ).

Et nogenlunde repræsentativt materiale fra Kysing Fjord, hvor arten som sædvanlig ikke er særlig talstærk repræsenteret med følgende:

6/1 14, 12/1 23, 13/1 10, 17/1 13, 26/1 10, 27/1 11, 28/1 7, 29/1 10, 16/2 19, 23/2 3, 3/3 10, 9/3 5, 16/3 27, 23/3 20, 26/3 30, 3/4 20, 4/4 20, 5/4 20, 12/4 8, 26/4 20, 1/5 7, 8/10 1, 30/11 2, 14/12 2, 23/12 3, 26/12 6, 28/12 5 og 30/12 3 (H+JE, HET, JF, FF, PH, HHH, AJ, LPJ, BHJ, PM, CP, HP, SS, ET).

Alrø og Lerdrup Vig, et ret umuligt materiale, da forvirringen har været ret stor. Nogle har taget Alrø for sig og Lerdrup Vig for sig medens andre har opgivet et samlet antal for begge lokaliteter.

Her vil begge blive behandlet under et. Det lader til, at lokaliteten er ret god for arten, meget store tal specielt fra marts:

20/1 14, 27/1 6, 16/2 49, 24/2 59, 1/3 150, 2/3 131, 5/3 313, 9/3 188, 16/3 71, 23/3 50, 27/3 54, 29/3 9 og 18/4 1 (AJ, LPJ, HP, JR).

Fra Horskær enkelte iagttagelser af denne art, dog en enkelt større observation: 5/1 1, 8/1 2 + 3N, 20/1 6, 27/1 3, 16/2 45 og 20/4 2 (AJ, LPJ).

Mariager Fjord: 25/2 15 (LPJ), 27/2 18 Dania + 2 Hadsund (NÅ), 13/12 7 Pletten + 32 Als Odde (JRR) og 28/12 2 Pletten (JRR).

Gudenå v./ Randers: 2/1 16, 10/3 7, 29/3 14, 14/12 1 og 31/12 2 (JRR).

Salten Langsø: 19/1 2, 2/3 4, 3/3 4, 10/3 10, 2/11 25, 8/11 52, 9/11 27, 16/11 60, 19/11 3 og 26/12 15 (LNH, HHH, LPJ, HP).

En del enkeltiagttagelser fra sæsonen udeladt.

Arten må betegnes som værende ret almindelig i amtet. Vil kunne ses de fleste steder med åbent vand i mdr. okt.-april.

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*).

Artens faste overvintringsplads i amtet, Kysing Fjord tegner sig stadig for hovedparten af iagttagelserne.

Arten er fåtallig i amtet.

Kysing Fjord: 13/1 1hun (DOF), 8 (H+JE), 17/1 10 (PM,ET), 20/1 9 (JF), 26/1 6 (PM,ET), 28/1 5 (CP), 2/2 11 (JF), 16/2 5 (H+JE), 23/2 2 (H+JE), 3/3 11 (CP), 16/3 17 (HP), 23/3 16 (H+JE), 20 (JF) 5/4 3 (LPJ), 6/4 4 (JF). De første i efteråret 26/10 1hun (JF,PH, BHJ), 2/11 4, 6/12 6, 14/12 10, 26/12 11, 28/12 1hun (JF) og 30/12 4 (LPJ). Et helt normalt år for arten. Brabrand Sø: I perioden 21-27/3 1hun (NÅ,AJ,HLL,CP). Endvidere er arten set: 5/1 1 hun Rye Møllersø (HHH), 9/2 1 Studstrupværket (SS) og 10/3 1 Salten Langsø (LPJ).

Kongeørn (*Aquila chrysaëtus*).

Meget sjælden trækfugl.

1/4 2 Gjerrild (DOF).

Se appendix II og III.

Musvåge (*Buteo buteo*).

Ret almindelig trækfugl om foråret, hvor langt den overvejende del af iagttagelserne er gjort. Fåtalig sommer, efterår og vinter.

Over 3000 iagttagelser med Moesgård og Gjerrild som bedste lokaliteter. Alle indrapporterede obs. nævnes.

Brabrand Sø: 20/3 8N, 28/3 11N, 11/5 6NØ (HLL), 31/8 2S og 1/9 1 (LLH). Hesselholm,Samsø: 4/4 2, 2/8 1, 5/8 1, 4/10 1, 5/10 3S, 22/11 1SV+1, og 23/11 1 (LB). Samsø iøvrigt: 4/4 1, 6/4 3N, 5/8 2V, 4/10 2 og 5/10 10+7S (LB). Alrø: 16/2 1N (AJ), 1/3 1N (HP), 9/3 1NØ (AJ,LPJ) og 29/3 7N+1VNV (AJ). Risskov,Århus: 28/3 6N (AJ) og 13/4 1N (LNH). Moesgård Strand: 29/3 480trk., max.-dag. Ialt 912 trk. i perioden 29/2-11/5 (MS). Enkelte ynglende i skovene (MS). Gjerrild: 22/3 20F-NØ-retur+40kresende (EH), 324trk. (GF), 31/3 276, 1/4 400, 2/4 53, 3/4 44, 4/4 414 (DOF), 15trk. (JoA,MR), 5/4 182, 6/4 49 (DOF), 7/4 10NØ+6rast (??), 15/4 7trk. (NÅ), og 26/4 17trk. (GF). Anholt: 1-8/5 210trk. (6/5 145), 3 østlig race? (NÅ). Kasted Mose: 24/9-22/12 1-2 set jævnligt (LLH) Kvottrup: 6/12 1 og 30/12 2 (LLH), Kysing Fjord: 23/3 1 (LLH). Lisbjerg Skov: 25/10 2S (LLH). Sondrup Plantage: 26/7 1 (LLH). Sondrup Bakker: 23/3 9N+6rast og 20/4 1N+4rast (HP). Lyngballe-

gård Skov 3/3 5-6N (JoA,MR). Udbyhøj: 22/3 2trk., 12/4 1N og 26/4 1Ø (EH,JRR). Jernhatten,Mols: 22/3 27trk., 12/4 3trk., og 26/4 3trk. (Gf). Allestrup Gård Plantage: 10/3 3N (JRR), Bjerregrav Mose: 13/4 3rast (JRR). Skanderborg: 29/3 2NØ (HP), og Vejlbjby:14/5 + (LNH).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*).

Fåtalig træk- og vinterfugl med max. i april og okt./nov. Dette kan delvis skyldes øget ornithologisk aktivitet p.g.a. påske og efterårsferie. Alle iagttagelser er træk- og vintergæster.

jan.	feb.	mar.	apr.	maj.	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
5-1	3-1	1-5	22-5	5-0	0-0	0-1	0-0	0-2	5-8	6-0	2-0

Fordelig pr. $\frac{1}{2}$ mdr. året igennem. (Alle iagttagelser nævnes).
 Moesgård Strand: 8/2 1 (SS), 20/3 1, 29/3 1N og 12/4 1N (MS).
 Storskoven v/ Odder: 2/3 2 og 26/10 3 (SS). Vilhelmsborg: 4/10 1 (BHJ) og 12/10 1 (PH,BHJ). Dolmer: 11/4 1 og 13/4 1(JJP). Hesselholm,Samsø: 3/4 1, 24-25/10 1 (LB). Gjerrild-Fornæs: 1/4 3, 2/4 1, 3/4 2, 4/4 2 og 5/4 1, alle trk. (DOF). Kasted Mose: 24/9 1, 27/9 1, 11/10 2, 13/10 2, 21/10 1, 26/10 1, 1/2 1 og 5/2 1 (LLH). Anholt: 3/5 2 og 6/5 2 (NÅ). Kysing Fjord: 31/3 1, 3/5 1, 20/10 1 (JF), 1/11 1 (HLL), 2/11 1 og 8/11 1 (JF). Vrads Enge: 23/3 2, 3/4 3, 6/4 1, 20/4 2 (JAX). Øvrige (i tlf. orden): 3/12 1 Ajstrup Bugt,Mariager Fjord (MWJ), 1/1 1 Hørret (BHJ), 12/1 1 Tåstrup Mose (BHJ), 13/4 1 Fornæs (JJP), 6/4 1 Brattingsborg, Samsø (LB), 4/10 1 Kragemosen,Samsø (LB), 5/1 1 Dejret,Mols (PM, ET), 12/1 1 Århus Å (PM,ET), 17/1 1 Fløjstrup (PM,ET), 22/4 1 Kolindbro (PN), 12/10 1 Stubbe Sø (PN), 4/11 1 Fårup V/ Thorsager (PN), 4/1 1 Stubbe Sø (LNH), 11/4 1 Skørring Overskov (JTL), 20/4 1 Sondrup Bakker (HP), 22/4 1 Kolindbro (PN), 12/4 1trk. Udby v/ Randers Fjord (JRR), 29/7 1? Sondrup Plantage (LLH), 16/3 1 Nørreris (SMJ), 12/4 1 Storesand,Udby (EH), 9/11 1 Åkær Enge (LNH), 8/12 1 Korsker (LPJ), 5/1 1 Emborg,Mossø (DOF) og 3/4 2 Vrads Sande (JAX).

Rød Glente (*Milvus milvus*).

I alt 10 individer på forårstræk i perioden 16/3-4/5. Er nede på et normalt niveau efter 1979 med 22 iagttagelser.

Sjælden trækgæst om foråret.

Moesgård Strand: 16/3 1, 29/3 2 og 12/4 1, alle trk. (MS).
 Øvrige: 23/3 1 Lading (SS), 13/4 1 Fornæs (JJP), 23/4 2 Åbyhøj
 (HEt), 3/5 1 Anholt (NÅ) og 4/5 1 Kysing Fjord (??).

Sort Glente (*Milvus migrans*).

Meget sjælden trækgæst om foråret.

3/5 1 Anholt (Keld Henriksen) og 24/5 kl. 15.00-15.05 1 Thors-
 ager Mose (JTL).

Havørn (*Haliaeetus albicilla*).

Meget sjælden trækgæst.

2/11 1 imm. Salten Langsø (HP) og 3/11 1 Voer Mølle (Karsten
 Bjørnkær).

Hvepsevåge (*Pernis apivorus*).

120 iagttagelser, hvilket trods svigt ved Moesgård, er 4 gange
 så mange som i 1979.

Fåtalig-ret almindelig trækgæst i maj-juni. Øvrige mdr. meget
 sjælden-sjælden.

Moesgård Strand: 11/5 1N, 31/5 6N+2V+3rast (MS). Manglende dæk-
 ning ult. maj/pr.-med. juni. Brabrand Sø: 7/5 2, 13/5 2, 22/5
 55NNØ!, 27/5 2NNØ (HLL), 28/5 2, 30/5 1 (JR), 3/6 1 (HLL), 22/6
 1NØ (PH) og 10/9 1 (HLL). Hesselholm, Samsø: 24/5 4N (LB), 26/5
 1V (LB, HHH, AJ), 28/7 1, 31/7 1SØ og 1/8 1S (LB). Anholt: 5/5 1NØ
 og 6/5 1 (NÅ). Øvrige (i tlf. orden): 24/5 1SV Mårslet (BHJ),
 25/8 1SØ Vilhelmsborg (BHJ), 3/7 1NØ Søndervangen, Viby (PH), 13/7
 1N Finds Mølle (PH, BHJ), 6/6 1 Nørreris (SMJ), 7/6 1 Hattemager
 Skov (SMJ), 13/8 1 Nørringuhre (SMJ), 13/8 2 Fårup v/ Thorsager
 (PN), 28/5 1N Århus N ((FM, ET), 29/5 2NV Schleppegrellsgade,
 Århus (HLL), 14/6 3 Åkjær Skove (LPJ), 6/9 1NØ Hassensør (LPJ),
 6/7 1 Kysing Fjord (AJ), 23/8 1 Øksenmølle Å (AJ), 24/8 2S Alrø
 (DOF), 13/5 1N Botanisk Have (NÅ), 4/7 3 Pøt Mølle (JoA, MR),
 15/5 4 nær Odder (SS), 18/9 1 Vejlbj Nord (SS) og 26/4 1! Gjer-
 rild (GF).

Rørhøg (*Circus aeruginosus*).

Ca. 140 iagttagelser hvoraf adskillige er af samme fugl. Bedøm-
 mes til fåtalig-ret almindelig om foråret og fåtalig om somme-
 ren. Der er langt flere iagttagelser end i 1979.

Ynglefugle er ladet ude af betragtning, da specialartikel i Sørav-

nen påtænkes til efteråret. Alle indrapporterede obs. nævnes.

Brabrand Sø: 13/4 1par, 15-16/4 1par, 17/4 1han, 21/4 1han, 22/4 1par vestenden; 1par i leg Døde Å; 1 ad han + 1 sudad han, begge i parringsflugt i vestenden, 29/4 1par; 2han, 30/4 1par, 1/5 1 ad han SV Døde Å + 1han, 5/5 5, 7/5 2, 8/5 1par, 9/5 1han, 10-11/5 1 par, 12/5 1hun, 13/5 4, 14/5 2, 15/5 1han, 16/5 2han+1hun, 19/5 1han, 22/5 2, 27/5 1han, 1/6 1 ad han+1 juv han, 3/6 2, 6/6 1han, 9/6 1par, 19/6 1han, 5/7 1han+1hun+1hun/juv, 7/7 1juv han, 13/7 1hun, 23/7 1, 25/7 1, 9/8 1han, 11/8 1han+1juv, 12/8 1par med 1 juv, 15/8 1han+1juv, 16/8 1hun, 19/8 1+1han+1juv, 24/8 1han+1juv, 27/8 1hun, 1/9 3 og 4/9 1 (HHH,AJ,HLL,JTL,PM,SBN,HP,ET).

Kysing Fjord: 5/4 1; 1juv hun, 13/4 1, 22/6 1, 23/6 1, 6/9 1juv, og 14/9 1 (DOF,JF,HP).

Bjerregrav Mose: 10/5 2han+2hun, 19/5 2han+1hun, 4/6 1han og 20/6 1han (GG,EH,HP,JRR).

Skaføgård: 16/5 1han og 6/7 1han+1hun (JoA,MR).

Sortesø, Skanderborg: 8/4 1han, 10/5 1par og 24/6 1han (HHH).

Hesselholm, Samsø: 23-24/7 1, 28/7 1, 7/8 1 og 7/9 1 (LB).

Tranemosen, Samsø: juli 1hun (JTL), 13/7 1han (LPJ), 2/8 1han, 5/8 1han, 6/8 1 og 23/8 1 (LB).

Stavns Fjord, Samsø: 25/5 1juv hun (HHH,AJ), 17/6 1han (JRR) og dgl. i juli 1par+1juv Besser (JTL).

Kragemosen, Samsø: 24/5 1han (HHH,AJ) og 23/8 2 (LB).

Skanderborg Sø: 30/5 1han og 25/6 1par (HHH).

Fornæs: 3/4 1 (DOF) og 13/4 1 (JJP).

Moesgård Strand: 29/3 2trk og 11/5 1 juv hun trk. (MS).

Anholt: 1/5 1hunN, 3/5 1hun rast + 1 juv han trk, 5/5 2hun+2juv han; 5-6hun, 8/5 4hun (NÅ).

Øvrige (i spredt orden!): 15/6 lad han mellem Voer og Stenalt (JRR), 15/6 1hun Kare Holm i Randers Fjord (JRR), 25/5 1han Pindstrup (PN), 23/6 1han Fårup (PN), 17/9 1hun Kolindbro (PN), 6/4 1han Vesborg Fyr, Samsø (LB), 23/5 1han Permelille, Samsø (LB), 15/5 1 hun/juv (??), 10/5 1han Astrup Mose (HHH), 25/5 1han Tranebjerg Mose, Samsø (HHH,AJ), 4/5 1hun Emborg Odde, Mossø (DOF), 25/5 1par Rolsøgård (JTL), 20/7 1han+1hun Sødring Kær (AJ), 12/7 1 juv hun Nordby, Samsø (LPJ), 20/8 1 Kolind (JJP) og 18/4 1SV Midtbyen, Århus (HLL).

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*).

28 iagttagelser, hvilket er 3 gange så mange som i 1979. Flest iagttagelser i april-maj og okt.-nov.

Meget sjælden vintergæst, fåtallig trækfugl.

Moesgård Strand: 29/3 1hun/juvN, 6/5 1hun/juvN og 10/5 1hun/juvN (MS). Kysing Fjord: 29/3 1hun (BHJ), 26/10 1hun (JF) og 14/12 1hun (DOF). Gjerrild: 7/4 1hun/juvNV (HP) og 15/4 1hunN (NÅ). Øvrige: 5/1 1han Dejret, Mols (PM,ET), 6/1 1han ad Brabrand Sø (HLL), 27/1 1hun/juv (indtrk. fra havet) Horskær (AJ,LPJ), 1/4 1 Fornæs (DOF), 6/4 1hanN Vesborg Fyr, Samsø (LB), 7/4 1han Vorsø (Jens Gregersen), 12/4 1hun rast Langsø, Djursland (ØBF), 13/4 1hun Allingåbro (EH), 30/4 2hun/juvN Venge Sø (??), 30/4 1han ad (til overnatning i rørskov) Tåstrup Sø (AJ), 1/5 2hun/juvN+NØ Anholt (NÅ), 2/5 1hun/juv syd for Randers (HP), 5/10 1hun/juvV Schleppegrellsgade, Århus (HLL), 11/10 1 Stubbe Sø (SS), 26/10 1 nær Odder (SS), 2/11 1ad hun (??) og 13/11 1 Kolind (JJP).

Hedehøg (*Circus pygargus*).

Sjælden trækfugl om foråret, hvilket svarer til 1979.

1/5 1-2ad hunN Anholt (NÅ), 8/5 1juv rast Anholt (NÅ) og 18/5 1 Salten Langsø (SS).

Duehøg (*Accipiter gentilis*).

I alt 38 iagttagelser, hvilket er en fordobling i forhold til 1979. Ses fåtalligt, jævnt fordelt over hele året og mange forskellige steder.

Anholt: 1/5 1hun rast, 4/5 1ad hun og 7/5 1 (NÅ). Fornæs: 1/4 2, 2/4 1, 3/4 1, 4/4 4 og 5/1 1 (DOF). Kasted Mose: 19/2 1juv hun og 22/12 1han (LLH). Brabrand Sø: 24/1 1 (JTL) og 8/12 1han Åby eng (AJ). Moesgård Strand: 12/4 1N, 17/4 1N (MS), 29/4 1 (JR) og 10/5 1han (MS). Kysing Fjord: 27/1 1 (SS) og 28/1 1 (CP). Salten Langsø: 2/11 1hun (HP) og 9/11 1 (LNH). Øvrige: 20/2 1hanNØ (JTL), 23/3 1 Hørret (BHJ), 23/3 1NV Harrisskov (SS), 12/4 1NV Storesand v/ Udby (EH), 16/5 1hun Skaføgård (JoA,MR), Venge Sø 1 ynglepar (JTL), 6/7 1juv Nielstrup v/ Auning (EH), 3/8 1 Gudensø (BHJ), 9/8 1juv Julianeholm Skov (JRR), 16/8 1 Sødrieholm Skov (JRR), 13/9 1 Forsthaven, Århus (PH), 14/9 1 Gjerrild Nederskov (SBN), 20/10 1 Storskoven v/ Odder (SS) og 9/11 1 Åkær Enge (LLH).

Spurvehøg (Accipiter nisus).

Op imod 375 iagttagelser (mange har nok undladt denne art i opgivelserne).

Ret almindelig trækfugl om foråret, fåtallig sommer og efterår. Antagelig fåtallig ynglefugl.

Anholt: 1-8/5 34trk. (6/5 14trk) (NÅ). Gjerrild-Fornæs-området: 31/3 27, 1/4 28, 2/4 46, 3/4 16, 4/4 30, 5/4 20, 6/4 11 og 7/4 9, alle trk. - ialt 187. (DOF,HP). Kvottrup Skov: 30/10 2 og 6/12 (??), Kasted Mose: 11/10 1, 26/10 2, 13/11 1 og 1-29/11 2 set jævnlige (LLH), Brabrand Sø: 12/1 1-2, 24/2 1, 10/3 1, 30/4 1, 1/5 1 (PM,ET), 2/9 1, 4/9 1, 6/9 2 (LLH), 1/12 1 og 6/12 1-2 (PM,ET). Moesgård Strand: 29/2-1/5 103 trk. - flest 5/4 13N og 12/4 14N (MS). Kysing Fjord: 26/1 1 (HEt,PM,ET), 23/4 1 (LLH) og 26/4 1N (PH,BHJ). Hesselholm,Samsø: Regelmæssigt 4/4-26/10. Ynglede antagelig i plantagen (LB). Øvrige: 5/1 1 Dejret,Mols (PM,ET), 14/2 1 Lisbjerg Skov (LLH), 7/4 2N+1rast Randers Fjords udløb (JRR), 12/4 3 Storesand,Udby (EH), 16/4 1 Kalsemade (LLH) og 1par med unger Ballen,Samsø (JTL).

Fiskeørn (Pandion haliaëtus).

40 iagttagelser, der er langt mere spredt end i 1979, hvor Fornæs vejede meget tungt.

Fåtalig forårstrækfugl og sjælden øvrige del af året.

Anholt: 1/5 1N, 3/5 1N, 5/5 1rast og 7/5 2Ø (NÅ). Gjerrild-Fornæs området: 1/4 1, 2/4 1, 3/4 1, 6/4 1 (DOF) og 15/4 1NØ (NÅ). Brabrand Sø: 30/4 1 (PM,ET), 10/5 1 (BHJ), 31/8 1ad (LLH) og 1/9 1SV (AJ). Moesgård Strand: 30/3 1N, 12/4 1N, 17/4 1N, 23/4 1N og 3/5 1N Søsterhøj (MS). Kysing Fjord: 1/5 1 og 6/9 1 (GG,HP). Skanderborg Sø: 6/9 1 og 13/9 1sud-ad+lusp (HP). Mossø,Emborg Odde: 24/4 1 (JR), 1/6 1 (DOF), 4/8 1 (BHJ) og 14/9 2 (GG,HHH,HP). Øvrige: 6/4 1 Ulstrup (SBN), 13/4 1N Horskær (AJ,LPJ), 2/5 1 Stubbe Sø (LNH), 3/5 1 Kolindbro (PN), 4/5 1N Århus N (PM,ET), 4/5 1N Hesselholm,Samsø (LB), 4/6 1 Bjerregrav Mose (ØBF), 5/6 1 Salten Langsø (HP), 11/7 1 Vrold,Skanderborg (GG), 31/8 1ad Kasted Mose (LLH) og 27/9 1 Tange Sø (FC).

Vandrefalk (*Falco peregrinus*).

Nærmest som i 1979, meget sjælden træk- og vintergæst.

1/2 lad Stubbe Sø (LNH), 27/3 1 Ålsrode (medd. JTL), 4/4 1 Gjer-rild (DOF) og 23/12 1 Ajstrup (BHJ).

Lærkefalk (*Falco subbuteo*).

6 iagttagelser, alle fra foråret. Sjælden forårstrækgæst, hoved-sagelig pr. maj.

Anholt: 1/5 1, 4/5 lad, 6/5 1 juvNV og 7/5 ladN (NÅ). Øvrige: 10/5 lad retur-rast Moesgård Strand (MS) og 4/6 1 Bjerregrav Mose (ØBF).

Dværgfalk (*Falco columbarius*).

Fåtalig forårstrækfugl, idet der var 17 iagttagelser, hvoraf 12 fra forårsmånederne. Ud over foråret må den betragtes som sjælden. Set flere forskellige steder end i 1979.

Moesgård Strand: 31/3 1 og 15/4 1 SØ (MS). Alnrø: 13/4 1 hun/juvN Strevelshoved (AJ,LPJ) og 18/4 1 rast (AJ,JR). Anholt: 3/5 1, 4/5 1 og 8/5 1 hun (NÅ). Øvrige: 28/1 1 hun Grund Fjord (EH), 11/2 1 Rosengade, Århus (NÅ), 12/4 1 Helgenæs (GF), 12/4 1 hanN Dragsmur Helgenæs (LNH) (ant. samme fugl?), 26/4 1 Gjerrild (GF), 1/5 1 Kysing Fjord (JF), 10/5 1 hun/juvN Astrup Mose (AJ), 15/11 1 Randers Fjord (MWJ) og en hvor datoen er ukendt, nemlig 1 Ring syd for Auning (MWJ).

Aftenfalk (*Falco vespertinus*).

31/5 1 mulig Aftenfalk ved Søsterhøj, Moesgård Strand (MS).

Tårnfalk (*Falco tinnuculus*).

Ca. 120 iagttagelser. Ret almindelig yngletrækfugl. Iagttagelserne er godt fordelt over hele året dog en klar hovedvægt i feb., marts, april og maj. Mange har nok undladt at rapportere Tårnfalke. Man har nok ikke anset den for at være en I-art.

Månedsfordeling.

jan.	feb.	mar.	apr.	maj.	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
6	14	14	18	16	6	6	9	9	10	6	8

Ynglefund: Hevring: 7/4 1, 8/4 2 og 10/8 1 par med 6 store juv. (JoA,MR). Kolind: mulig ynglepar, set dlg. hele året (JJP). Sivested: mulig ynglepar, set næsten dgl. hele året (JJP). Kalø: 11/5 1 ynglepar (JJP).

Agerhøne (*Perdix perdix*).

I den snedækkede vinter 79-80 så vi mange flokke Agerhøns; som regel på 6-12 ex., flest 12/2 15 Stautrup (JTL) og 2/3 15 Århus Å (ET).

Trane (*Grus grus*).

Flere end vanligt.: 26/4 1 rst. Gjerrild Nederskov (JTL), 6/5 1N-rst. Anholt (NÅ) og 22/6 90NØ (kl. 10.30) Overgård v. Mariager Fjord (JRR).

Vandrikse (*Rallus aquaticus*).

Sjælden vintergæst og fåtallig yngletrækfugl. Vinterobs: 1-4/2 2 Brabrand Sø (AJ,LPJ,PM,ET).

I yngletiden (pr. april-pr. aug.) set/hørt ved Sorte Sø v. Skanderborg, Astrup Mose, Brabrand Sø, Kasted Mose (3 hørt), Smørmosen v. Auning, Gudenåbredningen v. Randers, Kongslund v. Randers, Bjerregrav Mose samt Flakket på Anholt (NÅ,HHH,EH,AJ,LPJ,CP,JRR).

Flettet Rørvagtel (*Porzana porzana*).

Meget sjælden forårstrækgæst. 7/5 (kl. 00.30)-11/5 1 sang Brabrand Sø, vestenden (PD,KH,AJ) og 25/5 1 Ris Sø v. Tebstrup (JR).

Blishøne (*Fulica atra*).

Almindelig-meget almindelig trækgæst og ret almindelig vintergæst. Formentlig ret almindelig ynglefugl, men ingen konkrete oplysninger foreligger.

Vinter: (max.-tal på de enkelte lokaliteter). 26/1 500 Kysing Fjord 4/2 130 Århus Havn, 24/2 70 Brabrand Sø og 27/2 5000 Mariager Fjord (NÅ,HE,PM,ET).

Forår: (max.-tal over 100). 9/3 415 Råby Odde i Randers Fjord, 16/3 800 Kysing Fjord, 31/3 510 Brabrand Sø og 7/4 125 Ramten-Dystrup Søer (AJ,HP,JRR).

Efterår: (max.-tal over 100 samt alle over 1000). Kysing Fjord: 6/9 2000, 20/9 1000, 11/10 4680, 11/10 4430 og 12/10 3800 (JF,PM,ET,HP). Ajstrup Bugt i Mariager Fjord: 25/10 1350, 23/11 2100 og 30/12 1450 (JRR). Desuden 30/11 168 Brabrand Sø (AJ) og 28/12 248 Mariager Fjord vest for Hadsund (JRR).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*).

Enkelte vinterfugle. Trækket indledes pr. marts og der er flere store obs fra foråret. Efterårstrækket forløber i juni-juli og herefter foreligger der kun 1 iagttagelser af arten. Alle indlandsobs og træk obs nævnes.

Vinter: 8/1 1 Horskær (AJ,LPJ), 20/1 1 Egehoved, Alrø, 16/2 1 Horskær 24/2 1 Sønderby, Alrø (AJ,LPJ) og 22/11 1 Randers Fjords udløb (JRR) samt 23/2 2 Kysing Næs (JF).

Alrø: 2/3 333, 5/3 64, 9/3 162, 16/3 81, 27/3 27, 29/3 74, 3/4 40, 13/4 106, 18/4 74, 20/4 76, 23/4 20, 27/4 347, 3/5 100, 15/5 70-75, 25/5 69, 31/5 10, 1/6 18, 8/6 40, 20/6 10-15, 29/6 10, 20/7 10, 27/7 36 (KB,GG,H+JE,PH,LLH,AJ,BHJ,LPJ,CP,HP). HORSKÆR: 2/3-8/6 10-12 og 14/6-20/7 12-17 (LPJ,AJ). Andre kystobs: 11/5 13-17 Kalø (JJP), 15/5 35 Tved Øhoved (CP), 17-18/5 anslået 15 par Begtrup Røn (LNH), 24/5 10 Sælvig (HHH,AJ), 22/6 10 Mariager Fjord (JRR), 12/7 12 Besser Rev Samsø (LPJ) og 20/7 3rast+48SV Kysing Fjord (CP). INDLANDSOBS: Ramten-Dystrup sø: 31/3 1 (DOF), 5/4 2 (DOF) og 7/4 1 (HP). Stubbe Sø: 3/4 2 (DOF). Skanderborg Sø: 30/5 2, 25/6 1, 19/7 2 (HHH). Samsø: 24/5 1 Tranemosen, 3 Toftbjerg, 5 Kragemosen og 2 Tranebjerg Mose (HHH,AJ). TRÆKOBS: Moesgård Strand: 11/3-30/4 17 trk. (MS). Fornæs: 31/3 19, 1/4 12, 2/4 9, 3/4 13, 4/4 0, 5/4 13, 6/4 7, ialt 73 trk. (DOF).

Vibe (*Vanellus vanellus*).

De første, de største og de sidste som er 2 vinterobs. Desuden trækobs.

FØRSTE: 16/2 1 Kysing Fjord (JF), 29/2 2 Brabrand Sø (AJ) og 3N Moesgård Strand (MS), 1/3 1 Alrø (HP), 2/3 1 Søften (SMJ) og 2/3 30 Alrø (AJ,LPJ). STØRSTE OBS: Brabrand Sø: 15/3 229, 25/7 108 (AJ) og 1/9 345 (HLL). Kysing Fjord: 26/7 500 (GG,HP), 9/8 750 (JF), 28/9 716 (LPJ), 11/10 1875 (HP) og 2/11 200 (CP). Horskær: 11/10 182 og 9/11 127 (LPJ), Begtrup Røn: 27/9 490, 12/10 100 og 15/11 50 (LNH). Øvrige: 29/6 100 Alrø (H+JE), 20/7 152 Lerdrup Vig (LPJ), 16/8 180 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 9/9 105 Hattemagerskoven, Hinnerup (SMJ), 27/9 300 Tjele, Va (JRR) og 4/10 100-150 Nørreskifte, Samsø (LB) VINTER: 30/11 1 Brabrand Sø (AJ) og 6/12 1 Kysing Fjord (JF). TRÆK: Moesgård Strand: 29/2-3/5 497 trk. max. 29/3 192 og 28/3 177 (MS). Fornæs: 31/3-6/4 363 trk. max. 31/3 159 (DOF).

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula).

De første, de største og de sidste.

FØRSTE: 24/2 2 Horskær (AJ,LPJ), 1/3 2 (HP) og 2/3 3 (AJ,LPJ) Alrø samt 2/3 6 Horskær (AJ,LPJ). STØRSTE: Alrø-Lerdrup Vig: 5/3-20/4 10-20, dog 9/3 79 og 16/3 61 (AJ,LPJ,HP). 29/6 20 (H+JE). Horskær: 16/3 20-25, 29/3 6 + 9S, 8/8 17 (AJ,LPJ). Kysing Fjord: 12/3-5/4 10-20, dog 16/3 22-23 (JF,GG,HP,H+JE). 24/8 16 Kysing Næs (PH,BHJ). Andre: 16/3 20 Ebeltoft Færgehavn, 21/3 10 Kalø (JoA,MR) 25/7 13 og 21/9 10 Århus Havn (CP,SS). TRÆK: Fornæs: 31/3-6/4 43 trk. max. 31/3 14 og 3/4 11 (DOF). INDLANDSOBS: 21/4-18/7 1par med 5 unger v/ Hasle,Århus (HET) og 24/5 2 Møgelmosen,Samsø (HHH,AJ). SIDSTE: 4/10 4 og 12/10 1 Århus Havn (CP).

Lille Præstekrave (Charadrius dubius).

Brabrand Sø: 3/5 1 Døde å, 11/5 2, 13/5 1 hørt, 15/5 1par, 18/6 2 Åby eng, 23/7 1juv og 29/7 1juv Åby eng (PH,AJ,BHJ,PM,ET). Skanderborg Sø: 26/4 1par+2, 30/5 1par+1, 25/6 3par+1 og 19/7 2 (HHH). Øvrige: 2/5 2 Kysten mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), 14/5 2 Hasle,Århus (HET), 26/5 1 Langør,Samsø (HHH,AJ), 1/6 1 Emborg Odde,Mossø (Gf) og 1-3/8 1 Kysing Fjord (JF,AJ,HLL).

Strandhjejle (Pluvialis squatarola).

ALRØ: 15/5 1 (SS), 27/4 1 (KB) og 18/5 1 (AJ), HORSKÆR: 9/5 2, 17/5 2, 8/8 3, 16/8 3 og 17/8 4 (LPJ). KYSING FJORD: 4/5 2 (JF), 26/7 1 (GG,HP), 3/8 2 (LLH,HLL,AJ), 27/7 1 (LNH), 6/9 3 (JF), 11/10 1 (HP), og 12/10 1 (PH,BHJ). ÅRHUS HAVN: 25/7 2 (SS),27/7 1 (LNH), 4-5/10 2, 12/10 1 og 26/10 1 (CP). TVED ØHOVED: 15/5 1 (CP) og 12/10 12 (MWJ).

SKØDSHOVED: 8/6 2 (HHH,AJ), RANDERS FJORDS UDLØB: 16/8 6 og 28/9 30 (JRR), SØDRINGKÆR: 20/7 35 (AJ), BOELS REV: 9/8 54 og 16/8 31 (JRR), MARIAGER FJORD: 22/6 6 og 17/8 19 (JRR). BESSER REV,SAMSØ: 25/5 2 (HHH,AJ).

Hjejle (Pluvialis apricaria).

KYSING FJORD: 29/3 (2)-3/5 (104), jævnt stigende fra 2-104 (JF,PH,AJ, BHJ,CP). 23/8 11, 2/9 37, 28/9-26/10 180-400, dog 11/10 625 og 2/11 40 (H+JE,JF,GG,PH,BHJ,LPJ,HP). ALRØ: 16/3 2, 29/3 (33)-15/5 (55) konstant 30-100, dog 13-18/4 300-500 og 3/5 1000 (NÅ,AJ,LPJ,CP,HP,SS). 31/5 4 (H+JE). HORSKÆR: 13/4 90 (AJ), 16/4 450 (LLH), 18/4 40 (AJ), 26/7 37 (PH,BHJ), 8/8 26, 21/9 23, 11/10 332 og 26/10 50 (LPJ). RANDERS FJORDS UDLØB: 2/5 34, 28/9 237, 25/10 17 og 22/11 220 (JRR).

ØVRIGE: 5/4 1 trk. Fornæs (DOF), 26/4 260 Kare Holm og Storesande; Udby (EH,JRR), 15/5 12 Tved Øhoved (CP), 9/8 20 Boels Rev (JRR), 10/8 13 Mørke Kær (PN), 17/8 68 Mariager Fjord (JRR), 28/8 50 Lisbjerg (AJ), 2/9 492 Splidholm (LPJ), 18/9 25-30 Kolind (JJP), 27/9 40 Tjelic, Va (JRR), 28/9 349 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 29/9 2000-3000 Lerdrup Vig (MWJ), 5/10 100 trk. S Gylling (MWJ) og 21/10 50 Ørsted (JoA,MR).

Resume, første og sidste, forår og efterår: 16/3 2 Alrø og 1 Gylling Næs (AJ,LPJ), 31/5 4 Alrø (H+JE), 25/7 2 Århus Havn (SS) og 22/11 220 Randers Fjords udløb (JRR).

Stenvender (*Arenaria interpres*).

Fåtalig trækfugl. ALRØ: 15/5 4 (SS), 18/5 6 (AJ) og 27/7 1 (LPJ). HORSKÆR: 8/8 lad+ljuv og 16/8 1 (LPJ). SØBY REV: 18/5 7 (AJ) og 12/7 4 (LLH) samt 1/5 1 Kysing Fjord (CP) og 16/8 1 anskudt Boels Rev (JRR).

Enkeltbekkasin (*Limnocyptes minimus*).

Sjælden (fåtalig?) efterårstrækfugl. Vi må vist se at komme ud med støvlerne i april og oktober måned. BRABRAND SØ: 5/10 5 (AJ) og 21/10 1 (PH,BHJ).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*).

Hyppig (almindelig) trækfugl. Sjælden vintergæst og formodentlig hyppig yngletrækfugl. Alle vinterobs og rasttal på mindst 5 nævnes. VINTER: 19/1 1 Grundfør Mølle (SMJ), 3/2 1 (PH) og 15/2 2 Døde å, Brabrand Sø. BRABRAND SØ: 27/3 11, 10/4 16, 12/4 82, 22/4 10, 29/4 50, 9/5 6, 23/7 6, 25/7 10, 11/8 10, 17/8 40, 25/8 8, 1/9 25, 3/9 20, 6/9 14, 18/9 14, 5/10 67 og 21/10 45 (JAx,LLH,PH,AJ,BHJ,PM,ET). KYSING FJORD: 9/3 5, 26/4 8, 17/8 15, 23/8 18, 5/10 8, 11/10 90, 12/10 30, 18/10 6, 26/10 41, 2/11 32, 16/11 30 og 26/11 8 (JAx,JF,GG,PH,BHJ,CP,HP). BEGTRUP RØN: 15/4 115 (SS), 27/9 70-80 (LNH), 5/10 15 (MWJ), 12/10 100-150 og 15/11 100-110 (LNH). ASTRUP MOSE: 10/5 11 og 16/8 7 (AJ). KASTED MOSE: 27/9 50, 1/10 5, 4/10 5 (LLH). ØVRIGE: 12/4 3 trk. Jernhatten (Gf), 5/5 6 Kolindbro (PN), 14/6 6 Vrads Sande (JAx), 1/9 5 Hørret Eng (BHJ), 9/9 30 Hattemager, Hinne-rup (SMJ), 29/10 100 Lerdrup Vig (MWJ), 5/10 5 Gylling (MWJ), 26/10 7 Horskær (LPJ), og 9/11 10 Udbyhøj (MWJ). Sluttelig er arten iagttaget på yderligere 20 lokaliteter i antal af 1-4.

Skovsneppe (*Scolopax rusticula*).

Ifølge rapporteringerne en hyppig trækfugl og en sjælden yngletrækfugl, men arten er uden tvivl overset i betydelig grad. Kronologisk 19/3 1 Kysing Fjord (JF), 26/3 1 Søskoven (NÅ) og 28/3 3 Pilekrattet (HLL) Brabrand Sø, 1/4 1 Viby (Christian Andersen), 2/4 1 Gjerriild (DOF), 3/4 1 Stubbe Sø (DOF), 4/4 1 Fløjstrup (MS), 6/4 1 Gjerriild (DOF), 13/4 1 trk. Risskov (LNH), 23/4 1 Lillenor (JF), 1/5 1 Anholt (NÅ), 14/5 1 Kysing Fjord (CP), 5/6 1 Klapskov (SMJ), 6/6 1 Kasted Mose (NÅ), 27/6 3-4 hanner Norringure (SMJ), 18/10 1 Forstbotanisk Have (PH), 4/11 1 Ryomgård (JJP), 27/11 1 Hattemager (SMJ) og 15/4 1 N Moesgård Strand (MS) smuttede ud af systemet.

Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*).

Hyppig trækfugl især på Kattegatøerne. Muligvis en del overset/hørt på fastlandet. FORÅR: 30/4 32 NØ Tåstrup Sø (JTL), 5/5 1 rast og 8/5 skønnet 240 på nattræk Anholt (NÅ), og 18/5 1 Alrø Poller (AJ). samt 23/5 1, 26/5 1 og 28/6 1 (efterårets første) Hesselholm, Samsø (LB).

EFTERÅR: Fordeling på 5-dagsperioder:

	17-21/7	22-26/7	27-31/7	1-5/8	6-10/8	Ialt
Hesselholm, Samsø	59	150	29	35	30	303
i øvrigt	2	0	0	1	0	3

Stor Regnspove (*Numenius arquata*).

ALRØ: 24/2 1, 2/3 15, 5/3 3, 9/3 11, 12/3 12, 16/3 15, 27/3 40, 3/4 2, 13/4 3, 15/4 4, 20/4 4, 22/4 5, 27/4 2 og 18/5 8 (GG, AJ, LPJ, HP, SS). GYLLING NÆS: 24/2 3 og 16/3 1 (AJ, LPJ). HORSKÆR: 3/4 1, 10/4 5 (LPJ), 13/4 1 (AJ), 16/4 4 (LLH), 18/4 7 (AJ), 20/4 2, 9/5 4, 6/7 1, 8/8 1 og 16/8 1 (LPJ). KYSING FJORD: 26/3 1, 29/3 1, 4/4 1, 5/4 5, 26/4 2, 10/5 2, 26/7 1, 27/7 2 og 23/8 11 (JF, GG, PH, EH, AJ, BHJ, CP, HF) MOESGÅRD STRAND: 22/3 1 (GF), 30/3 7 SV (NÅ), 31/3 1, 4/4 1 (MS) og 5/4 3 (GG). BRABRAND SØ: 16/4 1 (AJ) og 11/9 3 (LLH). FORNÆS: 31/3-5/4 ialt 11 trk. (DOF). ANHOLT: 1/5 1 V og 8/5 10 på nattræk (NÅ). ØVRIGE: 7/4 200 Vørsø (FC), 3 Møllerup (JRR), 12/4 1 trk. Kysing Næs (GF), 22 Kare Holm (JRR, EH), 68 Udbyhøj (EH, JRR), 13/4 35 Lerdrup Vig (AJ), 15/4 62 Ø Tåstrup Sø (AJ), 24/4 50 Emborg Odde (GF), 26/4 4 Kare Holm, 2 St. Sjørup, 22 Udby (EH, JRR), 1/5 1 Bjerregrav Mose (JRR), 18/5 8 Søby Rev (AJ), 26/5 1 Hesselholm, Samsø (HHH, AJ), 30/6 3 SV og 6/7 1 V Nielstrup v/ Auning (EH), 20/7 3 Sødring Kær (AJ), 27/7 1 Århus Hayn (LNH), 16/8 47 Boels Rev (JRR), 25/10 5 og 22/11 1 Randers Fjords udløb (JRR).

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*).

Sjælden forårstrækgæst.

15/4 1 Ramten-Dystrup Sø (NÅ), 17/4 1 Døde Å, Brabrand Sø (AJ) og 22/4 2 Kolindbro (PN).

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*).

Ved munden af Horsens Fjord, specielt ved Alrø Poller alm. forårstrækgæst. I resten af amtet fåtallig trækgæst. Kulminationen falder om foråret i maj og om efteråret i ult. juli og september.

ALRØ: Første 2/3 107 og 5/3 250 (AJ,LPJ), herefter op til 500 i marts-maj, dog 3/5 2000 (CP), 18/5 1500 (AJ) og 25/5 505 (LPJ). Sidste 8/6 3 (PH,BHJ) og 12/6 5 (PD). I efteråret kun 20-27/7 1-4 (PH,BHJ,LPJ).

På nærliggende lokaliteter (Lerdrup Vig, Søby Rev, Horskær m.fl.) ses i april-maj ofte strejfflokke fra Alrø og i efteråret er set 26/7 2 Horskær (PH,BHJ), 2/9 6 Splidholm (LPJ) og 21/9 1 død Horskær (LPJ).

SAMSØ: Hesselholm 6/4-25/5 ingen større (100-300) flokke, flest 23/5 20 og 25/5 20. 19/7-27/7 1-5 (LB). Desuden 24/5 40 N Sælvig (HHH,AJ) og sidste på Samsø 6/8 3 Kanehave (LB).

KYSING FJORD: 26/4 1, 7/5 1, 20/7 1, 8-10/8 1, 11/9 3, 13/9 4, 18-20/9 2 og 28/9 3 (JF,DOF,GG,PH,BHJ,LPJ,PM,CP,ET). ANDRE: 3/5 1 S Moesgård Strand (MS), 8/5 2 nattræk Anholt (NÅ), 13/9 4 trk. Kysing Næs (HP), og 14/9 1 Kulhavnen (CP).

Svaleklire (*Tringa ochropus*).

Fåtallig trækgæst ult. marts-med maj og ult. juni-ult. august (visse år til okt.) Meget sjældn sommergæst. Yngel kan ikke udelukkes.

KYSING FJORD: 13/4 2 (JF), 26/6 1, 6/7 1, 12/7 1, 13/7 1, 20/7 3 27/7 2, 17/8 2 og 23/8 3 (GG,PH,AJ,LPJ,LNH,HP). BRABRAND SØ: 12/4 2, 15/4 2, 10/5 1, 14/5 1, 5/7 1, 23/7+25/7+27/7+17/8 2 og 31/8 1 (LLH AJ,BHJ,HLL). ØVRIGE: 6/4 1 trk. Fornæs (DOF), 13/4 2 Hattemager (SMJ), 15/4 1 Tåstrup Sø (AJ), 22/4 1 Spangsbæk, Addit (NÅ), 8/5 2 nattræk Anholt(NÅ), 26/5 2 Løvenholm Skov (LPJ), 18/6 1 Hjelm (Kjeld Hansen), 8/7 1 Flakket, Anholt (MSL), 1/8 2 Hattemager (SMJ), 9/8 1 Boels Rev (JRR), 10/8 3 Udbyover Sø (JRR). samt 28/3 1N og 29/3 1N Moesgård Strand (GG,MS).

SAMSØ, HESSELHOLM: 21/7 2, 23/7 1, 24/7 2, 27/7 1 og 31/7 4 (LB).

Tinksmød (*Tringa glareola*).

Fåtalig trækfugl maj og ult. juni-med. september.

KYSING FJORD: 7/5 5 (JF), 10/5 3 (EH), 20/7 8 (CP), 26/7 3 (HP), 27/7 7 (AJ), 3/8 8 (AJ), 17/8 27 (PH,BHJ), 23/8 1 (GG,HP), og 6/9 3 (GG,HP), BRABRAND SØ: 1/5 1, 9/5 1-2, 10/5 1, 11/5 12, 12/5 2-3, 14/5 1, 15/5 2, 16/5 4, 17/5 2, 26/5 1, 22/7 1, 23+25/7 1, 27/7 4, 19/8 9-10 (HHH,AJ,BHJ,HLL). SAMSØ: 29/6 2, 21/7 2, 30/7 2, 23/8 5 og 24/8 4 Hesselholm. 29/7 3 Barnekold (alle LB). ØVRIGE: 4/5 3 og 8/5 3 Kolindbro (PN), 8/5 2 nattræk Anholt (NÅ), 11/5 4 Kalø (JJP), 17-18/5 1 Begtrup Røn (LNH), 26/5 3 Langør, Samsø (HHH,AJ) og 23/8 1 Stubbe Sø (AJ).

Rødben (*Tringa totanus*).

Hyppig yngletrækfugl og trækfugl ult. marts-sept. Sjældent vintergæst (formodentlig racen Islandsk Rødben). Ynglefuglene er på ynglepladsen ult. marts-ult. juli og da forårstrækfuglene ofte raster langs kysten i april-maj kan man ofte ikke afgøre, hvad der er hvad YNGLEOBS: Samsø: Hesselholm 3-4par, Tranbjerg Mose 1par, Møgelmosen 4par, Kragemosen 2par. Desuden: Horsker 3par, Brabrand Sø 2-4par, Tved Øhoved 8par og Kolindsund mindst 3par, ialt 22-25par.

ALRØ: 9/3 1 og ingen før 29/3 43 - 24/8 2, i antal op til 25, dog 13/4 29, 18/4 40, 20/4 30 og 27/4 26 (KB,H+JE,LLH,AJ,LPJ,HP). HORSKÆR: 29/3 1 - 2/9 1, i antal 1-6, dog 8/6 11, 14/6 16, 6/7 15, 14/7 15, 27/7 10 og 16/8 16. En vinterobs fra 21/12 1 (alt LPJ). KYSING FJORD: 29/3 7 - 28/9 1, i antal 1-10, dog 1/5 17 (CP), 13/7 12 (CP) 27/7 16 (LNH) og 9/8 20 (H+JE). (H+JE,JF,GG,LNH,PH,EH,BHJ,AJ,LPJ,CP HP). SAMSØ: Hesselholm: ynglefuglene synes at forsvinde 20-25/7, og fugle efter denne dato skønnes at være trækfugle. Af de senere 22/8 2, 23/8 mindst 15, 24/8 11, 6/9 få og 5/10 4 (Islandsk Rødben)(alle LB). Ellers 4/4 30 Barnekold (LB) og 25/5 28 Stauns (HHH,AJ). BEGTRUP RØN: 17/5 10, 18/5 30 og vinterobs 15/11 4 (LNH). Desuden 16 kystlokaliteter med obs. af 1-12 Rødben. INDLANDSOBS: Brabrand Sø: 30/5 5 - 23/7 1, i antal 1-7 dog 12/4 12 og 15/5 11 (NÅ,AJ,LPJ,PM,ET). Kasted Mose: 11/5 2 (AJ), 4/9 20 og 9/9 14 (JAX). Kolindbro: daglig april-maj, max. 5/5 15 (PN) og 14-23/6 min. 3par med unger (JJP). Desuden 8 lokaliteter med 1-5 Rødben, Flest 13/7 5 Tarskov Mølle (PH,BHJ) og senest 27/8 1 Fussing Sø (PER). To meget store efterårsobs 20/7 130 Sødring Kær (AJ) og 16/8 128 Randers Fjords udløb (JRR).

Sortklire (*Tringa erythropus*).

Fåtalig trækfugt maj og med. juni-sept. Sjælden ved ferskvand.

ALRØ: 3/5 1 Lerdrup Vig (CP) og 27/7 2 (LPJ). HORSKÆR: 17/5 1, 14/7 1, 20/7 7, 27/7 2, 16/8 6 og 17/8 4 (LPJ). KYSING FJORD: 10/5 1, 21/6 1, 12/7 1, 20/7 1, 27/7 1, 8/8 8, 17/8 3, 23/8 1, 6/9 1 og 28/9 1 (JF, GG, LNH, PH, EH, BHJ, LPJ/HP). SAMSØ: 2/5 3 Langør (LB), 19/6 1 Besser Rev (JRR), 28/6 1 og 7/8 3 Hesselholm (LB). BRABRAND SØ: 8-9/5 4, 10/5 6, 11/5 4, 22/7 2, 19/8 1, 1-2/9 2 (LLH, AJ, BHJ, HLL, PM, ET). KOLINDBRO: 8+10/5 2 (PN). ANDRE: 8/5 15 nattræk Anholt (NÅ) og 17/5 1 Begtrup Røn (LNH).

Hvidklire (*Tringa nebularia*).

ALRØ: 3/4 2, 27/4 2 (LPJ), 3/5 75 (H+JE)+ 6 Lerdrup Vig (CP), 15/5 3 (SS), 27/7 2 (LPJ) og 24/8 2 (AJ). HORSKÆR: 10/4 1, 20/4 5, 9/5 10, 17/5 5, 25/5 1, 20/6 2, 29/6 2S + 1, 6/7 2 - 21/9 2, i antal 1-10, dog 8/8 47. Desuden 26/10 2 (alle LPJ). SPLIDHOLM: 9/5 7 (LPJ), 24/8 1 (AJ) og 11/10 2 (LPJ). SAMSØ, HESSELHOLM: 2/5 2, 28/6 1, 20/7 3 - 5/10 2, i antal 1-10, dog 22/8 15 og 23/8 mindst 22 (alle LB). Desuden 25/5 1 Stauns (HHH, AJ). KYSING FJORD: 26/4 1 (JF, PH, BHJ), 1/5 60 (CP), 3/5 25 (H+JE), 4/5 72 (JF), 10/5 62 (EH). 3/7 2 - 28/9 1, i antal 1-10, dog 3/8 15 (GG, LNH, PH, AJ, BHJ, LPJ, CP, HP). ÅRHUS HAVN: 15/4 1 (FF), 25/7 3 og 11/8 1 (SS). BRABRAND SØ: 7/5 1, 9/5 1, 10/5 1, 11/5 6, 13/7 1, 11/8 1, 19/8 2 og 4/9 2 (LLH, AJ, HLL). TÅSTRUP SØ: 6/5 1 (CP) og 16/8 1 (AJ). KASTED MOSE: 2/5 2 (CP), 11/5 1 (AJ), 4/9 20 og 9/9 18 (JAX). HATTEMAGER: 27/8 1 og 9/9 4 (SMJ). BEGTRUP RØN: 17/5 2, 27/9 2 og 12/10 1 (LNH). KOLINDBRO: 22/4 1, 5/5 10, 8/5 4, 10/5 17 (PN). ANHOLT: 3/5 1 og 8/5 20 nattræk (NÅ). KARE HOLM: 26/4 1 og 27/8 2 (EH, JRR). RÅBY ODDE: 2/5 25, 10/8 1, 16/8 6 (JRR). BOELS REV: 2/5 2 og 9/6 6 (JRR). ØVRIGE: 12/4 3 Søby Rev (LLH), 10/5 6 trk Blegind Mose (AJ, LPJ), 15/5 1 Tved Øhoved (CP), 20/7 25 Sødring Kær (AJ), 29/7 6 Hjarnø (LLH), 17/8 11+8 Ajstrup Bugt+Mariager Fjord (JRR) og 1/9 1 Østerby Mose (BHJ).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*).

ALRØ: 3/2 1 (SS) fejlskrivning?!, 15/5 1 (SS), 27/7 2 (LPJ) og 24/8 2 (AJ). HORSKÆR: 17/5 2, 13/7 3, 14/7 1, 20/7 4, 26/7 1, 27/7 2, 8/8 5, 16/8 7, 17/8 5 og 24/8 1 (LPJ, AJ, LLH). KYSING FJORD: 1/5 4 (CP), 4/5 2 (JF), 10/5 4 (EH) 23/5 5 (PH, BHJ). 3/7 1 - 28/9 1, i antal 9-20, dog 19/7 31, 20/7 30, 23/8 40 (H+JE, JF, GG, LNH, PH, AJ, BHJ, LPJ, CP, HP). BRABRAND SØ: 30/4 4 - 3/6 1, i antal 1-10, dog 9/5 12. 7/7 1 -

1/9 1, i antal 1-10, dog 27/7 11 og 17/8 12 (LLH,PH,AJ,BHJ,JTL,HLL,PM,ET). Desuden fra 8 kystlokaliteter i antal 1-6 for 5/5-25/5 og 1-7 for 7/7-6/9. Nævnes skal dog 1/4 1 trk. Fornæs (DOF). Fra 17 ferskvandslokaliteter i antal 1-17 for 15/4 (2)- 4/6 (4) med 26/5 17 Løvenholm Skov som max. I antal 1-10 27/6 (1) - 18/9 (10). (NÅ,LB,HEt,PD,GG,LNH,HHH,AJ,SMJ,LPJ,MSL,JJP,PER,JRR,PN,SS).

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*).

ALRØ: 27/4 12 (KB) og 26/7 3 (PH,BHJ). KYSING FJORD: 22/7 4 (JF), 26/7 1 (JF,GG,HP), 27/7 8 (LNH), 3/8 2, 4/8 1, 7/8 4 (JF), 17/8 1 (PH,BHJ) og 24/8 1 (JF). SAMSØ: 22/7 2 Hesselholm (LB), 27/7 2 (JTL) og 23/8 1 (LB) Issehoved. ØVRIGE: 22/6 1 Pletten, Mariager Fjord (JRR), 20/7 20 Sødring Kær (AJ), 25/7 11 Århus Havn (SS) og 8/8 3 Horsker (LPJ).

Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*).

15/4 2 Begtrup Røn (SS), 11/5 14 trk. NØ Kalø (JJP) og 15/11 2 Begtrup Røn (LNH,ØBF).

Dvergryle (*Calidris minuta*).

KYSING FJORD: 26/7 1 (JF,GG,HP), 4/8 2 (JF), 17/8 1 (PH,BHJ), 23/8 2 (GG,HP) og 6/9 7 (JF,GG,HP). ÅRHUS HAVN: 27/7 2 (LNH), 10/8 2, 14/9 1 og 21/9 8 (CP).

Temmincksryle (*Calidris temminckii*).

KYSING FJORD: 9/8 1 (JF), 9/8 4 (H+JE), 10/8 2 (DOF), 15/8 1 (JF), 17/8 1 (PH,BHJ) og 24/8 1 Kysing Næs (PH,BHJ). BRABRAND SØ: 15/5 2 Åby eng, 17/5 4 Døde å (AJ), 17/5 1, 20/5 1 og 31/5 1 (PH,BHJ). ØVRIGE: 27/4 2 Alrø (KB), og 11/8 1 Århus Havn (SS).

Dvergryle/Temmincksryle (*Calidris minuta/temminckii*).

29/7 2 Stavns, Samsø (LB).

Almindelig Ryle (*Calidris alpina*).

Ynglefund: Råby Odde, Randers Fjord 1par (JRR), Tved Øhoved 1par (HHH,AJ) og Alhale, Alrø 3par. Ialt 5par=ca. 1% af landsbestanden. ALRØ: 20/1 19, 27/1 60-70, 2/3 300 - 31/5 2, i antal 10-300, dog 5/3 405, 12/3 500-600, 16/3 447, 18/4 700, 20/4 900, 22/4 700, 15/5 700-900, 18/5 900 (H+JE,KB,AJ,LPJ,HP,SS). 20/7 40, 26/7 60, 27/7 21 og 24/8 20 (PH,AJ,BHJ,LPJ). HORSKÆR: 8/1 2, 27/1 10, 5/3 35 -

25/5 58, i antal 12-58 (AJ,LPJ). 13/7 4 - 26/10 1, i antal 1-25, dog 11/10 50 (LPJ). KYSING FJORD: 8/3 5, 16/3 3 (JF), 29/3 16 (BHJ) 4/4 1 (PH). 13/7 4 - 19/10 12, i antal 1-50 (JF,GG,PH,BHJ,LPJ,CP,HP). BEGTRUP RØN: 15/4 25-30 (SS), 27/9 8, 12/10 3 og 15/11 25 (LNH) RANDERS FJORDE UDLØB: 16/8 163, 28/9 60 og 25/10 145 (JRR). INDLANDSOBS: 13/5 6 Emborg Odde, Møssø (GF) og 4/10 2. Kasted Mose (LLH) ØVRIGE: 31/3 36 trk. Fornæs (DOF), 18/5 750 Søby Rev (AJ), 20/7 750 Sødring Kær (AJ), 17/8 13 Mariager Fjord (JRR) og 12/10 100 Tved Øhoved (MWJ).

Krumnæbbet Ryle (*Calidris ferruginea*).

KYSING FJORD: 31/5 2 (H+JE) er amtets første forårsfund, 20/7 1 (PH,BHJ), 26/7 5 (JF,GG,HP), 27/7 1 (PH,AJ,BHJ), 10/8 3 (DOF), 15/8 1 (JF). ØVRIGE: 20/7 30 Sødring Kær (AJ), 22/7 2 Hesselholm, Samsø (LB), 24/8 1 Alrø, 8 Horskær (AJ).

Sandløber (*Calidris alba*).

ÅRHUS HAVN: 11/8 2 (SS) og 4-5/10 1 (CP). SAMSØ: 28/7 3 Østre Hede-krog, 23/8 1 og 6/9 1 Issehoved (LB). Samt 7/8 2 Kysing Fjord (JF).

Kærløber (*Limicola falcinellus*).

4/9 2 Kasted Mose (JAx).

Brushane (*Philomachus pugnax*).

KYSING FJORD: 1/5 5, 3/5 5, 10/5 3, 6/7 6, 19/7 9, 20/7 7, 26/7 3, 27/7 1, 17/8 31, 23/8 50, 24/8 13, 6/9 40, og 2/11 2 (JF,GG,PH,EH,AJ,BHJ,CP,HP). BRABRAND SØ: 29-30/4 20, 1/5 10, 3/5 4, 11/5 2, 12/5 6, 13/5 1, 14/5 3, 15/5 9, 16/5 2, 17/5 3, 22-23/7 2, 25/7 2, 17/8 25-30, 19/8 15, og 3/9 2 (PH,AJ,HLL,PM,ET). KASTED MOSE: 4/9 40, 9/9 60 (JAx) og 4/10 15 (LLH). KOLINDBRO: 2/5 1, 4/5 3, 5/5 19, 8/5 1 og 10/5 1 (PN). SAMSØ: 24/5 1hun Møgelmosen (HHH,AJ), 19/7 1 og 23/8 6 Hesselholm (LB). ØVRIGE: 15/5 2 Alrø (SS), 17/5 14hanner Begtrup Røn (LNH) og 6/7 1 Ebeltoft (MSL).

Klyde (*Recurvirostra avosetta*).

Ynglefund: Råby Odde, Randers Fjord 1par (JRR), Tved Øhoved 1par, Dejret Øhoved 2par, Skødshoved 4-5par (HHH,AJ), Begtrup Røn 0-1par (LNH), Søby Rev 10par (Flemming Christensen), Horskær 2par (LPJ), Lerdrup Vig 2par (Jens Gregersen), Alrø Poller 6par, Alhale, Alrø 6 par, Strevelshoved, Alrø 2par (Lars Abrahamsen, FC, JG), Hesselholm 4

par (LB), Stavns Fjord, Langør 1par (Vildtbiologisk Station, Kalø).
Ialt 40-42par=ca. 1% af den danske ynglebestand.

KYSING FJORD: 29/3 7 - 23/5 2, 12/7 3, 20/7 4 og 27/7 3 (JF, PH, AJ, BHJ, LPJ, CP). HORSKÆR: 29/3 2 - 26/7 4, i antal 2-11 (17/5). I juni sås yngleparrene med unger (LPJ). ALRØ: 12/3 2 - 6/8 36, i antal 5-20, dog 29/3 47, 13/4 22, 20/4 31, 27/4 42 og 3/5 21 (KB, H+JE, LLH, PH, AJ, BHJ, LPJ, CP, HF, SS). SAMSØ: Hesselholm: 3/4 - 22/6 konstant klyder, herefter kun 24/7 4. Desuden ved Barnekold 4/4 15, 6/4 8 og 2/5 6 (alle LB). KARE HOLM: 12/4 5 og 26/4 8 (EH). ØVRIGE: 1/4 1 trk. Fornæs (DOF), 8/5 10 nattræk Anholt (NÅ), 22/6 29 Pletten, Mariager Fjord (JRR) og 12/7 5 Søby Rev (LLH).

Odinshane (*Phalaropus lobatus*).

KYSING FJORD: 22/6 1han, 15/8 1 (JF) og 17/8 1 (PH, BHJ). Desuden 11/8 1 Emborg Odde, Mossø (GF) og 2/9 1 Splidholm Bro (LPJ).

Vadefugle (Charadriiformes).

ANHOLT: Om natten d. 8/5 hørtes i perioden 0-2 et stort træk af vadefugle. Vejret var varmt, (varmfront gik over øen d. 6/5) vindstille med sliende regn. De trækkende antal er nævnt under de enkelte arter.

RANDERS FJORDS UDLØB: 7/4 400 trk. Ø, 16/8 12 og 25/10 18 (JRR).
BOELS REV: 9/8 1 anskudt (JRR).

Almindelig Kjøve (*Stercorarius paraciticus*).

Meget sjælden efterårstrækgæst.
24/8 2 Kysing Næs (PH, BHJ).

Šildemåge (*Larus fuscus*).

Lokalt ret almindelig yngletrækfugl, fåtallig eller ret almindelig træk- og sommergæst (marts-okt.) ved Kattegatkysten. Muligvis fåtallig træk- og sommergæst ved større ferskvandssøer.

Vi nævner første og sidste obs. ved kysten, et yngleobs. samt alle indlandsforekomster: 20/4 10 Alrø (HP), 26/11 4 (JAx), 5/5 500 ex. i den største ynglekoloni på Anholt (NÅ) samt 2/3 1 Rye Mølle Sø, 8/3 1 Bråbrand Sø, 10/7 3 Mossø, 19/7 11 Skanderborg Sø, 20/7 8 Mossø, 22/7 1 Mossø, 5/10 1 Emborg Odde, Mossø og 9/11 1 Skanderborg Sø (alle HHH).

Indlandsforekomsten er et nyt fænomen, muligvis tidligere overset. Observatøren fastholder stædigt artsbestemmelsen; det har i alle tilfælde drejet sig om udvoksne fugle.

Gråmåge (*Larus hyperboreus*).

Meget sjælden-sjælden træk- og vintergæst.

29/3 1 2K Århus Havn (NÅ), 7/5+9/5 1 2K Anholt Havn (NÅ) og 2/12
1 2K Århus Fiskerihavn (NT).

Dværghmåge (*Larus minutus*).

Meget sjælden-sjælden træk- og sommergæst.

13/7 1 adult Kysing Fjord (CP).

Ride (*Rissa tridactyla*).

Trækgæst. Meget sjælden om foråret, fåtallig om efteråret.

22/3 1S Fornæs (EH), 7/5 1 adult Anholt Havn (NÅ), 14/9 1 juv.N
Kysing Næs (PH,BHJ) og 20/11 ca. 10 mellem Grenå og Anholt (NT).

Sortterne (*Chlidonias niger*).

Sjælden sommergæst (maj-sept.), flest i juni og august.

6/6 4 Emborg Odde,MOssø (GF), 17/8 2 Brabrand Sø (AJ), 23-24/8 1
juv. Kysing Fjord (JF,PH,BHJ,HP).

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*).

Meget sjælden, uregelmæssig trækgæst.

August 1 rst.+trk. Fornæs (Gf).

Rovterne (*Hydroprogne caspia*).

Meget sjælden, uregelmæssig trækgæst.

6/9 (kl. 11.00) 2S Ballebjerg,Samsø (LB).

Hav-/Fjordterne (*Sterna paradisaca/hirundo*).

Artsbestemmelsen volder ofte besvær. Iagttagelser ved ferskvand
drejer sig så godt som altid om Fjordterne.

15/7 4 Fussing Sø (PER), 4/8 1 Emborg Odde,MOssø (PH,BHJ) og 25/8-
4/9 1-4 Brabrand Sø (LLH,AJ,PM,ET).

Fjordterne (*Sterna hirundo*).

Tilsyneladende sjælden på forårstræk. Fåtallig efterårstrækgært
især aug.-pr sept. Alle obs. nævnes.

6/5 2 Anholt (medd. NÅ), 10/5 1 Astrup Mose (AJ,JPJ), 25/5 2 Tra-
nemosen,Samsø (LB), 22/7 16 Mossø (HHH), 10/8 1 Mørke Kær (PN),
19/8 5 Døde Å,Brabrand Sø (AJ), 23/8 min. 10 Stubbe Sø (AJ), 26/8
1 Rønbækskolen,Hinnerup (SMJ), 27/8 40-50 Mossø,Emborg Odde (Gf),
30/8 2 Juul Sø (JTL), 31/8-4/9 1 Brabrand Sø (LLH,AJ,JPJ), 14/9 10
Salten Langsø (HHH) og 17/9 1 Rønbæksøen,Hinnerup (PN).

Havterne (*Sterna paradisaea*).

Tidligere end normalt. Ingen sikre indlandsobs.

Første: 30/3 1 Gjerrild Stenværk (DOF) og de næste til normal tid 16/4 2 Horskær (Jens Gregersen) og 18/4 5 Alrø (AJ). Den sidste 24/8 Hesselholm, Samsø (LB).

Dværgterne (*Sterna albifrons*).

Fåtalig yngletrækfugl og sommergæst (maj-aug.). Første som vanligt 3/5. Alle obs. nævnes.

Kysing Fjord: 6/7 2 ad. (AJ), 13/7 1 (JF,CP), 20-26/7 2 (JF,GG,PH, BHJ,CP,HP), 7/8 1 (JF) og 17/8 3 (PH,BHJ). Århus Havn: 17/5 2 (NÅ), 13/7 1 (FF), 21/7 1 (PN), og 27/7 2 (LNH). Begtrup Vig: 3/5 1 (LNH). Samsø: 24/5 2 Sælvigbugten (HHH,AJ), 25/5 3 (HHH,AJ), 19/6 2 (JRR) 12/7 3 (LPJ), 29/7 1 (LB), 25/5 2 og 28/6 2 Hesselholm (LB), 26/5 1 Langør (HHH,AJ), 18/6 1 Stavns Fjord (JRR), 24/7 1 Østre Hedekrog (LB) og 6/8 1 Kanahave (LB). Anholt: 3/5 2, 6-9/5 10-15 dlg., dog 6/5 22 (NÅ), 7/7 22 og 8/7 50 (MSL). Årets sidste og eneste ferskvandsobs. var 6/9 1 Brabrand Sø (LKH).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*).

Fåtalig trækfugl og sandsynligvis fåtalig ynglefugl. De første var 31/3 2 Fornæs (DOF) og de sidste var fra Samsø 6/9 11 Egholm og 8 Hjortholm i Stavns Fjord (LB).

Alkefugle (Alcidae).

Tilsyneladende er folk nu "gået over til" at artsbestemme næsten alle alkefugle. Det må være svært!

Påskelejren ved Fornæs viste, at her også er alkefugle om foråret. Det bliver spændende at høre mere om. Men hvor er alle novemberobsene? Er det fuglefolket eller alkene, der har svigtet?

5/4 2 + 6/4 1 Fornæs (DOF) og 13/9 1 SØ + 28/9 4 S Kysing Næs (HP).

Alk (*Alca torda*).

Flest forårsfugle er usædvanligt.

22/3 2 S (EH), 4/4 8 (DOF) og 5/4 1 (DOF) fra Fornæs og 1/11 1 Kysing Næs (HLL).

Søkonger (Alle alle).

2/4 1 N Fornæs (DOF).

Lomvie (*Uria aalge*).

4/4 2 trk. Fornæs (DOF).

Tejst (*Cepphus grylle*).

Yngler vistnok ikke længere ved Sangstrup Klint. Sjælden trækgæst udenfor ynglepladserne (Tunø, Vejro mv).


3/4 1N, 4/4 1N-rst. Fornæs (DOF), 19/6 9 Vejro (JRR) og 23/8 1 juv Hov Strand (PH).

Lunde (*Fratercula arctica*).

3/4 1S og 5/4 1N Fornæs (DOF).



Solmager i
luft



Huldue (*Columba oenas*).

I marts måned ankommer de danske ynglefugle, og artens hyppighed i amtet må betegnes som sjælden til fåtallig mar./apr.-ult.aug./nov.

Moesgård Strand: 23/2-15/5 101 trk., flest 29/3 14N, 5/4 10N, og 12/4 12N (MS). Kysing Fjord: 10/5 2 (EH), 27/7 1 (LNH), 1/8 4, 15/8 2, 9/11 1 og 16/11 2 (JF). Brattingborg, Samsø: 21/7 2 (LB) og ult. juli 5 (JTL). Øvrige: 19/1 1 Vosnæsgård - tidlig! - (SS), 13/3 10 Fornæs (JRR), 22/3 2 Gjerrild (??), 7/4 1 Vilhelmsborg (BHJ), 12/4 2 Dragsmur (LNH), 12/4 1 Ellemandsbjerget, Helgenæs (LNH), 23/4 1N Mårslet (BHJ), 24/4 1 Mindeparken, Århus (NÅ), ult. juli 1 Brabrand Sø (JTL), ult. juli 1 Sønderskoven (JTL), ult. juli 1 Rugård Have (JTL).

Ringdue (*Columba palumbus*).

Moesgård Strand: 23/2-11/5 7999 trk., flest 29/2 1078 og 29/3 3013 (MS). Samsø: Ses dgl. det meste af året (LB).

Turteldue (*Streptopelia turtur*).

Muligvis yngleforsøg, dog ikke konstateret. Sjælden trækgæst, meget sjælden sommergæst; i Atlasperioden 1971-74 et sikkert ynglefund i Danmark.

Nielstrup v/ Auning: 18/6 2, 20/6 1, 29/6 2, 1/8 1han og 3/8 1 (EH).

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*).

Århus Havn: 21/10 90 og 4/11 75 (NÅ).

Skoggerdue (*Streptopelia risoria*).

Se appendix II.

Gøg (*Cuculus canorus*).

Kun de første og sidste iagttagelser nævnes. Disse iagttagelser beskriver de gamle fugles ophold i Danmark (ult. apr./pr. maj-ult. juli) nogenlunde.

3/5 1 Århus Å (PM,ET), 8/5 1 Anholt (NÅ), 10/5 1 Astrup Mose (AJ), 18/6 1han+1hun Kasted Mose (PM,ET) og 29/6 1 Hesselholm, Samsø (LB).

Slørugle (*Tyto alba gutata*).

Ses og høres året rundt på en lokalitet i amtet.

Kirkeugle (*Athene noctua*).

Fåttallig-ret almindelig, har kun kendskab til få obs.

2/4 1 Fjellerup (DOF), 28/6 1han Nielstrup v/ Auning (EH), ult. juli 1par med 4 juv Lyngby (JTL), ult. juli 1par yngleforsøg Borum (JTL) og 3/10 1 Vilhelmsborg (BHJ).

Skovhornugle (*Asio otus*).

Brabrand Sø: 1/1 7, konstant bestand på omkring 7 gennem jan. 6/2 8, set op til 10 sidst på måneden, 1/3 7, ved udgangen af mar. op til 4, 7/4 1, 10-23/11 1, 29/11 3, 30/11 5, 21/12 7-8 og 27/12 9 (AJ,LPJ,HHH,PM,ET,NT,NÅ). Desuden: 29/3 1 Kongslund v/ Randers (JRR), 3/5 1 Haraldslund (SMJ), 6/6 3juv. der forlader gammel kragerede (SMJ), juli 1par Helgenæs (JTL), 1/8 1 Hesselholm, Samsø (LB), 12/10 2 Strands Plantage (LNH) og 26/10 1juv Salten Langsø (HB).

Mosehornugle (*Asio flammeus*).

2/3 1 Horskær (AJ,LPJ), 29/3 1 Kongslund v/ Randers (JRR), 29/3 1 Horskær (HHH,AJ,LPJ), 30/3 1 rast-Ø Moesgård Strand (DOF,MS), 26/4 1 Kare Holm, Randers Fjord (EH), 1/5 1 Mårup (SS), 2/5 1-3 Ørkenen, Anholt (NÅ), 22/7 1 Kysing Fjord (JF), og 30/10 1 Lykkendalsvej, Brabrand (LAB).

Perleugle (*Aegolius funereus*).

Meget sjælden vintergæst. Noget af en obs; Jylland iøvrigt tyndest besøgt!!!

29/1 1 syngende ? Marselisborg Skov (NÅ). altså ikke sikker obs.

Natugle (*Strix aluco*).

Fussing Sø: 4/5 1 (JRR) og "Natuglen ses eller høres jævnligt året rundt" (PER). Salten Langsø: 13/9 1par, 19/9 1hun hørt og 25/9 2par hørt (LPJ). Nørreris: 31/5 4 unger der forlader kassen og 17/7 2 (SMJ). Desuden: Ses regelmæssigt v/ Vilhelmsborg, Mårslet, Storskoven v/ Brabrand Sø (BHJ) og Lykkendalsvej i Brabrand (LAB). I hele året Risskov (CP). Moredaterede obs: 7/2 1 Hørslev (PH), 2/4 1 Gjerrild (DOF), 3/4 1 Brabrand Sø (JoA,MR), 3/5 1 Universitetsparken, Århus (JAx), 16/5 1 Salten Langsø (LPJ) - blev væk for ovenstående beskrivelse af SL -, 6/6 1 Fløjstrup (BHJ), 7/9 2 Hørret Skov (BHJ),

Mursejler (*Apus apus*).

Kun første og sidste obs. nævnes.

13/5 1 Århus (PN) og 10/9 4 Brabrand Sø (HLL).

Isfulg (*Alcedo atthis*).

Fåttallig, foregående hårde vintre har måske givet tilbagegang, i hvertfald ret tyndt materiale.

29/1 1 Funder Å (LA,FC), 18/5 1 lokaliteten ukendt (SS), 27/9 1 Kongsvad Mølle v/ Glenstrup (JRR) og to fra Brabrand Sø: 4/12 2 og 23/12 1 (HLL).

Grønspætte (*Picus viridis*).

En bunke iagttagelser og egentlig pænt materiale.

Løvenholm Skov: 8/3 2 og 28/7 4 (JRR,LPJ). Gjerrild: 22/3 1 og 26/4 1 (EH,ØBF). Stubbe Sø: 15/4 1-2 og 12/10 2 (NÅ,PN). Rugård Nørresø: 26/4 1 og 10/5 1 (ØBF). Haraldslund: 3/5 1 og 6/8 1 (SMJ). Fussingø Skov: 23/5 1 og 27/9 1 (JRR). Skanderborg Sø: 8/4 1 Dyrehaven, 26/4 1 og 17/5 1 (HHH). Salten Langsø: 3/3 3, 10/3 4, 16/5 1 24/5 1 (LPJ), 5/6 3 (HP) og 8/11 4 (HP). Øvrige: 7/4 1 Ryomgård Skov (PN), 13/4 1 Emborg, Mossø (HHH), 26/4 1 han Auning (EH,JRR), 26/4 1 St. Sjørup (JRR), 27/4 1 Skrødstrup Skov (JRR), 3/5 1 Hinnerup Skov (SMJ), 10/5 1 Sønderkov v/ Rugård (ØBF), 10/5 1 Sortesø, Skanderborg (HHH), 10/5 1 Døjsø, Skanderborg (HHH), 13/6 1 Frisenborg (LPJ), 21/9 1 Tinning Skov (SMJ), 26/10 1 Kongsdal Skov (JRR), 26/10 1 Odder (SS) og 16/12 1 Varna, Marselisborg Skov (NÅ). Sluttelig et par sikre yngleiagttagelser: Ryomgård 2par, Kolind sandsynligvis 1par, Fannerup sandsynligvis 1par (JJP).

Sortspætte (*Dryocopus martius*).

1 iagttaget i amtet. Alt hemmeligholdes som ved Slørugle.

Vendehals (*Jynx torquilla*).

Anholt: 1/5 3 og 8/5 1 (NÅ). Thingvallagade, Århus N: 16/4 1 og 19/4 1 (PM,ET). Brabrand Sø: 1/9 1 Åby eng (AJ) og 15/9 1 (KH). Mindeparken: 13/5 2 (par v/ redekasse) (H+JE), og 16/5 1 (BHJ). Salten Langsø: 1/5 2 han syngende (Poul Hansen) og 24/5 1 (LPJ). Moesgård Strand: 16/4 1 og 11/5 1 (MS). Øvrige: 19/4 1 Tirstrup Mose (LA,FC), 24/4 1 Tåstrup Sø (LPJ), 13/5 1 Kasted Mose (JTL), 14/8 1 Mårslet (BHJ), 17/8 1 Nielstrup v/ Auning (EH), 27/8 2 Vejlbj Nord (SS) og 31/8 1 Hørslev Krat (PH).

Toplærke (*Galerida cristata*).

Ialt er indrapporteret 20-30 par.

Ynglelokaliteter, alle i Århus: Frydenlund-Århus V, Fuglebakkevej/Spøttevej-Århus V, City Vest, Langcnæs Alle, Lindholmparken, Områdekantor Nord-Århus N, Randersvej, Rosenhøj, Tranbjergcenteret, Vejlbj Vest, Vibycenteret og Århus Havn (LAB,H+JE, EII,HHH,PH,AJ, BHJ,SMJ,SBN,CP,JJP,JTL,NT,NÅ).

Udenfor Århus foreligger der ingen yngleiagttagelser, kun spredte obs. fra efterår og vinter: jan.-feb. 3 Ryomgård (JJP), 13/2 5 Randers (EH), 27/2 2 Skovby (JTL), 17/9 1 Hinnerup (SMJ) og nov.-dec. 1 Trige (HB).

Hedelærke (*Lullula arborca*).

Ynglefugle: 3-5/4 1 sang Tingdalen v/ Vrads (JAx), 6/4 1 sang Salten Langsø (DOF), 26/4 1 sang Gjerrild Nederskov (ØBF), 7/5 2 Udbygårde v/ Allingåbro (EH) og 5/6 2 Salten Langsø (HP).

Trækfugle: Moesgård Strand: 6/3 1 (NÅ) og 5/4 1 (GG) (begge MS). Fornæs: 3/4 3, 4/4 2 og 5/4 2 (DOF). Endvidere: 30/3 1 Gjerrild Station (DOF).

Sanglærke (*Alauda arvensis*).

Ingen overvintrende fugle er indrapporteret. De første fugle: 16/2 100 Tørring Mark v/ Ry og 50 Flirgårde v/ Ry (JK).

Moesgård Strand: 7074 trk. fugle er noteret mellem 23/2 og 3/5 med 29/2 4230N som max. (MS). Fornæs: 31/3-6/4 2239 trk. fugle (DOF).

Landsvale (*Hirundo rustica*).

De første: 13/4 1 Kysing Fjord (JF), 16/4 1N og 17/4 4 Moesgård Strand (NÅ) og 18/4 1 Skejby (JT). De sidste: 5/10 9 Hesselholm (LB), 5/10 5-6 og 14/10 1 Brabrand Sø (AJ,BHJ).

Bysvale (*Delichon urbica*).

De første: 2/5 1 Anholt (medd. NÅ), 3/5 1-2 Brabrand Sø (PM,ET), 3/5 1 Kysing Fjord (JF), 7/5 1 Brabrand Sø (JTL), 7/5 10 Anholt (NÅ) og 8/5 3 Brabrand Sø (AJ). De sidste: 3/9 5 Brabrand Sø (AJ).

Digesvale (*Riparia riparia*).

De første: 5/5 10 Anholt (NÅ), 7/5 1 Kysing Fjord (JF), 8/5 3 Brabrand Sø (AJ) og 11/5 20-25 Kalø (JJP). De sidste: 3/9 10-20

Brabrand Sø (AJ).

Pirol (*Oriolus oriolus*).

Tre fugle er indrapporteret: 7/5 1han Anholt (NÅ), 25/5 1han Tranebjerg Mose, Samsø (HHH,AJ) og 5-7/6 1 Kastrup Skov (PD).

Ravn (*Corvus corax*).

Ynglefugle: 1par Bistrup Skov v/ Randers (JTL), 1par Fløjstrup Skov - parret iøvrigt set regelmæssigt ved Moesgård Strand - (H+ JE, LNH, SBN, NÅ, FMS), 1par Hørret Skov (BHJ), 1par Katholm Skov (JTL), 1par Skårupgård Skov (PN, SS) og 1par Thorsager (JTL). Endvidere: 11/1 1 Lyngbygård Å (JTL), 18/2 3 Pindsmølle-dalen (FF), 24/2 1 Pinds Mølle (DOF), 2/3 1 Storskoven v/ Odder (SS), 25/3 1 Århus Å v/ motorvejen (JR), 29/3 1 Vilhelmsborg (BHJ), april 2 Trige Skov (SS), april 2 Lisbjerg Skov (SS), 1/4 1trk. Fornæs (DOF), 4/4 1N Moesgård Strand (MS), 7/4 1 Gjerrild (HP), 30/4 1 Tåstrup Sø (JTL), 2/5 1 Anholt (NÅ), 3/5 2S Storskoven v/ Brabrand Sø (PD), 6/5 1 Anholt (NÅ), 10/5 2N Moesgård Strand (MS), 12/5 1 Tåstrup Sø (JTL), 1/6 2 Kasted Mose (JTL), 6/8 1 Kysmose v/ Mundelstrup (PH, BHJ), 14/9 2 Malling (PH, BHJ), 3/10 2 Obstrup (BHJ), 3/10 1 Vilhelmsborg (BHJ), 14/11 2 Salten Langsø (JTL) og 5/12 1 Stjær (PM, ET).

Sortkrage (*Corvus corone corone*).

Mange iagttagelser: Moesgård Strand: 31/3 2N, 1/4 1N, 5/4 1N, 6/4 1N, 12/4 1N og 30/4 1N (MS). Fornæs: 31/3 7trk., 1/4 1trk. og 5/4 5trk. (DOF). Kysing Næs: 12/4 1N (PH, AJ, BHJ) og 27/9 1N (HP). Hørret: 21/4 1, 4/5 1, 11/5 1, 12/5 1 og 2/9 2 (BHJ). Derudover: 2/1 1 Kongslund v/ Randers (JRR), 7/4 1 Truevej, Brabrand (LAB), 17/4 1 Fløjstrup Skov (LAB), 3/5 1 Anholt (NÅ), 15/5 1 Kysing Fjord (JF), og 23/11 1 Hesselholm, Samsø (LB).

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*).

6/1 1 Klostermølle, Mossø og 7/12 1 Salten Langsø (DOF).

Se appendix III.

Skovskade (*Garrulus glandarius*).

Eneste større flok: 8/11 46 Salten Langsø (HF).

Pungmejse (*Remiz pendulinus*).

Se appendix I.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*).

Fra træklokaliteter: Moesgård Strand: 39 trk. ex. mellem 29/2 og 23/4 (MS). Fornæs: 30/3 4trk., 31/3 34trk., 1/4 30trk., 2/4 6trk., 3/4 6trk., 4/4 11trk., 5/4 10trk., og 6/4 6trk. (DOF). Anholt: 1/5 1, 2/5 1, 3/5 1N, 4/5 1, 7/5 2 og 8/5 2 (NÅ). Derudover: Salten Langsø: 1/3 3 (SS), 18/5 2 (SS), 5/6 1 sang (HP), 8/11 6 (HP), 9/11 2 (LNH), 16/11 2-3 (LNH,HP) og 19/11 2 (HP), samt: 22/3 2 Gjerrild (EH), 22/3 1 Udbyhøj (GF), 23/3 2 Brabrand Sø (HLL), ult. marts 1 sang Hou Strandskov (JT), 7/4 1NV Gjerrild Nordstrand (HP), 13/4 2 Nørreris (SMJ), 26/4 1 sang Gjerrild Nederskov (ØBF), 3/5 2 Brunmosen v/ Fjeld Skov (PN), 24/5 1 Thorsager (JTL), 2 ynglepar Vengsø (JTL), 25/6 6 Mossø (HLL), 12/7 1 Nordby,Samsø (LPJ), og 16/7 1 ynglepar Fjeld Skov v/ Marie Magdalene (PN),

Sjagger (*Turdus pilaris*).

Større flokke, samt en sen forårsfugl.

12/1 150 Århus Å (PM,ET), 2/2 100 Århus Å (PM,ET), 4/5 100 Anholt (NÅ), 26/10 min. 10000 Hesselholm,Samsø (LB), 8/11 177 Skanderborg Sø (HHH), 15/11 875 Brabrand Sø (HLL), 1/2 100 Århus Å (PM,ET), og 6/12 100 Århus Å (PM,ET). Forårsfuglen: 26/5 1 Nordby Plantage, Samsø (HHH,AJ).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*).

Ingen vinteriagttagelser. Den sidste: 16/11 1 Salten Langsø (HP).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*).

1-7/5 min. 3 fugle, 1han+2hun Anholt (NÅ) og 11/5 2han+2hun Moesgård Strand (MS).

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*).

Den første: 6/4 1 Kysing Fjord (JF).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*).

De første: 2/5 2 Anholt (NÅ).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*).

Ynglefugle: Århus; ca. 30 par indrapporteret (LAB,H+JE,FF,PH,HLL, SBN, PN,JT). Fannerup lpar (JJP), Løvenholm Skov lpar (LPJ), Moesgård lpar (FF), Skæring lpar (PH), Søften lpar (SMJ), Søsterhøj lpar (BHJ).

Træk: 11/5 2 Moesgård Strand (MS) og 6/9 7 Hassenør (LPJ). De første og de sidste: 20/4 1 hun Århus (JT), 20/4 1 han Vorsø (Jens Gregersen), 22/4 1 Brabrand (LAB), 14/9 1 Ajstrup (BHJ), 16/9 1 Søften (SMJ) og 20/9 1 Lushage, Samsø (LB).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*).

Ynglelokaliteter: Århus: Ankersgade 1par (HLL), Berggade 1par (NÅ), Brabrandstien v/ Vester Ringgade 1par (NÅ), Fredenstov 1par (AJ), Læssøesgade 1par (AJ,HLL), Viby Industrikvarter 2par (PH,BHJ), Århus Banegård 1par (HHH,AJ) og Århus Havn min. 5par (FF,CP,SS,NÅ). Desuden: Kolt 1par (HHH), Molslaboratoriet 1par - hannen, som var ungfuglefarvet immiterede både Torn- og Løvsanger! - (JK).

Træk: 1/5 1 Anholt (NÅ).

Nattergal (*Luscinia luscinia*).

De første: 14/5 1 sang Brabrand Sø (AJ), 15/5 1 sang Sorte Sø, Skanderborg (HHH), 17/5 1 sang Forsthaven, Århus (PH,BHJ), og 18/5 1 sang Moesgård Strand (NÅ).

Græshoppesanger (*Locustella naevia*).

10/5 1 sang Sorte Sø, Skanderborg (HHH), 15/5 2 sang Sorte Sø, Skanderborg (HHH), 17/5 1 sang Brabrand Sø (AJ), 20/5 2 sang Brabrand Sø (KH), 4/6 7 sang Bjerregrav Mose (ØBF), 4/6 1 sang Kasted Mose (CP), 10/6 1 sang Nielstrup v/ Auning (BH), 16/6 1 sang Kasted Mose (HB), 24/6 1 sang Sorte Sø, Skanderborg (HHH), 25/6 1 sang Mossø (HLL) og 30/7 1 Kysing Fjord (JF).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*).

De første: 10/5 2 sang Astrup Mose (HHH,AJ), 10/5 2 sang Brabrand Sø (BHJ), 10/5 2 sang Sorte Sø, Skanderborg (HHH), 13/5 1 Brabrand Sø (HLL) og 15/5 7 sang Sortesø, Skanderborg (HHH).

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*).

De første: 14/5 2 sang Astrup Mose (BHJ), 19/5 3 Brabrand Sø (HLL) og 21/5 1 sang Tre Broer v/ Brabrand Sø (NÅ).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*).

Fra følgende lokaliteter er arten indrapporteret: Brabrand Sø (FF, HHH,AJ,LPJ,HLL,SN,HP), Bjerregrav Mose (GG,BH,HP,JRR), Bredning v/ Gudenaen (JRR), Fannerup (JJP), Kolind (JJP), Kongslynd v/ Randers

(JRR), Kragemosen, Samsø (HHH,AJ), Kysmose v/ Mundelstrup (AJ), Nielstrup v/ Auning (EH), Smørmosen v/ Auning (EH), Sortesø, Skanderborg (HHH), Tranemosen, Samsø (HHH,AJ,LPJ), Kysing Fjord (LPJ), og Ramten-Dystrup Søer (LPJ).

Gulbug (*Hippolaris icterina*).

De første: 16/5 1 sang Brabrand Sø (AJ) og 22/5 1 Brabrand Sø (HLL) 22/5 1 Viby (PN), 22/5 1 sang Vorrevangens kolonihaver (NÅ).

Munk (*Sylvia atricapilla*).

Den første samt to vinteriagttagelser.

14/4 1 sang Forsthaven, Århus (PH), 1/12 1hun Århus Å (PM,ET) og 18/12 1 Holger Drachmannsvej, Århus (H+JE).

Havesanger (*Sylvia borin*).

Den første. 2/5 1 sang Hesselholm, Samsø (LB).

Tornsanger (*Sylvia communis*).

De første. 10/5 2 sang Astrup Mose (HHH,AJ), 11/5 2 Brabrand Sø (HLL) og 14/5 3 sang Astrup Mose (BHJ).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*).

De første. 2/5 1 Kysing Fjord (JF), 2/5 1 thingvallagade, Århus N (PM,ET), 3/5 1 sang Moesgård Strand (BHJ), 5/5 2 Nordre Kirkegård, Århus (PN), 6/5 2 Anholt (NÅ), 7/5 1 Brabrand Sø (JTL), 7/5 1 sang Rosenhøj (SBN) og 8/5 2 sang Brabrand Sø (AJ).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*).

De første. 15/4 1 hørt Vorsø (Jens Gregersen), 20/4 3 sang Brabrand Sø (AJ), og 22/4 2 sang Århus Å (PM,ET).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*).

DE første og de sidste.

30/3 1 sang Århus Stadion (AJ), 3/4 2 Fannerup Mølle (DOF), 4/4 2 sang Moesgård Strand (BHJ), 5/4 1 Kysing Fjord (LPJ), 5/4 3 Sønder-
skov v/ Haar (SMJ), 6/4 1 sang Ulstrup (SBN), 6/4 1 Fornæs (DOF).
9/10 1 sang Universitetsparken (SBN) og 10/10 1 Salten Langsø (LPJ).
Se ivotrigt appendix II.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*).

De første. 2/5 1 Århus Kommunehospital (PN), 4/5 1 sang Hørret Skov (BHJ) og 7/5 1 Anholt (NÅ).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*).

De første. 13/5 1 Marselisborg Slotspark (NÅ) og 17/5 1 Søften (SMJ).

Broget Fluesnapper (*Muscicapa hypoleuca hypoleuca*).

Først en meget tidlig fugl, derefter de øvrige første iagttagelser. 7/4 1 Brabrand Sø (LPJ), 2/5 1han Anholt (NÅ), 4/5 1han Anholt (NÅ), 4/5 1 Ankersgade, Århus (HLL), 6/5 1 Mjndeparken (PH, BHJ), 6/5 1 Forsthaven (PH, BHJ) og 6/5 1 Thingvallagade, Århus N (PM, ET)

Hvidhalset Fluesnapper (*Muscicapa albicollis*).

Se appendix I.

Mærkpiber (*Anthus campestris*).

9/7 1par fodrede 2juv Anholt (MSL) og 1-3/8 5-6juv Langør Kirke, Samsø (LB).

Skovpiber (*Anthus trivialis*).


De første. 3/5 1N Moesgård Strand (MS) og 10/5 1 Brabrand Sø (AJ).

Skærpiber (*Anthus spinoletta littoralis*).

Ynglefugle: 1par Stavns Fjord, Samsø (HHH, AJ). Øvrige: 8/2 2 Alrø (SS), 2/3 1 Alrø (SS), 16/3 1 Kysing Fjord (GG, HP), 22/3 1 hørt Fornæs (EH), 23/3 1 Alrø (GG), 31/3 1 Fornæs (DOF), 4/4 2 Fornæs (DOF), 5/4 2 Fornæs (DOF), 7/5 1 Anholt Havn (NÅ), 27/9 2 Kysing Næs (HP), 5/10 2 Kysing Næs (PH, BHJ), 12/10 2 Begtrup Røn (LNH), 18/10 1 Århus Havn (PH), 19/10 1 Kysing Næs (PH, BHJ), 15/11 2 Begtrup Røn (ØBF) og 12/12 2 Århus Havn (NÅ).

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba alba*).

Den første og de sidste. 13/3 1 Resenbro (LA, FC), 4/10 1 Krage-mosen, Samsø (LB) og 5/10 4 Brabrand Sø (AJ).



Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*).

Ynglefugle: Bodil Mølle (HHH,PH,BHJ), Giber Å (FF), Lyngbygård Å (CP,NÅ), Rue Møllesø (HHH), Salten Langsø (SS), Søbyvad Mølle (JTL), Tarskov Mølle (PH,AJ,BHJ), og Vilhelmsborg (BHJ). Øvrige: 3/2 1 Ludvigholm,Harlev (PM,ET), 13/3 1 Resenbro (LA,FC), 1/4 1 trk. Fornæs (DOF), 3/4 1 Fannerup Mølle (DOF), 4/4 3trk. Fornæs (DOF), 6/4 1trk. Fornæs (DOF), 12/4 1N Møsgård Strand (MS), 2/5 1 Tyreengen,Anholt (NÅ), 12/5 3 Århus Havn (NÅ), 16/9 1 Skovmøllen (PM,ET) og 11/10 1N Åbyhøj (PM,ET).

Gul Vipstjert (*Motacilla flava flava*).

De første. 23/4 2 Brabrand Sø (JR) og 29/4 2 Brabrand Sø (AJ).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*).

2/1 15 Schleppegrellsgade,Århus (HLL), 4/1 25 Schleppegrellsgade Århus (HLL), 5/1 15 Schleppegrellsgade,Århus (HLL), 7/1 75 Schleppegrellsgade,Århus (HLL), 9/1 50 Tandlægehøjskolen,Århus (JOA,MR),18/1 2 Vejlbj Nord (SS), 18/1 8 Årsager (SS), 19/1 60 Vejlbj (JTL), 2/2 24 Brabrand Sø (LPJ), 2/2 40 Århus Å (PM,ET), 4/2 35 Brabrand Sø (LPJ), 10/2 7 Brabrand Sø (LPJ), 11/2 42 Søndervangen Vibj (PH), 29/2 50 Vejlbj Nord (SS), 4/3 hørt Trøjbj,Århus N (JM), 5/3 hørt Brabrand Sø (LPJ), 6/3 47 Brabrand (JTL), 16/3 25 Brabrand (AK), 18/3 15 Silkeborgvej,Brabrand (LAB), 24/3 26 Brabrand Sø (AJ,AK), 26/3 2 Brabrand Sø (NÅ), 27/3 17 Brabrand

(JTL), 4/4 35 Norringure (SMJ) og 20/4 4 Brabrand Sø (AJ).

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*).

6-8/4 1 Hevring Hede (JoA,MR), 5/11 og 4/12 1 Kasted Mose (LLH) samt 3/3, 2/11 og 24/11 1 Salten Langsø (DOF,LPJ).

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*).

Ynglefugle: Brabrand Sø 1par (HLL,JR), Fjeld Skov 3par (PN), Jernhatten,Djursland 1par (JTL), Kysing Fjord 1-2par (JF,GG,HHH, AJ, CP,HP,SS), Nordby Hede,Samsø 1par (JTL), Pøt Mølle 1par (JoA,MR), Rolsøgård Skov 1par (JTL), Salten Langsø 1par (JTL,HP), Store Vorbjerg,Samsø 1par (LB), Støvringgård Skov 1par (JRR), Sødring Kær 1par (AJ), Sønderkoven,Haar 1par (SMJ), Trustrup, Djursland 1par (EH,JTL), Vrads Sande 1par (JAx), Åby Eng,Brabrand Sø 1par (AJ) og Ålsrode,Djursland 3par (JTL).

Øvrige: 7-8/5 1han Anholt (NÅ), 16/8 1juv Astrup Mose, 23/8 2juv Stubbe Sø (AJ), 24/8 1 Hesselholm,Samsø (LB), 27/8 2 Kare Holm (EH), 6/9 1S Hassensør (LPJ), 6/9 1 Hesselholm,Samsø (LB) og 13/9 1juv Kysing Næs (GG,HP).

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*).

10/1 2 Høegh Guldbergsgade,Århus (JoA,MR), 11/1 3 Høegh Guldbergsgade,Århus (JoA,MR), 15/3 1 Høegh Guldbergsgade,Århus (JoA,MR), 29/4 1 Ryomgård (PN), 23/5 1 Fussingø Skov (JRR), 2par Vengsø (JTL), 16/11 2 Salten Langsø (LNH) og 7/12 1 Adit (PM,ET).

Grønsisken (*Carduelis spinus*).

Ynglefugle: min. 2par Anholt (MSL).

Større flokke: 5/1 75 Rye Møllensø (HHH), 8/1 50 Søby Fredskov (AJ) 1/2 115 Brabrand Sø (AJ), 4/2 50-75 Hinnerup (JoA,MR), 6/2 50 Brabrand Sø (AJ), 8/2 265 Brabrand Sø (HLL), 12/2 50 Brabrand Sø (AJ), 16/2 95 Brabrand Sø (HLL), 18/2 79 Brabrand Sø (AJ), 29/2 109 Brabrand Sø (AJ), 10/3 145 Brabrand Sø (AJ), 20/3 50 Moesgård (NÅ), 3/4 100 Stubbe Sø (DOF), 20/4 125 Birksø,Ry (HHH), 1/5 55 Anholt (NÅ), 10/10 80 Skivholme Skov og 21/12 110 Brabrand Sø (AJ)

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*).

8/1 25 Horskær (AJ), 23/1 15 Brabrand Sø (HLL), 26/1 60-70 Åby eng,Brabrand Sø (AJ), 29/1 10 Storetorv,Århus (NÅ), 1/2 100 Eskelund,Brabrand Sø (AJ), 8/2 200 Århus Havn (SS), 12/2 1 Ankers-

gade, Århus (HLL), 12/2 14 Brabrand Sø (HLL), 15/3 20-25 Eskelund, Brabrand Sø (AJ), 1/4 12 Fornæs (DOF), 4/4 21 Fornæs (DOF), 5/4 30 Fornæs (DOF), 6/4 3 Fornæs (DOF), 11/10 20 Kysing Fjord (HP), 12/10 40 Begtrup Røn (LNH), 10/11 61-71 Brabrand Sø (AJ), 15/11 10 Brabrand Sø, 30/11 50 Brabrand Sø (AJ) og 12/12 50 Århus Havn (NÅ).

Gråsisken (*Carduelis flammae*).

Ingen racebestemmelser.

Ynglefugle: 1 fugl set flere gane i parringsflugt, Vrold, Skanderborg (GG), 3-5/5 ynglekald Anholt (NÅ) og 7/5 10 sang Anholt (NÅ).
 Øvrige: 4/1 10 Stubbe Sø (LNH), 5/1 5 Rye Møllersø (HHH), 6/1 2 Brabrand Sø (HLL), 1/2 10 Nordre Ringgade, Århus (NÅ), 5/2 75-100 Universitetsparken (JoA, MR), 12/2 9 Brabrand Sø (HLL), 12/2 9 Århus Kommunehospital (PN), 16/2 1 Brabrand Sø (HLL), 18/2 3 Brabrand Sø (AJ), 22/2 8 Brabrand Sø (AJ), 23/2 2N Moesgård Strand (MS), 29/2 14 Brabrand Sø (AJ), 1/3 1 hørt Brabrand Sø (AJ), 3/3 hørt Brabrand Sø (AJ), 6/3 3 Trøjborg, Århus N (JM), 27/3 50 Brabrand Sø (AJ), 31/3 2N Moesgård Strand (MS), 31/3 92trk. Fornæs (DOF), 1/4 47trk. Fornæs (DOF), 4/4 43trk. Fornæs (DOF), 5/4 1N Moesgård Strand (MS), 5/4 28trk. Fornæs (DOF), 6/4 22trk. Fornæs (DOF), 7/4 1SØ Gjerrild Nordstrand (HP), 12/4 4N Dragsmur, Helgenæs (LNH), 20/4 4 Birkesø, Ry (HHH), 22/4 4 Salten Langsø (NÅ), 5/10 1 Brabrand Sø (AJ) og 27/12 1 Løvenholm Skov (JRR). Endvidere er fugle set jævnligt vinter-forår og fra okt. ved Vrold, Skanderborg (GG).

Korsnæb sp. (*Loxia sp.*).

4/5 3 Fussingø Skov (JRR) og 15/5 6N Moesgård Strand (LNH).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*).

26/1 2 Ryomgård (PN), 31/3 12trk. Fornæs (DOF), 1/4 10trk. Fornæs (DOF), 2/4 10trk. Fornæs (DOF), 3/4 3trk. Fornæs (DOF), 4/4 19trk. Fornæs (DOF), 4/4 1han+1hun Frederikshåb, Samsø (LB), 5/4 9trk. Fornæs (DOF), 6/4 12trk. Fornæs (DOF), 12/4 1par Ellemandsbjerg, Helgenæs (LNH), 20/4 1par Birkesø, Ry (HHH), 26/4 4 Gjerrild (GF), 1/5 1juv han Anholt (NÅ), 3/5 45 Anholt (NÅ), 4/5 3 Anholt (NÅ), 4/5 6 Salten Langsø (DOF), 5/5 10 Anholt (NÅ), 7/5 17 Anholt (NÅ), 8/5 5 Anholt (NÅ), 25/5 2 sang Rolsøgård Skov (JTL), 19/6 1 Hjelm (KH), og 27/7 1 Mosfeld Plantage v/ Mesballe (PN).

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*).

Ialt 8-9 fugle fordelt på 5 obs.

31/3 4trk. Fornæs (DOF), 1/4 1trk. Fornæs (DOF), 5/4 2 Fornæs (DOF), 3/5 1 Anholt og 7/5 2 Anholt (begge NÅ).

Hortulan (*Emberiza hortulana*).

Se appendix II.

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*).

Flere obs. end sædvanligt.

Alrø: 23/2 1 (H+JE), 24/2 34 (AJ,LPJ), 2/3 75 (AJ), 5/3 8 (AJ), 10/3 38 (HHH), 12/3 21 (SS), 16/3 10 (AJ,LPJ) og 28/12 22 (AJ).
Derudover: 8/1 2 Egå (FC), 8/1 9 Horskær (AJ,LPJ), 13/1 13 Vild, Djursland (PN), 19/1 23 Vosnæsgård (SS), 12/2 27S Horskær (AJ,LPJ), 4/4 1 Fornæs (DOF), 12/10 4 Århus Havn (CP), 18/10 25 Kysing Næs (BHJ), 19/10 1 Kysing Næs (PH,BHJ), 24/10 1 Hørret Eng (BHJ), 9/11 2 Horskær (LPJ), 16/11 30 Kysing Fjord (LPJ), 23/11 300 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR) og 30/11 4 Århus Havn (CP).



APPENDIX I (Arter der kræver SU' godkendelse før offentliggørelse)

Rustand (*Tadorna ferruginea*).

20/4-året ud 1-2 gadekær i Beder, sikkert fangenskabsfugle (NÅ,FC).
10/5 1 hun Kysing Fjord (EH) pga datoen mulig vild, men arten er
alm. som fangenskabsfugl.

Islom/Hvidnæbbet Lom (*Gavia immer/adamsii*).

29/2 1V Moesgård Strand (MS).

Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*).

december 1 Horskær (LPJ).

Hvidøjjet And (*Aythya nyroca*).

11/12 1 juv Århus Havn (NÅ), og 21-31/12 1 han Moesgård Skovmølle
(PH,BHJ). I hvertfald den sidste er utvivlsomt undsluppen (udsat?)
fra fangenskab.

Pungmejse (*Remiz pendulinus*).

Maj-juni, par ved rede set et sted i amtet (NÅ,AJ,JTL,m.fl.) Reden
forladt muligvis pga forstyrrelser.

Hvidhalset Fluesnapper (*Muscicapa albicollis*).

6/5 1 han Anholt (NÅ)

7/5 1 han af racen (*M. a. semitorquata*) Anholt (NÅ).

APPENDIX II (Usædvanlige iagttagelser)

Grågås x Kanadagås (*A. anser x B. canadensis*)

17/2 (DOF) og 29/2 (Arne Kiis) 1 Mariager Fjord.

Atlingand (*Anas querquedula*).

20/10 ca. 50 Fussing Sø (PER). Ses sjældent efter sept. Kan anbefales forelagt SU.

Kongørn (*Aquila chrysaetos*).

2/5 1 ad. Stubbe Sø (LNH). Er meget sjælden i voksendragt hertil-
lands.

Skoggerdue (*Streptopelia risoria*).

19/5 1 Århus Sydhavn og 9/7 1 Århus Oliehavn (NÅ). Sikker undsluppen fangenskabsfugl. (Se Fitter, Heinzl og Parslow: Fuglene i Europa ect. for artsbestemmelsen).

Hortulan (*Emberiza hortulana*).

13/11 1 Kasted Mose (LLH). En meget sen fugl!

APPENDIX III (Iagttagelser fra 1979).

Lom sp. (*Gavia sp.*): 27/12 1 trk. Fornæs (JRR).

Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*): Vinter: 13/1 4 Århus Havn (PM,ET), 16/12 1 Brabrand Sø (PM,ET) og 70-85 ynglepar Emborg Odde, Mossø (Gf).

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*): 4-6/2 2 Risskov (NÅ)

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 4/6 8 Kolstermølle, Mossø (PM,ET), 23/8 2 Kysing Fjord (GG) og 105-130 ynglepar Emborg Odde, Mossø (Gf).

Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): 17+19/8 1 ad+3 juv Boels Rev (JRR), 18/8 20 Kysing Fjord (PM,ET), 23/8 2 Kysing Fjord (GG).

Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 5/6 2 NV Gudensø (PM,ET), 3/8 1 Brabrand Sø (GG), 16/8 64 v Alrø Poller (PM,ET), 17/8 14 Mariager Fjords udløb (JRR), og 14/10 45 Stubbe Sø (JTL).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): Nyt månedsmax. 10/11 28 Kysing Fjord (PM,ET).

Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 26/6 1 SSV Marselisborg Seminarium, 28/6 1 kredsede Lyagbygård Skov og 28/6 2 juv. @ Halgenæs kl. 09. 57. (alle JTL).

Knopsvane (*Cygnus olor*): 24/11 1088 Aistrup Bugt, Mariager Fjord og 29/12 202 Mariager Fjord (JRR).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 16/12 1 V Brabrand Sø (PM,ET), 16/12 2ad+3juv Lykkendalsvej, Brabrand (LAB), 28/12 140 Boels Rev (JRR), og 160 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR).

Knopsvane/Sangsvane (*Cygnus olor/cygnus*): 28/12 110 Randers Fjords udløb og 29/12 1800 Ajstrup Bugt (JRR).

Grå gås sp. (*Anser sp.*): 10/2 11 SV Kysing Fjord (PM,ET), 15/12 2 V Kongslund v/ Randers (JRR).

Grågås (*Anser anser*): 8/3 1 Århus å (PM,ET), 10/3 4 trk. Stubbe Sø (GF), 10/3 25 Udbyhøj (GF), 11/3 1 Brabrand Sø (GG), 10/5 6 Brabrand Sø (PM,ET), 19/6 1par m. 6 pull. Bjerregrav Mose (GG), 16/8 54, heraf 2 skudt Alrø Poller (PM,ET), 23/8 3 Kysing Fjord (GG), 10/11 17 Kysing Fjord (PM,ET).

Sædgås (*Anser fabalis*): 10/3 3 trk. Moesgård (GF), 24/3 1 trk. Gjerrild (GF) og 27/3 1 V Åbyhøj (JPL).

Knortegås (*Branta bernicla*): 10/3 4 trk. + 25 rast Udbyhøj (GF), 13/10 7 mørkbuget, 24/12 230 lysbuget, 31/12 20 mørkbuget og 420 lysbuget Randers Fjords udløb (JRR) og 29/12 590 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR).

Gravand (*Tadorna tadorna*): 7/1 1 Kysing Fjord (PM,ET), 29/5 7ad+2ad m. 9 pull. Tåstrup Sø (PM,ET), 16/9 262 Boels Rev, 13/10 166 Randers Fjords udløb og 24/11 710 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR).

Gråand (*Anas platyrhynchos*): Antal over 500: 10/2 900, 10/11 600, 21/11 700 Kysing Fjord (PM,ET), 25/11 550 og 26/12 450 Fussing Sø (JRR).

Krikand (*Anas crecca*): 26/4 48, 5/5 4 Døde å, Brabrand Sø, 18/8 35, 26/8 30, 10/11 26 og 21/11 20 Kysing Fjord samt 24/8 6 Kasted Mose og 5/11 1 Brabrand Sø (PM,ET).

Pibeand (*Anas penelope*): Antal over 100: 14/9 236 og 24/11 400 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR), 13/10 242 Randers Fjord (JRR), 10/11 340 og 21/11 400 Kysing Fjord (PM,ET).

Spidsand (*Anas acuta*): 11/6 1han Emborg Odde, Mossø (GF), 21/7 2 Råby Odde, Randers Fjord (JRR) og 10/11 2 Kysing Fjord (PM,ET).

Skeand (*Anas clypeata*): Brabrand Sø: 21/4 17 (GG), 26/4 13 og 27/4 8 (PM,ET). Emborg Odde, Mossø: 6/8 11 og 15/8 30-40 (GF). Kysing Fjord: 18/8 18 (PM,ET), 23/8 50 (GG), 26/8 12, 10/11 5 og 21/11 7 (PM,ET).

Bjergand (*Aythya marila*): 7/1 4 Ajstrup Strand, 13/1 5hanner Tangkrogen, Århus og 10/2 1hun Kysing Fjord (PM,ET).

Taffeland (*Aythya ferina*): Vinter: 13/1 62 Tangkrogen, Århus, 27/1 2hanner Århus Havn, 27/1 31hanner + flere hanner Kysing Fjord (PM,ET) og 26/12 8 Fussing Sø (JRR). Øvrige: Brabrand Sø: 15/3 36, 28/3 25, 26/4 1han, 5/5 1han og 29/5 1par (PM,ET). Kysing Fjord: 18/8 17 10/11 30hanner og 21/11 150 samt 29/5 1par Tåstrup Sø (PM,ET).

Troløand (*Aythya fuligula*): 13/1 133 Tangkrogen, Århus (PM,ET), 13/7 1hun m. 4 pull. Emborg Odde, Mossø (GF).

Hvinand (*Bucephala clangula*): 24/11 210 og 29/12 320 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): Enkelte supplerende obs: Brabrand Sø: 2/2 14 (PM,ET), 9/5 4 (GG) og 5/11 3hanner (PM,ET). 27/1 58 Århus Havn (PM,ET), 26/12 9 Fussing Sø og 29/12 2 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR), 31/12 110 Emborg Odde, Mossø (GF) og 10/3 7 trk. Udbyhøj (GF).

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): 13/1 1han Tangkrogen, Århus (PM,ET), 2/2 2 (GG), 10/2 1hun (PM,ET), Kysing Fjord og 15/3 1par Brabrand Sø (PM,ET).

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*): 10/11 1 mulig Kolindbro (PN).

Musvåge (*Buteo buteo*): 24/3 51 trk. Gjerrild og 24/3 330 NØ Jernhatten (GF).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): 15/9 1 Salten Langsø (GG), 2/10 1 Brabrand Sø (JTL), 21/10 5 S Helgenæs (JTL) og 24/11 1 Randers Fjords

udløb. (JRR).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 24/3 1 N Moesgård Strand (MS) bringer totalen op på 23 ex. i 1979.

Hvepsevåge (*Pernis apivorus*): 24/6 1 rast Brabrand Sø (JTL), 21/7 1 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 12/8 3 Ravn Sø (JTL), og 23/8 4 Kysing Fjord (GG).

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 16/8 1 ad han Alrø (PM,ET), 17/8 1 han Sødring Kær (JRR) og 18/8 1 han Kysing Fjord (PM,ET).

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 24/3 1 trk. Gjerrild (Gf) og 21/10 2 brune rast Helgenæs (JTL).

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 22/2 1 Viby (JTL), 28/6 1 Borum Stor-MOSE (JTL) og 23/8 1 Kysing Fjord (GG).

Spurvehøg (*Accipiter nisus*): 24/3 4 trk. Gjerrild (Gf) og 21/10 8 S Helgenæs (JTL).

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): 4/6 1 Salten Langsø (PM,ET).

Lærkefalk/Aftenfalk (*Falco subbutoe/vespertinus*): 18/8 1 juv Kysing Fjord (PM,ET).

Blishøne (*Fulica atra*): 24/11 1110 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR)

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): 21/7 148 og 24/11 6 Randers Fjords udløb (JRR).

Vibe (*Vanellus vanellus*): 28/2 5 Åby eng, Brabrand Sø (PM,ET) og 18/8 600 Kysing Fjord (PM,ET).

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): 16/8 9 ad+2 juv Alrø Poller (PM,ET).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): 16/8 10-15 Alrø Poller (PM, ET), 17/8 402, 19/8 346, 16/9 6 Boels Rev (JRR), 23/8 2 Kysing Fjord (GG), 14/9 1, 24/11 1 (årets sidste) Ajstrup Bugt, Mariager

Fjord (JRR) og 15/9 1 Randers Fjords udløb (JRR).

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): Fra efteråret juli og november obs. samt antal over 25: 21/7 14 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 18/8 45 lille plet, Mariager Fjord (JRR), 23/8 40 (GG), 26/8 31, 10/11 1 og 21/11 50 Kysing Fjord (PM,ET), og 10/11 22 Kolindbro (PN).

Stenvender (*Arenaria interpres*): 17/8 1, 16/9 3 Boels Rev og 15/9 1 Randers Fjords udløb (JRR).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Alle forårsobs samt efterårsobs over 5: 26/4 2, 5/5 2 (PM,ET), 9/5 3 (GG) Brabrand Sø, 13/6 4 og 19/6 3 Bjerregrav Mose (GG), 16/8 5-7 Alrø Poller (PM,ET), 17/8 10 Boels Rev (JRR), 18/8 4-5 (PM,ET), 23/8 30 (GG), 26/8 6 (PM,ET) Kysing Fjord, 25/9 15 (PM,ET) og 17/10 72 (NÅ) Brabrand Sø

Enkeltbekkasin (*Lymnocyptes minimus*): 17/10 3 Døde å, Brabrand Sø (NÅ).

Stor Regnspove (*Numenius arquata*): 25/3 2 Moesgård (GG), 16/8 2-3 Alrø (PM,ET), 18/8 7 (PM,ET), 23/8 5 (GG) Kysing Fjord og 13/10 1 Randers Fjords udløb (JRR).

Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*): 18/8 1 Kysing Fjord (PM,ET) & 15/9 2 (sent) Randers Fjord v/ Møllerup (JRR).

Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 26/4 1 Døde å, Brabrand Sø (PM,ET)

Lille Kobbersnepe (*Limosa lapponica*): 16/8 1 Alrø (PM,ET), 15/9 7 Randers Fjords udløb (JRR) og 16/9 8 Boels Rev (JRR).

Svaleklire (*Tringa ochropus*): 21/4 8 Brabrand Sø (GG), 19/6 1 Bjerregrav Mose (GG), 16/8 1-2 Alrø (PM,ET), 18/8 2-3 (PM,ET) og 23/8 3 (GG) Kysing Fjord.

Tinksmed (*Tringa glareola*): 9/5 8 Brabrand Sø (GG) og 17/8 3 Boels Rev (JRR).

Rødben (*Tringa totanus*): 27/1 4 rast-S Århus Havn (PM,ET) og 19/8 39 Boels Rev (JRR).

Sortklire (*Tringa erythropus*): 5/5 1 (PM,ET), 9/5 1 (GG), 7-8/6 2 (NÅ) Brabrand Sø, 17/8 1 Boels Rev (JRR), 18/8 1 (PM,ET) og 23/8 10 (GG) og 26/8 (PM,ET) Kysing Fjord.

Hvidklire (*Tringa nebularia*): Alt forår samt efterårsantal over 10: 5/5 2 Døde å, Brabrand Sø (PM,ET), 13/6 1 Bjerregrav Mose (GG), 16/8 13-17 Alrø (PM,ET), 17/8 15, 19/8 10 Boels Rev (JRR), 18/8 17 (PM,ET), 23/8 15 (GG) og 26/8 19 (PM,ET) Kysing Fjord.

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): Antal over 5. 9/5 25 Brabrand Sø (GG), 21/7 5 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 17/8 14 Boels Rev (JRR), 18/8 7 (PM,ET) og 23/8 10 (GG) og 26/8 8 (PM,ET) Kysing Fjord.

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*): 16/2 2 Alrø Poller (PM,ET), 17/8 1 19/8 3, 16/9 4 Boels Rev (JRR) og 23/8 4 Kysing Fjord (GG).

Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): Antal over 50. 21/7 160, 15/9 200 Randers Fjords udløb (JRR), 16/8 100 Alrø Poller (PM,ET), 17/8 311, 19/8 280 og 16/9 60 Boels Rev (JRR).

Krumnæbbet Ryle (*Calidris ferruginea*): 23/8 3 Kysing Fjord (GG).

Brushane (*Philomachus pugnax*): 23/8 25 Kysing Fjord (GG).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 24/2 og 16/4 1 3K Århus Havn (NÅ).

Dværgrmåge (*Larus minutus*): 1/9 1 Emborg Odde, Mossø (Gf).

Sortterne (*Chlidonias niger*): 30/5 1 Emborg Odde, Mossø (Gf).

Fjordterne (*Sterna hirundo*): 12/8 1-2 Brabrand Sø (PM,ET).

Huldue (*Columba oenas*): 24/3 1 trk. Jernhatten (Gf).

Ringdue (*Columba palumbus*): 18/10 15.332 trk. Sletterhage Fyr (JTL).

Kirkeugle (*Athene noctua*): Ynglepar i Herskind og Lyngby vest for Århus (JTL).

Skovhornugle (*Asio otus*): 11/3 15 og 22/5 1 Brabrand Sø og ynglepar

med 3-4 unger i Bjerregrav Mose (GG).

Mosehornugle (*Asio flammeus*): Ynglepar med 4-5 unger på lokalitet i amtet (xxx).

Mursejler: (*Apus apus*): Ny førsteobs: 15/5 2 Åby eng, Brabrand Sø (SBN)

Digesvale (*Riparia riparia*): Ny førsteobs: 26/4 2 Døde å, Brabrand Sø (PM,ET).

Ravn (*Corvus corax*): 17/7 2 Lyngbygård Ådal (JTL).

Sortkrage (*Corvus corone corone*): 24/3 4 N Moesgård (GG,Gf), 24/3 1 trk. Jernhatten (gf) og 21/11 1 Kysing Fjord (PM,ET).

Vandstær (*Cinclus cinclus*): 28/1 1 Skovmøllen, 10/2 1 Fulden, 25/2 2 Pinds Mølle (PM,ET) og 25/11 1 Glenstrup Sø (JRR).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 24/3 22 trk. Gjerrild (Gf), og 18/10 31 SSV Sletterhage Fyr (JTL).

Sjagger (*Turdus pilaris*): 18/10 545 SSV Sletterhage Fyr (JTL).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 21/10 1han Lushage, Helgenæs (JTL).

Nattergal (*Luscinia luscinia*): Ny første-obs. 15/5 3-4 Brabrand Sø SBN). 22/5 12 syngende Brabrand Sø og 13/6 40 syngende Bjerregrav Mose (GG).

Græshoppesanger (*Locustella naevia*): 22/5 1 sang Brabrand Sø (GG), 13/6 6 syngende og 19/6 10-11 syngende Bjerregrav Mose (GG,JTL). Dette giver en total på 16-18 syngende ex. i 1979.

Kærsanger (*Accrocephalus palustris*): Ny førsteobs. 16/5 1 sang Åby eng, Brabrand Sø (SBN).

Sivsanger (*Accrocephalus schoenobaenus*): 22/5 15 syngende Brabrand Sø og 13/6 + 19/6 3 syngende Bjerregrav Mose (GG).

Munk (*Sylvia atricapilla*): Ny førsteobs. 14/5 2 syngende Brabrand Sø (SBN).

Tornsanger (*Sylvia communis*): Ny førsteobs. 15/5 1 sang Åby eng, Brabrand Sø (SBN).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*): 6/12 1 Lykkendalsvej/Brabrand (LAB).

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): 29/7 1han+2juv Sletterhage Fyr (JTL).

Grønsisken (*Carduelis cannabina*): 18/10 811 S Sletterhage Fyr (JTL).

Bjerggirisk (*Carduelis flavirostris*): 13/10 10 Råby Odde, Randers Fjord (JRR) og 21/11 12 Kysing Fjord (PM,ET).

Gråsisken (*Carduelis flammea*): 5/8 1 Helgenæs, 18/10 52 S Sletterhage Fyr (JTL) og 20/12 5 Lykkendalsvej, Brabrand (LAB).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): 28/6 28 Borum Stormose (JTL).

Bogfinke (*Fringilla coelebs*): 18/10 9200 S Sletterhage Fyr (JTL).

Rørspury (*Emberiza schoeniclus*): 439 SSV Sletterhage Fyr (JTL).

Laplandsværling (*Calcarius lapponicus*): 18/10 1 Sletterhage Fyr (JTL).

Snespury (*Plectrophenax nivalis*): 10/2 7 Norsminde, 21/11 11 Kysing Fjord (PM,ET) og 24/12 6 Randers Fjords udløb (JRR).

APPENDIX IV (Liste over alle de fuglearter vi ønsker indrapporteret). Dette appendix er en liste over alle de fuglearter som vi ønsker indsendt til Rapportgruppen. Hvis der ikke er gjort bemærkninger ved en art, ønskes iagttagelser af tækkende og rastende fugle samt optællinger af ynglefuglebestandene på besøgte lokaliteter. Desuden ønskes alle første og sidste iagttagelser af rigtige trækfugle (f.eks. svaler) samt iagttagelser af almindelige arter i store koncentrationer eller på usædvanlige tidspunkter. På listen er udeladt en række sjældnere fugle, som det helt naturligt forventes indrapporteret. Tilsvarende for de meget sjældne (på SU-listen, se DOFT 74, 1980 3-4 side 128-129) fugle. I sidste ende er det naturligvis vort håb, at alle vil sende alt deres materiale ind.

Sortstrubet Lom
 Rødstrubet Lom
 Lom sp.
 Toppet Lappedykker (ynglefugle+ jan.,feb. og dec.)
 Gråstrubet Lappedykker
 Sorthalset Lappedykker
 Lille Lappedykker

Gruppe:

Stormfugle (alle arter)

Skarv (Indlandsiagttagelser)
 Fiskehejre (ynglefugle + jan.,feb. og dec.)
 Hvid Stork
 Sangsvane
 Pibesvane
 Grågås
 Blisgås
 Sædgås
 Kortnæbbet Gås
 Knortegås
 Bramgås
 Kanadagås
 Gravand
 Krikand
 Atlingand
 Knarand
 Pibeand
 Spidsand
 Skeand
 Taffeland
 Troland
 Bjergand
 Hvinand
 Havlit
 Fløjlsand (Indlandsiagttagelser)
 Sortand (Indlandsiagttagelser)
 Stor Skallesluger
 Toppet Skallesluger (Indlandsiagttagelser)
 Lille Skallesluger
 Musvåge (ynglefugle + trækiagttagelser)
 Fjeldvåge "Låddenbenet Musvåge"
 Rød Glente
 Hvepsevåge
 Rørhøg
 Blå Kærhøg
 Hedehøg
 Duehøg
 Spurvehøg (ynglefugle + trækiagttagelser)
 Fiskeørn
 Vandrefalk
 Lærkefalk
 Dværgefalk
 Tårnfalk (ynglefugle + trækiagttagelser)
 Vagtel
 Trane
 Vandrikse
 Plettet Rørvagtel
 Engsnarre

Gruppe:

Vadefugle (alle arter)

Almindelig Kjove

Sildemåge

Gråmåge

Dværgrmåge

Ride

Sortterne

Fjordterne

Havterne (ynglefugle + indlandsiagttagelser)

Dværgterne

Splitterne

Gruppe:

Alkefugle (alle arter og alkefugl sp.)

Huldue

Kirkeugle

Natugle

Skovhornugle

Mosehornugle

Natravn

Isfugl

Grønspytte

Vendehals

Toplærke

Hedelærke

Bjerglærke

Pirol

Ravn

Sortkrage

Nøddekrige

Halemejse

Vandstær

Misteldrossel

Ringdrossel

Rødstjert

Husrødstjert

Græshoppesanger

Drosselrørsanger

Sivsanger

Munk (jan., feb., marts, nov. og dec.)

Skovsanger

Skærpiber

Bjergvipstjert

Silkehale

Stor Tornskade

Rødrygget Tornskade

Gråsisken

Tornirisk (jan., feb., nov. og dec.)

Bjergirisk

Lille Korsnab

Snespurv

LITTERATUR.

Sørvæn 1-1973: Efterårsrapport 1972 fra Århus Amt.

- 2-1973: Lokalrapporten.

- 1974: Lokalrapporten 2:73.

- 1-1975: Lokalrapport 1974

- 2-1975: Lokalrapport 1.1.-30.6. 1975.

- 1-1976: Lokalrapport 1.7.-31.12 1975.

- 2-1976: Lokalrapport 1.1.-30.6. 1976.

Lokalrapporten 1.7.-31.12. 1976 (duplikeret rapport)

- 1977 (duplikeret rapport)

- 1978 (duplikeret rapport)

- 1979 (duplikeret rapport)

P.t er følgende rapporter udsolgt, men søges genoptrykt ved et vist antal bestillinger, Lokalrapporterne 1.7.-31.12. 1976, 1977 og 1978.