


LOKALRAPPORTEN 1981

ÅRHUS AMT

DEL 1



INDHOLD

Del I	side	1-68
Indledning (Allan Janniche)	side	3
Behandling af materialet (Allan Janniche)	side	4-5
Retningslinier for indsendelse af materiale (Rapportgruppen)	side	5-6
Specialundersøgelser (Allan Janniche)	side	7-9
Bidragydere (Allan Janniche)	side	9-10
Rettelser (Rapportgruppen m.fl.)	side	10
Artsgennemgang, Lommer-Stor Regnspove	side	11-67
Lommer-storke (Hans Henrik Høj)	side	11-19
Svaner, gæs, svømmeænder (Jørgen Franck)	side	19-29
Dykænder, skalleslugere (Per Henriksen)	side	29-40
Ørne-Hvæpsevåge (Henning Lykke Larsen)	side	40-43
Kærhøge-falke (Jean Rasmussen)	side	44-51
Hønsefugle-vandhøns (Bjarke Huus Jensen)	side	51-53
Vadefugle- Stor Regnspove (Allan Janniche)	side	53-67
Biologiske tidsskrifter (Allan Janniche)	side	68
 Del II	side	69-140
Artsgennemgang, Lille Regnspove-værlinger	side	71-131
Lille Regnspove-alkefugle (Allan Janniche)	side	71-97
Duer-svaler (Bjarke Huus Jensen)	side	98-107
Pirrol-drosselfugle (Niels Aagaard)	side	107-116
Sangere (John R Rasmussen)	side	116-120
Fluesnappere-værlinger (Henning Ettrup)	side	120-131
Appendix I (Niels Aagaard)	side	132
Appendix II (Niels Aagaard, Allan Janniche m.fl.)	side	133-139
Litteratur	side	140

Redaktion: Rapportgruppen

Renskrivning: Hanne Eriksen

Lay-out: Allan Janniche

Tegninger: Erik Hørning

Tryk: Poul Bruun

Rapportgruppen, juni 1982:

Niels Aagaard, Henning Ettrup, Jørgen Franck, Per Henriksen, Allan Janniche, Bjarke Huus Jensen, Henning Lykke Larsen, Jean Rasmussen og John R. Rasmussen.

Kontaktadresse: Rapportgruppen, DOF/Århus Amt Viborgvej 29 8000 Århus C.

Kontakttelefon: Niels Aagaard 06 124151.

Kontakt til landsrapportgruppen: Niels Aagaard.

INDLEDNING

Så er vi igen klar med en lokalrapport for Aarhus amt. Denne gang gælder det år 1981. Også denne gang i kraftig ekspansion som gerne må stige endnu en tand!

At rapporten allerede er på gaden skyldes, at vi nu er 10 personer til at behandle materialet, og at Hanne Eriksen meget hurtigt har renskrevet rapporten.

Medarbejderstaben omkring 1981-rapporten er anderledes end ved 1980-rapporten. Jørgen Axelsen er rejst til USA for at studere, og Hans Christian Andersen er trådt tilbage. Efter denne rapport træder også Hans Henrik Høj tilbage. De nye, som blev budt velkommen med en stor arbejdsbyrde, er Hanne Eriksen, Henning Ettrup, Per Henriksen, Bjarke Huus Jensen og John R. Rasmussen. Til denne rapport har Erik Hørning udført en række dejlige tegninger.

Som det fremgår har rapporten ændret udseende i et vist omfang. Det helt utrolig store materiale har betydet, at vi måtte dele rapporten i to dele af hensyn til foldning og hæftning. Desuden er der nogle ændringer i artsgennemgangen, som er omtalt under behandlingen af materialet. Desværre er det nok endnu ikke helt lykkedes at skabe tilstrækkeligt overblik i behandlingen af de enkelte arter. Dette problem og mange andre er noget vi diskuterer på nogle ofte stormfulde møder i gruppen. I løbet af denne sæson håber vi at nå en afklaring på forholdene, så vi med 1982-rapporten når et stabilt leje, hvor vi kan opholde os over en årrække.

Til 1980-rapporten er der nogle rettelser, som bringes umiddelbart efter de indledende afsnit, men ellers går det slag i slag med artsgennemgangen og de sædvanlige appendices. Et forhold som bør nævnes, er, at iagttagelser fra en del af Viborg amt er medtaget, uden vi dog har fået gjort opmærksom på dette de enkelte steder. Det er dog ret let at komme uden om, da det kun er Beld Hansen, Kjellerup og Henning Pedersen, Tapdrup, der har sendt materiale ind fra Viborg amt. Disse personer har kun iagttagelser fra Viborg amt. Fremover vil der også være en klar ordning på dette forhold.

Tilbage er kun at takke de ca. 75 bidragsydere for det tilsendte material og ønske god fornøjelse med læsningen af rapporten.

BEHANDLING AF MATERIALET

I væsentlighed følger vi samme behandlingsform som ved 1980-rapporten.

Hyppighed

Igen i år har vi benyttet en række betegnelser for arternes hyppighed som ynglefugle og som træk-, sommer- og/eller vintergæster. Hyppighederne dækker over følgende betegnelser:

Meget sjælden	1-2 par eller individer
Sjælden	3-10
Fåtallig	11-100
Ret almindelig	101-1001
Almindelig	1001-10000
Meget almindelig	>10000

De benyttede hyppigheder dækker over det indsamlede materiales omfang, men hvor der skønnes at være tale om en større hyppighed, har den enkelte medarbejder desuden fremsat et formodet skøn. Det kan f.eks. være gjort i en parentes. I øvrigt har vi i videst muligt omfang fulgt Dybbro, 1978.

Efter den egentlige oversigt har den enkelte medarbejder evt. givet sine kommentarer til årets iagttagelser. Herefter er der i de tilfælde, hvor det indsendte materiale ikke er medtaget i fuldt omfang, gjort opmærksom på dette og hvilke "grænser", der er benyttet. Efter dette kommer opremsningerne af iagttagelserne, som er delt i yngleiagttagelser og hvad man kan kalde "almindelige" iagttagelser. For en række arter er der som noget nyt fremstillet kurver og tabeller. Kurverne er uens fremstillet, og der må henvises til de enkelte figurtekster. Endelig er der for en række arter givet et resume af forekomsterne de sidste 4-5 år, i enkelte tilfælde helt tilbage til 1972. Dette resume bygger alene på det til lokalrapporten indsendte materiale. Til sidst vil der evt. være henvisninger til de forskellige appendices.

I appendix I er alle de iagttagelser, som skal forelægges DOP's Sjældenhedsudvalg medtaget. Godkendte iagttagelser vil være forsynet med en * og vil alt efter tidspunkt for afgørelsen, enten være opført i selve rapporten eller i det følgende års lokalrapport i appendix II. I de tilfælde, hvor iagttagelser forkastes, behandles de ikke yderligere.

Appendix II er en opsamling af alle de iagttagelser, som ikke tidligere har været offentliggjort i lokalrapporter for Aarhus amt, siden de officielt blev fremstillet i DOF's regi fra efteråret 1972. (se Søravnen 1/73).



RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE AF MATERIALE

Det har naturligvis rapportgruppens interesse at alle iagttagelser indsendes. Hvordan det så skal behandles og arkiveres må blive et problem for de personer, som sidder i rapportgruppen.

Da det næppe er realistisk, at vi kan få alle iagttagelser ind fra bidragsyderne, har vi udarbejdet en liste med 53 indsamlingsarter, om hvilke vi ønsker alle enkelt-iagttagelser. Foruden at indsende alle enkelt-iagttagelser af indsamlingsarterne, forventer vi alle iagttagelser af SU-arterne og sjældne østjyske arter indsendt.

Når materialet indsendes er det vigtigt, at en række retningslinier overholdes. Det er følgende:

1. Observationerne skal opføres artsvis.
2. Der må kun skrives på den ene side af papiret.
3. Ved indsamlingsarterne skal alle enkelt-iagttagelser indsendes.
4. Hver enkelt iagttagelse noteres i rækkefølgen:
art, dato, antal, køn, lokalitet, opførsel/bemærkninger, evt. medobservatør (aldersangivelser skal følge kalenderåret, se DOFT 74, 1980 3-4 p. 89-90).
5. Alle usædvanlige iagttagelser vedlægges dokumentation.
6. Ved iagttagelser af SU-arter samt iagttagelser af storke, ørne, glenter, Hedehøg, Fiskeørn, falke (-Tårnfalk) og Trane noteres klokkeslet så præcist som muligt.

Vi vil gerne slå fast, at principielt bør alle iagttagelser indsendes, også af de almindelige fugle. Kan dette ikke overkommes bør i det mindste følgende indsendes:

Alle iagttagelser af SU-arterne

Alle iagttagelser af sjældne østjyske fuglearter

Alle enkelt-iagttagelser af følgende indsamlingsarter (alle enkelt-iagttagelserne vil blive offentliggjort i 1982-rapporten):

Lom sp.	Strandhjejle	Kirkeugle
Gråstrubet Lappedykker	Hjejle	Ravn
Sorthalset Lappedykker	Enkeltbekkasin	Halemejse
Sangsvane	Skovsneppe	Vandstær
Grågås	Stor Regnspove	Misteldrossel
Knortegås	Lille Regnspove	Stenpikker
Krikand	Lille Kobbersneppe	Rødstjert
Spidsand	Sortklire,	Sivsanger
Skeand	Islandsk Ryle	Skovsanger
Bjergand	Dværgryle	Skærpiber
Fløjlsand	Temmincksryle	Bjergvipstjert
Sortand	Krumnæbbet Ryle	Gul Vipstjert
Fjeldvåge (Låddenbenet Musvåge)	Brushane	Silkehale
Hvepsevåge	Ride	Stor Tornskade
Rørhøg	Fjordterne	Rødrygget Tornskade
Blå Kærhøg	Dværgterne	Gråsisken
Duehøg	Alkefugl sp.	Bjergirisk
Vandrikse	Huldue	Snespurv

Alle første og sidste iagttagelser af trækfugle. Herudover hvad man ellers kan overkomme.

Endelig H U S K at indsendelsesfristen til 1982-rapporten er

1. februar 1983

hvis materialet skal nå at komme med til tiden

SPECIALUNDERSØGELSER

Naturlokaliteter

Mørke Kær

I Gejrfuglen, 17. årg. nr. 2, bragte vi en større artikel om Bjerregrav Mose. Det er meningen, at Østjysk Biologisk Forening i år vil lave en tilsvarende undersøgelse over Mørke Kær ved Rosenholm nord for Aarhus og publicere resultaterne i oktobernummeret af bladet. Har du derfor oplysninger om eller fra denne spændende moselokalitet, vil vi meget gerne have disse tilsendt inden 1. oktober 1982. Alt har interesse - undersøgelsen drejer sig ikke kun om fuglelivet!

Ønsker du selv at deltage i indsamlingen af oplysninger om lokaliteten samt i årets feltarbejde, hører vi naturligvis også gerne fra dig. Stof samt eventuelle forespørgsler kan sendes til

Søren Højager
Mejløvænget 4
8381 Mundelstrup

Kasted Mose

Siden sidste supplement til hovedartiklen om Kasted Mose (Gejrfuglen, 8. årg. nr. 2) er der gjort en del spændende iagttagelser i mosen, især er der i 1980 set en del for lokaliteten sjældne vadefuglearter (iflg. DOF's lokalrapport). Med henblik på et nyt supplement i december - nummeret af Gejrfuglen vil jeg gerne have oplysninger fra perioden dec. 1975 - sept. 1982 tilsendt inden 1. nov. 1982. Iagttagelser af padder og krybdyr, fugle og pattedyr samt fund af "nye" planter har interesse. Materialet bedes indsendt til

Søren Højager
Mejløvænget 4
8381 Mundelstrup

Brabrand Sø

Alle iagttagelser af fugle indsamles af

Allan Janniche
Langenæs Alle 72
8000 Aarhus C

Moesgård Strand

Alle iagttagelser af fugletrækket ved Moesgård Strand i foråret 1982 indsamles af

Hans Pinstrup
Kjeldsensgade 13
8700 Horsens
tlf: 05 - 61 11 73

Der fremstilles en årlig rapport over trækket, som kan erhverves for kr. 10,-.

Artsundersøgelser

Rørhøg

Artiklen om Rørhøgens yngle- og trækforhold i Aarhus amt bringes i nr. 3/82 eller 4/82 af Søravnen. Ingen har hidtil reageret på opfordringen, og det må forventes, at artiklen ud fra det forhånden værende materiale, ikke kan belyse de faktiske forhold. Materiale kan dog inden 1. sept. 1982 indsendes til

Rapportgruppen
DOF
Viborgvej 29
8000 Aarhus C - mærket Rørhøg.

Hedelærke og Guldpirol

Med henblik på en kortlægning af de to arters udbredelse m.m. i Aarhus amt, modtages alle iagttagelser. Da arterne er sjældne i amtet har såvel nye som ældre enkeltfund interesse. Send venligst oplysninger til undertegnede senest 1/6 1982, men meget gerne før, da jeg i år vil undersøge ældre ynglepladser for arterne i amtet.

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 67A
8220 Brabrand
tlf: 06 - 26 12 96

Ugler vest for Aarhus

I området, der ca. afgrænses af byerne Stavtrup-Tåstrup i syd og Kasted-Skivholme i nord, har jeg siden 1975 undersøgt uglebestanden.

Eftersom undersøgelsen påtænkes afsluttet i 1982 modtages alle såvel nye som gamle iagttagelser af ugler fra dette område. Kort sagt: Alt om ugler fra området!! Modtages venligst senest 1/8 1982.

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 67A
8220 Brabrand
tlf: 06 - 26 12 96

BIDRAGSYDERE

Bidragssydere, Lokalrapporten for Aarhus amt 1981:

Niels Aagaard (NÅ), Lars Abrahamsen (LA), Henning Andersen, Rønde (HA), Jørgen Ballegård, Bryrup (JB), Lars Borup, Brabrand (LaB), Henrik Brandt (HB), Leif Brauer, Værløse (LB), Torben Bøgeskov, Hadsten, Jacob Bønløkke, Højbjerg, Liselone Callesen (LC), Flemming Christensen, (FC), Hans Christoffersen, Ålborg (HC), Rolf Danielsen, Risskov (RD), Henning Elgaard, Højbjerg (HE), Hanne og Jens Eriksen (H+JE), Mogens Erlandsen, Silkeborg (ME), Henning Ettrup, Abyhøj (HET), Flemming Falk, Floes ved Randers (FFa), Dansk Ornithologisk Forenings ekskursioner (DOF), Østjysk Biologisk Forenings ekskursioner (ØBF), Jørgen Franck, Brabrand (JF), Finn Frandsen (FF), Ole Frederiksen, Alsrode (ØF), Gejrfuglen, Østjysk Biologisk Forenings medlemsblad (Gejrf), Jens Gregersen (JG), Georg Guldvang, Skanderborg (GG), Poul Hald-Mortensen, København (PH-M), Keld Hansen, Kjellerup (KeH), Kjeld Hansen, Brabrand (KjH), Knud Erik Hansen, Randers (KEH), Lars Hansen, Risskov

(LH), Kel Henriksen, Abyhøj (KHe), Per Henriksen, Viby (PH), Bjørn Holmskjold, Skivholme (BH), Hans Henrik Høj, Skanderborg (HHH), Søren Højager, Mundelstrup (SH), Erik Hørning, Brabrand (EH), Allan Janniche (AJ), Lars Peter Johansson, Risskov (LPJ), Bjarke Huus Jensen, Mårslet (BHJ), Dinna Lønbæk Jensen, Horsens (DLJ), Jørgen og Viggo Mahler Jensen, Brande (J+VMJ), Svend Møller Jensen, Hinnerup (SMJ), Peder Jacob Jørgensen (PJJ), Jan Drachmann Kristensen, Hinnerup (JDK), Kirsten Ladefoged, Risskov (KL), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Terp Laursen, Brabrand (JTL), John Loft, Stautrup (JoL), Flemming Lundberg, Mårslet (FL), Jesper Madsen (JM), Moesgård 1981, trykt rapport (Moes), Knud Erik Mortensen, Ørting (KEM), Mosegruppen, bestående af LC, BH, AJ, LPJ, HM (Mgr), Hanne Møller, Brabrand (NM), Hans Ulrik Skotte Møller, København (HUSM), Peter Nielsen, Hinnerup (PN), Peder Nygaard Nielsen (PNN), Erik Tangaard Nielsen, Brabrand (ETN), Carsten Olsen, Grenå (CO), Henning Pedersen, Tapdrup (HeP), Jesper Juel Pedersen, Ryomgård (JJP), Claus Quist Pedersen (CQP), Hans Pinstrup, Horsens (HP), Knud Poulsen, Anders Rasmussen, Jean Rasmussen (JR), Per E. Rasmussen, Fussingø Vandmølle (PER), Birger R. Rasmussen, Randers (BRR), John R. Rasmussen, Randers (JRR), Olaf Sandberg, Abyhøj, Jan og Jacob Silberg, Silkeborg, Studielejren på Nord-Djursland, Påsken 1981 (Stl), Johannes Sørensen, Malling, Ole Sørensen, Gedved (OS), Eigil Thomasen, Dørup (ET), Pia Morsing Thomasen, Dørup (PMT), Niklas Tångeberg (NT).

RETTELSER

Rettelser til lokalrapporten for 1980

Følgende bidragsydere var gledet ud, hvilket vi beklager og undskylder: Lars Abrahamsén (LA), Flemming Christensen (FC), Hanne og Jens Eriksen (H+JE), Georg Guldvang (GG), Kjeld Hansen (KH), Jens Kirkeby (JK).

Rødstrubet Lom: 21/12 1 Kysing Fjord rettes til "7/12..."

Grågåas sp: 18/12 9 SV Aby Eng.... (lokalitetsnavn manglede)

Sædgåas: 27/9 28 Tjele, Viborg amt (dato manglede)

Bramgåas: 17-19/6 2 Hjelm (lokalitetsnavn manglede)

Rød Glente: 4/5 1 Kysing Fjord (JF) (observatørnavn manglede)

Sort Glente: 3/5 1 Anholt rettes til "1/5..."

Rødben: Brabrand Sø: 30/5 5 - 23/7 1 rettes til "30/3....."

Skovhornugle: 26/10 1 juv. Salten Langsø (HB) rettes til "16/6 3 juv. Kasted Mose (BH)."

Sjagger: 1/2 100 Aarhus A rettes til "1/12..."

Bjergvipstjert: 12/5 3 Aarhus Havn rettes til "12/12...."

ARTSGENNEMGANG

Lom sp (Gavia sp)

Fornæs: 29/3 2 trk (EH), 5/4 1 rast (JRR, BRR, KEH), 7/4 1 (NT), 13/4 2 trk (St1), 17/4 8 trk (St1), 19/4 2 trk (St1), 27/9 7 (CO), 3/10 6 N (CO), 10/10 1 N (CO), 11/10 9 trk (HLL), 25/10 1 N + 1 S + 1 rast (CO), 8/11 12 N + 1 S (CO), 21/11 5 S (JRR, BRR, KEH).

Øvrige: 2/1 1 Kysing Fjord (CQP), 10/1 1 S Moesgård Strand (Moes), 8/3 1 N Moesgård Strand (Moes), 9/3 1 S Moesgård Strand (Moes), 3/10 1 Hassensør (ØBF), 18/10 1 S + 2 SØ + 1 N Kysing Næs (BHJ, PH, FL, HP), 29/12 1-2 Vejrhø (PM, ET).

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Fornæs: 29/3 2 trk (EH), 5/4 1 rast (JRR, BRR, KEH), 7/4 1 (NT), 13/4 2 (St1), 17/4 8 (St1), 19/4 2 (St1), 10/10 1 N (CO), 11/10 1 trk (HLL).

Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii)

Se appendix II 1974 og 1979.

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Fornæs: 29/3 1 trk (EH), 13/4 1 (St1), 17/4 2 (St1), 18/4 1 (St1), 19/4 1 (St1).

Lappedykker sp (Podiceps sp)

8/3 1 rast Moesgård Strand (Moes).

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

Ret almindelig yngletrækfugl. Desværre mangler der oplysninger om bestanden i Søhøjlandet, hvor arten har sin hovedudbredelse. Fåtalig ynglestandfugl/vintergæst.

Ynglefund med antal par:

Borum Stormose 1 (SH, JTL), Bjerregrav Mose 10 (Gejrf), Brabrand Sø ca. 50 (AJ, KHe), Grauballe Mose 0-1 (HM, BH, IRL, AJ, IC, Mar), Lading Sø

5-6 (BH), Lysemose 1 (HM, BH, LPJ, AJ, Mgr), Ramten-Dystrup Søer 6 (OS), Silkeborg Langsø 6-7 (ME), Skarresø 1 (Mgr), Stubbe Sø "yngler"?, sø NV for Stubbe Sø 1 (BHJ), Solbjerg Sø 26 (BHJ), Søbygård Sø 6-7 (BH, AJ), Tåstrup Sø 3 (AJ), Vallum Sø 3-4 (JJP, Mgr), Østerby Mose 1 (BHJ, PH).

Større flokke (over 100 ex.):

13/4 576 Mossø (HHH), 14/4 400-500 Mossø (HHH), 15/4 162 Glenstrup Sø (JRR, BRR), 25/4 595 Mossø (HHH, JK), 29/8 274 Glenstrup Sø (JRR, BRR), 6/9 210 Sødbring Kær (HLL).

Vinterobs:

2/1 1 N Moesgård Strand (Moes), 7/1 2 Skanderborg Sø (HHH), 11/1 20 Mossø (HP), 4/2 1 Brabrand Sø (AJ), 5/2 3 Brabrand Sø (AJ), 4/12 5 Fussingsø (PER), 5/12 7 Solbjerg Sø (BHJ, PH, FL), 6/12 1 Gudensø (DOF) + 14 Mossø (DOF) + 4 Solbjerg Sø (FL), 9/12 1 Aarhus Havn (NA).

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena)

Fåtalig yngletrækfugl (marts/april-juli/nov) og trækøst (marts/april og juli/nov). Sjælden vintergæst.

Sikre ynglelokaliteter (ynglefund) med antal par:

Mergelgrav v. Borum 1 (JTL), Dystrup-Ramten Søer 1 (GG, OS), Galten Gammelmose 1 (BH), Hesselballe 1 (NT), Kysmose v. Mundelstrup 1 (JTL), Lysemose 2 (LC, HM, AJ, BH, LPJ, Mgr), Mørke Kær 1 (JTL), Rønbæksøen v. Hinnerup 2 (PN, SMJ), Skaføgård Sø 3 (JTL), sø NV f. Stubbe Sø 1 (BHJ), vandhul v. Trige 1 (HB), Østerby Mose (BHJ, PH).

Sandsynlige ynglelokaliteter (fugle set i yngletiden - maj/juli - i mulig ynglebiotop) med antal individer:

Amstrup Mose 1 (KHe), Borum Stormose 1 (SH), Bjerregrav Mose 2 (Mgr), Frederiksdal Hede 2 (ME), Tavlbord Mose 1 (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), Udbyover Sø 3 (JRR), Vr. Velling 3 (JTL), Galten Sømose 1 (BH), Hesselholm, Samsø 1 (LB), Lading Sø 1 (AJ, BH), Tranemose, Samsø 2 (LB, DOF), Tåstrup Sø 1 (AJ).

Alle daterede iagttagelser nævnes:

Galten Gammelmose: 3+9/4 2, 13+18/5 2, 1/6 2, 20/6 6, 2/7 5 (alle obs BH).

Galten Sømose: 3+9/4 2, 13+18/5 1, 1+20/6 1, 2/7 1 (alle obs BH).

Hesselholm, Samsø: 20/6 1, 19+28/7 1, 30/8 3, 19+29/9 1 (alle obs LB).

Kysing Fjord: 9+12/7 2, 18/7 1, 23/8 1 (alle obs JF). Ramten-Dystrup Søer: 29/3 1 (JRR), 13/4 1 (St1), 15/4 1 (HP), 17/4 3 (HP), 25/4 2 (DOF).

Rønbæksøen, Hinnerup: 22/3 1 par (SMJ), 23/3 2 par (PN, SMJ), 9/4 3 (PN), 11/5 2 par m. pulli (PN), 27/8 1 par m. 1 juv. (SMJ). Tranemose,

Samsø: 16/3 2 (LB), 13+14+16/4 1 (LB), 18/4 2 (LB), 20/4 4 (AJ), 8/5 2 (LB), 28/5 2 (DOF). Østerby Mose: 2/2 1 (BHJ), 1/3 1 (DOF), 2/3 1 (DOF).

Næs (HLL), 22/3 1 Alling Sø (ME), 1/4 1 Astrup Mose (BHJ, FL), 7/4 3 Sølund (JDK), 19/4 1 Fornæs (Stl) + 1 Østre Hedekrog, Samsø (LB), 20/4 1 Hattemager Skov (SMJ), 25/4 1 Mørke Kær (DOF), 6/5 2 Bjerregrav Mose (Mgr), 2/5 1 Tåstrup Sø (AJ), 10/5 1 Borum Stormose (SH) + 2 Kysmose (SH) 12/5 1 Lading Sø (AJ, BH), 15/5 1 Lading Sø (BH), 17/5 1 par + 1 ad. Udbyover Sø (JRR), 23/5 1 Tavlbord Mose (Mgr), juni 3 par Skaføgård Sø (JTL), 6/6 1 Mørke Kær (JTL), 8/6 1 Udbyover Sø (JRR), 10/6 1 Mørke Kær (JTL), 13/6 2 par (Mgr), 20/6 2 Frederiksdal Hede (ME), 19/7 1 par + 1 ad. Mose v. Vr. Velling (JTL), 22/7 1 Amstrup Mose (KHe), 17/8 1 juv. Gedding Sø (JR), 18/10 1 S Kysing Næs (BHJ, PH, FL, HP), 22/11 1 S Fornæs (CO), 5/12 1 Solbjerg Sø (BHJ, PH).

Se appendix II 1980.

Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus)

Meget sjælden trækgæst, dog regelmæssig med 1-2 iagttagelser hvert år. Denne gang et sent indlandsobs (oversomrende ex?): 17/5 1 ad. Udbyover Sø (JRR).

Se appendix II 1980.

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Ret almindelig, men meget spredt yngletrækfugl (marts/april-aug/nov). Fåtalig sommergæst (maj/juli) - blandt disse obs skjuler sig sikkert enkelte ynglefugle. Sjælden-fåtalig trækgæst (april og aug/nov).

Ynglefund med antal par:

Mossø: herfra foreligger ingen bestandsopgørelse, det vil dog næppe være urimeligt at regne med 100-150 (1980: 130-150). Nørremose: 1-2 (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr). Mose S f. Salten Langsø: 1 (NÅ). Alle iagttagelser nævnes: Mossø, Emborg Odde: 12/4 20 (ME). Mossø, Lindholm Hoved: 12/4 16 (LPJ), 22/8 9 (HLL), 5/9 5 (HLL). Mossø, ikke stedsangivelse: 30/3 2 (HHH), 5/4 2 (DOF), 13/4 89 (HHH), 14/4 69 (HHH), 15/4 1 (Keh), 25/4 32 (HHH, JK), 3/5 10 (DOF), 7/6 6 (DOF), 5/7 9 (DOF), 7/7 5 (HHH), 14/7 4 (HHH), 12/9 2 (ØBF). Østerby Mose: 11/4 1 ad. (BHJ, PH, FL), 12-13/4 1 ad. (PH, BHJ), 18-20/7 1 ad. (BHJ). Øvrige: 25/4 1 Bregnø, Julsø (HHH, JK), maj-juli 2 oversomrende Ramten-Dystrup Søer (OS, GG), 13/6 1-2 ad. + 1 par m. pulli. Nørremose + 2 Gammelose (begge obs LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), 6/7 2 Dystrup Sø (BHJ, PH), 9/7 2 Kysing Fjord (JF), 23/7 1 par m. 3 pulli. Mose S f. Salten Langsø (NÅ), 29/8 2 Glenstrup Sø (JR), 7/9 2 Kysing Fjord (JF),

12/9 1 ad. + 1 juv. Salten Langsø (JB), 1/11 1 Salten Langsø (JB), 14/11
2 Salten Langsø (JB).

Se appendix II 1980.

Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*)

Fåtalig yngletrækfugl (marts/april-okt/nov) og ynglestandfugl/vintergæst. Ret almindelig trækfugl (marts/april og aug/nov).

Sikre ynglelokaliteter (Ynglefund):

Agri Sø, Mols 1 (AJ), Gammelmose 1-2 (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr),
Kasted Mose 1 (AJ), Lindholm Hoved 1 (PMT, ET), vandhul v. Trige 1 (HB),
Udbyover Sø 1 (JRR).

Sandsynlige ynglelokaliteter (fugle set i yngletiden i mulig ynglebiotop):

Astrup Mose (SH), Bjørnholm Kær (OF), Brabrand Sø (AJ, HLL, NA, KHe, EH, HM), Fuglekær Mose, Mols (HET), Fuglemose, Gjern (Mgr), Fuglesø Mose, Mols (AJ), Fussing Vandmølle (JRR), Grauballe Mose (Mgr), mose N for Grauballe Mose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), Hattemager (SMJ), Høgholm Kær (CO), Kragemose, Samsø (HET, DOF), Kysmose, Mundelstrup (SH), Lading Sø (BH), Løvenholm Skov (LPJ), Nørremose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), Roholm Mose (HB), Salten Langsø (AJ, NA), mose S for Salten Langsø (NA), Salten Adal v. Vorret (JB), Sminge Sø (BH), Smørmose, Auning (EH, JRR), Tavlbord Mose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), Tåstrup Mose (BH, SH), Vrads Sande (JB), Ramten-Dystrup Søer (JRR, HP, Jacob + Bo Silberg, ØBF, DOF).

Alle iagttagelser nævnes:

Brabrand Sø: 25/1 5 (JTL), 27/1 1 (HLL), 4/2 1 (HLL), 4/3 1 (HLL, AJ),
5/3 3 (AJ), 8/3 4 (HLL), 10/3 3 (EH), 12/3 2 (AJ), 15/3 2 (EH, JDK, NA),
17/3 2 (AJ), 24/3 2 (AJ), 25/3 2 (AJ), 26/3 6 (AJ), 27/3 5 (EH, AJ, HLL),
28/3 4 (AJ, BHJ, PH, FL), 30/3 3 (LPJ, AJ), 31/3 2 (AJ), 3/4 1 (HLL),
11/4 2 (AJ), 12/4 4 (KHe, AJ), 15/4 2 (AJ), 16/4 1 (AJ), 22/4 2 (NA),
29/4 1 NA, HLL), 4/5 2 (NA), 6/5 1 (HLL), 8/5 2 (AJ), 9/5 1 (AJ), 21/5
1 (EH, AJ, HM), 4/6 1 (EH), 28/6 (HM), 6/7 1 synkende (AJ), 3/8 2 (NA),
8/8 2 (AJ), 10/8 1 (AJ), 28/8 2 (AJ), 30/8 1 (HLL), 7/9 2 (AJ), 10/9
1 (AJ), 19/9 7 (HLL), 24/9 1 (HLL), 26/9 1 (AJ), 4/10 2 (AJ), 15/10 6
(AJ, NA, PNN), 18/10 3 (LaB, EH), 21/10 2 (AJ), 24/10 1 (AJ), 1/11 3-4
(AJ), 12/11 2 (JDK), 16/11 2 (HLL), 5/12 2 (AJ, PNN), 6/12 3 (HLL, AJ),
8/12 2 (AJ), 9-10/12 1 (AJ), 12/12 2 (HHH), 13/12 2 (AJ), 19/12 2 (PNN),
20/12 1 (H+JE), 22/12 1 (AJ), 30/12 1 (AJ).

Kysing Fjord: 1/3 1 (JF), 23/3 1 (ET), 24/3 2 (JF), 27/3 1 (JF), 9/7
5 (JF), 12/7 1 (JF), 16/7 1 (JF), 18/7 3 (JF), 29/7 4 (HLL), 1/8 8 (FL,
JF), 2/8 (FL, JF), 3/8 22 (BHJ, JF), 5/8 4 (JF), 9/8 29 (BHJ, PH, FL,

JF, SH), 11/8 4 (JF), 14/8 32 (JF), 16/8 37 (HP, SH, JF), 20/8 15 (HLL), 21/8 22 (JF), 22/8 30 (BHJ, FL, SH), 23/8 36 (JF), 28/8 34 (HLL, JF), 31/8 82 (JF), 7/9 116 (JF), 9/9 93 (JF), 12/9 70 (BHJ, FL, JF), 15/9 80 (JF), 28/9 68 (HHH), 29/9 131 (HHH), 1/10 75 (HHH, ET), 4/10 92 (BHJ, PH, JF), 11/10 35 (HP), 17/10 35 (HP, JF), 18/10 42 (BHJ, PH, FL, HP), 4/11 23 (JF), 5/11 16 (JF), 6/11 6 (DOF), 8/11 6 (BHJ, FL), 16/12 1 (LPJ), 28/12 1 (CQP), 29/12 6 (H+JE).

Østerby Mose: 14/4 2 (BHJ, FL), 6/8 3 (BHJ, PH), 8/8 3 (BHJ, FL), 10+13/8 2 (BHJ), 21/8 7 (BHJ, FL), 24/8 7 (BHJ), 25/8 5 (BHJ), 28/8 6 (BHJ), 29/8 4 (BHJ), 4/9 6 (BHJ), 5/9 5 (BHJ), 9/9 8 (BHJ), 14/9 5 (BHJ), 15/9 4 (BHJ, PH, FL), 26/9 2 (BHJ), 14/10 3 (BHJ), 22/10 4 (BHJ), 24/10 4 (BHJ, FL), 6/11 2 (BHJ).

Kasted Mose: 21/3 1 hørt (JDK), 30/3 1 (HLL), 2/4 "hørt" (NT), 6/4 2 syngende (HEt), 9/4 2 (KHe), 16/4 3 (SH), 3/5 1 (SH), 6/5 "hørt" (NT), 15/5 1 hørt (JDK), 25/5 1 hørt (JTL), 12/8 1 ad. + 1 pull (AJ).


Salten Langsø: 11/1 1 (JB), 19/7 1 syngende (AJ), 23/7 1-2 + 1 i mose S for søen (NA), 14/10 1 (JB).

Kysing Næs: 26/1 2 (HLL), 9/2 2 (HLL), 17/2 2 (HLL), 6/3 1 (HLL), 20/12 4 (SH, BHJ, PH).

Øvrige: 2/1 1 rast Moesgård Strand (Moes), 26/1 2 Norsminde Havn (AJ), 1/2 3 Lille Å (SMJ), 28/2 2 Kastbjerg Å (JRR, BRR, KEH), 4/3 2 Silkeborg Langsø (JTL), 15/3 1 Ørting Mose (LPJ), 29/3 1 Nørremose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), 29/3 1 Fuglemose, Gjern (Mgr) + 2 Ramten Sø (JRR) + 1 Nørremose (Mgr) + 1 syngende Grauballe Mose (Mgr), 2/4 3 Sminge Sø (BH), 4/4 1 par vandhul v. Trige - yngede (HB) + 2 Ramten-Dystrup Søer (ØBF), 5/4 1 rast Gjerrild Nordstrand (JRR, BRR, KEH) + 1 syngende Fuglekær Mose, Mols (HEt) + 1 Hattemager (SMJ) + 1 Vrads Sande (JB), 6/4 1 Lading Sø (BH), 9/4 1 Tåstrup Mose (BH), 12/4 1 Lindholm Hoved (LPJ) + 1 par Roholm Mose (HB) + 1 Astrup Mose (SH), 14/4 1 rast Gjerrild Strand (Stl), 15/4 1 rast Fornæs (Stl) + 1 Hattemager (SMJ), 18/4 1 rast Fornæs (Stl), 25/4 2 Ramten-Dystrup Søer (DOF) + 1 syngende Kragemose, Samsø (HEt) + 2-3 syngende Huldremose v. Ramten-Dystrup Søer (DOF), 17/4 2 Ramten-Dystrup Søer (HP), 10/5 1 Kysmose, Mundelstrup (SH), 12/5 1 Tåstrup Sø (SH), 17/5 1 Udbyover Sø (JRR), 23/5 1 Tavlbord Mose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr) + 1 syngende Nørremose + 4 Gammelmose + 1 i mose N for Grauballe Mose (alle obs LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr) + 1 Fussing Vandmølle (JRR) + 2 Gjerrild Nordstrand (EH), 30/5 1 syngende Kragemose, Samsø (DOF), 7/6 1 hørt Løvenholm Skov (LPJ) + 2 Smørmose, Auning (EH, JRR) + 1 ad. m. 3 pulli, småsøer v. Lindholm Hoved, Mossø (PMT, ET), 8/6 1 Udbyover Sø (JRR), 13/6 1 ad. m. 2 pulli + 2 ad. Gammelmose (LC, HM, LPJ, BH, AJ, Mgr), 14/6 3 hørt Bjørnholm Kær (OF), 23/7 1 Hattemager (SMJ), 30/7 1 Ramten Sø (Jacob + Bo Silberg). 15/8

1 Salten Adal v. Vorret (JB) + 1 hørt Høgholm Kær (CO) + 3 ad. + 4 juv. Udbyover Sø (JRR), 16/8 1-2 ad. m. 2 pulli. Agri Sø, Mols (AJ), 22/8 1 ad. Fuglsø Mose, Mols (AJ), 6/9 1 Sødning Kær (HLL), 3/10 1 rast Hassensør (ØBF), 1/11 1 Vængsø (DOF), 10/11 12 Grenå Å (CO), 26/12 5 Gudensø (HHH).

Se appendix II 1980.



Figur 1. Lille Lappedykker, Kysing Fjord 1/8 - 29/10 1981.

Kurven følger ikke de officielle 5-dages perioder.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode startende 1/8 og sluttende 29/10.

Malleduk (*Fulmarus glacialis*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækgæst. En enkelt iagttagelse: 8/11 1 N-rast-N Fornæs (CO).

Sule (*Morus bassanus*)

Sjælden trækgæst i Kattegat. Meget sjælden og uregelmæssig indlandsgæst.

Maritime obs: 11/10 2 4-5 års. Fornæs (HLL), 7/11 1 4-5 års. Samsø (HLL).

Indlandsobs: ult. nov - 4/12 1 afkræftet fugl Silkeborg (meddelt JTL). Fuglen blev taget i pleje, men døde senere. Tredje obs af arten i Midtjylland.

Se appendix II 1980.

Skarv (*Phalacrocorax carbo*)

Kun indlandsobs og større flokke er medtaget.

Indlandsobs:

Brabrand Sø: 15/3 1 (AJ), 23/4 1 (NA), 29/4 3 (HLL), 2/5 1 (AJ), 6/5 2 N (AJ), 10/5 2 (AJ, JDK), 12/5 1 (JTL), 15/5 1 SØ (HP), 18+19/5 1 (LaB), 21/5 4 (JTL), 24/5 1 (HLL), 26/5 1 (NA), 28/5 1 (NA), 1/6 1 (AJ), 5/6 1 (KjH), 7+8/6 1 (KjH), 9/6 2 (JTL), 14/6 2-3 (AJ, EH), 2/6 1 (EH), 4/6 1 (EH), 17/6 2 (EH), 18/6 2 (HLL), 20/6 2 (AJ), 22/6 2 + 1 trk (HLL, AJ), 24/6 2 (HLL), 2/7 2 (AJ), 6/7 4 (AJ), 7/9 1 (AJ).

Fussingsø: med. aug. 25 (PER), 16/8 32 (JRR), 29/8 23 (JRR, ØBF), 5/9 32 (SH, JTL), 13/9 56 (JRR, BRR, KEH), 18/10 1 (SH), 27/10 3 (JRR, BRR).

Kysing Fjord: 2/1 2 (CQP), 26/1 2 (CQP), 9/7 1 (JF), 29/7 1 (HLL), 9/8 3 (DOF, SH), 16/8 3 (SH), 22/8 1 (SH).

Mossø: 30/3 2 (HHH), 12/4 12 (ME), 13/4 2 (HHH), 14/4 3 (HHH), 25/4 88 (HHH, JK), 7/6 8-9 (DOF, PMT, ET), 5/7 5 (DOF), 7/7 5 (HHH), 14/7 6 (HHH), 5/9 1-2 (HHH), 1/9 1 (DOF).

Salten Langsø: 31/5 1 (JB), 7/6 1 (DOF), 20/6 3 (JTL), 19/7 4 (AJ), 6/9 1 (DOF).

Skanderborg Sø: 11/3 1, 11/4 7, 29/4 42, 16/6 3, 23/6 8, 2/7 3, 3/7 1, 5/7 1, 17/7 5 (alle obs HHH).

Solbjerg Sø: 11/6 7 (BHJ), 12/6 8 (BHJ), 22/6 10 (BHJ), 22/7 3 (BHJ), 7/8 4 (BHJ, FL), 30/8 2 (BHJ).

Stubbe Sø: 15/8 5 (CO), 3/10 7 (JTL, ØBF).

Øvrige: 5/4 2 N Jelshøj (BHJ), 30/5 1 N Østerby Mose (PH), 4/6 1 S N for Yding Skov (PMT, ET), med juni 1 Stilling Sø (ET), 14/7 1 Gudensø (HHH), 15/8 5 Rugård Sø (CO), 30/9 1 ad. Mørke Kær (AJ).

Større flokke (over 100 ex): 19/10 177 NV Helgenæs (JTL), 22/10 143 NV (JTL), 21/11 115 Aarhus-Kalundborg (NA), 29/12 400 rast, hvor? (ET).

Se appendix II 1978, 1979.

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*)

Se appendix I.

Fiskehejre (*Ardea cinerea*)

Fåtalig yngletrækfugl/ynglestandfugl. Ret almindelig vintergæst.

Ynglefund med antal par:

Brattingsborg Skov min 4 (DOF), Marselisborg Skov min. 3 (NA), Skanderborg Sø 17 (HHH), Solbjerg Sø (meddelt BHJ).

Vinterobs:

Brabrand Sø: 4/1 8 (PMT, ET), 5/1 4 (AJ), 6/1 8 (NT), 10/1 15 (BHJ, PH, FL), 15/1 6 (AJ), 25/1 12 (PMT, ET, AJ), 27/1 3 (NA), 30/1 7 (NT), 31/1 8 (PMT, ET), 2/2 14 (AJ), 4/2 9 (AJ), 5/2 19 (AJ), 9/2 14 (FF, AJ),

11/2 18 (LaB, AJ), 14/2 3 (AJ), 15/2 11 (EH, AJ), 16/2 10 (EH, AJ),
 17/2 10 (JR, NT, AJ), 18/2 8 (EH), 19/2 10 (NA), 21/2 12 (AJ), 22/2
 "set" (AJ), 24/2 12 (EH), 1/12 4 (AJ), 4/12 13 (AJ), 5/12 19 (ET, PNN,
 LaB, AJ), 6/12 10 (AJ), 8/12 11 (AJ), 9/12 16 (AJ), 10/12 16 (AJ),
 11/12 7 (PH, PNN), 13/12 14 (AJ), 15/12 6 (AJ), 19/12 5-6 (PNN), 20/12
 7 (H+JE, EH, AJ), 22/12 4 (AJ), 26/12 3 (AJ), 27/12 10 (H+JE), 30/12
 2 (AJ).

Kysing Fjord: 4/1 11 (JF), 10/1 28 (LPJ, KL, JF), 11/1 12 (SH, BHJ,
 FL, PH, DOF), 13/1 2 (JF), 17/1 20 (HP), 18/1 11 (JF), 25/1 14 (JF),
 27/1 10 (JF), 1/2 18 (JF), 5/2 13 (JF), 7/2 6 (JF), 12/2 12 (JF),
 5/12 50 (JF), 6/12 36 (JF), 7/12 30 (AJ), 16/12 12 (LPJ), 20/12 4 (SH).

Horskær: 11/1 3 (LPJ), 25/1 1 (LPJ), 15/2 1 (LPJ), 22/2 4 (LPJ).

Pinds Mølle: 21/2 1 (ET), 6/12 3 (AJ), 7/12 3 (ET),
 10/12 2 (ET), 15/12 2 (ET), 17/12 2 (ET), 21/12 3 (ET).

Øvrige: 2/1 2 Lilleå (SMJ), 4/1 1 Norringenge (JDK), 11/1 2 Mossø (HP),
 17/1 2 Hattemager (SMJ), 1/2 1 Lilleå (SMJ), 9/2 1 N Moesgård Strand
 (NA), 11/2 5 Skanderborg Sø (HHH), 15/2 1 Lerdrup Vig (LPJ), 17/2 3
 beboede reder Marselisborg Skov (NA), 22/2 2 Bjerregrav Mose (JRR),
 25/2 "spor" Giber Å (BHJ), 28/2 4 Følle (HA), 5/12 5 Solbjerg Sø (BHJ,
 PH) + 1 Astrup Mose (BHJ, PH), 6/12 5 Stubbe Sø (OF) + 3 Tåstrup Sø
 (AJ) + 2-3 Mossø (DOF), 7/12 1 Dørup (ET), 11/12 1 Giber Å (BHJ),
 12/12 1 Dørup (ET), 13/12 2 SV Kollens Mølle (ET), 16/12 8 Følle (HA),
 18/12 3 Aarhus Å v. Åhavevej (AJ), 25/12 1 hørt Skanderborg Sø (HHH),
 27/12 1 Gudensø (HHH), 28/12 20 mark v. Langå (NA).

Se appendix II 1980.

Natthejre (*Nycticorax nycticorax*)

Se appendix II 1972.

Rørdrum (*Botaurus stellaris*)

Sjælden træk- og vintergæst. Ialt 5 forskellige fugle.

Brabrand Sø: 6/12 1 (AJ), 8/12 1 (AJ), 10/12 1 (AJ), 16/12 2 (KHe), 17/12
 2 (JoL), 20/12 1 (AJ, EH, NA).

Kysing Fjord: 10/1 1 (LPJ, KL), 11/1 1 (DOF), 13/1 1 (JF), 17/1 1 (GG,
 HP), 25/1 1 (JF), 12/3 1 (JF).

Øvrige: 27/3 1 N Fornæs (HC), ult. april 1 hørt Grund Fjord (FFa).

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Meget sjælden yngletrækfugl. Fåtalig trækgæst (ult marts og aug/sept).

Ynglefund:

Randers 1 (JDK, JRR, HP). Endvidere yngleforsøg i Ulstrup (GG, HP). Ingen ynglepar i Hobro (HP).

Alle daterede iagttagelser nævnes: 19/3 1 N Harlev (JTL), april 6 kredsede Høskoven, Brabrand Sø (Olof Sandberg), 4/4 1 Skjoldhøjparken (SH), 23/4 1 Ø Kolindbro-området (JJP), 11/5 1 Kolindbro-området (JJP), 15/5 1 mellem Randers og Langå (NT), 19/5 2 Ulstrup (HP) + 1 Kolindbro-området (JJP) + 1 N Grenå (Peter Andersen), 20/5 2 Ulstrup v. opsat rede (HP), 23/5 5 Ulstrup - kamp ved reden (HP), 25/5 5 mellem Auning og Pinstrup (Knud Poulsen), 26/5 4 Kolindbro-området (JJP), 27/5 2 motorvejsskråningen S for Bjertrup (PMT, ET), 30/5 1 V for Pinstrup (meddelt PMT, ET), 1/6 2 trk Tilst (PN), 2/6 1 Rosenholm Slot (meddelt PMT, ET), 16/6 1 SØ Himmelbjerget (ME), 19/7 1 Randers (JDK), 15/8 1 Bjerregrav Mose (SH), 15/9 1 juv. Havndal (KjH).

Se appendix II 1978, 1979.

Knopsvane (Cygnus olor)

Arten er konstant i amtet som såvel ynglefugl som træk- og vintergæst. Ynglefuglene begynder at optræde på ynglepladserne, så snart disse er isfri (med. marts - november), stort sommertræk af fældende fugle samt trækgæster nordfra findes flere steder i amtet (med. juli - med. marts). Arten er udfra det foreliggende materiale almindelig yngletrækfugl i amtet.

Ynglefugle er indrapporteret fra mange lokaliteter i hele amtet, ialt ca. 118 par, fordelt på 35 lokaliteter, deraf var der ialt 25 lokaliteter med et enkelt par, resten af parrene er fordelt med fra 2 - 30 par pr. lokalitet. Småøerne i den sydlige del af amtet er pænt repræsenteret med 30 par på Søby Rev, 14 par Hov Røn samt 15 par på Alrø Polder. Af større indlands obs. kan nævnes Brabrand Sø 4-5 par, Solbjerg Sø 6-8 par, Ramten/Dystrup Sø 5 par, samt 4 par Bjerregrav Mose. Max. tal fra lokaliteter med over 100 fugle nævnes. Som man kunne forvente, er arten talrigst i efteråret, undtagelsen er 5/4 170 Kalsemade (SH), 19/9 434 Hesselholm (LB), 17/10 120 Kysing Fjord (HP), 26/10 120 Kolindbro (JJP) samt 28/11 med ialt 1870 Mariager Fjord (JRR, JM, AJ).

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Træk- og vintergæst (okt/nov - marts), hvor arten optræder fåtallig, dog ser det ud til, at den optræder ret almindeligt i den nordlige del af amtet.

Kysing Fjord: I perioden fra 11/1 - 28/3 opholdt der sig 2 fugle ved fjorden, derefter sås arten først i efteråret 5/11 2, sidste obs fra lokaliteten 28/12 11 fugle. (GG, CQP, HP, AJ, JF, BHJ, PH, FL, SH, HLL).

Brabrand Sø: Ved søen opholdt 5 fugle sig i perioden fra den 9/2 - 17/2, derefter først 19/3 1 og 22/3 12 N. Sidste obs fra foråret 2/4 4 fugle, efterårets første fugl viste sig her 12/11, derefter 5-6/12 3, 18/12 1 Aby Eng, 20/12 1, 24/12 og 27/12 2 Aby Eng, 28/12 3 og sidste obs 30/12 3 (PH, BHJ, H+JE, JTL, AJ, FF, JDK, PNN, LaB, HLL, EH).

Mossø: Ret pæne tal fra denne lokalitet, 11/1 76, 15/2 16, 1/3 4, 6/12 25 samt 26/12 9 (GG, HP, DOF, HHH).

Kolindbro: Alle iagttagelser nov/dec 2/11 2, 3/11 3, 7/11 50, 13/11 3, samt 1/12 3 (JJP).

Kolindsund: Her er samtlige iagttagelser så til gengæld fra jan/feb/marts. 4/1 2, 25/1 2, 11/2 10, 10/3 10, 11/3 46, 13/3 20, 15/3 35, 18/3 16, 20/3 19, der forsvandt inden 25/3 (JJP).

Stubbe Sø: 15/11 27 trk, 28/11 10 og 6/12 19 (OF, CO).

Engene V for Grenå Enge: 22/10 1, 2/11 6, 10/11 10, 4/12 5 samt 6/12 8 (CO), dejligt at høre fra andet end Fornæs fra denne del af amtet.

Mariager Fjord: Ret beskedne tal fra fjorden, 11/1 20, 24/10 14 v udmunding + 45 Pletten, 14/11 12 Pletten + 37 Ajstrup Bugt, samt 13/12 6 Udmundingen + 16 Hadsund.

Øvrige: Gudensø: 24/12 29 og 27/12 16 (HHH), Hinnerup: 10/1 10 SØ (PN), Mørke Kær: 6/12 3 (JTL), Trustrup: 6/12 6 (OF, CO), Fornæs: Kun en enkelt obs 5/12 1 N (CO), Randers Fjord: 13/12 153 (JRR).

Se appendix II 1976, 1978, 1979, 1980.

besvane (Cygnus beewickii)

Arten ser ud til at være ret konstant, men fåtallig i amtet som træk-gæst i perioder (marts/april og okt/nov).

Kysing Fjord: Ialt 5 obs af arten, 10/3 1, 12/3 12 samt en ret stor flok 5/4 34, 17/10 8 og til slut 4/11 15 (JF).

Brabrand Sø: En enkelt juv. opholdt sig ved søen fra 15/11 - 5/12, derudover blev en formodet juv. set 8/12 (AJ, PNN, KHe).

Kolindsund: Flere iagttagelser fra marts, 11/3 7, 13/3 10, 15/3 10, 18/3 6 indtil 25/3, hvor de var forsvundet (JJP).

Øvrige: Pinds Mølle: 2/12 2 SV Pinds Mølle Dalen (ET), Kasted Mose: I perioden fra den 15/3 - 2/4 opholdt 5 ad. + 7 juv. pibesvaner sig i mosen (JDK, NT, HLL), Helgenæs: 18/10 en flok på 15 trak V Helgenæs (JTL), Randers Fjord: 24/10 3 rastende ved udløbet.

Se appendix II 1976, 1978, 1980

Ubestemte gæs (Anser sp.)

En del ubestemte grågæs foreligger. Moesgård Strand: 9/3 61 trk, 10/3 4 trk, 18/3 36 N, 22/3 2 S og 28/3 5 N (JRR, Moes), Dørup: 14/3 2 NØ, ult. okt. 26 SV, 7/12 7 Ø (ET), Gudenå v. Randers: 16/3 13 Ø (JRR), Fornæs: 12/4 1 Ø (NT).

Grågås (Anser anser)

Optræder som yngletrækfugl i amtet (marts-okt), arten er fåtallig. Ialt er 8 par rapporteret, fordelt på følgende lokaliteter: Hattemager, Astrup Mose, Solbjerg Sø, Skanderborg Sø, Fogstrup Mose og Bjerregrav Mose med 3 par (Gejrf, JRR, HHH, JB, SMJ, BHJ, AJ).

Alrø: 8/3 3, 15/3 2 NNØ, 14/7 54, 23/7 38, 27/7 34, 4/10 8 (LPJ, KHe, PN, JDK).

Samsø: Hesselholm: Første iagttagelser 15/3 10, 12/4 4, 16/4 2, 11/7 26, 18/7 7, 19/7 7. Mejlesholm: 21/7 over 100. Barnekold: 17/3 6. Trane-mosen: 18/4 3. Møgelmosen: 20/4 1, 29/5 1-2, 11/7 2. Kragemosen: 19/4 2, 25/4 1. Stavns Fjord: 28/3 2. Svanegrunden: 28/3 15. Besser Rev: 7/5 2. En del iagttagelser fra Samsø (LB, DOF, AJ, HHH, HeT, HLL, PE). Kysing Fjord: Første iagttagelser 28/2 1, 12/3 1, 18-23/3 2, 27/29/3 3, 31/3-2/4 2, 26/4 2, 14/6 1, 12/7 13, 21/7 18, 22/7-4/10 opholdt en enkelt fugl sig ved fjorden, 14/8 5 og 15/9 3 udover den enkelte fugl, der opholdt sig ved fjorden (JF, HLL, LPJ, AJ, H+Je, HP, HHH, SH, JDK, NT).

Brabrand Sø: 15/3 2 trk, 17/3 3, 18/3-20/3 2, 27/3-30/3 1, 9/4 2 (JDK, JR, HLL, EH, BHJ, PH, FL, AJ, KHe).

Skanderborg Sø: 11/3 16, 11/4 10, 29/4 12, 5/7 18 (HHH).

Lading Sø: En del iagttagelser begyndende den 15/3 1, 18/3 2, 26/3 2, 30/3 3, 31/3 2, 6/4 2, 14/4 2, 26/4 2, 2/5 5, 8/5 7, 10/5 3, 2/7 3 (BH, SH).

Mossø: 14/3 12, 18/3 19, 30/3 15, 5/4 9, 11/4 3, 14/4 2, 25/4 7, 7/7 1 (HHH, DOF).

Råby Odde, Randers Fjord: 22/3 1, 2/5 4, 7/5 1, 31/5 5 (JRR, BRR, EH).

Bjerregrav Mose: Udover ynglefuglene er der observeret følgende fugle: 17/3 6 (EH), 2/4 3 (JRR), 9/5 9 (JRR).

Øvrige: Astrup Mose: 18/1 2 trk (AJ). Moesgård Strand: I perioden 8/3-1/4 trk ialt 45 (Moes). Aarhus/Vejlby: 9/3 1 V (NT). Kasted Mose: 15/3 3, 18/3 2, 21/3 3 (JDK, KHe). Overgård, Mariager Fjord: 15/3 3 (ØBF). Østerby Mose: 18/3 1 (BHJ). Akær v. Ørting: 28/3 2 (HP). Aarhus/Gudrunsvvej, Brabrand: 28/3 28 trk (JR). Stubbe Sø: 28/3 3 (HLL). Fornæs: 29/3 1 trk (EH). Tåstrup Sø: 3/4 2 (NT). Horskær, Kalsemade Rev: 5/4 1, 11/4 2 (SH, LPJ). Salten Langsø: 5/4 11 (DOF). Vestermosen, Skanderborg: 12/4 2 (LPJ). Kysing Næs: 18/10 23 S (BHJ, PH, FL).
Se appendix II 1978 og 1980.

Blisgås (Anser albifrons)

Meget sjælden trækgæst (marts-april), kun en iagttagelse af den gås: Bakken, Gjerrild 12/4 2 (SH).

Sædgås (Anser fabalis)

Fåtalig trækgæst (feb-april).

Samtlige iagttagelser: Alrø pøller: 15/2 1 (LPJ), Moesgård Strand: 10/3 14 N, 24/3 1 SSØ (Moes). Pletten, Mariager Fjord: 15/3 13 (JRR, BRR, EH). Randers Fjords udløb: 12/4 1 (JRR, BRR, EH) samt en enkelt vinteriagttagelse: Hinnerup: 7/12 3 V (SMJ).

Knortegås (Branta bernicla)

To former i Aarhus amt:

Lysbuget Knortegås (B. b. hrota):

Igen i år fra formens faste rasteplass ved Mariager og Randers Fjorde. Formen er træk- og vintergæst (marts og nov/dec), ret almindelig.

Sødringholm, Randers Fjord: 22/3 41. Samsø, Hesselholm: 10/10 2 S.

Mariager Fjord: 14/11 4. Pletten, Mariager Fjord: 28/11 1260. Mariager Fjord: 13/12 682 rastende. Randers Fjord: 13/12 553. Fornæs: 28/12 9 (SH, JRR, JM, AJ, BRR, EH, LB)

Mørkbuget knortegås (B. b. bernicla):

Formen er som lysbuget træk- og vintergæst (sept/nov og april/maj), fåtalig.

Fornæs: 28/3 9 trk. Hesselholm: 14/4 ca. 25 og 15/4 60-70 trk. Anholt: 26-27/4 1. Hesselholm: 9/5 45. Mariager Fjord: 12/9 4 trk. Overgård: 15/9 15. Hesselholm: 29/9 15 trk. Hassenør: 3/10 4. Katholm Enge: 18/10 4 trk. Helgenæs: 18/10 4 trk. Kysing Næs: 18/10 14 trk. Randers Fjords udløb: 25/10 6 rastende. Mariager Fjords udløb: 14/11 9 trk. Samsø, Kyholm: 28/12 1. Ebeltoft: 28/12 9. (ØBF, KjH, OF, NT, HLL, BRR, KEH, JRR, BHJ, PH, FL, JTL, HP, LB).
Se appendix II 1978.

Bramgås (*Branta leucopsis*)

Se appendix II 1976.

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Træk- og vintergæst i amtet (dec.- marts), fåtallig.
Kolindsund: 15/3-25/3 1 (JJP), Lading Sø: 17/3 17 (BH), og Brabrand Sø: i perioden fra den 28/12-30/12 4 (BHJ, PH, H+JE, AJ).

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Vintergæster i amtet (dec-jan-feb), trækfugl (marts/juni og okt/nov) og ynglefugle (april-nov). Arten er ret almindelig i amtet. Samtlige ynglefund nævnes, rastende fugle kun tal over 50 nævnes, vinterfugle samtlige.
Ynglefund:

Hov Røn: 3 par. Horskær: 1 par. Samsø, Hesselholm: 2 par. Samsø, Kragemose: 3 par. Kysing Fjord: 4 par. Søbygård Sø: 1 par. Lading Sø: 2 par. Brabrand Sø: 2 par. Solbjerg Sø: 3 par. Kasted Mose: 2 par. Tomasholm Mose: 0-1 par. Tavlbord Mose: 1-4 par. Gråballe Mose: 0-2 par. Skejby: 1 par. Følle Bund: 2 par. Halvøen v. Kalø slotsruin: 2 par. Kolindsund: 2 par. Ramten-Dystrup Sø: 5 par. og Bjerregrav Mose: 1 par. (FL, LC, HM, LPJ, BH, AJ, JJP, BHJ, OS, JOL, Gejrf, HA, LB, HET, NT, JF).

Af rastende fugle kan nævnes:

Alrø Poller: 8/3 71 og 15/3 59 (LPJ).

Kysing Fjord: Se diagram.

Samsø, Hesselholm: 13-14-15/3 ca. 100 og 16/3 50 (LB).

Randers Fjord: 15/3 430, 12/4 402, 2/5 61, 17/5 105, 31/5 280, 8/6 480, 1/8 54, 22/8 59, 12/9 502, 24/10 536, 25/10 820, 14/11 534 og 28/11 530. (JRR, BRR, KEH, EH).

Mariager Fjord, Pletten: 15/3 140, 17/5 69, 24/10 390, 14/11 610 og 28/11 480. (JRR, BRR, KEH, JM, AJ).


Mariager Fjord, Ajstrup Bugt: 15/3 750, 8/6 86, 24/10 331, 14/11 70 og 28/11 285 (JRR, JM, AJ, ØBF, BRR, KEH).

Vinterfugle, (dec-jan-feb):

Brabrand Sø: Fra den 5/1-29/1 opholdt 1 fugl sig ved søen, 30/1 7, 31/1 1, 4/2 1, 5/2 2, 9/2 5, 11/2 1, 14/2 4, 15/2 2, 16/2 5, 17/2 7, 18/2 6 og 19/2 1.

Kysing Fjord: 1/2 1, 5/2 5, 7/2 4, 12/2 8, 14/2 1, 17/2 7, 5/12 1 og 6/12 1.

Endvidere blev der observeret gravænder: Hesselholm: 25/1 14. Horskær: 8/2 5. Kalø Slotsruin: 8/2 5. Alrø poller: 15/2 74. Lerdrup Vig: 15/2 18. Horskær: 15/2 3. Følle Bund: 28/2 8. Randers Fjord: 13/12 870. (FF, NÅ, JJP, LPJ, NT, LB, HLL, H+JE, AJ, JF, JRR, BRR, KEH).



Figur 2. Gravænder, Kysing Fjord 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode.

Rustand (*Tadorna ferruginea*)

Formodentlig er der tale om undslupne fangenskabsfugle tidspunkterne taget i betragtning.

Kysing Fjord: 5/9 1, 14/9 1 (Anders Rasmussen). Aarhus Havn: 14/9 1 (HLL) samt Randers Fjords udløb: 13/12 1 hun (JRR).

Se appendix II 1980.



Gråand (*Anas platyrhynchos*)

Arten yngle-, stand- og trækfugl og er i amtet hele året, almindelig. Alle obs over 500 fugle nævnes, ynglefugleagttagelserne er ikke særlig repræsentative, kun 55 par ialt, hvad man nok kan forvente er meget under det faktiske antal.

Lokaliteterne, hvorfra ynglefund er indrapporteret, er følgende:

Hov Røn, Søby Rev, Tomasholm Mose, Tavlbord Mose, Lysemose, Gammelmose, Kolindsund, Østerby Mose, Ramten-Dystrup Sø, Bjerregrav Mose, Tornsbjerg-Hadstrup Skov, Galten Sø, Sø i Ringelmoseskoven, Råby Odde Randers Fjord, Øje Sø samt Fuglekær (FL, LC, HM, LPJ, BH, AJ, ET, HE, JRR, ØBF).

Af større antal kan nævnes:

Kysing Fjord: 11/1 800, 17/1 700, 26/1 600, 15-16/8 600, 1/10 max 1000, 17/10 780, 20/12 > 1000 og 29/12 1000.

Fussing Sø: 21/3 1310, 18/10 800, 29/11 2378 og 4/12 3000.

Øvrige: Brabrand Sø: 20/2 700. Mossø: 11/1 1000. Salten Langsø: 1/3 500, 8/11 700.

(CQP, H+JE, HP, ET, PMT, SH, JRR, BRR, KEH, ØBF, EH, PER).

Se appendix II 1980.

Krikand (*Anas crecca*)

Arten er en meget sjælden ynglefugl i amtet, trækfugl i perioden (marts/maj og igen juli/dec). En del fugle overvintrer i amtet (dec, jan, feb). Alle obs over 50 nævnes, samt alle vinterobs.

Et enkelt ynglefund:

Ramten-Dystrup Sø (OS)

Rastende fugle i amtet:

Kysing Fjord: Se diagram. (HHH, AJ, CQP, NA, ET, PMT, NT, SH, HLL, LaB, BHJ, PH, HP, FL, JF)

Brabrand Sø: 9/4 67, 10/4 68, 11/4 > 60, 12/4 40-55, 13/4 69 og 16/4 75 (AJ, KHe).

Fussing Sø: 18/10 2000, 27/10 680 og 29/11 366 (SH, JRR, BRR, KEH, ØBF).

Råby Odde, Randers Fjord: 22/3 98, 12/4 198, 2/5 180 (JRR, BRR, EH, KEH)


Sødringholm, Randers Fjord: 22/3 50, 12/4 457, 15/8 96 og 12/9 69 (JRR, BRR, EH, KEH)

Øvrige: Fornæs: 28/3 95 N (HC). Bjerregrav Mose: 15/8 150 (SH, Gejrf).

Samsø, Hesselholm: 19/9 > 230 (LB). Vilhelmsborg: 27/9 77 (BHJ, PH, FL).

Solbjerg Sø: 21/10 50 (BHJ). Salten Langsø: 8/11 50 (HP).

Se appendix II 1980.



Figur 3. Krikand, Kysing Fjord 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode.

Atlingand (Anas guerguedula)

Arten yngletrækfugl i amtet, ret sent ankomsttidspunkt (april-sept). Sjælden.

Ynglefugle på følgende lokaliteter:

Østerby Mose 1 par, Brabrand Sø 1 par og Bjerregrav Mose 1 par (BHJ, PH, EH, AJ, SH, Gejrf, KHe).

Udover disse er der iagttaget fugle på følgende lokaliteter:

Kysing Fjord: 9/8 1, 20/8 1, 22/8 1 hun, 23/8 1 han og 28/8 2 (SH, HLL, JF, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 12/4 2 hanner, 13/4 1 han, 15/4 1 han, 16/4 1 han samt 27/8 1. Alle obs udover yngleparret (KHe, HLL, AJ).

Øvrige: Lading Sø: 8/4 2 (BH). Samsø, Møgelmosen: 29/5 1 han (DOF).

Østerby Mose: I perioden fra den 21/8-5/9 1 hun (BHJ, FL).

Se appendix II 1980.

Knarand (Anas strepera)

Udelukkende trækfugl i amtet (marts/maj og sept/okt), meget sjælden. Samtlige iagttagelser nævnes.

Kysing Fjord: 15/4 1 han, 29/4 1 han, 15/5 1 par, 19/5 1 par samt en enkelt. Udenfor perioden 6/6 1. 9/9 2 hanner, 12/9 2 hanner, 29/9 2 hanner, 1/10 2 hanner og 4/10 1 han (JF, BHJ, FL, PH, HHH).

Øvrige: Hattemager: 5/4 1 han (SMJ) og Lading Sø: 11/3 2 (BH).

Pibeand (*Anas penelope*)

Trækfugl (marts/maj og aug/nov-dec), enkelte individer kan oversomre, i milde vintre kan mange overvintre (dec, jan, feb), lokalt almindelig. Alle obs over 30 individer medtages, samt alle oversomrende (juni/juli) og overvintrende fugle (dec, jan, feb).

Kysing Fjord: Se diagram

Råby Odde, Randers Fjord: 22/3 363, 12/4 280 og 2/5 310 (JRR, BRR, KEH, EH).

Sødringholm, Randers Fjord: 22/3 44, 12/4 117, 12/9 259 og 24/10 32 (JRR, BRR, KEH, EM).

Ajstrup Bugt, Mariager Fjord: 12/4 77, 24/10 62, 14/11 326 (JRR, BRR, KEH)

Øvrige: Grund Fjord: marts max 90 (FFa). Fussing Sø: 31/3 52 (JRR, BRR).

Samsø, Hesselholm: 29/9 57 (LB). Hassenør: 3/10 86 trk (ØBF). Fornæs: 3/10 50 N + 61 S, 11/10 94 trk (CO, HLL, HC).

Oversomrende fugle:

Kysing Fjord: Se diagram.


Øvrige: Bjerregrav Mose: 3/6 1 par (Gejrf). Sødringholm, Randers Fjord: 8/6 14 (JRR, BRR, KEH, EH).

Vinteriagttagelser:

Kysing Fjord: Se diagram.

Brabrand Sø: 4/2 1 han og 5/2 2 hanner (AJ).

Se appendix II 1980.



Figur 4. Pibeand, Kysing Fjord 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode.

Spidsand (Anas acuta)

Arten er trækfugl i amtet (marts/juni og aug/nov-dec), af og til kan den vise sig i vintermånederne (dec, jan, feb). Fåttallig både som træk- og vintergæst. Samtlige iagttagelser nævnt.


Kysing Fjord: Se diagram.

Brabrand Sø: 9/3 1 han, 10/3 2 hanner, 16/8 1 hun og 27/8 1 hun (KHe, KjH, NT, HLL, AJ).

Sødringholm, Randers Fjord: 12/4 6, 15/8 2, 12/9 5, 24/10 2, 25/10 2 og 13/12 2 (JRR, BRR, KEH).

Øvrige: Kolindsund: 11+13/3 1 (JJP). Ajstrup Bugt, Mariager Fjord: 15/3 3 par (ØBF). Fornæs: 28/3 flok 22N (HC). Ramten-Dystrup Sø: 13/4 1 (St1). Stubbe Sø: 16/4 1 hun (St1). Lading Sø: 2/5 2 (BH). Boels Rev: 1/8 1 (JRR, BRR, KEH). Fussing Sø: 29/8 8 og 29/11 1 (JRR, BRR, KEH). Samsø, Hesselholm: 19/9 1 (LB).

Se appendix II 1980.



Figur 5. Spidsand, Kysing Fjord 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode.

Skeand (Anas clypeata)

Mange obs indrapporteret af denne art, Skeanden er yngletrækfugl her i amtet (marts - nov), enkelte fugle fra vinterperioden (dec, jan, feb), fåttallig.

Ynglefund i amtet:

2-3 par, Tavlbord Mose 0-1 par, Østerby Mose 1 par og Ramten-Dystrup Sø 1 par. (LC, HM, CPJ, BH, AJ, BHJ, OS).

Af rastende fugle kan nævnes:


Kysing Fjord: Se diagram.

Østerby Mose: 12-14/4 2, 15-19/4 4, 21/4 2, 22-23/4 4 og 24-25/4 2 (BHJ, FL, PH).

Brabrand Sø: 30/3 2, 2/4 1 han, 6/4 1 par, 7/4 2 hanner og 1 hun, 9/4 3 hanner og 2 hanner, 10/4 3 hanner og 2 hanner, 11/4 2 hanner og 1 hun, 12/4 1 han, 13/4 1 han, 14/4 2, 15/4 3 hanner, 28/4 3 hanner og 1 hun, 1/5 1 han, 3/5 1 han, 4/5 2 hanner og 1 hun, 5/5 2 hanner og 1 par, 6/5 2, 8/5 1 han, 12/5 1 han, 14/5 1 han, 19/5 2 N, 20/5 1 han og 16/8 1 hun. (AJ, BHJ, PH, FL, NA, H+JE, HM, LaB, HLL, LPJ).

Kolindsund: 6+14+21/4 2, 23/4 2, 4/5-18/6 2 og 2+7+10/8 2 (JJP) måske et enkelt par kan findes her.

Øvrige: Lading Sø: 21/3 1 og 12/5 2 hanner (AJ, BH). Tåstrup Sø: 3/4 2 hanner og 1 hun (NT). Hattemager: 9/4 1 han (SMJ). Sødringholm, Randers Fjord: 12/4 1 par og 15/8 1 (JRR, BRR, KEH). Sortesø: 12/4 2 hanner og 2 hunner og 29/5 1 han og 1 hun (HHH). Vilhelmsborg Sø: 14/4 1 par (BHJ, FL). Glenstrup Sø: 15/4 1 han (JRR, BRR). Bjerregrav Mose: 16/5 1 han (Gejrf). Samsø, Møgelmosen: 20/4 1 par og 1 han, 29/5 1 par (AJ, DOF). Råby Odde, Randers Fjord: 17/5 1 par (JRR). Dejret Øhoved: 24/5 1 han (KHe). Samsø, Hesselholm: 6/6 3 hanner og 1 hun, 7/8 2 (LB). Alrø: 8/6 4 hanner (HLL). Tavlbord Mose: 13/6 1 han (Mgr). Horskær-Kalsemade Rev: 30/7 1 (PN). Mossø: 22/8 1 (HLL).



Figur 6. Skeand, Kysing Fjord 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode.

Taffeland (Aythya ferina)

Taffelanden er en ret almindelig træk- og vintergæst ved Kysing Fjord fra primo/medio august til medio marts. Primo marts rykker en del fugle fra Kysing Fjord til indlandslokaliteterne, hvor den optræder som fåtallig trækgæst til ultimo april. Der er kun indrapporteret 11 sikre ynglefund, og af disse er de 8 på samme lokalitet. Formodentlig yngler Taffelanden på en del andre smålokaliteter og ynglebestanden ligger formodentlig på omkring 20-25 par, da arten ofte er set i yngletiden på potentielle ynglebiotoper. Den må betegnes som en fåtallig ynglefugl. Taffelanden oversommer fåtalligt i både Kysing Fjord og Brabrand Sø.

Sikre ynglelokaliteter:

Galten Gammelose: 13/5 2, 18/5 1 par, 1/6 9, 20/6 4 (BH).

Gammelose v. Nisset: 23/5 1 par, 13/6 2 hunner med henholdsvis 3 og 6 pulli (Mgr).

Ramten-Dystrup Søer: 6/7 10 + 1 hun med 10 pulli (PH, BHI) 8 yngler

indrapporterede af OS.


Langsø (Løvenholmskov): 25/4 2 (DOF). 7/6 1 (LPJ). 1/7 1 hun med 6 pulli (LPJ).

Lokaliteter med sene trækgæster eller oversomrende/ynglende fugle:

Kysing Fjord: 9/5 4 (JDK). 15/5 1 han (BHJ, FL, JF). 22/5 9 (JF). 24/5 8 (JF). 6/6 11 (BHJ, FL). 14/6 9 (DOF). 25/6 35 (BHJ). 1/7 42 (JF). 9/7 21 (JF). 12/7 17 (JF). 16/7 23 (JF). 18/7 23 (JF). 21/7 22 (BHJ).

Brabrand Sø: 2/5 1 han, 3/5 1 han, 5/5 2 hanner, 6/5 1 par, 8/5 3 hanner, 14/5 3 (EH), 21/5 1 han, 26/5 3 hanner (NA, BHJ), 22/6 10 hanner. Hvor intet er nævnt er observatøren AJ.

Øvrige: Søbygård Sø: 5/5 12 (BH). Sorte Sø: 8/5 23 (HP). Søbygård Sø: 19/5 19 (BH). Smørmose v. Auning: 7/6 1 han (JRR, EH), Udbyover Sø: 8/6 3 hanner + 1 hun (JRR). Tranemosen: 24/7 1 han + 2 hanner (LB).



Figur 7. Taffeland, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en sammentælling af de maksimale forekomster fra hver enkelt lokalitet pr. 5-dages periode. Figuren er delt i ferskvandsiagttagelser (lukket søjle) og saltvandsiagttagelser (åben søjle). Kysing Fjord henregnes til saltvandsiagttagelser.

Fugle iagttaget på indlandslokaliteter mellem 1/12 og 15/2:

Brabrand Sø: 10/1 1 han (BHJ, PH, FL), 5/2 1 (AJ), 15/2 1 (AJ), 1/12 12 (AJ), 4/12 13 (AJ), 5/12 15 (PNN), 6/12 22 (HLL), 10/12 2 hanner (AJ).

Solbjerg Sø: 5/12 2 hunner (PH, BHJ).

Flokke på flere end 20 individer udenfor Kysing Fjord, opført i kronologisk orden: Alrø: 28/2 20 (HP), Grund Fjord: primo marts 20 (FFa), Ramten-Dystrup Sø: 29/3 72 (JRR) 4/4 31 (ØBF), 13/4 33 (St1), 15/4 30 (HP) og 17/4 50 (HP), Kolindbro: 12/10 25 (JJP), Stubbe Sø: 17/10 30 (OF), Aarhus Havn: 8/12 26 (HLL), 9/12 45 (NA), 11/12 50 (HLL) og 18/12 90 (HLL). Samtlige indrapporterede obs i perioderne 1/1 til 1/5 og 9/8 til 31/12 er ført ind på figuren (se denne).

Bidragsgydere: Mgr, OS, AJ, BHJ, FL, PH, NA, NT, HLL, BH, JRR, ØBF, St1, HP, BRR, KEH, SH, FFa, EH, JJP, DOF, HET, LPJ, HC, CO, OF, CQP, JF, NT, JDK, H+JE, LaB, HHH, ET, T. Bøgeskov, JTL, JR, HM, PNN.

Se appendix II 1980.

Troldand (*Aythya fuligula*)

Troldanden forekommer ret almindeligt til almindeligt som træk- og vintergæst fra primo okt til ultimo april. Fra maj til sept optræden den fåtalligt oversomrende, dog må fuglene fra maj og august/sept betragtes som tidlige/sene trækfugle. Arten er kun konstateret sikkert ynglende med 8 par, men der er også indrapporteret 11 par som formodentligt yngler. Disse 8 til 19 par gør arten til en sjælden til fåtallig ynglefugl.

Sikre ynglelokaliteter:

Ringelmoseskoven: 2 par (HA), Ingen obs. er indrapporteret fra denne lokalitet.

Ramten-Dystrup Søer: 2 par (OS), 6/7 34 (BHJ, PH), 30/7 10 + hun med 6 pulli (BHJ).

Botanisk Have: 2 par (NA), 3/5 4, 10/5 2, 31/5 4, alle\NA.

Universitetsparken: 1 par (NA). Heller ikke fra denne lokalitet er der indsendt obs fra yngletiden.

Lokaliteter, hvor arten formodentligt yngler: Grauballe Mose: 23/5 2 par (AJ), 0-2 ynglepar (Mgr). Tomasholm Mose: 25/5 4 hanner + 1 hun (AJ), 0-3 ynglepar (Mgr). Bjerregrav Mose: 16/5 2 (SH), 18/6 3 hanner + 1 hun (SH), 0-2 ynglepar (Gejrf). Nørremose: 0-1 ynglepar (Mgr). Tavlbord Mose: 13/6 1 par (Mgr). Galten Gammelmose: 13/5 1 (BH), 18/5 7 (BH), Gammelmose v. Nisset: 23/5 1 par, 13/6 3 hanner+1 hun, 0-2 par (Mgr). Alle obs mellem 1/5 og 1/8 nævnes:

Kysing Fjord: 6/5 4, 9/5 7 (EH, JDK), 15/5 7, 19/5 11, 22/5 8, 24/5 16, 14/6 13 (DOF), 1/7 28, 9/7 36, 12/7 39, 16/7 28, 18/7 35, 21/7 33, 22/7 36, 28/7 27. Hvor intet er nævnt er observatøren JF.

Brabrand Sø: 2/5 2 hanner + 1 hun (AJ), 3/5 3 hanner + 1 hun (AJ), 5/5 mindst 6 (AJ), 8/5 5 hanner + 3 hunner (EH), 14/5 1 (EH).

Øvrige nævnes kronologisk: 2/5 9 Universitetsparken (PH), 5/5 84 Søbygård Sø (BH), 8/5 20 Sortesø (HP), 9 Lading Sø (BH), 10/5 1 par Kysmose (SH), 7 Borum-Stormose (SH), 12/5 2 Lading Sø (BH, AJ), 1 par Astrup Mose (BHJ, PH, FL), 16/5 2 Bjerregrav Mose (SH), 17/5 11 Udbyover Sø (JRR), 18/3 3 Tåstrup Sø (BH), 19/5 14 Søbygård Sø, 8 Sminge Sø (BH), 23/5 2 par Grauballe Mose (AJ), 24/5 4 Tomsbjerg-Hadrup Skov (AJ), 25/5 4 hanner + 1 hun Tomasholm Mose (AJ), Maj max. 2 Østerby Mose (PH, BHJ), 1/6 5 Galten Sø (BH), 7/6 2 par Lindholmhoved (PM, ET), Medio juni 2 par Pilebrodalen (ET, HE), 18/6 3 hanner + 1 hun Bjerregrav Mose (SH), 19/6 1 han Bygholmsø v. Horsens (NA), 10 Østerby Mose (NA), Juni max 22 Østerby Mose (BHJ), 21/6 1 par Tranemose (LB), 2/7 2 Galten Sø (BH), 5/7 1 Lading Sø (BH), 12/7 1 hun Lysemose v. Gjærn (Mgr), 19/7 7 Salten Langsø (AJ), 22/7 5 Solbjerg Sø (BHJ), 23/7 1 hun Lille Mose syd for Salten Langsø (NA), 24/7 1 hun Beder (BHJ), juli max 16 Østerby Mose (BHJ).

Flokke over 40, som er set udenfor Kysing Fjord, nævnes:

Brabrand Sø: 30/1 ca. 100 (NT), 31/1 465 (ØBF), 2/2 389, 4/2 110 til 210, 5/2 235, 9/2 225, 11/2 173, 13/2 68 (EH), 14/2 135 til 150, 15/2 530, 16/2 671, 17/2 733, 18/2 712 (JTL), 9/3 100 til 150 (KjH), 10/3 137, 12/3 63, 13/3 77, 14/3 70, 15/3 74, 16/3 117, 17/3 92, 18/3 66, 19/3 71, 20/3 83, 21/3 63, 22/3 122, 23/3 91, 24/3 81, 25/3 78, 26/3 66, 27/3 61, 28/3 73 (AJ, FL, BHJ, PH), 30/3 61, 31/3 54, 2/4 59, 3/4 60, 5/4 67, 10/4 44. Hvor intet er nævnt er observatøren AJ.

Aarhus Havn: 12/1 40 (NA), 24/2 900 (NA), 2/3 490 (HLL), 4/3 ca. 500 (NT), 14/3 70 (NT), 18/12 925 (HLL), 26/12 48 (PH).

Fussing Sø: 1/3 200, 21/3 72, 29/11 710, alle JRR, BRR, EH, ØBF, KEH. 4/12 250 (PER).


Resten i kronologisk orden: 11/1 350 Mossø (HP), 100 Mariager Fjord (H+JE), 8/3 325 S Moesgård Strand (Moes), 16/3 60 Tranemose (LB), 18 og 19/3 311 Lading Sø (BH), 13/4 54 (St1) og 17/4 50 Ramten-Dystrup Søer (HP), 6/12 300 Stubbe Sø (OF), Primo december max 100 Silkeborg Langsø (ME).

Bestanden i Kysing Fjord kan aflæses af grafen. Alle tal er max tal fra den pågældende 5-dages periode.

Desuden er trolldanden fundet på følgende lokaliteter:

Vilhelmsborg (BHJ, FL), Skarresø Mose (JJP, Mgr), Skarresø Kirkesø (Mgr), Ødam v. Aarhus Stadion (NA), Gudenå v. Randers (NA), Risskov (NA), Tåstrup Mose (AJ), Fornæs (EH, St1, Co), Sejling Mose v. Gjærn (Mgr), Testrup Mose (BHJ), Engene vest for Grenå (CO), Glenstrup Sø (JRR), Grenå Strand (BHJ), Vallum (Mgr), Studstrup Havn (SH), Tyrso (Mgr), Geding

Sø (SH), Stadsborg Mose (Mgr, AJ), Alling Sø (ME), Kragemosen (HET), Mørke Kær (AJ, DOF), Langsø (DOF), Kolindsund (JJP).



Figur 8. Troldand, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den maksimale forekomst pr. 5-dages periode i Kysing Fjord (åben søjle) og den øvrige del af Aarhus amt (lukket søjle). Det er en sammentælling af de maksimale forekomster fra hver enkelt lokalitet.

Bjergand (Aythya marila)

Arten må betragtes som fåtallig til ret almindelig. Den er givet overset meget, da den ofte færdes langt ude på havet. Den optræder normalt fra primo oktober til ultimo marts, så maj-obsene fra Kysing er bemærkelsesværdige.

Hov til Sælvig: 17/4 2 (AJ).

Kysing Fjord: 7/2 1 han. 25/2 1 han, 28/2 9, 1/3 2 hanner, 10/3 3, 13/3 1 par (NT), 15/5 1 par (BHJ, FL, JF), 19/5 1 par, 14/10 1, 17/10 1 hun (HP), 18/10 1 hun (HP, BHJ, FL, PH), 29/12 1 hun (H+JE).

Aarhus Havn: 24/2 5 (NA), 2/3 1 han (HLL), 18/12 9 (HLL).

Ebeltoft Havn: 29/3 1 hun (HHH).

Fornæs: 28/3 95 N (HC), 17/4 5 trk. (St1), 3/10 1 han S (CO) + 35 N (HC).

Bjerganden optrådte i 1981 som fåtallig trækgæst ved Brabrand Sø:

15/2 6 hanner + 3 hunner (AJ), 16/2 4 hanner + 2 hunner (AJ, EH), 17/2 3 hunner (AJ, JR), 18/2 19 (HLL, EH, NA), 9/3 1 (NT), 4/4 2 (HM).

Desuden en enkelt obs fra Lading Sø: 15/3 1 (BH).

Måned	jan	feb	mar	apr	maj	okt	nov	dec	ialt
Antal fugle	0	53	106	9	4	39	0	10	221

Hvinand (*Bucephala clangula*)

Hvinanden forekommer fåtalligt til ret almindeligt som efterårs-, træk- og vintergæst fra medio oktober til primo marts. Fra medio marts til medio april forekommer den ret almindeligt til almindeligt. Fra medio april til primo oktober er den sjælden til fåtallig.

Indlandsobs:

Østerby Mose: Marts max 8 (BHJ), april max 8 (BHJ, PH), 6/12 og 8/12 1 han (BHJ).

Brabrand Sø: 4/1 3 hanner, 5/1 3, 27/1 3, 30/1 1, 5/2 11, 8/2 7, 9/2 11, 11/2 1 han, 13/2 1, 14/2 1, 17/2 6, 16/2 5, 17/2 7, 18/2 16, 1/3 10, 3/3 4, 4/3 4, 5/3 4, 9/3 6, 10/3 8, 12/3 3, 13/3 5, 14/3 11, 15/3 17, 16/3 11, 17/3 24, 18/3 17, 19/3 15, 20/3 25, 21/3 15, 22/3 10, 23/3 8, 24/3 7, 25/3 7, 26/3 8, 27/3 6, 28/3 19, 30/3 11, 31/3 13, 2/4 16, 5/4 3, 10/4 6, 11/4 1, 4/5 2 hunner, 8/5 1 han, 1/10 1, 15/10 1, 16/10 1, 21/10 2 hanner, 1/11 2 hunner, 10/11 1, 29/11 4, 1/12 4, 4/12 5, 5/12 5, 6/12 4. Bidragsydere: ET, PMT, AJ, NA, NT, JR, LaB, EH, CQP, BHJ, PH, FL, HLL, JDK, PNN.

Lading Sø: 10/3 2, 14/3 3, 15/3 2, 16/3 3, 17/3 1, 18/3 5, 21/3 3, 22/3 7, 23/3 2. Alle BH.

Fussing Sø: 21/3 15 (JRR, BRR, KEH), 31/3 10 (JRR, BRR, KEH), 18/10 125 (SH), 29/11 3 (JRR, BRR, KEH).

Resten i kronologisk orden: 11/1 20 Mossø (HP), 8/2 8 Kulsø (JB), 1/3 8 Salten-Langsø (HP), 8/3 ca. 8 Salten-Langsø (JB), 14/3 min 15 Salten Langsø (BHJ), 29/3 4 Salten-Langsø (JB), 1 Alling Sø (Mgr), 30/3 1 par Bjerregrav Mose (Gejrf), 31/3 3 Testrup Mose og 1 hun Astrup Mose (BHJ), 2/4 43 Sminge Sø (BH), 4/4 10 Ramten-Dystrup (ØBF), 5/4 1 par Vallum (Mgr), 13/4 3 Ramten-Dystrup (stl), 16/4 4 Stubbe Sø (Stl), 17/4 6 Ramten-Dystrup (HP), 19/5 2 Søbygård Sø (BH), 23/9 2 Tomsbjerg-Hadrup Skov (DLJ), 30/9 1 hun Mørke Kær (AJ), 1/11 1 hun Vilhelmsborg (BHJ), 15/11 200 Stubbe Sø (OF), 6/12 min 125 Stubbe Sø (CO, OF).

Havobs:

Hesselholm: 25/1 min 200, 13/3 21, 14/3 ca. 98, 15/3 250 til 300, 16/3 32. Alle LB.

Alrø/Lerdrup Vig: 15/2 44 (LPJ, KL), 28/2 5 (HP), 7/3 16 (HP), 15/3 25 (LPJ, KL), 5/4 45 (SH), 14/11 2 (LPJ).

Horskær: 11/1 41, 25/1 14, 1/2 10, 8/2 14, 22/2 24, alle LPJ + KL, 14/11 2 (LPJ).

Kysing Fjord: 4/1 37, 10/1 28, 11/1 13, 13/1 7, 17/1 20, 18/1 5, 25/1 41, 27/1 2, 1/2 19, 5/2 75, 7/2 23, 12/2 30, 14/2 61, 20/2 100, 21/2 12, 25/2 17, 28/2 26, 1/3 3, 6/3 35, 10/3 79, 12/3 66, 13/3 150, 14/3 48, 17/3 10, 18/3 78+21, 19/3 100, 21/3 91, 22/3 127, 23/3 122, 27/3 46,

28/3 126, 29/3 212, 2/4 111, 4/4 100, 5/4 151, 9/4 11, 12/4 9, 15/4 13, 20/4 8, 29/4 1 han, 6/5 1 hun, 9/5 4, 9/7 9, 12/7 6, 16/7 8, 18/7 9, 21/7 4, 22/7 7, 28/7 6, 1/8 8, 2/8 10, 3/8 2, 5/8 2, 9/8 10, 11/8 1, 14/8 7, 15/8 2 hunner, 21/8 10, 22/8 6, 23/8 6, 31/8 2, 4/9 3, 7/9 4, 9/9 5, 15/9 2, 1/10 1, 4/10 8, 11/10 8, 14/10 13, 17/10 10, 18/10 28, 21/10 25, 23/10 15, 25/10 19, 4/11 41, 5/11 41, 6/11 48, 8/11 49, 16/11 105, 28/11 71, 5/12 102, 6/12 150, 7/12 160, 16/12 12, 20/12 5, 29/12 1. Bidragydere: JF, LPJ, KL, DOF, SH, HP, ET, PMT, NT, H+JE, BHJ, PH, JDK, EH, FL, KET, AJ.

Kysing Næs: 11/4 4 rast. (BHJ, PH, FL), 8/2 1 S (BHJ, PH, FL), 18/10 33 S + 1 N + 4 V (HP, BHJ, PH, FL), 20/12 13 N (SH, PH, BHJ).


Moesgård Strand: 4/1 1 S + 4 rast., 17/1 2 rast., 25/1 23 rast, 2/2 17 N (NA), 22/2 8 rast, 9/3 7 S, 16/3 1 hun S (NA), 18/3 2 S, 21/3 3 N, 22/3 3 N (NA). Hvor intet er nævnt Moes.

Aarhus Havn: 17/1 2 hanner (PH, BHJ), 24/2 2 hunner (NA), 5/10 1 han (PH)

Fornæs: 22/2 5 trk (EH), 4 N + 9 S + 1 rast (JDK), 29/3 6 trk (EH), 15/4 2 (SH), 18/4 2 (St1), 10/10 3 S (CO), 25/10 5 S (CO), 8/11 35 N + 11 S (CO), 28/12 5 (SH).

Randers Fjords udløb: 15/3 27, 22/3 5, 12/4 6, 1/8 3, 24/10 34, 25/10 6, 14/11 22, 28/11 8, 13/12 ? (JRR, BRR, EH, KEH, JM, AJ).

Resten i kronologisk orden: 14/2 2 Hassenøer (H+JE), 26/2 25 Risskov



Figur 9. Hvinand, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en sammentælling af den maksimale forekomst fra hver enkelt lokalitet pr. 5-dages periode.

Strand (NT), 1/3 15 Føllebund (HA), 14/3 150 Kalø Slotsruin (JRR), 15/3 240 Ajstrup Bugt (JRR, BRR, KEH), samt 12 mellem Mariager og Hadsund (ØBF), 22/3 24 Kareholm (EH), 4 Råby Odde (EH, JRR, BRR), 23/3 10 Risskov Strand (NT), 11/4 42 Kareholm (BRR, JRR, EH), 12/4 9 Gjerrild (St1), 13/4 1 Gjerrild (St1), 16/4 3 Gjerrild (St1), 31/5 5 Råby Odde (EH), Ultimo juni til primo juli 2 hanner + 1 hun Grund Fjord (FFa), 28/9 3 Sælvig-Bugten (LB), 25/10 11 Boelsrev (JRR), 7/11 5 Stavnsfjord (JR), 14/11 95 Ajstrup Bugt (JRR, BRR, KEH), 28/11 420 Ajstrup Bugt (AJ, JRR, JM), 1 Studstrup Havn (SH), 10/12 40 Føllebund (HA), 13/12 21 Mariager Fjords udløb (JRR).

Se appendix II 1980

Havlit (*Clangula hyemalis*)

Ifølge materialet er havlitten sjælden til fåtallig. Den er sikkert overset i betydelig grad, da det er den and, der findes længst fra land. Bedste sted i amtet er Fornæs med fire obs af 13 fugle.

Fornæs: 28/3 5 hanner N (HC), 14/4 6 trk (St1), 21/11 1 han (HC), 28/12 1 han (SH).

Øvrige obs i kronologisk orden: 19/4 1 han Østre Hedekrog (LB), 20/4 1 han Horskær (LPJ), 21/11 2 fra Kalundborg-færgen (NA).

Fløjlsand (*Melanitta fusca*)

Arten er i de seneste lokalrapporter betegnet som meget sjælden på grund af manglende indrapportering. Klaus Malling Olsen talte 15/4 1400 Fløjlsænder nær Samsø, hvorfor arten må betegnes som almindelig.

Kun en indlandsobs i år:

Lading Sø: 18/3 4 (BH).

Sortand (*Melanitta nigra*)

Ligeledes denne art er tidligere blevet betegnet som meget sjælden. Ifølge materialet er arten almindelig træk- og vintergæst fra primo oktober til medio april. Obs over 100 nævnes:

Fornæs: 14/4 439 trk (St1), 16/4 274 trk (St1), 17/4 2359 trk (St1).

Samsø, fra Kalundborg-færgen: 15/4 300 (Klaus Malling Olsen).

3 indlandsobs i år, heraf den ene fra juni:

Solbjerg Sø: 27/6 1 han (BHJ, FL), og Brabrand Sø: 4/3 1 hun (HLL),
27/3 1 han (AJ).

Ederfugl (*Somateria mollissima*)

FC har indsendt optællinger fra en del ynglelokaliteter. Arten er almindelig året rundt.

Svanegrund: 21/5 78 par. Alrø Polder: 19/5 166 par. Søby Rev: 19/5
366 par. Hov Røn: 27/5 828 par.

Desuden nævnes flokke over 500:

5/4 800 Kalsemade (SH), 31/3 500 hvor? (JJP).

Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*)

Se appendix II 1972.

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*)

Atter et meget fint materiale især fra Brabrand Sø. Arten er fåtallig til ret almindelig som forårstrækgæst. De første fugle ankommer primo oktober og sidste obs er fra 9/5. Alle obs nævnes:

Alrø/Lerdrup Vig: 15/2 91 (LPJ), 28/2 15 (HP), 7/3 3 (HP), 8/3 4 (LPJ),
15/3 7 (LPJ).


Kysing Fjord: 2/1 5, 4/1 7, 10/1 7, 11/1 7, 13/1 4, 17/1 15, 18/1 8,
25/1 12, 26/1 6 hanner, 27/1 11, 1/2 9, 5/2 5, 7/2 7, 12/2 4, 14/2 5,
17/2 4 par, 20/2 12, 21/2 17, 25/2 5, 28/2 9, 1/3 7, 6/3 11, 10/3 2,
12/3 4, 13/3 6, 14/3 8, 15/3 4, 18/3 11, 19/3 5, 21/3 6, 22/3 9, 23/3
12, 27/3 13, 28/3 15, 31/3 4, 2/4 10, 4/4 13, 5/4 4, 9/4 4, 12/4 3, 20/4
3 hanner, 22/4 + 26/4 + 29/4 3 hanner. 9/5 2, 17/10, 6/11 og 8/11 1
hun, 6/12 1 han. Bidragsydere: (CQP, JF, DOF, LPJ, KL, SH, BHJ, PH, FL,
AJ, PH, FF, ET, NT, HHH, H+JE, EH, JDK).

Mossø: 11/1 55 (HP), 12/2 18 (HHH), 15/2 7 (CQP), 14/3 53, 18/3 17, 14/4
4, 12/11 1. Alle HHH. 6/12 5 (DOF).

Salten Langsø: 1/3 7 (HP), 8/3 5 (JB), 9/3 18 (CQP), 14/3 14 (BHJ), 5/4
12 (DOF), 4/10 2 (DOF), 8/11 35 (HP), 15/11 2 (HP).

Moesgård Strand: 15/3 9 N (Moes), 16/3 1 han rast (NA), 18/3 (2 hanner
+ 1 hun) N (AJ), 20/3 5 N (Moes), 28/3 5 N (Moes).

Brabrand Sø: 2/1 30, 4/1 1 han, 5/1 1, 6/1 4, 10/1 22, 11/1 9, 13/1



Figur 10. Stor Skallesluger, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en sammentælling af den maksimale forekomst fra hver enkelt lokalitet pr. 5-dages periode. Figuren er delt i ferskvandsiagttagelser (åben søjle) og saltvandsiagttagelser (lukket søjle). Kysing Fjord er medtaget som saltvandsiagttagelse.

23, 15/1 26, 17/1 4, 25/1 3, 27/1 30, 30/1 40, 31/1 40, 2/2 25, 4/2 53, 5/4 43, 8/2 34, 9/2 25 til 30, 11/2 31, 13/2 36, 14/2 30 til 35, 15/2 40, 16/2 51, 17/2 48, 18/2 53, 19/2 3, 21/2 20, 22/3 + 24/2 8, 26/2 39, 1/3 16, 3/3 30, 4/3 33, 5/3 34, 8/3 36, 9/3 50, 10/3 41, 12/3 25, 13/3 30, 14/3 35, 15/3 47, 16/3 26, 17/3 36, 18/3 31, 19/3 22, 20/3 50, 21/3 15, 22/3 19, 23/3 14, 24/3 9, 25/3 10, 26/3 15, 27/3 12, 28/3 16, 30/3 12, 31/3 16, 2/4 17, 3/4 5, 5/4 11, 6/4 11, 7/4 6, 8/4 4, 9/4 4. Vinter: 1/12 4, 4/12 4, 5/12 4 (han + 3 hunner), 6/12 60, 8/12 6, 9/12 4 til 5, 10/12 7, 11/12 8, 12/12 3, 13/12 14, 15/12 6, 20/12 8, 22/12 6, 26/12 8, 27/12 6, 28/12 1 hun. Bidragsydere: HLL, ET, PMT, NT, BHJ, FL, PH, AJ, JTL, H+JE, NÅ, ØBF, JR, FP, LaB, EH, JDK, CQP, PNN, HHH, DOF. Lading Sø: 10/3 5, 13/3 7, 14/3 9, 15/3 11, 16/3 3, 17/3 1, 18/3 5, 19/3 7, 20/3 4, 21/3 18, 22/3 34, 23/3 40, 24/3 15, 26/3 14, 27/3 28, 28/3 8, 30/3 24, 31/3 18, 1/4 14, 2/4 3, 6/4 10, 8/4 11, 11/4 10. Alle BH. Resten i kronologisk orden: 11/1 8 Mariager Fjord (H+JE), 13/1 1 han og 17/1 10 hanner + 6 hunner ved Åhavevej (AJ), 25/1 4 hanner Horskær (LPJ), 7/2 4 Skanderborg Sø (HHH), 8/2 6 Kulsø (JB), 11/2 79 Skanderborg Sø (HHH), 28/2 10 Alling Sø (ME), 11/3 19 Alling Sø (ME), 12/3 2 hanner + 4 hunner Bjerregrav Mose (JRR), 13/3 30 Silkeborg Langsø (ME), 15/3 1

mellem Mariager og Hadsund (ØBF), 3 Pletten og 2 Ajstrup Bugt (begge Mar. Fj.) (JRR, BRR, KEH), 17/3 3 Bjerregrav Mose (EH), 21/3 3 Vallum Sø (JJP), 17 Fussing Sø (JRR, BRR), 22/3 5 Kareholm (EH, JRR, BRR), 200 Stubbe Sø (OF), og 1 han Råby Odde (EH, JRR, BRR), 23/3 6 Kongslund v. Randers (JRR, BRR), 25/3 1 Skanderborg Sø (HHH), 1 han + 3 hunner N Gjerrild (DOF), 27/3 1 han + 4 hunner Tåstrup Sø (AJ), 29/3 6 trk Fornæs (EH), 4 Torup Sø (JB), 30/3 14 Bjerregrav Mose (JRR, BRR, EH), 31/3 30 Fussing Sø (JRR), 11/4 22 Kareholm (JRR, BRR, KEH), 2 Skanderborg Sø (HHH), 12/4 1 hun Råby Odde og 24 Ajstrup Bugt (JRR, BRR, KEH), 13/4 26 Gjerrild (St1), 15/4 5 Glenstrup Sø (JRR, BRR), 17/4 1 Fornæs (St1), 2 hunner Ramten-Dystrup (HP), Efterår: 3/10 13 N Fornæs (CO), 21/10 1 hun Solbjerg Sø (BHJ), 15/11 5 Stubbe Sø (OF), 28/11 2 Ajstrup Bugt (AJ, JRR, JM), 4/12 1 han Fussing Sø (PER), 5/12 3 Solbjerg Sø (BHJ, PH). 6/12 60 Stubbe Sø (CO, OF), 19/12 9 V Grenå Plantage (CO), 27/12 10 N Polde Rev (CO), 26/12 8 og 27/12 2 hunner Aarhus Havn (PH), 28/12 60 Fornæs og 20 Studstrup Havn (SH).

Se appendix II 1980.

Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Ifølge LB er ynglebstanden på Samsø gået tilbage siden 1979. Arten er ret almindelig hele året, dog sjælden inde i landet.

Indlandsobs:

13/4 1 Ramten-Dystrup (St1), 16/4 1 Gedding Sø (SH), 10/5 1 par (JTL) og 20/5 1 hun (AJ) Brabrand Sø, 15/11 14 Ø Stubbe Sø (OF).

Se appendix II 1980.

Lille Skallesluger (Mergus albellus)

Arten optrådte i 1981 fåtalligt til ultimo marts, mens den svigtede i efterår og vinter, hvor den var meget sjælden. Kysing Fjord tegner sig stadigvæk for langt størstedelen af fuglene, men flere lokaliteter er kommet med.

Kysing Fjord: 2/1 1 han + 2 hunner, 4/1 3, 10/1 21, 11/1 25, 13/1 22, 17/1 17 hanner + 11 hunner, 18/1 5, 25/1 19, 26/1 8 hanner + 7 hunner, 1/2 8, 5/2 5, 7/2 2, 12/2 22, 14/2 32, 20/2 4 hanner + 7 hunner, 21/2 13, 25/2 17, 28/2 8, 1/3 5, 6/3 5, 10/3 11, 12/3 12, 13/3 6 hanner + 7 hunner, 14/3 20, 15/3 1 han + 2 hunner, 17/3 2, 18/3 5, 21/3 7, 22/3 9, 23/3 9, 27/3 5, 28/3 10, 2/4 6, 4/4 3, 5/4 4. Efterår: 16/11 1 hun, 28/11 1 hun, 5/12 1 hun, 7/12 2 hanner, 16/12 1 par, 20/12 1 han, 28/12


1 han. Bidragsydere: CQP, JF, LPJ, KL, BHJ, PH, FL, AJ, GG, HP, HLL, ET, NT, HHH, H+JE.

Desuden: 11/1 1 han og 18/3 2 hanner + 5 hunner Mossø (GG, HP, HHH), 21/3 1 han Fussing Sø (JRR, BRR), 31/3 1 han Knud Sø (PJJ), 15/10 1 han Brabrand Sø (PNN).

Også en sommerobs:

18/6 1 han Bjerregrav Mose (ØBF). Dette er meget usædvanligt for arten og ifølge NA skulle det være 4. gang arten er iagttaget i Danmark i sommerperioden.

Se appendix II 1980.



Figur 11. Lille Skallesluger, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en sammentælling af de maksimale forekomster fra hver enkelt lokalitet pr. 5-dages periode.

Ørn sp (Aquila sp)

31/5 i Tapdrup (HeP) meget sent tidspunkt for iagttagelse af ørne.

Stor Skrigeørn (Aquila clanga)

Se appendix I

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina)

Se appendix I

Musvåge (Buteo buteo)

Almindelig trækfugl fra medio marts til medio april. Forholdsvis almindelig ynglefugl. Fåtalig trækfugl i oktober måned samt ligeledes fåtaligt overvintrende.

Moesgård: Fra 18/2 til 29/5 874 trækkende. Noget under det normale. Max dage: 18/3 147, 22/3 131 og 10/3 106 (Moes).

Brabrand Sø: 11/2 2 N (LaB), 22/3 9 N (HLL), 2/4 7 trk (JR), 30/3 2 trk (EH), 13/8 4 N (LaB), 16/10 2§ (BHJ), 17/10 30 trk (HLL).

Anholt: 14/4 55, 15/4 45, 16/4 15, 17/4 30, 18/4 10 (OF), 24/4 10 NØ, 27/4 5 NØ (NT).

Djursland: 28/3 100 rast Gjerrild (OF), 29/3 7 Fornæs (EH), 29/3 1345 Veggervlev (EH), 29/3 283 Gjerrild (HC), 31/3 155 Fornæs (HLL), 31/3 174 Gjerrild (HLL), 4/4 55 rast Veggervlev (OF), 6/4 93 Fornæs (HLL), 9/4 44 NØ Fornæs (NT), 10/4 3 NØ Fornæs (NT), 12/4 36 SV + 3 NØ Fornæs (NT), 16/4 24 Stubbe Sø (St1), 17/4 125 Gjerrild (GG, HP).

Tomkær Alsrode: 18/3 550 S (OF), og 5/4 64 N (OF).

Øvrige: 22/3 32 trk Dudrunsvvej, Brabrand (JR), 29/3 7 Kysing Fjord (SH), 31/3 14 NØ Trige Skove (HB), 31/3 15 N Himmelbjerget (PJJ), 5/4 47 NØ Blisbæk ved Ørting (KEM), 5/4 6 N Jelshøj (BHJ), 12/4 3 N Kysing Fjord (BHJ, PH, FL), 14/4 10 Kolindsund (JJP), 23/5 2 trk Brønstrup (EH), 11/10 14 V Moesgård Strand (JTL), 18/10 19 i skrue Gylling Næs (CQP).

Ynglefugle:

1 par Skarre Sø (JJP), 1 par Vallum Sø (JJP), 1 par Sivested (JJP), 1 par Fastrup Skov (JJP), 1-2 par Ørbæk Skov (JJP), 1 par Vilhelmsborg (BHJ), 1 par Gedding Sø (HB), 2 par Trige Skov (HB), 1 par Ravnholt Skov (BHJ), 1 par Hørret Skov (BHJ), 1 par Brønstrup v. Gjerrild (BHJ), 1 par Vallum Sø (JJP), 1 par nær Kolind Sund (JJP), 1 par Dystrup-Ramten Sø (OS), og 3 par Tornbjerg-Hadrup Skov (DLJ).

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Fåtalig trækfugl med kulmination medio-ultimo april. Fåtalig vintergæst. Alle observationer nævnes:

Moesgård: 27/3 1 rast (NT), 29/3 1 N, 5/4 1 N, 9/4 3 N, 12/4 1 ad N (først 2. gang ad. er bestemt ved Moesgård) (NA), 14/4 2 N, 18/4 1 NV, 20/4 1 N (Moes).


Øvrige: 1/1 1 Vilhelmsborg (BHJ, FL), 4/1 1 Kolindsund (JJP), 22/2 1 Borskær (LPJ), 12/3 1 Bjerregrav Mose (JRR), 17/3 1 Bjerregrav Mose (EH), 22/3 1 Skarresø (JJP), 22/3 1 Kolindsund (JJP), 29/3 1 Fulden (BHJ, FL, PH), 1/4 1 Vilhelmsborg (BHJ), 6/4 1 Fornæs (HLL), 7/4 2 Gjerrild (JJP), 9/4 1 Fornæs (NT), 14/4 5 Anholt (OF), 14/4 1-2 Tomkær, Alsrode (OF), 21/4 2 Koed (JJP), 21/4 2 V Kolindsund (JJP), 26/4 2 Bjerregrav Mose (SM), 27/4 1 Anholt (NT), 2/5 1 Råbyenge, Randers Fjord (JRR, EPL, KeH), 17/5 5 trk Gjerrild (GG), 17/5 1 Råbyenge, Randers Fjord (JRR, BRE, KeH), 11/10 1 Akær (N. ID), 16/10 1 Råbyenge (JRR, BRE, KeH).

17/10 1 Hørret Enge (BHJ, PH), 17/10 2 V Helgenæs, 27/10 1 Råby Odde, Randers Fjord (JRR, BRR, KeH), 24/10 1 Pletten, Mariager Fjord (JRR, BRR, KeH), 25/10 og året ud 1 Vilhelmsborg (BHJ, PH, FL), 7/11 1 Koed (JJP), 8/11 1 Salten Langsø (JB), 14/11 1 Lerdrup by (LPJ), 28/11 1 Råby Enge, Randers Fjord (JRR, JM, AJ), 28/11 1 Pletten, Mariager Fjord (JRR, JM, AJ), 5/12 1 Astrup Mose (BHJ, PH), 26/12 1 juv Aarhus Havn (PH), og 27/12 1 trk Skovmøllen (HE).
 Se appendix II 1978, 1980.

rød Glente (Milvus milvus)

Sjælden trækgæst om foråret. Meget sjælden trækgæst i efterårsmånederne. 19 iagttagelser af 21 fugle er noget mere end i 1980.

19/3 1 N Moesgård Strand (Moes), 22/3 1 N Moesgård Strand (Moes), 29/3 1 Alsrode (OF), 31/3 1 N Gjerrild by (JJP), 2/4 1 NØ Ryomgård by (JJP), 6/4 1 N Moesgård Strand (Moes), 12/4 1 trk Kompedal Plantage (KeH), 16/4 2 Stubbe Sø (Stl), 16/4 1 Hyllested-Ørup (Stl), 17/4 2 Gjerrild (GG), 18/4 1 N Moesgård Strand (Moes), 23/4 1 ved Røved (PN), 26/4 1 Veggerslev Mose (OF), 28/4 1 Katholm Skov (OF), 5/5 1 Mossø (meddelt NA), 13/5 1 Spørring (HLL), 19/5 Tomkær, Alsrode (OF), 20/5 1 Spørring (LaB), og fra efteråret: 1/11 1 Tomkær, Alsrode (OF).
 Se appendix II 1980.



Sort Glente (*Milvus migrans*)

Meget sjælden trækgæst om foråret.

8/4 1-2 Veggerslev (RD), meget tidlig iagttagelse, normalt foreligger første iagttagelser ultimo april.

Havørn (*Haliaeetus albicilla*)

Meget sjælden trækgæst. 4 iagttagelser, noget over det normale niveau.

11/1 1 Mossø (GG), 30/3 1 juv trk N Brabrand Sø (KHe), 22/5 1 imm Salten Langsø (PJJ) og primo oktober i Havknuden, Katholm (meddelt OF).

Se appendix II 1978, 1980

Hvepsevåge (*Pernis apivorus*)

Ret almindelig trækgæst i maj-juni. Herefter iagttaget fåtalligt frem til medio september, hvor efterårstrækket er afsluttet. Fåtalig ynglefugl. Alle observationer nævnes.

Moesgård Strand: 15/5 5 NØ, 16/5 3 N, 18/5 69 N + 8 NV, 19/5 2, 22/5 1 par i parringsflugt, 23/5 1 N, 29/5 3, 30/5 3 N (Moes).

Brabrand Sø: 13/5 3 N (JTL), 15/5 1 N (LaB), 16/5 1 (JTL), 24/5 1 N (HLL) 26/5 1 NV (NA), 31/5 1 SV (NA), 1/6 1 N (JTL), 3/6 1 N (JTL), 5/6 1 N (JTL), 18/6 4 N (HLL), 24/6 1 (HLL), 13/8 2 (HLL).

Anholt: 24/5 15 (NT), 25/5 10 (NT), 26/5 20 (NT).

Kysing Fjord: 15/5 1 (BHJ, FL), 14/7 2 (PN), 21/7 1 (JDK), 15/8 6 (GG).

Øvrige: 15/5 11 NNØ Kasted Mose (JDK), 15/5 8 N Vilhelmsborg (BHJ, FL), 18/5 4 N Årslev (JTL), 19/5 2 NNØ Forsthaven (BHJ), 20/5 1 NV Skovby (JTL), 20/5 2 Bryrup (JB), 22/5 2 par i parringsflugt Fløjstrup Skov (JTL), 23/5 2 Veggerslev (EH), 23/5 6 trk Gjerrild Nordstrand (EH), 23/5 7 Brønstrup (EH), 24/5 5 Mølleparken (ET), 24/5 15 Ø Gjerrild Nedskov (HB), 24/5 1 Norring (SMJ), 31/5 2 i parringsflugt Draby Sø (ØBF), 31/5 6 NØ Ryomgård, 1/6 4 N Årslev (JTL), 2/6 9 Ø Gjerrild Nordstrand (JJP), 4/6 5 N Ørum (JJP), 4/6 1 Ryomgård (JJP), 23/6 1 Bryrup, 5/7 1 Sondrup (HLL), 22/7 Hasle Enge (NA), 27/7 1 par Nørreris (SMJ), 3/8 1 Lange Sø (JTL), 15/8 1 Vilhelmsborg (BHJ), 16/8 2 Fulden (BHJ, PH, FL), 20/8 2 Katrinedal (KB), 22/8 1 Mossø (Mossø), 22/8 1 Salten Langsø (HLL), 22/8 1 S Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (JRR, BRR, KeH), 5/9 1 Mossø (HLL), 5/9 1 Edslevknude (BHJ), 10/9 1 Kvottrup Skov (PN), 14/9 2 SV Dørup (PMT, ET), 24/9 1 Gedding Sø (JR).

Se appendix II 1978, 1980.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*)

Sjældnen, spredt forekommende ynglefugl (8-11 par). Da fuglene i yngletiden strejfer langt omkring, er antal ynglende par nok i overkanten. Almindelig forårstrækgæst (ult. marts/ult. maj). Almindelig efterårstrækgæst (pr. aug/ult. sept). Ungfuglene i pr. juni/med juni er sandsynligvis omstrefjende ikke-ynglende fugle. I 1981 indrapportering om 62 trækkende fugle. Yderligere oplysninger om denne rovfugl kommer som specialartikel i 1982 i Søravnen.

Ynglefugle:

Samsø 3-4 par. Tranemose: 13/4 1 han (LB), 16/4 1 han + 1 hun (LB), 20/4 1 hun (DOF), 29/5 2 hanner (DOF), 1 (LB), 11/7 1 han (AJ, HHH), 24/7 1 han (LB), 29/7 1 (LB). Hesselholm: 21/6 1 m. bytte (LB), 19/7 1 (LB), 28/7 1 han + 1 hun (LB), 29/7 1 han + 1 (LB), 1/8 1 hun (LB), 5/8 1 hun (LB), 29/8 1 han + 1 hun (LB). Kragesmose: 19/4 1 par m. redemateriale (DOF), 30/5 1 han + 1 hun (DOF), 26/4 1 par (HEt). Grydenæs: 20/4 1 han m. redemateriale (DOF), Møgelose: 6/6 1 hun (LB) og Brattingborg: 29/5 1 han (LB, DOF) + 1 hun (DOF).

Skanderborg Sø 1 par. 23/6 1 han + 1 hun (HHH), 2/7 1 hun (HHH), 3/7 1 han + 1 hun (HHH), 5/7 1 hun (HHH).


Skaføgård Sø 1 par. Juni et par bytteaflevering (JTL).

Brabrand Sø 1 par. Fin dækning. Fuglene ankommer i ult. marts. Parringsflugt i pr. april/ult. april. 30/3 1 ad. han (AJ), 1 hun/juv (EH) (1 han KHe), 2/4 1 ad. han (JR), 3/4 1 ad. han (AJ, JTL, JR), 6/4 1 ad. par (AJ, JTL parringsflugt), 7/4 1 ad. han (AJ, JTL), 1 ad. hun (JTL), 8/4 1 par (ET), 9/4 1 ad. han (AJ), 11/4 1 ad. han (AJ), 1 hun (AJ), 1 par parringsflugt (HM, BHJ, PH, FL), 12/4 1 ad. han (AJ, SH) + 1 hun (AJ), 19/4 1 par (JR), 21/4 1 par (NT), 22/4 1 par parringsflugt (PJJ), 24/4 1 han (AJ), 1/5 1 hun (AJ), 5/5 1 (AJ), 9/5 1 (AJ), 1 hun (BHS, PH), 10/5 1 han (JDK), 3/8 1 hun (NA), 13/8 1 ad. hun (HLL).

Smørmose v. Auning 1 muligt ynglende par. 7/6 1 hun (JTL), 8/6 2 hanner (JTL).

Bjerregrav Mose 1 par. 2/4 1 han (BRR, KEH, JRR), 26/4 1 han + 1 hun (SH), 9/5 1 par (JRR, 7/6 1 ad. han (JRR, ØBF), 18/6 1 hun (JRR, ØBF, SH), 15/7 1 han (SH).

Randers Fjord 1-2 par. Med. maj 1 hun Grund Fjord (FFa), 17/5 1 S, Randers Fjords udløb (JRR), 8/6 1 ad. han Møllegrund.



Figur 12. Rørhøg, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk pr. måned.

Forårstrækgæster:

29/3 1 han og 1 hun Kysing Fjord (SH), 30/3 1 juv han Brabrand Sø (NA), 31/3 1 Abyhøj (HET), 11/4 2 hunner Brabrand Sø (AJ), 12/4 1 han Kysing Fjord (DOF), 1 Gudenaen v. Randers Fjord (HP), 14/4 1 ad. han N Akær v. Ørting (HP), 16/4 2-3 Stubbe Sø (Stl), 18/4 2 hanner Vesterløkke, Samsø (LB), 20/4 3 hanner Kolby, Samsø (DOF), 1 han Vesborg Fyr, Samsø (DOF), 22/4 1 juv. hun Brabrand Sø (NA), 24/4 1 juv. Brabrand Sø (HLL), 25/4 1 Anholt (NT), 27/4 1 Anholt (NT), 29/4 1 ad. Kasted Mose (LLH), 1 ad. han Alsrode (OF), 2/5 1 han Tåstrup Sø (AJ), 18/5 4 juv. Alsrode (OF), 19/5 2 juv. Tomkær Alsrode (OF), 28/5 1 han Gammelholm, Samsø (DOF) 1 Alstrup Mose, Samsø (DOF), 29/5 1-2 Vesborg Fyr, Samsø (LB) (1, DOF), 31/5 1 hun Kysing Fjord (JF), 1 han Hassensør (JTL, ØBF), 2/6 1 sub.ad. han Alsrode (OF), 14/6 1 sub.ad. han Alsrode (OF), 18/6 1 juv. Stubbe Sø (OF).


Efterårstrækgæster:

1/8 1 hun Hesselholm, Samsø (LB), 11/8 1 + 2 hunner/juv. Kysing Fjord (AJ), 14/8 1 juv. Kysing Fjord (JF), 16/8 1 han Kysing Fjord (JF), 21/8 1 juv. Kysing Fjord (JF), 22/8 1 Skødshoved (AJ), 1 Kolindsund (OF), 1 engene v. Grenå (OF), 3/9 1 hun engene v. Grenå (CO), 6/9 1 rast Brabrand Sø (JTL), 9/9 2 Kysing Fjord (JF), 12/9 1 ad. hun + 1 juv. Kysing Fjord (BHJ, FL), 15/9 1 Kysing Fjord (JF), 19/9 1 ad hun Brabrand Sø (JTL), 25/9 1 Brabrand Sø (LA, JG), 28/9 1 hun Hassensør (LPJ).

Se appendix II 1980.

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

77 indrapporteringer i 1981. Fåtalig træk- og vintergæst. Hyppigst i forårs månederne (pr. marts/med. maj - max. med. april) med 54 observationer. Efteråret med 23 observationer (pr. sept/med. dec). Ingen iagttagelser af hanner i denne periode. Efter med. nov, sandsynligvis overvintrende ex. Største tal: Moesgård 6 (forår), Fornæs-Gjerrild 21 (forår) og 4 (efterår), Mariager Fjord 7 (efterår/vinter), Anholt 14 (forår).



Figur 13. Blå Kærhøg, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk pr. 5 dages periode.

Forårstrækgæster:

4/3 1 hun/juv. Brabrand Sø (AJ), 9/3 1 Lading Sø (BH), 22/3 1 hun/juv. Stenalt (EH, JRR), 1 han trk N Moesgård (Moes), 1 ad. han trk N kl. 12.7 Moesgård (AJ), 23/3 1 hun/juv. trk NØ Moesgård (Moes), 30/3 1 Lading Sø (BH), 31/3-11/4 1 hun/juv. set dagligt Alsrode (OF), 5/4 1 han trk N Bilsbæk v. Ørting (KEM), 6/4 1 hun/juv. Moesgård (Moes), 1 hun/juv. Fornæs (HLL), 7/4 1 hun/juv. Fornæs (NT), 1 hun/juv. Gjerrild (Stl), 9/4 1 hun/juv. Moesgård (Moes), 1 hun/juv. Hattemager (SMJ), 12/4 1 han Kysi Fjord (DOF), 3 trk Gjerrild (Stl), 13/4 1 juv. han trk N Katrinebjerg Aarhus (NA), 3-4 trk Gjerrild (Stl), 14/4 4 trk Gjerrild (Stl), 1 hun/juv. Anholt (OF), 15/4 1 hun/juv. Tåstrup Sø (PNN), 1 trk Gjerrild (Stl), 4 hun/juv. Anholt (OF), 16/4 1 hun/juv. Stubbe Sø (Stl), 6 trk Gjerrild (Stl), 1 han + 1 hun/juv. Anholt (OF), 17/4 4 hun/juv. Anholt (OF), 22/4 1 hun/juv. Alsrode (OF), 24/4-26/4 1 hun/juv. Anholt (NT), 6/5 2 hun/juv trk N Moesgård (Moes), 18/5 1 juv. han Alsrode (OF).

Efterårstrækgæster:

6/9 1 hun/juv. Sødring Kær (HLL), 27/9 3 hun/juv. trk S Fornæs (CO), 30/9 1 hun/juv. Samsø (LB), 3/10 1 indtrk VSV Fornæs (HC), 10/10 1 hun/juv. Samsø (LB), 11/10 2 Akær (H+JE), 14/10 1 hun/juv. Tomkær Alsrod (OF), 1 Ajstrup Bugt v. Mariager Fjord (JRR, BRR, KEH), 18/10 1 hun/juv. Katholm Enge (OF), 18/10-22/10 1 rast Helgenæs (JTL), 24/10 1 hun/juv. Pletten, Mariager Fjord (JRR, KEH, BRR), 25/10 1 hun/juv. Randers Fjords udløb (JRR), 7/11 1 hun/juv trk S Stavnsfjord Samsø (DOF), 14/11 1 Ajstrup Bugt v. Mariager Fjord (JRR, BRR, KEH), 28/11 1 hun/juv. Terskelbakkeholm Mariager Fjord (AJ), 1 Ajstrup Bugt v. Mariager Fjord (JRR, JM, AJ), 5/12 1 hun/juv. Fuglsø Bæk Enge (JRR), 6/12 1 hun/juv. Mørkekær (KHe, JTL), 13/12 1 hun/juv. Mariager Fjords udløb (JRR).
Indrapportering i 1977: 11 ex., 1978: 40 ex., 1979: 17 ex., 1980 28 ex
Fremover bør arten i videst muligt omfang kønsbestemmes.

Se appendix II 1978, 1980.

Duehøg (Accipiter gentilis)

47 observationer indrapporteret i 1981. Jævnt fordelt over hele amtet. Størst i området Fornæs-Gjerrild med 13 ex. Forårstrækket: pr. marts/pr. maj - 34 indrapporteringer. Efterårstrækket: pr. aug/per. nov - 4 indrapporteringer. Vintergæster: pr. dec/ult feb 4 indrapporteringer. Sommergæst/unglefugl: ult. maj/med juli - 5 indrapporteringer.

Sommergæst/unglefugl:


24/5 1 Tornsbjerg Hadrup Skov (DLJ), 7/6 1 hun? Kare Holm Randers Fjord (EH, JRR). 10/6 1 Bjørnholm Kær (OF), 1 Fladstrup (OF), 9/7 1 Fuglebakke-

vej Aarhus V (NA).

Vinter- og trækfugter:

1/2 1 Haraldsund (SMJ), 15/2 1 Kysing Fjord (JF), 1 Mossø (CQP), 24/2 1 v. Ny Mølle (PN), 4/3 1 hun Kjellerup (JTL), 5/3 1 han Brabrand Sø (JTL), 10/3 2 Lading Sø (BH), 12/3 1 Ørum Djursland (JJP), 22/3 1 Moesgård (Moes, NA), 24/3 1 Ørbæk Skov (JJP), 1 Alsrode (OF), 30/3 1 ad Trige Skov (LLH), 31/3 1 juv. Trige Skov (HB), 2 trk Gjerrild (HLL) (1, JJP), 4/4 1 Vrold Skanderborg (GG), 5/4 1 Salten Langsø (DOF), 6/4 han og hun rast Moesgård (Moes), 8/4 1 trk N Moesgård (NA), 1 hun Hørret Enge (BHJ, FL), 12/4 1 Kompedal Plantage (KeH), 2 trk Gjerrild (Stl), 13/4 1 trk Fornæs (Stl), 2 trk Gjerrild (Stl), 14/4 4 trk Gjerrild (Stl), 15/4 1 trk Gjerrild (Stl), 16/4 1 hørt Stubbe Sø (Stl), 17/4 1 Tornsbjerg Hadrup Skov (DLJ), 1 Anholt (OF), 27/4 1 Anholt (NT), 2/8 1 Stubbe Sø (BHJ), 15/8 1 syd for Alsrode (CO), 19/8 1 Kysing Fjord (JF), 8/11 1 trk N Kasted Mose (CQP).

Indrapportering i 1977: 25 ex., 1978: 12 ex., 1979: 20 ex., 1980: 38 ex.
Se appendix II 1979, 1980.



Figur 14. Duehøg, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk pr. 5-dages periode.

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Formodentlig fåtallig ynglefugl (6 fund i 1981). Almindelig forekommende i forårsperioden (ult. marts/ult. april - max med. april). Største tal: Fornæs-Gjerrild 297 ex (28/3-18/4), Moesgård 130 ex. (9/3-16/5), Anholt 30 ex. (15/4-27/4).

Ynglefugle:

2 par Tornsbjerg, Hadrup Skov (DLJ), 1 par set jævnligt i yngleperioden Gedding/Kasted Mose (JR), 1 par Vallum Sø (JJP), 1 par Nødager (JJP), 1 par Dørup (ET; PMT).

Trækfugle:

Moesgård: 10/3 2 trk N (AJ), 18/3 2 trk N (AJ), 23/3 9 trk (Moes), 30/3 11 trk (Moes), 31/3 10 trk (EH, NA), 5/4 18 trk (Moes, GG), 6/4 7 trk (NA), 9/4 20 trk (Moes, NA), 14/4 7 trk (Moes), 18/4 7 trk (Moes), 11/10 4 v (JTL).

Fornæs-Gjerrild: 28/3 5 (OF), 29/3 14 trk (EH), 31/3 29 trk (HLL), 6/4 13 (HLL), 9/4 4 NØ (NT), 10/4 4 NØ (NT), 12/4 37 trk (NT, Stl), 13/4

36 trk (Stl), 14/4 36 (Stl), 15/4 26 trk (Stl), 16/4 20 trk (Stl), 17/4 28 trk (Stl), 23 trk (GG), 18/4 21 trk (Stl), 23/5 1 trk (EH).
 Øvrige: 19/3 1 N Aarhus Havn (NA), 20/3 1 N Jægergårdsgade Aarhus C (NA), 22/3 1 N Gudrunsvej Brabrand (JR), 31/3 1 N Gudrunsvej Brabrand (JR), 5/4 6 Tomkær Alsrode (OF), 6/4 8 Høgebjerg (LLH), 15/4 12 Anholt (OF), 16/4 5 Anholt (OF), 27/4 5 NØ Anholt (NT).
 Indrapportering i 1977 ufuldstændig, 1978 107 ex. fra Moesgård, og 18 ex. fra Fornæs-Gjerrild, 1979 115 ex. fra Moesgård og 70 ex. fra Fornæs-Gjerrild (8/4-15/4), 1980 ialt 375 ex. hvoraf 187 ex. fra Fornæs-Gjerrild, 103 fra Moesgård og 34 ex. fra Anholt.

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*)

Fåtalig trækfugl. Forår: ult. marts/ult. maj. Efterår: pr. aug/ult. sept. Meget sjælden sommergæst (juni). 33 indrapporteringer, der fordeles sig således 16 forår, 1 sommer og 16 efterår. Indrapportering fra udprægede træksteder beskedent i forhold til tidligere år (Moesgård 9 ex 1979, 5 ex. 1980 og 1 ex. 1981. Fornæs-Gjerrild 45 ex. 1979 og 3 ex. 1981).

Forårstrækfugle:


22/3 1 trk N Gudrunsvej Brabrand (JR), 29/3 1 Gammelose Gjern v. Silkeborg (LPJ), 31/3 1 Dystrup-Ramten Sø (HLL), 1 trk NØ Trige Skov (HB), 9/4 1 Fornæs (NT), 11/4 1 Sorte Sø v. Skanderborg (GG), 12/4-13/4 1 trk Gjerrild (Stl), 15/4 1 trk Vejle Fjord (KeH), 24/4 1 Anholt kl. 18.00 (NT), 26/4 1 Salten Langsø (PJJ, HB), 6/5 1 trk N Moesgård (Moes), 10/5 1 trk V Brabrand Sø (JTL), 18/4 1 Rugård (OF), 19/5 1 Alsrode (OF), 23/5 1 Bjerregrav Mose (Gejrf).

Sommergæst:

19/6 1 Brabrand Sø (LA, JG).

Efterårstrækfugle:

2/8 1 four. Ringesø v. Auning (NA), 10/8 1 juv. Kolindsund (JJP), 13/8 1 trk N Brabrand Sø kl. 11.30 (LaB), 15/8 1 fisk. Stubbe Sø (CO), 20/8 2 Salten Langsø (JB), 22/8 1 Kolindsund (SPA), 5/9 3 Salten Langsø (HLL), 2 Mossø (DOF), 6/9 1 Salten Langsø (DOF), 1 Mossø (DOF), 8/9 1 Fussing Sø (PER), 27/9 1 trk S Hassensør (CQP).



Figur 15. Fiskeørn, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk pr. 5-dages periode.

Indrapportering i 1977: 15 ex., 1978: 12 ex., 1979: 69 ex., 1980: 40 ex.
Fremover kunne det være interessant at få iagttagelsestidspunkterne med
i lokalrapporten. I 1980 er det seneste tidspunkt kl. 18.00.

Se appendix II 1975, 1976, 1977, 1978, 1980.

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Meget sjælden, spredt forekommende trækfugl (ult. marts). To forårs-
iagttagelser (den samme fugl).

29/3 1 ad. rast Gjerrild (HC, EH).

Indrapportering i 1977: 1 ex., 1978: 1 ex., 1979: 5 ex., 1980: 4 ex.

Se appendix II 1980.

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Sjælden trækfugl (med. april/pr. juni - max. ult. maj - sept). Hyppigst
i foråret. 13 indrapporteringer, hvoraf de 12 falder i foråret og kun
1 i efteråret. En fordobling af observationer i forhold til 1980. En
kønsbestemt fugl d. 31/5. Alle indrapporteringer er trækkende fugle.
12/4, 15/4 og 18/4 1 Gjerrild (Stl), 9/5 1 juv. N Moesgård (EH), 23/5
1 Bjerregrav Mose (GF), 1 juv. N Gjerrild (EH), 24/5 1 Anholt (NT),
25/5 2 Bjerregrav Mose (GF), 29/5 1 Brattingborg Skov, Samsø (DOF),
31/5 1 ad. han Tapdrup (HeP), 7/6 1 ad. Brabrand Sø (KjH), 1 Løvenholm
Skov (LPJ), 3/9 1 Polderev (CO).

Indrapportering i 1977: 2 ex., 1978: 3 ex., 1979: 4 ex., 1980: 6 ex.

Se appendix II 1980.

Dværgfalk (Falco columbarius)

Fåtalig trækfugl. Foråret: pr. april/ult. april. Efterår: pr. okt/
ult. okt. 18 indrapporteringer (forår 12 og efterår 6). Alle observa-
tioner er af trækkende fugle.

Forårsgæster:

9/4 1 N Moesgård Strand (Moes), 1 hun N Moesgård Strand kl. 12.05 (NA),
12/4 1 rast Fornæs (NT), 2 Gjerrild (Stl), 14/4 1 Gjerrild (Stl), 15/4
1 hun/juv. NØ Gjerrild (HP), 16/4 4 Gjerrild (Stl), 17/4 1 ad. han N +
1 usp. N (GG, HP), 18/4 1 Gjerrild (Stl), 27/4 1 hun/juv. Brabrand Sø
(AJ).

Efterårsgæster:

3/10 1 Hassensør (ØBF, JTL), 4/10 1 Fornæs (OF), 17/10 1 Alsrode (OF),
18/10 1 hun S Helgenæs (JTL), 21/10 1 Brabrand Sø (AJ), 25/10 1 N
Fornæs (CO).

Indrapportering i 1977: 6 ex., 1978: 15 ex., 1979: 14 ex., 1980: 17 ex.
Se appendix II 1978.

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Sjælden, meget spredt forekommende trækgæst om foråret (ult. maj/pr.
juni). Meget sjælden sommergæst (juli). Meget sjælden efterårsgæst
(sept). 6 indrapporteringer, der fordeler sig på 4 forårs-, 1 sommer-
og 1 efterårsobservation.

15/5 1 juv. hun Brabrand Sø (HP), 23/5 1 ad. trk N Gjerrild (EH), 31/5
1 ad. han Draby Sø (ØBF, JTL), 2/6 1 han trk N Brabrand Sø (HLL), 8/7 1
2K han Hasle Enge (NA), 25/9 1 ad. han Motorvej Aarhus/Skanderborg (HP).
Indrapportering i 1977: 2 ex., 1978: 2 ex., 1979: 0 ex., 1980: 1 ex.

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Almindelig, jævnt udbredt ynglefugl (14 registrerede + 2 mulige).
Almindelig forårstrækgæst (ult. marts/med. april). Sjælden efterårs-
trækgæst (med. sept/med. okt). Indrapportering i forhold til 1980
en smule dårligere (1980: 120 ex., 1981: 95 ex.).

Ynglefugle:

1 par Dørup (ET), 1 par Bjertrup (ET9), 1 par fik > 1 unge på vingerne
Gedding/Kasted Mose (JR), 4 par omkring Hinnerup (SMJ), 1 par v. Kalø
Slotsruin (HA), 2 par Kolindsund (JJP), 2 par Sivested/Tøstrup (JJP),
1 par Koed (JJP), 1 par Nørreris (3 juv. af reden den 30/7) (SMJ).

Mulige ynglefugle:

1 par Hesselholm Made Samsø (LB), 1 han Skærsø Plt. v. Ebeltoft (FF).

Trækfugle:

Samsø: 14/3, 12/4-14/4 1 (LB), 3/8 2 Hesselholm (LB), 29/9, 10/10 1
Hesselholm (LB).

Moesgård: 9/3-9/5 27 trk (Moes), Nogle tal: 22/3 2 N + 3 S (GG), 5/4
3 trk (GG).

Fornæs-Gjerrild: 31/3 1 trk N (HLL), 6/4 1 trk N (HLL), 12/4 2 trk (Stl),
13/4 7-9 (Stl), 14/4 3 trk (Stl), 15/4 2 trk (Stl), 16/4 4 trk (Stl),
17/4 1 trk (Stl), 18/4 1 (Stl), 29/9 6-7 trk (CO).

Øvrige: 8/3-17/5 1 jævnlgt set Skejby Golfbane (NT), 22/3 1 par Lystrupvej Aarhus (NT), 1 trk Gudrunsvej Brabrand (JR), 23/3 1 trk Gudrunsvej Brabrand (JR), 25/3 4 Ryomgård (JJP), 14/4 4 Anholt (OFO), 15/4 3 Anholt (OF), 17/10 1 SV + 2 rast Kysing Fjord (HP), 18/10 4 Kysing Fjord (HP).

Se appendix II 1980.

Vagtel (Coturnix coturnix)

Meget sjælden - sjælden sommergæst (ynglefugl?). De varme østenvinde i maj gav tre obs i juni.

Gl. Harlev: 1/6 1 hørt (AJ, HM), Brabrand Sø: 4/6 1 hørt (RD, EH), Kasted Mose: 16/6 1 syngende (RD, EH).

Der kan være tale om samme fugl.

Trane (Grus grus)

Arten må betegnes som sjælden - fåtallig træk-gæst. Der foreligger hele fire iagttagelser af ialt 12 individer.

25/4 2 Anholt 18.00-19.00 (NT), 14/8 2 ad. rast Kysing Fjord (JF), 6- eller 10/10 2 Kolindbro kl. 09.00 (meddelt JJP), ult. august 6 rast Constantinsborg Enge v. Brabrand Sø (Olaf Sandberg).

Vandrikse (Rallus aquaticus)

Få-tallig ynglefugl ca. 30 par, måske i fremgang - pænt med indrapporteringer. Sjælden - fåtallig vingergæst. Træk dårlig kendt, da arten er nattrækker.

Iagttagelser fra yngleperioden:

Kragemosen, Samsø: 30/5 2 hørt (DOF, LB), Kysing Fjord: 9/8 1 (SH), Sortesø, Skanderborg: 8/5 1 hørt (HP), Lindholm Hovede, Mossø: 22/8 1 (HLL), Astrup Mose: 1/4, 6/4, 12/5 alle 1 (HHH, BHJ, FL), Vilhelmsborg Sø: 17/5, 2/6 1 hørt (PH, BHJ), Langballe Krat: 23/6 1 hørt (BHJ), Bjødstrup Mose: 1/6 1 hørt (BHJ), Brabrand Sø: 10/4 2, 11/4 1, 15/4 1, 28+29/4 1, 2+5/5 2, 6/5 1, 7/5 3, 8/5 3-4, 9/5 2, 1/6 1, 4/6 2, 2/7 1 (EH, PH, KHe, BHJ, AJ, JTL), Tåstrup Sø: 12/5 1 (SH), Kasted Mose: 3/5 1 (SM), 26/5 1 (SH), 16/6 1 (EH, JRR, JDK), Lillesø, Djursland: 31/5 1 hørt (ØBF), Stubbe Sø: 18/6 2 hørt (OF), Bjørnholm Kær: 14/6 1 hørt (OF), Smørmose, Auning: 7/6 1 hørt (EH, JRR), Gjerrild Nordstrand:

25/3 1 (JRR), 13/4 1 (St1), Bjerregrav Mose: 2/4 1, 26/4 3, 6/5 1, 9/3, 15/8 1, 30/8 3, 5/9 1 (SH, KEH, ØBF, AJ, B+JRR), Lillemose, Anholt 19/4 4 hørt (OF), Kul Sø: 22/6 1 hørt (JB).

Træk- og vinteriagttagelser:

Brabrand Sø: 21/1 1 (AJ), 16/12 2 v. Dødeå (KHe), 19/12 1 hørt v. Dødeå (PNN). Eneste træk iagttagelse er fra okt., hvor en sås rastende på Havnegade en morgen (LPJ).

Se appendix II 1979, 1980.

Engsnarre (Crex crex)

Sjælden sommergæst, måske ynglefugl. Også denne art nød godt af det fine majvejr.

De seks iagttagelser fra tre lokaliteter er som følger:

Brabrand Sø: 8-9/5 1 hørt (AJ), 8/7 1 hørt (JTL), Assedrup Enge: 16/5 1 hørt, 23/5 2-3 hørt (JF), Møgelskår, Samsø: 31/5 1 hørt, 1/6 1 set + hørt (J+VMJ).

Blishøne (Fulica atra)

Ret almindelig - almindelig ynglefugl, almindelig forårgæst, meget almindelig efterårgæst, alm. vintergæst.

Ynglefugle, de vigtigste lokaliteter nævnes:

Brabrand Sø: min 40 par (AJ), Ramten-Dystrup Sø 28 par (OS), Solbjerg Sø: 15-20 par (BHJ), Bjerregrav Mose 13 par (Gejrf), Galten Sømose: ca. 11 par.

Nogle store tal af oversomrende og/eller tidlige trækgæster:

Kysing Fjord: 3/8 825, 22/8 1240 (JF, BHJ, FL), Østerby Mose: juli-aug 66 ikke ynglefugle (BHJ), Brabrand Sø: 8/5 66 ikke ynglefugle (AJ), Glenstrup Sø: 29/8 54 (JRR), Mariager Fjord: 22/8 208 v. Ajstrup Bugt (B+JRR, KEH).

Forår, max tal over 100:

Kysing Fjord: 29/3 250 (SH), Brabrand Sø: 20/3 391 (AJ), Ramten-Dystrup Søer: 29/3 209 (JRR), Mariager Fjord: 15/3 680 v. Ajstrup Bugt (B+JRR, KEH) + 250 v. Mariager (ØBF).

Efterår, max tal over 100:

Kysing Fjord: 17/10 5865 (HP), Solbjerg Sø: 21/10 231 (BHJ), Østerby Mose: sept 125 (BHJ), Kolindbro: 26/11 250 (JJP), Mariager Fjord: 28/11 4380 v. Ajstrup Bugt (JRR, JA, AJ).

Vinter max tal fra de vigtigste lokaliteter:

Kysing Fjord: 11/1 625 (DOF), 11/1 1000 (SH), 7/12 2477 (AJ), Solbjerg Sø: 5/12 82 (PH, BHJ), Brabrand Sø: feb 150-200, 8/12 100 (AJ), Aarhus Havn: 20/1 111 (NÅ), Studstrup Havn: 28/12 100 (SH), Fussing Sø: 4/12 100 (PER), Mariager Fjord: 13/12 280 v. Fladbjerg (JRR).

Vadefugle (Charadriiformes)

I forbindelse med indsamling af materiale til lokalrapporten for 1981 besluttede vi i rapportgruppen at gøre alle vadefugle til I-arter (indrapporteringsarter). Vi har modtaget et meget stort materiale om vadefuglene, men det er helt klart at flere personer ikke har indsendt alle deres iagttagelser af vadefugle. F.eks. er Viben en af de arter, hvor indrapporteringslysten var ringe. Vi håber dog på, at vadefuglematerialet i de kommende år vil stige i mængde.

Materialet om vadefugle har været stort. Med hensyn til I-arterne, bl.a. vadefuglene, hvor alle iagttagelser ønskes indrapporteret, er vi lidt i et dilemma. Kan vi tillade os at sortere materialet på en måde, så visse af iagttagelserne ikke offentliggøres i lokalrapporten? Det er gjort ved flere af vadefuglene, og grænserne for materialets størrelse er nævnt. Det man kan frygte er, at nogle ikke fremover vil indsende f.eks. 3 Hvidklire fra Stubbe Sø den 8/8, når den ikke offentliggøres med dato, lokalitet og observatør i rapporten. Denne iagttagelse bliver arkiveret og brugt, når materialet om Hvidklire er stort nok til at fortælle om udbredelsen i Aarhus amt. Aktuelt indgår den i det 5-dages diagram, vi laver over arten. Derfor send alle vadefugle-iagttagelser ind, uanset om de med det samme bliver offentliggjort med dato, lokalitet og observatør.

I 1981 må det med beklagelse konstateres, at områderne Horskær-Kalsemade Rev og Alrø/Alrø Polder ikke er optalt særlig ofte. Det fik stor betydning for materialet om Lille Kobbersnepe og Almindelig Ryle. Til gengæld fik vi flere optællinger fra vort nordlige vadehav omkring Randers og Mariager Fjord. Kan aktiviteten på de sidstnævnte lokaliteter holde og kan aktiviteten på de førstnævnte genoptages i lighed med tidligere år, er vi ved at have en kontinuerlig dækning af alle større vadefuglelokaliteter i amtet.

Flere steder, hvor en arts forekomst må formodes at være større, er der i parentes fremsat en formodning om artens forekomst.

I 1981 3 iagttagelser af ubestemte vadefugle:

15/3 25 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR), 4/5 3 NV Møesgård Strand (Moes) og 1/11 10 Brabrand Sø (AJ).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*)


Fåtalig (ret almindelig) yngletrækfugl (feb/pr. marts-ult. juli/aug), ret almindelig-almindelig trækgæst (marts/april og med. juni/ult. okt), sjælden og uregelmæssig vintergæst (nov-jan). 74-77 ynglepar rapporteret. I februar ses nogle enkelte fugle, men trækket kommer først i gang omkring 6. marts. To toppe under forårstrækket, hvor den første med. marts må hidrøre fra vore egne ynglefugle, medens toppen med. april må være gennemtræk af skandinaviske fugle. I juni træffes enkelte flokke af omstrejvende, ikke-ynglende fugle. Efterårstrækket foregår næsten udelukkende i juli, hvorefter fuglene når til den jyske vestkyst og det sønderjyske vadehav. Efter med. august kun 3 obs, hvor oktoberfundene er usædvanlig store for vort område. Der burde dog være mulighed for overvintring i det store vadehavsområde omkring Randers og Mariager Fjorde, hvor oktoberfundene også er gjort. Et vinterfund, som dog er udenfor ovennævnte område. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund; alle før 1/3 og efter 1/9; kystiagttagelser på mindst 10, dog kun de største tal i tilfælde af mange registreringer på samme lokalitet; alle indlandsobservationer.

Ynglefund med antal par:

11 Svanegrund (FC), 14 Alrø Polder (FC), 1 Alrø Egehoved (LPJ), 24 Søby Rev (FC), 8 Hov Røn (FC), 5-6 Hesselholm Made, Samsø (LB), 1 Aarhus Havn (NA), 1 Følle Bund (HA), 3 halvøen ved Kalø Slotsruin (HA), mindst 1 Ebeltoft Færgenhavn (FF), 1 Hassensør (JTL). Indlandet: 1? Skanderborg Sø (HHH), 2-3 Solbjerg Sø (BHJ), 1 Lading Sø (BH), 1 Ramten-Dystrup Sø (OS), ialt 74-77 par.

Jan-feb og sept-dec fund:

9/2 1 S Kysing Næs (HLL), 15/2 1 Alrø, 1 Horskær (LPJ), 22/2 2 Horskær (LPJ), 2 Fornæs (EH), 7/9 1 ad. Aarhus Havn (HLL), 24/10 11 og 25/10 102 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR), 28/12 6 Fornæs (SH).
 Alrø: 7/3 16 - 27/7 72, flest 8/3 46, 14/6 45 og 23/7 90 (KHe, LPJ).
 Horskær: 8/3 6 - 14/6 9, flest 5/4 12 og 20/4 15 (SH, LPJ). Hesselholm, Samsø: 13/3 - 7/8 ved hvert besøg (LB). Kysing Fjord: 7/3 6 - 16/8 9, flest 9/5 18 (BHJ, PH, FL, SH, JF, DOF, JDK, KHe, H+JE). Følle Bund: 8/3 2 - 15/8 2, flest 5/4 18 (HA). Aarhus Havn: 14/3 13 - 9/8 6, flest 29/7 11 (PH, NT, HLL, KHe, CQP, NÅ). Halvøen ved Kalø Slotsruin: 14/3 20 - 3/8 1, flest 27/3 18 (HA, JJP). Randers Fjords udløb: 15/3 3 - 22/8 7, flest 1/8 129 (KEH, BRR, JRR). Øvrige: 15/3 35 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (ØBF), 19/3 19 Fuglekær (ET), 12/4 11 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 17/4 95 Sælvigbugten, Samsø (AJ) og 25 Sværm, Samsø (AJ), 20/4 mindst 30 Barnekold, Samsø (AJ), 7/7 20 Ahl Hage (FF), 19/7 110 Tved Øhoved (CQP) og 41 Fornæs (JDK), 15/8 31 Skødshoved (JTI).



Figur 16. Strandskade, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver < 3 individer.

Indlandsiagttagelser:

Skanderborg Sø: 11/3 1, 29/4 1, 23/6-8/7 1-2 (HHH). Mossø: 14/4 1 og 7/7 3 (HHH). Solbjerg Sø: 11/6 1, 12/6 2, 22/6 5, 27/6 2, 22/7 3 (BHJ, FL). Brabrand Sø: 12/3 2, 15/3 1, 18/3 2, 19-20/3 1, 27-28/3 1, 2+5/5 1, 24/6 1 trk, 26/6 3, 28/6 4, 2/7 1 og 1/8 1 (NT, HLL, AJ, BHJ, PH, FL, HHH). Arten er ikke tidligere truffet så hyppigt ved denne lokalitet. Lading Sø: 22/3 2 - 5/7 2, 1-2 dagligt (BH), Stubbe Sø: 16/4 2 (St1). Ramten-Dystrup Sø: 4/4 2 (ØBF), 13/4 2 (SH), 25/4 1 (DOF), 4/7 2 (GG), 6/7 1 (BHJ, PH).

Se appendix II 1980.

Vibe (*Vanellus vanellus*)

Ret almindelig yngletrækfugl (pr. marts-ult. juni/ult. sept), almindelig trækgæst om foråret (pr. marts/ult. april), meget almindelig trækgæst om efteråret (ult. juni/pr. dec). Helt klart en art, som desværre ikke er indrapporteret i fuldt omfang af bidragsyderne, men det kommer forhåbentligt. 107-122 ynglepar er rapporteret fra 18 lokaliteter. Forårs trækket, bortset fra et par forvirrede februarfugle, indledes omkring 6.-7. marts og kulminerer i slutningen af samme måned. Fra omkring midt af april er det med meget få undtagelser kun ynglefuglere, som ses. I juni mangler de første egentlige efterårsflokke og først i 2. halvdel af juli begynder der at ske noget med efterårstrækket. Kurven er dog yderst svingende, men toppe i midten af aug/sept/okt er tydelige. Formentlig er det de gamle fugles træk i juli/aug og ungfugletrækket efter 1. sept. Arten er ret let at aldersbestemme, så det kunne være interessant at undersøge, om det kunne være blandede flokke af adulte og juvenile fugle fra forskellige bestande i stedet for et klart adskilt aldersbestemt træk. I øvrigt forholdsvis mange fugle omkring måneds-

skiftet nov/dec, som må skyldes det endnu ret milde vejr, som herskede på dette tidspunkt. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund; første og sidste fugle; alle obs. på mindst 1000 fugle; månedsmaksima for alle lokaliteter, hvorfra der foreligger mindst 6 registreringer spredt over hele året; maksimumstallet, dog mindst 100 for lokaliteter med under 6 registreringer.

Ynglefund med antal par:

5-6 Hesselholm Made, Samsø (LB), 3-4 Tornsbjerg-Hadrup Skov (DLJ), 9-12 Kysing Fjord (JF), 10 Solbjerg Sø (BHJ), 9 Østerby Mose (BHJ), 26-31 Brabrand Sø (AJ), 1 Galten Gammelose (BH), 0-1 Galten Sømose (BH), 7-8 Lading Sø (BH), mindst 3 Tavlbord Mose (Mgr), 1-2 Lysemose (Mgr), 6-8 Følle Bund (HA), 1 Halvøen v. Kalø Slotsruin (HA), 1 Skærsø v. Ebeltoft (FF), 4 Bjerregrav Mose (Gejrf), 10 Kolindsund (JJP), 9 Ramten-Dystrup Sø (OS), 2 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), ialt 109-122 par.

Første:

9/2 2 Kolindbro (JJP) og 6/3 6 N Kysing Næs (HLL).

Sidste:

4/12 10 Grenå Enge (CO), 5/12 1 Kysing Fjord (JF) og 128 Fuglsø Bæk Enge (JRR).

Lokaliteter med mindst 6 registreringer:


Hesselholm, Samsø: 14/3 - 11/10, aug/sept "fåttallig", max 11/10 56 (LB).
 Alrø: 9 registreringer fra 7/3 6 - 14/11 25; 15/3 24, 5/4 20, 23/7 8, 18/10 40 (SH, LPJ, JDK, HP). Langt under normalt for lokaliteten.
 Horskær: 6 registreringer fra 8/3 4 - 18/10 43; 18/10 43 er eneste over 5, også under normalt for lokaliteten (LPJ). Kysing Fjord: 59 registreringer fra 7/3 37 - 5/12 1; 21/3 71, 15/4 50, 9/5 23, maj-juni ses kun ynglefuglene (JF), 28/7 369, 15/8 750, 15/9 1000, 14/10 1200, 17/10 2400, 18/10 2200, 21/10 1000, 5/11 300, oktoberantallet normalt, de øvrige måneder under middel (JF, DOF, H+JE, HP, PMT, ET, EH, LPJ, JDK, SH, NT). Moesgård Strand: Trækiagttagelser. 8/3-9/5 873 trk, max 18/3 295 (Moes). Dørup v. Hørning: 7-24/9 44 stigende til 200 (ET, PMT).
 Brabrand Sø: 51 registreringer fra 9/3 30 - 15/11 10 trk; 15/3 129, 10/4 44, 16/4-31/5 ynglefuglene (AJ), 4/6 28, 2/7 56, 8/8 140, 19/9 175, 18/10 36, 15/11 10 trk, normalt for lokaliteten (AJ, FF, ET, NA, EH, LPJ, KJH, JDK, NT, JR). Lading Sø: 45 registreringer fra 9/3 3 - 5/7 1; 19/3 55, 11/4 28, 8/5 24, 18/6 14 (BH, SH). Følle Bund: 8 registreringer fra 8/3 1 - 15/7 60; 14/3 28, 2/4 20, 6+18/5 16, 15/7 60 (HA). Kolindsund: 14 registreringer 9/2 2 Kolindbro (JJP), 10/3 2 - 1/11 10 trk; 20/3 100, 11/5 - 18/6 20 = 10 ynglepar (JJP), 15/8 1000, 13/9 100, 4/10 100 (SPA, JJP, OF). Fornæs/Gjerrild området: Trækiagttagelser. 29/3-18/4 39 trk (EH, Stl). Råby Odde, Randers Fjord: 9 registreringer fra 22/3 216 -

14/11 2; 22/3 216, 12/4 10, 2/5 4, 8/6 5, 1/8 45, 12/9 3, 14/11 2 (EH, KEH, BRR, JRR).

Lokaliteter med under 6 registreringer: 22/3 175 Kare Holm, Randers Fjord (EH), 22/8 200 Grenå Enge (OF), 328 Råby Enge, Randers Fjord (KEH, BRR, JRR), 15/8 450 Bjerregrav Mose (SH), 29/8 200 Vesborg, Samsø (LB), 162 Glenstrup Sø (JRR), 3/9 100 Stilling Sø (ET), 11/10 250 Kysing Næs (HP), 18/10 118 Lerdrup Vig (LPJ), 5/12 128 Fuglsø Bæk Enge (JRR).

Desuden oplysninger fra 43 lokaliteter i antal 1-70.

Se appendix II 1980.



Figur 17. Vibe, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Trækiagttagelser fra Moesgaard er vist med lukket søjle. Den åbne søjle viser alle iagttagne fugle, incl. de ved Moesgaard iagttagne. Tal fra følgende perioder er udeladt: Kysing Fjord: 1/5 - 1/7 og Brabrand Sø: 16/4 - 1/7. Et + angiver < 50 individer.

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*)

Fåttallig (ret almindelig) yngletrækfugl (pr. marts-ult. juli/ult. sept), ret almindelig trækgæst (pr. marts/pr. maj og med. juli/pr. okt sjældent til ult. nov). 15-16 ynglepar er rapporteret og alle med en undtagelse fra kystlokaliteter. Materialet er endnu for lille til sikkert at kunne udtale sig om artens forekomst i amtet. På en række lokaliteter antydes det, at der er forskel i de lokale bestandes afrejse. Det kan formentlig hænge sammen med yngletidspunkt og -succes. Novemberfuglen må betragtes som en sen trækgæst, snarere end en vintergæst. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund, alle indlandsiagttagelser, kystobservationer større end 10 fugle; første og sidste iagttagelse samt et novemberfund.

Ankomst og afrejse:

6/3 2 Kysing Næs (HLL) og 5/10 1 Aarhus Havn (PH, BHJ, FL).

Novemberfund: 21/11 L Kysing Næs (CQP).

Ynglefund:


2 par Alrø Polder (FC), 5 par Søby Rev (FC), 1 par Hov Røn (FC), 1 par Østerby Mose (BHJ), 2 par Aarhus Havn (NA), 1-2 par halvøen v. Kalø Slotsruin (HA), 2 par Hassensør (JTL), mindst 1 par Glatved Strand (JRR) ialt 15-16 par.

Kystiagttagelser:

Alrø: 8/3 6 - 23/7 3; 15/3 19 (SH, LPJ, JDK). Horskær-Kalsemade: 15/3 1 - 30/7 14; 30/7 14 (SH, LPJ, PN). Hesselholm, Samsø: 12/4 2 - 28/7 3; nedadgående tendens, som også konstateredes i 1980 (LB). Kysing Fjord 7/3 4 - 12/9 10; 13/3 10, 17/3 19, 18/3 17, 10/5 12, 9/8 12, 12/9 10 (JF, BHJ, FL, PH, DOF, KHe, AJ, EH, CQP, JDK, SH, NT, LPJ). Kysing Næs: 6/3 2 - 21/9 1 (BHJ, PH, FL, NT, HLL, CQP), 21/11 1 (CQP). Aarhus Havn: 14/3 8 - 5/10 1; 25/4 14, 29/7 20, 1/8 12, 13/9 10 (BHJ, PH, FL, KHe, CQP, NA, NT). Halvøen v. Kalø Slotsruin: 14/3 8 - 3/8 1; 8/5 10 (HA, JPP, JR). Fornæs: 25/3 2 - 17/7 17; 17/7 17 (St1, BRR, JRR, KEH, JDK, NT). Øvrige: 15/3 20 Barnekold, Samsø (LB), 17 Mariager Fjords udløb (KEH, BRR, JRR).

Indlandsiagttagelser:

10-11+13/3 2 Kolindsund (JJP), 8/5 1 Brabrand Sø (AJ), 23-25/5 1 ynglepar Østerby Mose (BHJ) og 17/8 1 Brabrand Sø (AJ).



Figur 18. Stor Præstekrave, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Et + angiver < 3 individer.

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*)

Sjælden (fåtallic) yngletrækfugl (med. april-med. aug), muligvis sjælden trækgæst (ult. april/pr. maj og aug). Flere indrapporteret end tidligere år. Hovedparten er dog stadig fra ynglelokaliteterne, hvorfra 3-4 par er registreret. Alle observationer nævnes.

Ynglefund:

2 par Østerby Mose (BHJ), 1 par Eskelund, Brabrand Sø (AJ), formodentlig 1 par Dania v. Mariager (ØBF), ialt 3-4 par.

Kysing Fjord: 5/8 2 (JF), 9/8 2 (DOF), 11/8 1 (AJ, JF). Skanderborg Sø: 23/6 8, 2/7 2, 2/7 1 + 1 hørt, 5/7 2, 17/7 1 (alle HHH). Østerby Mose: 7/5 - 22/6 2 ynglepar (PH, BHJ). Brabrand Sø: 17/4 2 Eskelund (KHe), 26/4 2 (HM), 27/4 1, 28/4 2, 29/4 4, 1/5 2, 2/5 1 (alle AJ), 20/5 4 Eskelund (KHe), 24/6 4 Eskelund (KHe), 2/7 1 (AJ). Øvrige: 25/5 1 rast Aarhus Planteskole, Skæring (EH), 21/6 1 varslende Dania Kalkburd v. Mariager (ØBF), 12/7 1 Aarhus Havn (FF).

Hvidbrystet Præstekrave (*Charadrius alexandrinus*)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

1 fund: 25/6 2 Kysing Fjord (BHJ).

Inden for de sidste 5 år iagttaget i april og maj 1979. Herudover kun yderligere to fund i lokalrapportens tid, nemlig sept. 1972 og juli 1973.

Hjejle sp (*Pluvialis squatarola/apricaria*)

17/5 31, 1/8 40 og 25/10 220 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*)


Fåtallic trækgæst om foråret (pr. ult. maj), ret almindelig trækgæst om efteråret (med. juli-ult. okt). Kun et ganske svagt forårstræk omkring midten af maj. Efterårstrækket normalt med de første fugle med. juli og kulmination i 1. halvdel af august (gamle fugle) og sept/okt (ungfugle). Som tidligere år langt flest fugle fra vadehavsområdet mellem og omkring mundingerne af Randers og Mariager Fjorde. Alle iagttagelser nævnes.

Hesselholm, Samsø: 24/7 1, 2/8 4, 29/9 3 V, 11/10 6 SV (alle LB).

Alrø: 19/5 1 Polderne (FC), 27/9 2 (LaB), 4/10 15 (PN), 11/10 10 (H+

JE), 18/10 1 Egehoved (LPJ). Kysing Fjord: 7/5 4 (KHe), 9/5 2 (JF), 19/5 1 (JF), 16/7 1 (JF), 29/7 2 (HLL), 1/8 1, 2/8 1, 3/8 5, 5/8 4 (alle JF, BHJ, FL), 9/8 2 (NA), 1 (DOF), 20/8 1 (HLL), 7/9 2 (JF), 21/9 8 S (CQP), 27/9 4 (LaB), 1/10 2 (Torben Bøgeskov, ET). Aarhus Havn: 31/7 1, 5/8 6 (KHe), 6/8 1 (PNN), 9/8 1 (CQP). Randers Fjords udløb: 17/5 1, 1/8 6, 15/8 58, 12/9 22, 24/10 2, 25/10 88 (KEH, BRR, JRR). Pletten, Mariager Fjord: 17/5 19, 15/8 15, 12/9 1, 24/10 3 (KEH, BRR, JRR). Øvrige: 23/5 2 Gjerrild Nordstrand (EH), 31/7 1 V. Gjerrild Klint (BHJ), 1/8 75 Boels Rev (KEH, BRR, JRR). 15/8 26 Skødshøved (JTL), 6/9 86 Sødtring Kær (HLL), 15/9 50 Overgård v. Mariager Fjord (KjH), 13/10 3 og 14/10 1 Polderev, Grenå (CO), 25/10 221 Boels Rev (JRR).

Se appendix II 1980.



Figur 19. Strandhjejle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver 1 individ.

Hjejle (*Pluvialis apricaria*)

Almindelig trækgæst om foråret (med. marts-ult. maj), meget almindelig trækgæst om efteråret (pr. juli-ult. nov). I midten af marts ses de første fugle, men trækket starter først rigtigt omkring 1. april. Kulminationen falder i månedsskiftet april/maj og de sidste fugle er allerede væk 10. maj, dog med et par efternølere. Efterårstrækket, der er væsentligt større end forårstrækket, starter i de første juli-dage, men der sker først rigtigt noget i midten af august. Antallet af Hjejler svinger meget efteråret igennem, men toppene i aug/sept må formodes at være de gamle fugles træk, medens toppene i okt/nov må være ungfugletrækket. Det kunne være spændende at undersøge, om de 4 toppe skulle vise gennemtræk af forskellige bestande af henholdsvis Nordlig og Sydlig Hjejle. Det kræver dog en meget stor indsats at racebestemme fuglene, men det kunne jo tænkes at være noget for

vadefugleentusiaster! Følgende iagttagelser nævnes: Ankomst og afrejse forår og efterår, alle obs over 100 og iagttagelsesperiodens forløb for lokaliteter med over 100 fugle, ellers kun maksimum.

Ankomst og afrejse:


15/3 6 Alrø Polder (LPJ), 24/5 2 Dejret Øhoved (KHe), 4/7 2 S Egsmark Strand (AJ), 28/11 280 Randers Fjords udløb og 30 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (AJ, JM, JRR).

Lokalitet med over 100 fugle:

Alrø: 5/4 125 (SH), 23/7 40 - 14/11 235, 4/10 1000, 18/10 692 (LPJ, JDK, PN). Kysing Fjord: 21/3 1, 12/4 9 - 10/5 67; 29/4 112, 2/5 111, 5/7 1, 21/7 4 v, 1/8 1 - 8/11 58; 7/9 118, 12/9 150, 14/9 200, 11/10 100, 17/10 300, 18/10 275, 21/10 293, 26/10 190, 4/11 225 (JF, DOF, BHJ, FL, PH, CQP, H+JE, HP, AJ, LPJ, EH, PMT, ET, JDK, SH, LaB, HLL). Kolindsund: 7/8 25 - 4/10 100; 16/8 1000, 29/8 150, 13/9 100 (SPA, OF, JJP). Randers Fjords udløb: 1/8 5 - 28/11 280; 25/10 121 (AJ, KEH, JM, BRR, JRR). Pletten, Mariager Fjord: 15/8 35 - 14/11 110; 12/9 620, 24/10 750 (KEH, BRR, JRR). Øvrige : 29/8 100 Vesborg, Samsø (LB), 22/10 100 Grenå Enge (OF), 7/11 150 Stavns Fjord, Samsø (DOF) 14/11 300 Gjerrild (CO).

Lokaliteter med under 100 fugle, kun højeste antal nævnes:

22/3 18 Kare Holm, Randers Fjord (EH, BRR, JRR), 12/4 2 Fornæs (NT), 16/4 50 NV St. Vorbjerg, Samsø (LB), 16/4 + 12/8 1 Kasted Mose (SH, AJ), 31/7 5 trk Gjerrild Klint (BHJ), 3/8 2 Brabrand Sø (NA), 30/8 8, Hesselholm, Samsø (LB), 31/8 40-50 Søndervangen, Viby J (PH), 5/9 80 Bjerregrav Mose (Gejrf), 7/9 2 Dørup (ET), 15/9 10 nær Salten (JB),



Figur 20. Hjejle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver < 10 individer.

20/9 28 S Lading Sø (KHe, JTL), 17/10 1 Hørret (BHJ, FL), 24/10 7 Råby Odde, Randers Fjord (KEH, BRR, JRR), 7/11 22 Norring (PN), 12/11 12 N Fuglsø Bæk Enge (JRR), 14/11 60 Horskær (LPJ), 50 Råby Enge, Randers Fjord (KEH, BRR, JRR), 34 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR)
Se appendix II 1980.

Pomeransfugl (*Eudromias morinellus*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækgæst.

23/5 1 rast på mark nær Gjer Mose (LC, BH, AJ, HM).

2. fund i lokalrapportens tid. Det første var aug. 1975.


Stenvender (*Arenaria interpres*)

Sjælden trækgæst om foråret (maj), fåtallig trækgæst om efteråret (med. juli - med. sept).

Ingen iagttagelser fra de traditionelt bedste lokaliteter, nemlig Alrø Polder og Søby Rev. Et forårsfund er under middel, og det er usædvanligt med så mange store "flokke". Alle iagttagelser nævnes.

7/5 7 Kysing Fjord (KHe), 18/7 1 Kysing Fjord (JF), 19/7 1 Fornæs (JDK), 21/7 2 + flok 10 S Fornæs (HC), 3/8 1 Kysing Fjord (BHJ, FL), 9/8 1 Kysing Fjord (NA), 15/8 5 Randers Fjords udløb (JRR), 15/9 1 Overgård, Mariager Fjord (KjH).

Artikel om arten er på vej til Søravnen.



Figur 21. Dobbeltbekkasin, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver < 5 individer.

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*)

Sjældnen (fåtalig-ret almindelig) yngletrækfugl (med. marts - aug/nov). Ret almindelig (almindelig) trækgæst om foråret (med. marts/pr. maj), almindelig trækgæst om efteråret (ult. juli-med. nov), fåtalig, men regelmæssig vintergæst (dec-feb). 9 ynglepar er rapporteret. Kun et lille forårstræk med kulmination i månedsskiftet april/maj, mod normalt med. april. Efterårstrækket indledes ret sent i juli og først omkring 8. august begynder der at komme gang i trækket. Kurven noget svingende med den største trækbølge med. sept. Vinterfundene er lidt vanskelige at definere, men henregnes her til månederne dec-feb. Arten er meget vanskelig at tælle op. Fremover burde bidragsydere opfordres til ved denne og følgende to arter at notere om der ved registreringen er foretaget egentlige "bekkasintællinger" og i bekræftende fald på hvilke datoer. Følgende iagttagelser er nævnt: Ynglefund, første og sidste fugle på træk, alle obs over 5 samt vinterfund (jan-feb og dec).
Ynglefund:

5 par Brabrand Sø (AJ), 1 par Tåstrup Sø (AJ), 2 par Kolindsund (JJP), 1 par Ramten Dystrup Sø (OS), 1 par Bjerregrav Mose (Gejrf), ialt 9 par. Desuden en spøjst obs: 5/6 1 han syngende Aarhus Havn (KHe).

Første: 16/3 2 Brabrand Sø (AJ).

Sidste: 16/11 5 Hørret Enge (FL), 2 Brabrand Sø (AJ), 1 Gedding Sø (JR).
Hesselholm, Samsø: 12/4 3, 25/7 1, 11/10 3, 6/8 8 (alle LB).

Kysing Fjord: 21/3 1, 10/5 1, 29/3 21, 26/4 9, 3/8 5, 8/11 2, 9/8 35, 11/8 55, 14/8 34, 16/8 18, 21/8 48, 28/8 10, 31/8 21, 7/9 22, 10/9 10, 12/9 22, 14/9 100, 15/9 83, 1/10 64, 4/10 24, 17/10 48, 18/10 16, 21/10 41, 23/10 33, 25/10 31, 6/11 10 (JF, BHJ, FL, PH, ET HHH, HP, DOF, AJ, SH, T. Bøgeskov, NT, LaB).

Østerby Mose: 13/4 7, 14/4 6, 13/8 5, 9/11 14, 5/9 9, 14/9 10, 15/9 30, 26/9 6, 24/10 44, 6/11 7, 9/11 14 (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 16/3 2, 15/11 2, 11/4 8, 28/4 10, 2/5 12, 10/8 15, 27/8 58, 28/8 85, 24/9 25, 4/10 43 (AJ, EH, HLL, HM, JDK, LaB, JR).

Lading Sø: 20/3 16, 12/5 1, 20/3 16 (BH).

Grenå Enge: 19/8 8, 3/9 33, 19/8 8, 28/8 6, 31/8 13, 3/9 33 (CO).

Bjerregrav Mose: 30/3 4, 5/9 29, 15/8 30, 30/8 15, 5/9 39 (KEH, SH, BRR JRR, ØBF, Gejrf).

Øvrige: 12/4 7 Astrup Mose (SH), 16/4 6 Kasted Mose (SH), 2/5 33 Tåstrup Sø (AJ), 1/8 9 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 17/8 8 Gedding Sø (JR), 16/9 40-50 Stubbe Sø (CO), 24/10 8 Hørret Enge (BHJ, FL).

Vinterfund:

2/1 16 Kysing Fjord (CQP), 6/1 7 Brabrand Sø (NT), 18/1 1 (JF), 26/1 2 Kysing Fjord, 11/2 4 (AJ), 17/2 4 (NT), 21/2 1 (AJ), 4/3 2 (HLL), 5/12 1 (KjH), 6/12 4 (HLL) Brabrand Sø, 7/12 2-3 Assedrup Enge (AJ), 8/12 1, 9/12 3, 10/12 4-5 Brabrand Sø (AJ), 11/12 1 Vilhelmsborg (BHJ), 27/12 1 Brabrand Sø (H+JE).

Følgende vinterfund er rapporteret inden for de sidste 5 år:

År	1976	1977	1978	1979	1980
Måned	J F D	J F D	J F D	J F D	J F D
Antal fund	1 0 3	3 1 2	0 0 0	1 0 1	1 2 0
Antal fugle	6 0 4	2 2 21	0 0 0	1 0 3	1 3 0

Enkeltbekkasin (*Limnocyptes minimus*)

Meget sjælden (sjælden, men uregelmæssig forår og fåtallig men regelmæssig efterår) trækgæst (april og okt). Sporadisk sommergæst. Endnu vanskeligere at optælle end foregående art, da denne art "trykker" helt utroligt. Kun 3 fund i 1981, og første sommerfund i rapportens tid.

22/4 1 Kysing Fjord (JF), 9/8 1 Kysing Fjord (DOF) og 4/10 1 Døde A Enge, Brabrand Sø (AJ).

Følgende oplysninger fra sidste 5 år viser endvidere, at arten er en sjælden, men uregelmæssig vintergæst (dec-feb). Set i jan+feb+apr+sept+okt 1976, jan+okt+nov+dec 1977, jan+feb+apr+maj+okt+nov 1978, okt 1979 og okt 1980.

Skovsneppe (*Scolopax rustica*)

Sjælden (fåtalig) yngletrækfugl (ult. feb/pr. april-pr.nov), fåtalig trækgæst (ult. marts/med. april og med. okt/dec), meget sjælden og uregelmæssig vintergæst (med. dec-med. feb). Ingen ynglefund rapporteret, men iagttagelser i tiden 1/5-1/9 hidrører fra vore ynglefugle. Fra denne periode foreligger flere iagttagelser og fra lokaliteter, hvor arten med sikkerhed har ynglet tidligere år. Forårstrækket foregår omkring månedsskiftet marts/april og efterårstrækket også næsten udelukkende i en kort periode med./ult. okt. Enkelte trækgæster ses til pr. dec. Fuglen nær årsskiftet må nok regnes som en overvintrende, skønt Dybbro (1978) nævner hele dec. som trækmåned.



Figur 22. Skovsnepe, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.


Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

Alle iagttagelser nævnes.

24/2 1 Frisenborg Skov/Fajstrup Krat (AJ), 28/3 2 Giber A (NT), 1 Eskelund, Brabrand Sø (KHe), 1 Gjerrild (OF), 30/3 2 Tomkær, Alsrode (OF), 31/3 1 Moesgård Strand (EH), 4/4 2 Ruggård (OF), 16/4 1 Veggerslev (Stl), 18/4 1 Veggerslev Krat (Stl), 8/5 1 Mårup Skov, Samsø (LB), 20/5 1 Lading Sø (HLL), 22/5 min. 1 spillende Anholt (NT), 23/5 1 Norringure (SMJ), 24/5 min. 1 spillende Anholt (NT), 30/5 2 Mårup Skov, Samsø (LB, DOF), 14/6 1 Norringure (SMJ), 21/6 1 Mårup Skov, Samsø (LB), 1/8 1 og 9/8 1 Ryomgård (JJP), 18/10 6 Mejlgård (lokal jæger), 20/10 1 og 27/10 1 Pinds Mølle (ET), 30/10 5 Ryomgård (JJP), 2/11 1 NØ Viby Torv (PH), 8/11 1 Mejlgård, Djursland (lokal jæger), 26/11 1 Risskov (HLL), 5/12 1 Kysing Fjord (JF), og 27/12 1 Brabrand Sø (H+JE).

Inden for de sidste 5 år er følgende vinterfund gjort (mellem 15/12-15/2): jan 1 ex., feb 3 ex. og dec 1 ex. alle fra 1976.

Se appendix II 1976, 1980.



Regnspejlsnæse sp (Numenius arquata/phaeopus)

8/6 3, 22/8 5, 12/9 28 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR).

Store Regnspove (Numenius arquata)

Ret almindelig trækfugt (pr. marts/ult. maj og med. juni/ult. okt.), fåtallig og uregelmæssig sommergæst (pr./med. juni), sjælden og uregelmæssig vintergæst (ult. nov-feb). Forårstrækket indledes pr. marts og antallet stiger i løbet af måneden for at kulminere i 1. halvdel af april. Herefter falder antallet hurtigt, og i en periode omkring månedsskiftet april/maj ses ingen fugle. Omkring med. maj kommer så atter en mindre trækølge. I 1. halvdel af juni ses enkelte oversomrende, og formentlig ikke yngledygtige fugle. De første fugle på efterårstrækket ses med. juni, men først pr. juli kommer trækket i gang. Julitrækket er de gamle fugle, og ungerne følger efter i aug/sept. Fra med. sept ses kun få fugle, men ult. okt. kommer en lille flok, som vel realistisk set kunne tænkes at ville prøve at overvintre. I ult. nov og med. dec. ses enkelte fugle som klart må betragtes som overvintringsforsøg. På kurven vises de ændrede jagttider for vadefugle indenfor de sidste to år. Som bekendt ønskes alle vadefugle fredet, undtaget dog Skovsneppe. Dette er næppe muligt endnu, og derfor søges svømmeænder og vadefugle at få samme jagttid. Det er tilfældet fra 1981. Svømmeænderjagten ønskes udskudt til 1. sept. og vadefuglene skal (ønskes) fremover også følge denne jagttid. Der er næppe tvivl om, at en udskydelse af vadefuglejagten til 1. sept, vil få positiv indflydelse på den Store Regnspove. Dels vil den opnå fred på rasteplassen, og dels vil størstedelen af efterårsbestanden være væk ved jagtens begyndelse. Resultatet vil nok ikke helt urealistisk blive samme positive virkning som Knortegåsefredningen. Alle obs nævnes:

Første: 8/3 2 hørt Moesgård Strand (Moes).

Sidste: 24/10 13, 25/10 10 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR).

Hesselholm, Samsø: 14/3 1, 12/4 1 SØ, 13/4 3, 17/4 3 NØ + 2 SØ, 20/6 4, 23/7 1 og 25/7 1 (alle LB).

Alrø: 31/3 40 (CQP), 11/4 3 Polderne (LPJ), 14/6 7 (LPJ) og 27/7 1 (KHe)

Kalsemade-Horsker: 5/4 80 (SH), 7/4 30, 11/4 7 og 20/4 2 (alle LPJ).

Kysing Fjord: 12/3 1, 18/3 1, 27/3 7, 5/4 1, 12-13/4 4, 15/4 1, 9/5 1, 15/3, 24/5 4, 5/7 5, 9/7 6, 12/7 1, 16/7 1, 21/7 1, 28/7 2, 1/8 1, 9/8 5, 14/8 2, 15/8 6, 20/8 7, 21/8 22, 22/8 4, 31/8 4, 7/9 3, 9/9 3, 18/10 1 (EH, HLL, SH, JDK, CQP, DOF, JF, BHJ, FL, PH, HP, KHe).

Brabrand Sø: 3/4 1 (KHe), 15/6 2 N, 6/7 18 VSV, og 28/8 1 NV (alle AJ).

Fornæs: 29/3 3 trk (EH), 9-10/4 1 (NT), 12/4 1 (NT), 15/4 2 (St1).

Gjerrild Fyr: 9-10/4 1 (NT), 12/4 1 (NT, St1), 15/4 2 (St1).

Bjerregrav Mose: 30/3 1, 6/5 1 og 15/8 4 (KEH, BRR, JRR, SH, Mgr, Gejrf)

Randers Fjords udløb: 22/3 4, 12/4 5, 17/5 30, 8/6 10 - sommerobs - ,

22/8 12 (KHE, EH, BRR, JRR).


Øvrige: 19/3 1 S Moesgård Strand (Moes), 22/3 1 Råby Odde, Randers Fjord (EH, KEH, JRR), 25/3 3 Gjerrild (JJP), 3/4 1 Tåstrup Sø (NT), 11/4 28 Lerdrup Vig (LPJ), 9 Kare Holm, Randers Fjord (KEH, BRR, JRR), 12/4 33 Randers Fjord ved Udby (KEH, BRR, JRR), 9 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 18/4 8 Bakken, Gjerrild (Stl), 20/4 3 Splidholm (LPJ), 25/4 hørt Anholt (NT), 17/5 1 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 19/5 5 Søby Rev (FC), 17/6 1 Hørret Enge (BHJ), 12/7 1 hørt Sælvigbugtens camping, Samsø (HHH, AJ), 15/7 1 Damsbro Mose (SMJ), 15/7 1 Norring Vesterskov (JDK), 19/7 25 Tved Øhoved (CQP), 21/7 1 Hattemager (SMJ), 31/7 11 Gjerrild Sø (BHJ), 12/8 1 trk Kasted Mose (AJ), 22/8 5 Tved Øhoved (AJ), 27/8 3 Grenå Enge (CO), 30/8 1 S Glatved Strand (KEH, JRR), 6/9 1 S Dørup ved Hørning (ET, PMT), 32 Sødring Kær (HLL), 12/9 1 anskudt Råby Odde, Randers Fjord (KEH, BRR, JRR), og 28/9 1 Hassensør (LPJ).

Vinter:

28/11 4 (AJ, JM, JRR) og 13/12 2 (JRR) Randers Fjords udløb.

Sommer- (pr. med. juni) og vinterobs (ult. nov/feb) inden for de sidste 5 år: kun følgende vinterobs: 17/12 2 1978, 24/2 4 og 26/11 1 1980.

Se appendix II 1980.



Figur 23. Stor Regnspove, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

BIOLOGISKE TIDSSKRIFTER

Udgivelser af biologiske tidsskrifter

Østjysk Biologisk Forening (Ø.B.F.)

er udgiver af bladet Gejrfuglen, der normalt udkommer 3 gange om året. Bladet behandler alle biologiske emner og særlig inden for det østjyske område.

Arsabonnement på bladet andrager i øjeblikket kr. 25,-.

Arsmedlemskab af foreningen andrager i øjeblikket kr. 50,-.

Foreningens adresse er:

(girokontoens nr) 7 14 83 13

Østjysk Biologisk Forening

Postbox 169

8100 Aarhus C

Østjysk Biologisk Kartotek (Ø.B.K.)

Så har vi fået trykt rapporten om fugletrækket ved Moesgård Strand i 1981. Det er den 3. rapport som Østjysk Biologisk Kartotek udgiver, og de har alle omhandlet fugletrækket ved Moesgård. Vi har hidtil haft problemer med udgivelsen af rapporterne, men nu synes vi dog at have fået gang i arbejdet, og vi vil derfor forlods tilbyde dig en række rapporter, som ved et samlet abonnement giver rabat. Vore rapporter koster kr. 10,- pr. stk, men du kan ved et abonnement få denne og de næste 4 rapporter for kr. 35,- incl. forsendelse. "Abonnement 1982" på kr. 35,- dækker således: Moesgård 1981 (vedlagt), Samsø (april/maj), Brabrand Sø (maj/juni), Moesgård 1982 og Kysing Fjord (efteråret 1982). Tilbuddet gælder til 1. august 1982.

Vor ide med udgivelse af faunistiske rapporter om Østjyllands fugle, dyr og natur er at skaffe økonomiske midler til opkøb af PR-materiale/midler til nogen form for "vandhulshjælp", og vi håber derfor, du vil støtte os ved at tegne abonnement for 1982.

(girokontoens nr) 5 01 47 43

Østjysk Biologisk Kartotek

v/Allan Janniche

Langenæs Alle 72

8000 Aarhus C