

# LOKALRAPPORTEN 1981

## ÅRHUS AMT

### DEL 2



# INDHOLD

Del I	side	1-68
Indledning (Allan Janniche)	side	3
Behandling af materialet (Allan Janniche)	side	4-5
Retningslinier for indsendelse af materiale (Rapportgruppen)	side	5-6
Specialundersøgelser (Allan Janniche)	side	7-9
Bidragydere (Allan Janniche)	side	9-10
Betænelser (Rapportgruppen m.fl.)	side	10
Artsgennemgang, lommer-Stor Regnspove	side	11-67
Lommer-storke (Hans Henrik Høj)	side	11-19
Svaner, gæs, svømmesænder (Jørgen Franck)	side	19-29
Dykkender, skalleslugere (Per Henriksen)	side	29-40
Erne-Hvepsevåge (Henning Lykke Larsen)	side	40-43
Kærhøge-falke (Jean Rasmussen)	side	44-51
Hønsefugle-vandhøns (Bjarke Huus Jensen)	side	51-53
Vadefugle- Stor Regnspove (Allan Janniche)	side	53-67
Biologiske tidsskrifter (Allan Janniche)	side	68
 Del II	 side	 69-140
Artsgennemgang, Lille Regnspove-varlinger	side	71-131
Lille Regnspove-alkefugle (Allan Janniche)	side	71-97
Duer-svaler (Bjarke Huus Jensen)	side	98-107
Firol-drosselfugle (Niels Aagaard)	side	107-116
Sangere (John R. Rasmussen)	side	116-120
Fluesnapperne-varlinger (Henning Estrup)	side	120-131
Appendix I (Niels Aagaard)	side	132
Appendix II (Niels Aagaard, Allan Janniche m.fl.)	side	133-139
Litteratur	side	140

Redaktion: Rapportgruppen

Renskrivning: Hanne Eriksen

Lay-out: Allan Janniche

Tegninger: Erik Hørring

Tryk: Poul Bruun

Rapportgruppen, juni 1982:

Niels Aagaard, Henning Estrup, Jørgen Franck, Per Henriksen, Allan Janniche, Bjarke Huus Jensen, Henning Lykke Larsen, Jean Rasmussen og John R. Rasmussen.

Kontaktadresse: Rapportgruppen, DOF/Århus Amt Viborgvej 29 8000 Århus C.

Kontakttelefon: Niels Aagaard 06 124151.

Kontakt til landsrapportgruppen: Niels Aagaard.

Lille Regnspejl (Larus glaucopus)

Udfaldet (fåbaltlig - ret almindelig, visse år) trækgest om foråret (med enkelte ret almindelig, og meget spredt forekommende trækgest om efteråret (sædvanlig juli-aug.). Kun to forårsfund. Efterårstrækket indtræder i juli, men næsten hele trækket foregår uld. juli (21.07/pr. ex) (21.08). Vigtige forekomster og lagttagelserne fra Hesselholm på Samsø. De adskillige trækkende lagttagelser kunne formodes at være samme flok, nemlig 19/7 11 S Hesselholm, og 19/7 11 S Hesselholm, Samsø. Alle lagttagelser nævnes.

Forår:

1975: 1 Samsø's Fjerde udløb (JRR) og 19/5 hørt Alrø Polder (FC).

Efterår:

Jylland: Samsø: 18/7 26, 18/7 21 S, 20/7 4, 21/7 4 + flok 60 SØ, 22/7 24 (10 ved KL, 14,45 - 11 SØ KL, 18.45, 22/7 39, 23/7 23 + 11 S, 24/7 14 + 7 S, 25/7 39, 26/7 34, 27/7 11, 28/7 ca. 5, 29/7 15, 30/7 25, 31/7 14, 1/8 51, 2/8 10, 3/8 ca. 5, 4/8 26 og 5/8 5 (alle 18).  
 Grønland: 5/8 2 S Dråby Strand (BS), 8/7 3 øer ved Ebeltoft (FF), 9/7 1 S Dråby Strand (ZHS), 15/7 1 Høring Westerskov (JDK), 19/7 11 S Hesselholm (GSD), 1 Sørnes (JDK), 24/7 2-4 trk Lundbyesgade, Aarhus (SA), 1/8 1 Lærre Havn (SNe), 1 Sølsø Rev (KEH, BRK, JRR), 3/8 1 Kysing Fjord (BL), 9/8 1 Kysing Fjord (DOF), 15/8 1 Kysing Fjord (HP).

Efterårstræktest: 3 år er lagttagelsernes antal fordelt således:


1976: ingen

1977: 1 ex. forår og 11 ex. efterår

1978: 38 ex. forår, 5 ex. i juni, 316 ex. efterår

1979: 11 ex. forår og 179 ex. efterår

1980: 276 ex. forår, 1 ex. juni og 306 ex. efterår.



Figur 24. Lille Regnspejl, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver 1 individ.

Fra 1978, hvor LB indsender de første iagttagelser fra Hesselholm, Samsø, dominerer dette materiale fuldstændigt om efteråret. Forårs-materialet domineres kun i 1978 af Hesselholm, men der er næppe tvivl om, at forårstrækket også hovedsageligt går over Samsø og Anholt, hvor sidstnævnte dominerer materialet i foråret 1980. På baggrund af vor nuværende viden om arten, må det antages, at der findes en hovedtrækrute forår som efterår over Samsø og Anholt.

Kobbersneppe sp (Limosa limosa/lapponica)

7/7 2 Ahl Hage ved Ebeltoft (FF).


Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)

Se appendix II 1980.

Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica)

Almindelig, men spredt forekommende trækgæst om foråret (ult. marts-ult. maj), meget sjælden (visse år sjælden-fåtalig), uregelmæssig sommergæst (juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (pr. juli-ult. okt). For denne arts vedkommende mangler iagttagelserne fra vadehavsområdet omkring Gylling Næs. Dette er også den væsentligste årsag til den sene første-iagttagelse (31.03). Faktisk er det ikke muligt at sige noget generelt om forårstrækket med det svage materiale. Efterårsbilledet er pænere, da arten har en mere jævn udbredelse i amtet om efteråret. Trækket indledes pr. juli, kulminerer i månedsskiftet juli/aug og ophører så med. aug. Herefter ses enkelte efternølere i sept. og okt. Artens trækforhold gør som bekendt, at der kun er nogle få forårslokaliteter, hvor alle fuglene ses. Om efteråret er den jævnt fordelt over landet, men i ringe antal, da fuglene søger langs den jyske vestkyst til Vadehavet. Alle iagttagelser nævnes:  
 Hesselholm, Samsø: 12/4 4, 14/4 4, 15/4 5, 17/4 6, 18/4 2, 8/5 23, 9/5 21, 10/5 28, 23/7 1, 29/7 1, 2/8 3, 4/8 4 (alle LB).  
 Alrø: 31/3 1000 (CQP), 11/4 14 NV + 18 rast Egehoved og 38 rast Polderne (LPJ), 7/5 100 (HLL), 19/5 400 (FC), 14/6 1 Polderne - sommerobs - (LPJ), 14/7 13 (PN), og 27/7 14 Polkrog.  
 Kysing Fjord: 7/5 1 (KHe), 9/5 1 (JDK, EH), 3 (JF), 5/7 1 (CQP), 21/7 2 (BHJ), 3/8 1 (JF), 4 (BHJ, FL), 6/8 1 (LPJ), 9/8 1 (DOF), 24 (SH).

Øvrige: 1/6 19 Brabrand Sø (AJ), 5/4 1 Kalsmadsø (SH), 11/4 6 Hørskær  
 (ØBF), 17/4 3 Sværm, Samsø (AJ), 10/4 40-60 Barnekold, Samsø (AJ),  
 5/5 1 X Hoestård Strand (Moes), 7/5 40 Søby Rev og 40 Stavns Fjord,  
 Jæren (HLL), 19/5 18 Søby Rev (FC), 28/5 2 Sværm og 1 Lilleholm, Samsø  
 (ØBF), 5/7 2 ad. Aarhus Havn (KHe), 13/7-5/8 1 ad. han Aarhus Havn  
 (WHe), 21/7 5 trk Fortes (MC), 1/8 3 Randers Fjords udløb (KEH, BRR,  
 JRR), 2/8 15 Spilling Næs (ØBF), 4-8-13 SV Hassensør (JTL), 8/8 1 S  
 Aarhus Havn (WHe), 15/8 5 Randers Fjords udløb (JRR), 6/9 1 Sødring Kær  
 (HLL), 28/9 1 Hassensør (LBJ) og 25/10 1 Soels Rev (JRR).  
 Underfor de sidste 5 år foreligger følgende sommeriagttagelser, alle  
 fra Århus: 10/5 50 og 15/5 32 1978 samt 8/6 3 og 12/6 5 1980.



Figur 28. Lille Kobbersnepper, Aarhus ant 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.  
 Et + angiver < 20 individer

### Blækske (Fringa ochropus)

Fåtalig brækgest (med. marts-pr. maj og med. juni-med. sept). Vi er  
 efterhånden ved at have et ret godt materiale om denne art. Forårs-  
 strækket indledes med. marts, kulminerer pr. med. april og slutter pr.  
 maj. Efterårstrækket starter med. juni, svinger lidt i antal ult.  
 juni/med. juli, kulminerer ult. juli, antallet holder sig jævnt med.  
 aug, falder omkring 1. sept og slutter med. sept. Alle iagttagelser  
 nævnes.


Kysing Fjord: 7/4 2 (JF), 15/4 3 (JF), 1/7 2 (JF), 29/7 1 (HLL), 1/8  
 1 (H+JE), 3/8 1 (JF, BHJ, PH), 9/8 1 (DOF) og 4 (NA), 11/8 1 (JF),  
 15/8 3 (HP), 16/8 2 (SH, JF), 28/8 1 (HLL), 31/8 1 (JF), 15/9 1 (JF).  
 Østerby Mose: 30/4 1, 4/5 1, 7-8/5 1, 17/6 1 og 23/8 1 (PH, BHJ).  
 Brabrand Sø: 28/3 1 (AJ), 9/4 3 (KHe, AJ), 10/4 4 (AJ), 15/4 4 (HM),  
 2+3/5 1 (AJ), 27/8 1 (HLL).

Bjerregrav Mose: 17/3 3 (EH), 30/3 4 (Gejrf, KEH, BRR, JRR), 2/4 1  
 (JRR), 26/4 2 (Gejrf, SH), 5/9 1 (Gejrf, SH, JRR, ØBF).

Øvrige: 29/3 1 Ramten Sø (JRR), 30/3 2 Astrup Mose (AJ), 6/4 2 Hørret

Enge (BHJ), 7/4 1 hørt Horskær (LPJ), 11/4 1 Båstrup Mose (HHH), 12/4 1 Lillenor (PH), 5 Bakken, Gjerrild (St1), 15/4 2 NV Gjerrild (HP), 15/4 1 mose ved Gassum (JRR), 16/4 1 Kasted Mose (SH), 18/4 2 Hellemose, Samsø (AJ), 2 N Moesgård Strand (CQP), 1 trk Bakken, Gjerrild (St1), 23-24/4 1 Hesselballe (NT), 3/5 1 Tomkær, Alsrode (OF), 5/5 2 Sorte Sø, Skanderborg (GG), 25/6 2 Kasted Mose (KHe), 2/7 1 Lilleå-dalen (SMJ), 8/7 3 øer ved Ebeltoft (FF), 23/7 5 Hesselholm, Samsø (LB), 27/7 7 Polkrog, Alrø (KHe), 1 Hesselholm, Samsø (LB), 5 Gjerrild Skovene (BHJ), 28/7 1 Gjerrild Skovene (BHJ, FL), 5/8 2 Solbjerg Sø (BHJ), 3 Hattemager (SMJ), 6/8 1 Hesselholm, Samsø (LB), 12/8 1 Kasted Mose (AJ), 22/8 2 Tved Øhoved (AJ), 27/8 3 Grenå Enge (CO).

Se appendix II 1980.



Figur 26. Svaleklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

#### Tinksmed (Tringa glareola)

Fåtalig trækgæst om foråret (pr. ult. maj), meget sjælden og uregelmæssig sommergæst (pr. juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (ult. juni-pr. sept). Også for denne art har vi efterhånden fået samlet et ret godt materiale. Forårstrækket foregår mellem 5. og 23. maj, med kulminationen 5.-10. Uden for kulminationsperioden kun få fugle. En enkelt oversomrende fugl. Mistanke om en yngleforekomst, dog på et tidspunkt, hvor efterårstrækket netop indledes. Biotopen er dog formentlig velegnet som yngleområde. Først med. juli kommer trækket for alvor i gang og to toppe, den ene med./ult. juli hidrører fra de adulte og den anden pr. med. aug hidrører fra juvenile fugle. Trækket ophører de første dage i sept. Alle iagttagelser nævnes.

Kysing Fjord: 7/5 1 (KHe), 10/5 3 (PH, BHJ), 19/5 2 (KHe), 16/7 2 (JF), 18/7 17 (JF), 21/7 2 (JDK), 29/7 3 (HLL), 1/8 2 (FL, JF), 6/8 1 (LPJ), 9/8 5 (DOF), 6 (SH), 7 (PH, BHJ, FL), 9 (NÅ), 11/8 7 (JF), 11 (AJ), 14/8 5 (JF), 15/8 7 (HP), 16/8 2 (SH), 20/8 8 (HLL), 21/8 2 (JF).

Østerby Mose: 5/5 1, 6/5 1, 7/5 12, 8/5 7, 9/5 6, 10/5 2, 11/5 1, 20/5 1, 23/5 3 (PH, BHJ).

Skovsmed Sø: 10/5 2, 10/5 2 (AJ), 4/6 1 (EH), 22/6 1 (AJ), 10/8 1 (AJ).


Kalundborg: 7/5 13, 11/5 7, 21/5 1, 7/8 3, 10-11/8 2 (JJP).

Skovsmed Sø: 27/5 4, 28/5 1, 29/5 2, 31/5 2-3, 1/9 5, 3/9 7 (CO).

Skovsmed Sø: 20/5 2 Frederiksdal Hede (ME), 19/7 2 Tved Øhoved (CQP), 27/7 1

Polenæs, Alstø (HSE), 1 Hesselholm, Samsø (LB), 23/8 1 Hattemager (SMJ).  
 Inden for de sidste 5 år foretager 2 formodede sommerfund fra 16/5 1977 og 14/5 1978.

Se appendiks II 1980.



Figur 27. Dinksmad, Samsø amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle dagtagne fugle pr. 3-dages periode.

### Såben (Fringilla coccyzus)

Fåttellig (ret almindelig) yngletrækfugl (med. marts/med. april - med. juli/ult. aug). Ret almindelig trækfugl (med. marts-pr. maj og pr. juli-med. sept, sjældnere til okt), sjælden, men formodentlig regelmæssig vintergæst (nov-feb). 12 ynglet lokaliteter indrapporteret. Forårstrækket indledes med enkelte fugle med. marts men først i slutningen af måneden kommer trækket i gang. To toppe med kulmination med. april, men også et større træk pr. maj. Fra med. maj til ult. juni er det ynglefuglene, som registreres. Efterårstrækket indledes pr. juli. Tre, måske egentlig fire toppe kan skelnes. Toppen med. juli kan formodes at være adult-trækket eller måske være egne (danske) ynglefugles (adulte som juvenile) borttræk. Sidstnævnte synes at underbygges med LB's kommentarer for Hesselholm (se senere). Toppen i månedsskiftet juli/aug hører måske sammen med den næste top med. aug. Adskilles de to, kan den første være adulttræk og den næste juveniltræk af de skandinaviske ynglefugle. Samles de to toppe, kan det måske alene være adult-trækket af skandinaviske fugle. Den sidste top må så være juvenil-trækket af skandinaviske fugle. En anden mulighed var en kulmination i de Islandske Rødbens træk. Mod sidstnævnte taler dog den pludselige forsvinden af fuglene med. sept. Okt-dec fuglene kan

dog foreligger racebestemte fund af fuglene. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund, første, sidste i sept, alle fra okt-dec, alle på mindst 6, dog undtaget alle obs mellem 20/5-1/7 som henregnes til ynglefuglene.

Ynglefund med antal par:

2-3 Hesselholm, Samsø (LB), 2 Alrø Polder (FC), 3 Alrø Egehoved (LPJ), 3 Horskær (LPJ), 1 Solbjerg Sø (BHJ), 1-2 Østerby Mose (BHJ), 2 Brabrand Sø (AJ), 3-5 Følle Bund (HA), 1 halvøen ved Kalø Slotsruin (HA), 2 Kolindsund (JJP), 0-1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 3 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), ialt 23-28 par.

Første: 14/3 1 Kysing Fjord (JF) og 15/3 1 Barnekold, Samsø (LB).

Sidste i sept: 14/9 30 (PMT, ET) og 15/9 10 Kysing Fjord (JF).

Oktoberfund: 4/10 6, 17/10 1 og 21/10 1 Kysing Fjord (JF).

Vinterfund (nov-dec): 28/11 5 Pletten, Mariager Fjord (AJ, JM, JRR), 5/12 2 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 20/12 1 Kysing Fjord (PH, BHJ) og 1 (samme?) Kysing Næs (SH), 29/12 1 Kysing Fjord (H+JE).


Hesselholm, Samsø: 11/4 - 29/8; 12/4 15 og 28/7 6. Efter med. juli er det formentlig trækgæster og ikke ynglefuglene, der ses på stedet (LB).

Horskær: 5/4 2 - 14/6 3 par. 7/4 6 (SH, LPJ, PN).

Kysing Fjord: 14/3 1 - 15/9 10; 9/4 6, 12/4 9, 13/4 6, 15/4 13, 20/4 8, 26/4 8, 29/4 9, 2/5 7, 6/5 2, 7/5 13, 9/5 15, 15/5 9, 20/5 - 1/7 ynglefuglene, 12/7 7, 16/7 7, 18/7 33, 21/7 7, 1/8 13, 2/8 16, 3/8 12, 5/8 31, 9/8 24, 11/8 32, 14/8 20, 15/8 12, 16/8 68, 21/8 8, 28/8 8, 31/8 28, 4/9 10, 7/9 25, 9/9 29, 12/9 23, 14/9 30 og 15/9 10 (LPJ, AJ, EH, JDK, SH, JF, KHe, PMT, ET, NÅ, H+JE, BHJ, PH, FL).

Brabrand Sø: 26/3 1 - 22/6 3; 4/5 5 (AJ, NÅ, EH, HM, NT).

Kolindsund: 23/4 2 - 13/9 6; 13/9 6 (JJP, SPA).



Figur 28. Rødben, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver < 3 individer.



Råby Odde, Randers Fjord: 12/4 4 par ~ 1/8 3; 12/4 8 (KEH, EH, BRR, JRR).  
Randers Fjords udløb: 12/4 9 - 22/8 15; 12/4 9, 4/5 9, 1/8 12, 15/8  
14, 22/8 15 (KEH, PH, BRR, JRR).

Øvrige: 5/4 36 Alrø (SH), 11/4 10 St. Sjørup (KEH, BRR, JRR), 20/4 13  
Langelandsø, Samsø (AJ), 7/5 70 Børnekold, Samsø (AJ), 6/5 10 Følle Bund  
(NA), 17/5 13 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 18/5 10 Følle  
Bund (NA), 14/7 25 Alrø (PH), 19/7 44 Boels Rev (KEH, BRR, JRR), 2/8  
15 V Fjellerup Strand (NA).

Inden for de sidste 5 år foreligger følgende vinterfund. Dog er fund  
fra Vorse/Vejle amt, som er nævnt i tidligere rapporter, ladet ude af  
betragtning her.

År	1976				1977				1978				1979				1980			
	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D	J	F	N	D
Antal fund	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1
Antal fugle	0	0	0	0	0	0	52	22	314	1	279	86	4	0	0	0	0	0	4	1

På ovenstående tabel må det bemærkes, at Rødben slet ikke er medtaget  
i 1978-rapporten, og januarfundet dette år er fra 1980-rapportens  
appendix III.

### Bortklire (*Tringa erythropus*)

Båtdaglig trækfugt (med. april-pr. maj og pr. juni-med. sept). Bortset  
fra en enkelt april-fugl, er arten i foråret kun set mellem 2. og 10.  
maj. Efterårstrækket noget mystisk, når man ser på 5-dages-kurven.  
Junitrækket er adulte hunner, julitrækket adulte hanner og fra aug ses  
ungfuglene, som iøvrigt i aug viser et meget jævnt gennemtræk. Ult.  
aug ebber trækket ud og med. sept er de sidste fugle væk. Alle iagt-  
tagelser nævnes.

Kysing Fjord: 12/4 1 (DOF), 7/5 3 ad. (KHe), 9/5 3 (JF, JDK, EH),  
10/5 1 (PH, BHJ), 3/8 2 (JF, BHJ, FL), 5/8 6 (JF), 9/8 1 (NA), 11/8  
1 (JF), 6 (AJ), 14/8 4 (JF), 15/8 1 (HP), 16/8 4 (SH), 6 (JF), 20/8  
6 (HLL), 21/8 3 (JF), 28/8 2 (JF).

Øvrige: 2/5 1 Råby Odde, Randers Fjord (JRR), 4/5 1 Østerby Mose (PH,  
BHJ), 1 Brabrand Sø (AJ), 5/5 1 Østerby Mose (BHJ), 6/5 1-2 Brabrand  
Sø (KHe, AJ), 8/5 3 Kolindsund (JJP), 9/5 6 Hesselholm, Samsø (LB),  
1 N Østerby Mose (PH, BHJ), 3 Kolindsund (JJP), 8/6 3 Randers Fjords  
udløb (JRR), 10+18/6 1 Kolindsund (JJP), 30/7 2 Ramten Sø (Jacob og  
Jan Silberg), 1/8 1 Ramten-Dystrup Sø (NA), 6 Randers Fjords udløb  
(KEH, BRR, JRR), 7/8+10-11/8 1 Kolindsund (JJP), 6/9 1 Sødring Kær

(HLL), 14/9 1 og 15/9 2 Østerby Mose (PH, BHJ).

Se appendix II 1980.



Figur 29. Sortklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

### Hvidklire (Tringa nebularia)

Ret almindelig trækgæst (pr. april-ult. maj og ult. juni-ult. okt), meget sjælden og uregelmæssig sommergæst (pr. med./juni). Forårstrækket indledes pr. april, hvilket er tidligere end normalt. I midten af april ses enkelte fugle, men det egentlige forårstræk starter først ult. april og overstås meget hurtigt med kulminationen pr. maj og de sidste forårsfugle med. maj. I de første junidage ses en oversomrende fugl. Efterårstrækket indledes ult. juni, men også her går der lang tid inden trækket rigtigt kommer i gang. Nogenlunde jævnt adult-træk med. juli/pr. aug. Kulminationen i juvenil-trækket falder i sidste halvdel af aug og mod månedens slutning falder antallet markant og i løbet af sept ebber trækket langsomt ud. Ult. sept ses de sidste fugle med en efternøler ult. okt, som dog er inden for den normale træktid. Følgende iagttagelser nævnes: Alle april-, juni- og okt-fund. De sidste september-fugle og alle over 5 fugle.

April:

7/4 1 Begtrup Røn (EH), 12/4 2 Ø Kysing Fjord (PH, BHJ, FL), 13/4 1 Ramten-Dystrup Sø (St1), 15/4 2 Kysing Fjord (JF), 17/4 1 Fornæs (St1), 20/4 1 Barnekold, Samsø (AJ), 20/4 1 (JF) og 26/4 6 (JF) Kysing Fjord, 26/4 1 Brabrand Sø (AJ), 28/4 1 Flakket, Anholt (NT) og 29/4 14 Kysing Fjord (JF).

Juni: 4/6 1 Brabrand Sø (EH) og 20/6 4 Hesselholm, Samsø (LB).

Oktober: 23/10 2 Følle Bund (HA).

Sidste i september: 28/9 1 Hesselholm, Samsø (LB).

Hesselholm, Samsø: 18/7 7 - 28/9 1; 18-19/7 7, 26/7 8, 27/7 7, 28/8 7, 29/8 6 (alle LB).

Kysing Fjord: 12/4 2 Ø - 22/5 1; 26/4 6, 29/4 14, 1/5 31, 2/5 8, 6/5 45, 7/5 80, 9/5 70, 10/5 41. 1/7 1 - 12/9 1; 9/7 6, 18/7 21, 21/7 14, 29/7 8, 1/8 8, 3/8 12, 5/8 15, 9/8 10, 11/8 21, 14/8 11, 16/8 25,


21/4 1, 21/4 1, 23/4 2, 23/8 14 (KEH, SH, NT, PH, BHJ, FL, JDK, HLL, LPJ, EE, DOF, AJ, PH, JF, MA, BSTR).

Østerby Mose: 4/5 1 - 7/5 3, 21/7 1 - 17/9 2. (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 26/4 1 - 3/5 1, 3/5 1 - 27/8 4. (BHJ, FL, AJ, HLL).

Holtebjerg: 4/5 2 - 11/5 2, 7/8 1 - 13/9 1; 22/8 20 og 29/8 15 (SPA, JJP, CF).

Øvrige: 2/5 12 (KEH, BRR, JRR), 4/5 59 (PN) Randers Fjords udløb, 8/5 12 Rals slotsruin (JR), 17/5 9 Randers Fjords udløb (KEH, BRR, JRR), 1/8 14 Boels Rav (KEH, BRR, JRR), 5/8 26 Dråby Sø (JTL), 15/8 6 Bjerregaard Mose (SH), 6 Randers Fjords udløb (JRR), 15 Pletten, Mariager



Figur 30. Hvidklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. En + angiver < 3 individer.

### Midderklire (Tringa hypoleucos)

Ret almindelig trækfugl (med. april-ult. maj og pr. juli-pr. okt, yderst sjældent til ult. okt). Trækket indledes med. april med en jævnt stigning til kulminationen pr. med. maj og herefter et hurtigt fald med de sidste forårsfugle ult. maj. Efterårstrækket starter pr. juli og stiger til den første kulmination med de adulte fugle med./ult. juli. Herefter et fald i antallet omkring månedsskiftet juli/aug, men en ny kulmination med de juvenile fugle med./ult. aug. Herefter et hurtigt fald, dog et pænt antal til med. sept, og de sidste fugle ses i slutningen af måneden. Oktoberfundene er temmelig sene. Følgende iagttagelser nævnes: første og sidste forår og efterår, alle april- og oktoberfund, alle over 5 fugle.

Forår: 11/4 2 Brabrand Sø (PH, BHJ, FL) og 31/5 1 Brabrand Sø (NA).

Efterår: 1/7 2 Kysing Fjord (JF), 1 Brabrand Sø (HM), 28/9 1 Hassensør (LPJ).

April: 11/4 2 Brabrand Sø (PH, BHJ, FL), 25/4 1 Aarhus Havn (PH), 1 Ramten-Dystrup Sø (DOF), 26/4 1 (AJ), 27/4 2 (AJ) og 28/4 1 (JR)

Brabrand Sø, 28/4 1 Flakket, Anholt (NT), 29/4 1 Tåstrup Sø (BB).  
 Oktober: 14/10 2 Kysing Fjord (EH) og 23/10 1 trk Følle Bund (NA).  
 Kysing Fjord: 2/5 2 - 22/5 5; 9/5 17, 10/5 6 og 19/5 19. Efteråret pr.  
 1/7 2 - 12/9 3; 9/7 8, 12/7 12, 16/7 79, 18/7 27, 21/7 32, 22/7 28,  
 25/7 53, 28/7 26, 29/7 17, 1/8 20, 2/8 19, 3/8 22, 5/8 23, 9/8 29,  
 11/8 23, 14/8 28, 15/8 38, 16/8 31, 20/8 38, 21/8 38, 22/8 21, 23/8  
 15, 28/8 14, 31/8 11, 9/9 7 (JDK, EH, BKJ, PH, FL, AJ, NA, SH, JRR, BKH,  
 PH, DOF, H+JE, HLL).

Østerby Mose: 4/5 2 - 20/5 3; 14/5 7 og 18/5 6. I efteråret fra 18/9  
 6 - 15/9 1; 18/7 6, 6/8 7 (PH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 11/4 2 - 31/5 1; 9/5 6 og 14/5 7. Fra efteråret 1/7 1 -  
 24/9 1; 11/7 11, 9/8 9 (HM, JDK, JR, NA, JTL, EH, PH, FL, HLL, AJ, BKH).  
 Aarhus Havn: 25/4 1 - 18/5 1. Efteråret 12/7 1 - 17/9 2; 29/7 15, 30/7  
 25, 23/8 8 og 14/9 7 (NA, PH, CQP, FF, KHe).


Øvrige: 17/5 8 Vilhelmsborg (PH, BHJ), 21/5 10 Hov Røn (FC), 17/7 10  
 Kalø Slotsruin (HA), 20/7 25 Brattingsborg, Samsø (LB), 21/7 22 trk  
 Fornæs (HC), 23/7 6 Alrø (JDK), 24/7 8-10 Tranemosen, Samsø (LB),  
 30/7 11 Horskær-Kalsemade (PN), 1/8 16 Randers Fjords udløb (KEH, BKH,  
 JRR), 13/8 6 SV Hassensør (AJ), 16/8 10 Kalø slotsruin (HA), 29/8 1  
 Glenstrup Sø (JRR).

Inden for de sidste 5 år foreligger følgende april og oktoberfund.

April: 1980 1 fund af 4 fugle.

Oktober: 1976 1 fund af 1 fugl.

Se appendix II 1980.



Figur 31. Mudderklire, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

### Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Sjælden, visse år ret almindelig, men uregelmæssig trækgæst om foråret (april-maj), ret almindelig (fåtalig-almindelig) trækgæst om efteråret (pr. juli-ult. okt, visse år til pr. nov). 7. og 8. forårsfund i Aarhus amt. Efterårstrækket normalt, måske nærmest lidt over normalt. Trækket indledes pr. juli, og en lille top i månedsskiftet juli/aug antyder kulminationen i de adulte fugles træk. Fra med. aug stiger

antallet vil en kumulativt til sept., der udgøres af årsungerne. Alle angivelser nævnes:

Forår: 4/4 1 Kysing Fjord (JF), 20/4 4 Barnekold, Samsø (AJ).  
 Efterår: 5/7 2 Studstrup (KHe), 12/7 1 Kysing Fjord (JF), 19/7 6 Tved  
 Ørsted (CO), 25/7 3 Hesselholm, Samsø (LB), 28/7 2 Aarhus Havn (KHe),  
 29/7 8 Aarhus Havn (CO), 31/7 8 Aarhus Havn (KHe), 1/8 3 Kysing Fjord  
 (JF, FL), 3/8 4 Kysing Fjord (HLL, FL), 5/8 5 Kysing Fjord (JF), 12/8  
 1 Aarhus Havn (KHe), 14/8 3 Kysing Fjord (JF), 1 Aarhus Havn (KHe),  
 20/8 6 Kysing Fjord (HLL), 28/8 10 Hesselholm, Samsø (LB), 2 Kysing  
 Fjord (JF, AJ, HLL), 31/8 1 og 1/9 2 Grenå Enge (CO), 6/9 19 Sødring Kær  
 (HLL), 12/9 84 Pletten, Mariager Fjord (KEH, BRR, JRR), 25/10 7 Randers  
 Fjords udløb (JRR).

Inden for de sidste 5 år er der alle forårsfund. 1978 var et fint  
 forår, det viste for arten glimtelige og overvældende træk, som visse  
 år har funde sted. Efterårstrækket er regelmæssigt, men meget varieret  
 i antal hvad nedenstående også viser:

Forår: 1978: 19/4-17/5 5 fund af 476 fugle.

1980: april 1 fund af 12 fugle.

Efterår: 1976: 13/7-13/9 mindst 4 fund af mindst 112 fugle


1977: juli-sept ukendt antal fund af 136-141 fugle

1978: 19/7-7/11 23 fund af 1999 fugle

1979: 14/7-14/9 3 fund af 72 fugle

1980: 22/7-24/8 15 fund af 64 fugle

Med appendix II 1980 blev det til 16 fund af 244 fugle mellem 22/7 -  
 5/10.



Figur 32. Islandsk Ryle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode.

### Dværgryle (Calidris minuta)

Meget sjælden-sjælden, uregelmæssig trækgæst om foråret (med. maj-  
 pr. juni), ret almindelig trækgæst om efteråret (med. juli-pr. okt).  
 Et helt utroligt stort materiale, som ikke tidligere er set i rappor-  
 tens historie. Forårsfundet er det 4. i amtet. Forløbet af efterårs-

trækket er meget flot. I juli ses nogle enkelte fugle, og fra omkring 10. aug kommer der rigtigt gang i trækket, som kulminerer pr. sept. Herefter holder antallet sig ret højt til fuglene forsvinder ult. sep. Et par efternøglere afrunder efterårets træk.


Forår: 10/5 1 Kysing Fjord (BHJ).

Efterår: Kysing Fjord: 1-2/8 1 (JF, FL), 9/8 1 (DOF), 2 (SH), 4 (WA), 11/8 2 (AJ), 3 (JF), 20/8 3 (HLL), 21/8 3 (JF), 23/8 2 (JF), 28/8 1 (JF), 10 (AJ, HLL), 31/8 1 (JF), 4/9 2 (H+JE), 7/9 48 (JF), 9/9 15 (JF), 12/9 3 (AJ), 21 (JF, BHJ, FL), 15/9 23 (JF), 20/9 26 (PH, BHJ), 4/10 2 (JF, BHJ, PH, CQP), Aarhus Havn: 12/7 1 (FF), 29/7 9 (CQP), 9/8 3 (CQP), 12/8 2 (KHe), 14/8-9/9 2 (KHe), 11/9 1 (HLL), 17/9 1 (HLL), 18/9 2 (PH, BHJ, FL). Grenå Enge: 19/8 1, 29/8 2, 31/8 3, 1/9 7-9, 3/9 7 (CO). Øvrige: 30/8 3 Glatved Strand (KEH, JRR), 6/9 60 Sødring Kær (HLL), 15/9 9 Overgård ved Mariager Fjord (KjH).

1981 overgår totalt 1978, som på landsplan var topåret med flokke på op til 1000 i Vestjylland (se lokalrapporten for 1977). At arten næret feltornitologisk aktivitet svinger meget i antal, fremgår tydeligt af en sammenstilling af iagttagelserne fra de sidste 5 år i Aarhus amt.

Forår: 2 fund maj 1977 og 1 fund juni 1978.

Efterår: 1976: 28/8-2/10 7 fund af 62 fugle. Desuden et nov-fund, som blev anbefalet forelagt SU, grundet dets antal (50 ex.).  
1977: 13/8-24/9 5 fund af 33 fugle  
1978: 15/8-15/10 9 fund af 60 fugle  
1979: kun 14/7 1  
1980: 26/7-21/9 9 fund af 26 fugle



Figur 33. Dvergrylle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne fugle pr. 5-dages periode. Et + angiver 1 individ.

#### Temmincksrylle (Calidris temminckii)

Fåtalig trækgæst (med./ult. maj og med. juli-med. sept). Arten er

for de fleste lokaliteter. Den træffes zeks. ofte i grusgrave og lignende, altså et biotopkræv, der ligner Lille Præstekraves. Om vinteren træffes arten, med meget få undtagelser, kun i tiden 10.-25. maj. De fleste stemmer overens med 1981-observationerne. Om efteråret ses den mellem med. juli og med. sept. som oftest kun i juli/aug. Generelt 1981 langt over normalt.

Observ. vesterby Mose: 14/5 3, 15/5 2, 17/5 2, 18/5 3, 20/5 2, 21/5 1, 21/5 2 (BE, BBJ, FL). Foruden disse kun 21/5 1 Hov Røn (FC).

Efterår: Kysing Fjord: 21/7 2 (BHI), 1/8 1 (JF, FL), 2/8 3 (JF, FL), 3/8 1 (JF, BHI, FL), 4/8 1 (H+JE), 9/8 3 (JF), 12/8 3 (JF, BHI, FL), 18/8 1 (JF), 20/8 1 (PH, BHI). Aarhus Havn: 12/7 4 (KHe), 19/7 2 (FF), 21/7 1 (KHe), 6/8 1 (PNN). Øvrige: 18/7 1 Eskelund, Brabrand Sø (KHe), 28/7 1 S Hornæs (BHI, FL).

Antallet af de sidste 5 år er arten truffet som vist i skemaet:

år	1976				1977	1978		1979	1980		
	maj	juni	aug	sep	maj	jul	aug	jul	apr	maj	aug
antal fund	1	1	1	1	2	1	1	2	1	4	7
antal individer	1	1	2	1	31	1	1	4	2	7	11

### Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Arten: sjælden (sjælden) yngletrækkfugl, almindelig trækgæst (pr. marts-ult. maj og med juli-med. nov). Fåttallig og regelmæssig vintergæst (dec-feb). Kun et ynglefund rapporteret i år. Forårets træk indledes i marts, men herudover er det svært at give en beskrivelse af det, bortset fra, at der er et meget tydeligt og stort gennemtræk med. maj. Efterårstrækket indledes med. juli og varer til med. nov. Flere mindre toppe i efterårets løb med den helt store kulmination ult. okt. Fra såvel forår som efterår savnes i år optegnelser fra det sydlige vadehav omkring Gyllingnæs-halvøen. Efter med. nov foreligger der 7 vinterfund fra dec. Følgende iagttagelser nævnes: Ynglefund, første fugl, kyst observationer på mindst 50, alle indlandsiagttagelser og vinterfund (dec).

#### Ynglefund:

1 par Alrø Polder (FC).

Første: 2/3 1 Aarhus Havn (HLL) og 14/3 8 Kalø slotsruin (JJP).

#### Kystiagttagelser:

Hesselholm: 19/7 11 - 11/10 8 i antal 2-24 (LB).

Alrø: 15/3 117 (LPJ), 31/3 1000 (CQP), 5/4 200 (SH), 19/5 1100 (FC).

Kysing Fjord: 18/3 2 - 10/5 2, i antal 1-4. 2/7 2 - 16/11 20, med

følgende over 50: 9/8 300, 7/9 140, 12/9 113, 20/9 72, 4/10 57, 17/10 59, 26/10 65 (JF, HP, AJ, DOF, PMT, ET, T. Bøgeskov, CQP, NÅ, H+JE, KHe, BHJ, LPJ, PH, FL, NT, JDK, SH, HLL).

Aarhus Havn: 12/7 14 - 18/10 10 i antal 14-35 (PH, BHJ, FL, CQP, NÅ, FF, KHe, PH, PNN, HLL).

Randers Fjords udløb: 17/5 2465, 1/8 9 - 14/11 73, med følgende over 50: 15/8 92, 24/10 410, 25/10 1989, 14/11 73 (KEH, EH, BRR, JRR).

Pløtten, Mariager Fjord: 17/5 280. 15/8 1 - 14/11 80, med følgende over 50: 24/10 430, 14/11 80 (KEH, BRR, JRR).


Øvrige over 50: 15/3 70 (LB) og 20/4 75-125 Barnekold, Samsø (AJ), 19/5 800 Søby Rev (FC), 1/8 108 Boels Rev (KEH, BRR, JRR), 6/9 350 Sødring Kær (HLL), 21/9 125 Kysing Næs (CQP), 18/10 60 Horskær (LPJ) og 25/10 221 Boels Rev (JRR).

Indlandsiaagttagelser: 28/5 1 Østerby Mose (PH, BHJ, FL), 27/8 1 Brabrand Sø (HLL), 29/8 4 og 31/8 2 Grenå Enge (CO), 21/10 7 Brabrand Sø (AJ), 22/10 50 (OF) og 2/11 9 (CO) Grenå Enge.

Følgende vinterfund fra de sidste 5 år. De i tidligere rapporter nævnte fund fra Vorsø, Vejle amt er udeladt af tabellen.

År	1976			1977			1978			1979			1980	
	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb	dec	jan	feb
Antal fund	2	3	4	1	1	1	2	3	0	3	0	0	4	0
Antal fugle	39	76	100	3	225	218	7	68	0	8	0	0	91-	101

Se appendix II 1980.



Figur 34. Almindelig Ryle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagelser pr. 5-dages periode. Et + angiver < 20 individer.




1981-1982 Ryge (Calidris alpina)

Uregelmæssig og uregelmæssig træk om foråret, fåtalling træk om efteråret (ult. juli-med. okt). Amtets 2. forårsfund og igen 18. Kysing Fjord. I efteråret iagttages ikke nogen klar adskillelse mellem de gamle og unge fugles træk, og alligevel antyder de "tomme" jagttagelser med. aug. nov. vinteren. Alle jagttagelser nævnes.

Forår: 21/3 1 Kysing Fjord. Efterår: 19/7 1 (JF), 21/7 5 (BHJ), 22/7 1 (JF), 23/7 3 (HLL), 1/8 6, 2/8 2 (JF, FL), 3/8 1 (JF, BHJ, FL), 9/8 5 (NA, HLL), 9/8 4 (BA, BHJ, FL), 11/8 1 (JF), 20/8 7 (HLL), 21/8 1, 23/8 2 (HLL), 4/9 3 (HLL), 7/9 4, 9/9 2 (JF), 12/9 5 (JF, BHJ, FL), 15/9 3 (JF, BHJ, FL), 21/9 2 (JF, BHJ). Aarhus Havn: 12/7 1 (JF), 12/7 2 ad. (KHe), 18/7 2 ad. (KHe), 28/7 1 ad. (KHe). Grenå: 6/8 3 (PH), 12/8 3 (PH). Øvrige: 31/7 3, 1/8 3-4, 2/8 3 (HLL). Øvrige: 12/9 11 Kjetten, Mariager Fjord (HLL, BHJ, JF).

1981



Fign: 1. Kystsejlet Ryge, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Jagttagelser en summering af alle jagttagelser pr. 5-dages periode.

Fandløber (Calidris alba)

Ujælden og uregelmæssig træk om foråret, fåtalling træk om efteråret (ult. juli-med. okt), fåtalling og uregelmæssig vintergast.

Martsjagttagelsen er 4. Forårsfund i amtet. De øvrige 3 alle fra ult. april-ult. maj 1975. Efteråret ganske godt med Aarhus Havn som den dominerende lokalitet. Jagttagelserne viser tydeligt adskillelsen mellem de gamle og unges træk. I sept er der nok flere gengangere. Inden for de sidste 5 efterår er arten truffet i aug 1976, sept 1977, aug+sept+nov 1978, juli+aug 1979 og juli+aug+sept+okt 1980. Novemberfundet fra 1978 henregnes til de sene træk og amtets 1. vinterfund er således en kendsgerning i december 1981.

Forår: 23/3 10 N Fornæs (HC).

Efterår: Aarhus Havns: 28/7 2 ad. (KHe), 3/8 3 ad. (KHe), 9/9 5 1K (KHe), 11/9 3 juv. (HLL), 13/9 1 juv. (PH), 14/9 4 (HLL), 17/9 4 juv. (HLL), 18/9 4 (PH, BHJ, FL). Øvrige: 22/7 2 trk Fornæs (HC), 9/8 2 Kysing

Fjord (DOF), 19/9 1 Langør, Samsø (LB), 13/10 6 Grenå Strand (CO),  
14/10 Polde-Rev, Grenå (CO).

Vinter: 20/12 11 Polde-Rev - Havknude, Grenå (CO).

### Brushane (Philomachus pugnax)

Ret almindelig trækfugl om foråret (med. april-ult. maj), fåtallig sommergast (ult. maj/pr. juni-ult. juni/pr. juli), almindelig trækfugl om efteråret (ult. juni/pr. juli-med./ult. okt), sjælden og uregelmæssig vintergast. Forårstrækket indledes med. april med de første fugle, men bliver så bremset af en længere "kuldeperiode". Derefter ses de næste 5. maj, hvorefter forårstrækket iøvrigt kulminerer. I slutningen af maj ses de sidste trækfugle, som forbliver i området for at oversomme. Først midt i juli indledes efterårstrækket, og den første kulmination falder omkring midten af august. Det drejer sig om de gamle fugle. Herefter en glidende overgang til ungfuglenes enorme kulmination i begyndelsen af september. I lokalrapportens omkreds, uanset den forøgede interesse for indrapportering, er lignende fugle ikke iagttaget. Efter ungfuglenes kulmination falder antallet hurtigt, og det sidste træk ophører i slutningen af september med enkelte enkelte fugle til midten af oktober. Herefter forligger 3 isolerede iagttagelser, som må henføres til vinterobs. Alle iagttagelser nævnes.

Kysing Fjord: 13/4 2 (JF), 1/5 41 (JF), 10/5 7, 19/5 3, 23/6 1 hanner, 16/7 2, 18/7 5, 21/7 8, 28/7 21, 1/8 12, 2/8 11, 3/8 22, 5/8 14, 9/8 45 (PH, BHJ, FL), 11/8 46 (JF), 14/8 36, 15/8 70 (HF), 16/8 56 (JF), 20/8 15, 21/8 27, 22/8 5, 23/8 45 (JF), 28/8 96 (JF), 31/8 55 (JF), 1-4/9 250-300 (ET, PMT), 7/9 113 (JF), 9/9 28, 12/9 40 (BHJ, FL), 13/9 102 (JF), 20/9 8, 21/9 90 (CQP), 27/9 2, 1/10 1, 4/10 8, 12/10 1, 21/10 4, 23/11 1-2 hanner (CQP), 28/11 1 (JF), 5/12 1 (JF); (L&B, Torben Bøgeskov, H+JE, JF, KHe, PH, SH, EH, AJ, BHJ, JDK, HLL, FL, CQP, KE, ET, PMT, NA, DOF).

Østerby Mose: 6/5 1, 7/5 8, 9/5 2, 18/5 1, 14-15/9 1 (PH, BHJ, FL).


Brabrand Sø: 5-6/5 1, 9/5 2, 12/5 6, 2/7 hanner, 10/8 35 (AJ), 27/8 15, 28/8 14, 29/8 1, 31/8 76 (CO), 1/9 90 (CO), 3/9 125 (CO); (OF, CO).

Øvrige: 11/4 1 hun Alrø (LPJ), 8/5 7 Tranekær Mose (OF), 19/7 2 Tved Øhoved (CQP), 27/7 1 Hesselholm, Samsø (LB), 1/8 5 Ramten-Dystrup Sø (NA), 15/8 100 Bjerregrav Mose (SH), 29/8 2 Glenstrup Sø (JRR), 30/8 2 (BHJ), 18/9 6 Aarhus Havn (PH, BHJ, FL), 26/9 2 Fornæs (CO).

Vinter: 23/11 1-2 hanner (CQP), 28/11 1 og 5/12 1 (JF) Kysing Fjord.  
Se appendix II 1980.



Kare Holm: 11/4 3 (KHE, BRR, JRR), 7/6 6 (EH, JRR); y1-3par.  
 Råby Odde, Randers Fjord: 12/4 9 (KEH, BRR, JRR), 2/5 6, 17/5 12 (JRR),  
 31/5 1 (EH, JRR); y1-?.  
 Randers Fjords udløb: 12/4 2 (KEH, BRR, JRR), 17/5 1, 22/8 (JRR).  
 Pletten, Mariager Fjord: 17/5 2 (JRR), 12/9 1 ad. (KEH, BRR, JRR).  
 Øvrige: 7/4 2 Begtrup Røn (EH), 17/4 2 Sværm, Samsø (AJ), 20/4 15-20.  
 Barnekold, Samsø (AJ), 24/5 5 Skødshoved (KHe); y1-2/3par, 25/5 2.  
 Følle Bund (KHe); yngler ikke her.



Hellemåge (Stercorarius pomarinus)

Se appendix II 1973.

Svartbag (Larus marinus)

Fåtalrig (ret almindelig), men spredt og lokalt forekommende yngletrækfugl. Rapporteret fra 3 ynglepladser, men kendes desuden fra øerne i Stavns Fjord og Ørkenen på Anholt. Overvintringen skal hovedsagelig i vore egne farvande.

Ynglefund:

13 par Svanegrund, 1 par Søby Rev, 85 par Hov Røn (alle FC), ialt 100 par.

Sildemåge (Larus fuscus)

Fåtalrig (ret almindelig), men spredt og lokalt forekommende yngletrækfugl (med. marts-med. okt), fåtalrig træk- og sommergæst ved større ferskvandssøer i indlandet (med. feb/med. marts-ult. juli). To ynglefund er rapporteret, men det vides med sikkerhed, at arten også yngler på øerne i Stavns Fjord og i Ørkenen på Anholt, hvor landets største koloni findes. Iagttagelserne fra større ferskvandssøer langt fra kysten fortsætter. At de første iagttagelser af arten gøres ved

Svaner og albatros i med. januar er meget usædvanligt. At arten var afledt fra med. februar, er der næppe tvivl om, men at den alle-  
 dele da optræder ved feriemid. er det nok dokumenteret. Hvad der taler  
 mod vorrækmsten er også dens tidsmæssige isolation fra de næste jagt-  
 tagelser i begyndelsen af april. Alle jagttagelser nævnes:

#### Ynglefund:

16 par Svanegrund og 1 par Albatros (begge FC), ialt 27 par.

#### Kvælandsjagttagelser:

Svanemosen, Damsø: 25/5 2 (BCH) og 11/7 2 (HHH, AJ), Skanderborg Sø.  
 28/4 1, 2/7 4, 2/7 1, 5/7 3 (alle HHH), Mossø: 5/7 1, 7/7 1, 14/7  
 1 (alle HHH), Prætorand Sø: 15/7 2, 16/2 14, 10/3 1 (alle EH), og  
 18/7 3 (EH, YAK). Lading Sø: 2 3 4 og 24/3 1 (BH). Salten Langeø.  
 22/7 1 ad. (NA).

#### Tidlige jagttagelser:

Kvængård Sørand: 14/4 8 unger, 12/4 1 sub-ad. N, 22/4 1 sub-ad. N,  
 24/4 1 sub-ad. N (alle NA). Havn: 11/5 1 ad. (NA) og 12/7 2  
 (PH). Lading Sø: 11-28/4 ca 11-12 almindelig (NT) og 7/7 10 (PH, BH,  
 YAK). Albatros Fjerstrup Sørand: BHJ, 14/6 2 Kysing Fjord (BHJ),  
 Søby Rev (BHJ, FL), 18/7 1 ad -britisk race- Lundbyesgade,  
 Søby (BHJ). 25/7 1 ad. Søby (BHJ, FL), 24/9 mindst 10 Grenå  
 Sørand (EH). 11/10 2 ad. Lading Sø (HF).

Litteratur: Dybbro 1978, Oversigt over Danmarks fugle

Danmarks Dyreverdiv Bd. 7

#### Hættemåge (Larus argentatus)

Er almindelig og spredt forstret både ynglestrekket, meget almindelig  
 sommer- og vintergæst. Den er rapporteret fra 4 kolonier,  
 men det er næppe alle inden for hvert område, hvor den i hvert fald også  
 yngler på søerne i Stavns Fjord og på Anholt. Findes formentlig også  
 på flere andre søområder og søer, som f.eks. Vejvø, Tunge, Segtrup Røn,  
 Hjertebæk, Sønder og Lading Sø. Nogle tal fra Lading Sø, hvor arten  
 synes at træffe størst antal som Hættemåger i antal

#### Ynglefund:

114 par Svanegrund, 5 par Alcø Polder, 116 par Søby Rev og 477 par Hov  
 Røn (alle FC), ialt 712 par.

Lading Sø: 30/3 250, 1/4 250, 2/4 400 og 11/4 250 (alle BH).

Stormmåge (Larus canus)

Ret almindelig yngletrækfugl (marts-nov), fåtallig ynglestandfugl, almindelig/meget almindelig træk- og vintergæst (sept-april). Fire yngleiagttagelser og to sovepladser rapporteret.

## Ynglefund:

9 par Svanegrund, 69 par Alrø Polder, 245 par Søby Rev og 10 par Hov Røn (alle FC), ialt 333 par.

## Sovepladser:

31/3 650 Fussing Sø (JRR) og 3/9 10.000 Storm/Hættemåger Stilling Sø (ET).

Gråmåge (Larus hyperboreus)

Meget sjælden og uregelmæssig træk- og vintergæst.

1 fund: 28/12 1 1K Svanegrund (HLL).

I de sidste 5 år er arten iagttaget maj+sept+nov 1976, maj 1977, feb+apr 1979 og mar+maj+dec 1980.

Hvidvinget Måge (Larus glaucooides)

1 fund: Se appendix I.

Udgik af SU-listen i 1972 og kom igen på listen fra 1979. En tidligere iagttagelse fra amtet, nov 1973 skal således anbefales forelagt SU til godkendelse.

Sortrovedet Måge (Larus melanocephalus)

1 fund: Se appendix I.

Arten er truffet tre gange i Østjylland, Aarhus amt. To af iagttagelserne er godkendt af SU, nemlig: 27/4-2/5 1975 1 ad. Hjelm (yngleårs søn) havde bygget redeskål og udviste parringsadfærd overfor Stormmåge; og 1/9 1975 1 - skudt - Brabrand Sø (ringmærket ved Sortehavet, USSR). Om en 3. iagttagelse fra 1976 er forelagt SU vides ikke.

Se appendix II 1975.

Østergaard (Larus argentatus)

Østergaard er meget almindelig som vintergæst (med april-ult. sept.).  
 Der er dog få fagttagelser (se bl.a. 1), hvor arten iøvrigt var meget tal-  
 rigt forekommende i dele af Nord- og Østeuropa og for Danmarks vedkommende  
 specielt i Vestjylland.

1976: 1 21 N + 1 S i Hornum Sø (PH, EKS), 10/5 1 2K Østerby Mose (PH, EKS),  
 11/5 1 21 N + 1 S i Hornum Sø (PH, EKS), 6/6 1 juv. Mørke Rør  
 (JTB), 8/8 1 Kysing Fjord (JTB), 8-9/8 1 2K Østerby Mose (BHU), 9/8 1  
 1 Kysing Fjord (DOF), 24/9 1 1P Brabrand Sø (HLL) og 25/9 1 juv.  
 Brabrand Sø (HLL, JTB).

Inden for de sidste 5 år er arten fagttaget aug 1970 - aug+sept+nov  
 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 og juli 1980.

Brudefugl (Larus tridactylus)

Brudefugl er meget almindelig som vinter- og yngletidsfugl (marts  
 - juli) og meget almindelig næst- og vintergæst (aug-april). 21 yngler-  
 fund er registreret, men helt givet findes flere kolonier, bl.a. i flere  
 søer og åer i det vestlige og nordlige Danmark (meddelt af BHM og Jens Kirkeby).  
 Indtil nu er registreret 10 kolonier med 1-2 sovoplåde.

Yngstefund med antal par:

11F Ålborg polder (FC), 5 Søby (FC), mindst 100 Møgelmosen, Samsø  
 (DOF m.fl.), 10 Kragemosen, Samsø (DOF m.fl.), mindst 2 Østerby  
 Mose (PH), 1000 Brabrand Sø (HLL, PH, EKS, AT), 1-2 Kysing Sø (BHU),  
 mindst 10 Tømose (Mgt), 100 Søen mellem Lysekøb og Grauballe Mose  
 (Mgt), 100 Grauballe Mose (Mgt), 25 Tomaskov Sø (Mgt), 100  
 Tømose (Mgt), 300 Gammelmoort Sø (Mgt), 150 Frøherredals Hede (ME), 15  
 Græs Sande (JTB), 200 Mørke Rør (JTB), 65 halvøen ved Kalø slots-  
 ruin (HLL), 10 Tømose ved Bjerslevvej (SH), 300 Bjerslevvej Mose (Gejrf),  
 5-10 Kolind Sø (HLL) og 10 Søen i Sankt-Bystrup Søer (CS).  
 Sovoplåde: 1000 i Søen mellem Lysekøb og Shilling Sø (ET).

Bide (Nissa tridactylus)

Sjælden og uregelmæssig værgæst /ult. marts-april og pr. okt-ult. nov).  
 I 1981 flest forårsfund med 9-10 ex. mod efterårets 5 ex.

28/3 4 N + 2 S Fornæs (HC), 29/3 1 N Fornæs (HC, EH), 19/4 1 trk Fornæs

Fyr og 1 trk Gjerrild Fyr (St1) - må være det samme individ-, 24/4 1 ad. Anholt (NT), 3/10 1 N + 1 S Fornæs (HC), 17/10 1 juv. havet øst for Samsø (PN), 14/11 1 ad. Grenå Havn (NT) og 21/11 1 S Fornæs (HC). Inden for de sidste 5 år er arten truffet i nov 1976, okt+nov 1978, april+okt 1979 og mar+maj+sept+nov 1980.

#### Sortterne (Chlidonias niger)

Fåtalig og uregelmæssig trækgæst om foråret (maj-juni og sjælden og uregelmæssig trækgæst om efteråret (ult. juli-pr. aug). En meget stor majforekomst fra Kysing Fjord er usædvanlig og i øvrigt den største forårsobs i lokalrapportens historie. Kysing Fjord er afgjort amtets bedste lokalitet for Sortterne både hvad "regelmæssighed" og hyppighed angår.

8/5 2 Østerby Mose (PH, BHJ), 9/5 13 (JF) og 2 (EH, JDK) Kysing Fjord, 17/5 2 Østerby Mose (PH, BHJ), 23/5 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 26/5 1 ad. Brabrand Sø (RD, EH), 27/7 1 juv. Kysing Fjord (JF), 28/7 3 Kysing Fjord (HLL), 29/7 2 Aarhus Havn (CQP), 1-3+5/8 1 Kysing Fjord (JF). Fra Viborg amt: 21/4 1 Knudstrup (KeH).

Inden for de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 juni+aug, 1977 juni+juli, 1979 maj+aug, 1980 juni+aug.

#### Fjord/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea)

1 Fjællands-iagttagelser og sidste obs af Fjord- eller Havterne.

12/8 2 Fjællands Sø (BHF, FL), 7/9 1 Solbjerg Sø (BHJ, FL), 12/8 3 Fjællands Sø (LH), 6/9 7 V Edslev (BHJ) og sidste 12/9 4 Pletten, Karlaget Fjord (KEE, BEE, JRR).

Se appendix II 1978.

#### Fjællands-iagttagelser (Sterna hirundo)

Sjælden yngletrækfugl og fåtalig træk- og sommergæst (med. maj-ult. aug/med. sept). To ynglefund rapporteret, men det er næppe de eneste, trods det, at vor samlede ynglebestand næppe overstiger 20 par. Flere sommeriagttagelser langt fra de rapporterede ynglepladser. Alle iagttagelser nævnes.



Ynglefugl

1 par i Hov Røn (BA) og 1-2 par i Bjerregrav Mose (Gjrrf).  
 12/5 2 ad. i Brabrand Sø (JTL), 19/5 2  
 ad. i Møllegrund, 21/5 1 i Bjerregrav Mose (HF), 31/5 1 i Møllegrund,  
 Randers Fjords Udløb, 22/6 1 i Langsø (JTL), 28/6 2 i Kysing Fjord  
 (BHF), 3/7 4 ad. i Møllegrund, 7/7 9 i Mose (HHH), 12/7 3 i Aarhus  
 Havn (FF), 13/7 1 ad. i Kysing Fjord (LL), 22/7 6 i Solbjerg  
 Sø (RH), 20/7 1 ad. i Søerne ved Samsø (LB), 20/7 2 ad. i Aarhus  
 Havn (EB), 27/7 1 ad. i Kysing Fjord (HLL), 3/8 2 ad. + 4 i Aarhus  
 Havn (EH), 5/8 1 i Solbjerg Sø (HH), 15/8 1 i Randers Fjords udløb (JRB),  
 22/8 1 i Kysing Fjord (BHF), 22/8 15 i Møllegrund, Randers Fjord  
 (HH), 28/8 1 i Søerne ved Samsø (JRF).

Ynglefugl (Stor) paradisfugl

En af de største og mest spredte forekommende yngletræfugle (med april- og  
 august). Kom to indrapporteret, men fra de kendte  
 kolonier. Enkelte mindre kolonier så kunne  
 findes i nogle af de gamle og gamle egendomme i Sønderjylland, Hjørring og  
 i de gamle søer i Sønderjylland. I alle disse områder er der  
 ynglefugle.

1 par i Søerne (JF), 2 par i Søerne (FC), 20/4 mindst 5-10 par  
 i Søerne (LØ).

1 par i Søerne (JF) og 21/4 1 i Hov Røn (AC).

1 par i Søerne (JF) og 1 par i Søerne (LØ).

1 par i Søerne (JF) og 1 par i Søerne (LØ) 3 ad. 4 i Søerne  
 (JF) og 1 ad. i Søerne.

Indlandsiagttagelser: 13/5 1 i Søerne og 2/7 1 ad. i Søerne (RC, EH) Brabrand  
 Sø, 2/7 1 i Søerne (BR) 13/8 1 i Søerne (Stl)

Ynglefugl (Stor) paradisfugl

I meget fåde iagttagelser, men spredt forekommende yngletræfugl (all. april  
 - med. aug). Kom to yngletræfugle indrapporteret, men på Anholt  
 findes en af landets største kolonier. Iagttagelserne er samlet i  
 grupper omkring sikre og formodede ynglefugleforekomster. Alle iagttagelser  
 nævnes.

Første og sidste iagttagelse: 28/4 1 i Flakket, Anholt (NT) og 19/8 2 ad.  
 Aarhus Havn (EH).

Samsø: I hvert fald en koloni med mindst 5 par på Besser Rev. Disse ses fouragere langs kysten omkring øens nordlige del, således: 28/5 mindst 10 - i koloni med Havterne - Besser Rev (DOF), 30/5 2 Østre Hedekrog (LB, DOF) og 20/6 5 Østre Hedekrog (LB).

Kysing Fjord: iagttagelserne fra fjorden og Kysing næs giver formodning om et ynglepar. Endnu i de seneste år har arten ynglet på næsset og bl.a. fourageret i fjorden med ungerne. Sådanne obs er dog ikke rapporteret i år, det skyldes måske manglende ynglesucces. Iagttagelser: 1 (KHe), 15/5 2 Kysing Næs (BHJ, FL), 5/7 2 (CQP), 9/7 4 (JF), 9/7 1 (KHe), 16/7 2 (JF), 18/7 2 (JF), 21/7 2 (JDK), 22/7 1 (JF), 25/7 3 (GG), 28/7 2 (JF), 29/7 1 ad (HLL), 2/8 2 (JF).

Aarhus Havn: Mindst to par har ynglet på det opfyldte areal i den nye Østhavn, da pullus og juv. er set. Pullus er set meget sent, pr. alt hvilket formentlig skyldes ødelæggelse af rede(r) i forbindelse med anlægsarbejdet først på sæsonen, og det er således unger fra omlagt ægkuld. Et andet par var mere heldig, da flyvedygtige unger så med juli. Det kan vel næppe tænkes, at et par har udruget to kuld?! Iagttagelserne var: 9/5 3 (KHe), 11/5 1 (NA), 28/6 2 (FF), 15/7 4 ad. (KHe), 18/7 1 (CQP), 6/8 2 ad + 2 pull (PNN), 8/8 2 ad + 1 pull (KHe), 9/8 1 ad. + 2 juv. (CQP), 19/8 2 ad. (KHe).

Anholt: Ingen rapportering fra ynglekolonien, men ud fra de indseende oplysninger må det synes, at bestanden på øen er på mindst 10 par. Følgende er set: 28/4 1 Flakket, 22/5 1, 24/5 1, 25/5 ca. 20 (alle 4 arter): 28/5 2 fouragerende Moesgård Strand (NA) og 19/7 2 Fornæs - er nærliggende yngleplads? (JDK).


#### Skuerne (Sterna sandracensis)

Formentlig regelmæssig og fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl - fåtallig træk og sommergæst (ult. marts-med. okt). Ingen rapporterede ynglefund, men mange forårs- og sommeriagttagelser fra Samsø og Sjerrild Nordstrand giver formodning om mindre kolonier. I den sydlige del af amtene Alsø Fjelder og Søby Rev, skifter ynglekolonien mellem disse to øgrupper og Hjarnø og Endelave i Vejle amt. Arten er kendt for sin "uregelmæssige" optræden på langt de fleste danske ynglepladser. Alle iagttagelser nævnes.

Første: 28/3 6 S Fornæs (HC), 29/3 2 trk Fornæs (EH), 5/4 12 Kalsemade (SH), 13/4 3 Fornæs Fyr (Stl)

Sidste: 28/9 2 Vesborg Fyr, Samsø (LB), 11/10 1 S Kysing Næs (HP),





Figur 37. Alkefugle, Aarhus amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser en summering af alle iagttagne alkefugle, såvel ubestemte som bestemte, pr. 5-dages periode. Et + angiver < 10 individer.

#### Alk (Alca torda)

17/4 2 trk Fornæs Fyr (St1), 19/4 1 trk Fornæs Fyr (St1), 21/11 2 Aarhus-Kalundborg overfarten (NP), 21/11 57 N + 4 S (KEH, BRR, JRR) og 38 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC).

I de sidste 5 år foreligger der sikre iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 for- og efterår.

Se appendix II 1980.

#### Spkonge (Alca alle)

18/4 1 trk Fornæs Fyr (St1), 18/7 1 N Fornæs Fyr (RD), 21/11 2 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC), 28/12 1 fouragerede 5 m fra St1 og langstræk (SH).

I de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 forår.

#### Lomvie (Uria lomvia)

18/4 1 Aarhushavn (PH, BHJ), 17/4 2 trk Fornæs Fyr (St1), 19/4 3 trk Fornæs Fyr (St1), 18/10 1 N Kysing Næs (PH, BHJ, FL; HP), 25/10 1 rast Fornæs (CO), 8/11 2 rast Fornæs (CO), 21/11 4 Aarhus-Kalundborg overfarten (NA), 21/11 6 S (KEH, BRR, JRR) og 2 trk mellem kl. 10.30 - 11.00 Fornæs (HC).

Fra de sidste 5 år foreligger der iagttagelser fra 1976 efterår, 1978 efterår, 1979 forår og 1980 forår.

*Agelaius phoeniceus*

Agelaius phoeniceus er et meget sjældent fugl. Formodes også at være fåtallic  
med i de fleste år (almindelig i Danmark og Sverige. Kun et par gange  
er det blevet set i Danmark. Det er således på Vejersø. Muligvis også  
på Sjælland og i Sverige. I Sverige er der mange steder dog måske  
ikke så få forekomster. I Danmark er der dog kun et enkelt fund på  
Vejersø. I Sverige er der dog mange steder hvor der er en mulighed for at  
det kan være mere almindeligt. Selvfølgelig kan det være  
sandsynligt, at der er flere steder i Danmark hvor det kan være  
almindeligt. I efteråret tagtogs mange af  
agelaius var ved vejersøen. I liket af fælles. Et en del af den  
stodder er blevet fundet i området og altså standfugle.

Indsamlingen fra Danmark

28/11 1976 - 1/12 1976 - 1/12 1976 - 1/12 1976 - 1/12 1976. Altså mindst  
10 aktive ynglesæsoner


- 1/11 i S Fyring (HC) 1976, 28/3 i N + i S Fornæs (HC), 19/5
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 21/7 i S Fornæs (HC), 26/7 i N
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)
- 1/11 i S Fornæs (HC) 1976, 1/11 i S Fornæs (HC), 1/11 i S Fornæs (HC)

*Agelaius phoeniceus artica*

Agelaius phoeniceus artica er et meget sjældent fugl. Formodes også at være fåtallic  
med i de fleste år (almindelig i Danmark og Sverige. Kun et par gange  
er det blevet set i Danmark. Det er således på Vejersø. Muligvis også  
på Sjælland og i Sverige. I Sverige er der mange steder dog måske  
ikke så få forekomster. I Danmark er der dog kun et enkelt fund på  
Vejersø. I Sverige er der dog mange steder hvor der er en mulighed for at  
det kan være mere almindeligt. Selvfølgelig kan det være  
sandsynligt, at der er flere steder i Danmark hvor det kan være  
almindeligt. I efteråret tagtogs mange af  
agelaius var ved vejersøen. I liket af fælles. Et en del af den  
stodder er blevet fundet i området og altså standfugle.

Agelaius phoeniceus artica er et meget sjældent fugl. Formodes også at være fåtallic  
med i de fleste år (almindelig i Danmark og Sverige. Kun et par gange  
er det blevet set i Danmark. Det er således på Vejersø. Muligvis også  
på Sjælland og i Sverige. I Sverige er der mange steder dog måske  
ikke så få forekomster. I Danmark er der dog kun et enkelt fund på  
Vejersø. I Sverige er der dog mange steder hvor der er en mulighed for at  
det kan være mere almindeligt. Selvfølgelig kan det være  
sandsynligt, at der er flere steder i Danmark hvor det kan være  
almindeligt. I efteråret tagtogs mange af  
agelaius var ved vejersøen. I liket af fælles. Et en del af den  
stodder er blevet fundet i området og altså standfugle.

Agelaius phoeniceus artica er et meget sjældent fugl. Formodes også at være fåtallic  
med i de fleste år (almindelig i Danmark og Sverige. Kun et par gange  
er det blevet set i Danmark. Det er således på Vejersø. Muligvis også  
på Sjælland og i Sverige. I Sverige er der mange steder dog måske  
ikke så få forekomster. I Danmark er der dog kun et enkelt fund på  
Vejersø. I Sverige er der dog mange steder hvor der er en mulighed for at  
det kan være mere almindeligt. Selvfølgelig kan det være  
sandsynligt, at der er flere steder i Danmark hvor det kan være  
almindeligt. I efteråret tagtogs mange af  
agelaius var ved vejersøen. I liket af fælles. Et en del af den  
stodder er blevet fundet i området og altså standfugle.



Huldue (Columba oenas)

Fåtalig ynglefugl (ult. marts-aug), ret almindelig trækfugl om foråret (pr. marts-april) og fåtalig efterårsgæst (med. aug-okt).

Arten er i yngletiden konstateret på følgende lokaliteter:

Brattingborg, Samsø: 14/4 1, 24/7 1 (LB), Kysing Fjord: 15/4 1, 15/4 1, 1/8 1, 3/8 3, 14/8 3, 16/8 1 (JF, BHJ, FL), Vilhelmsborg: 2-3 par (BHJ, NPO) Moesgård Skov v. hejrekolonien 1 par (SH, BHJ, FL).

Brabrand Sø: 28/3 1 syngende, 2/4 1 par v. redegul (JTL), 14/5 1 (KH). Risskov: 28/7 1 par v. redegul (LPJ), Tølløke Skov: 2 par (JTL),

Tange Sø: 9/5 1 (KEH), ialt 7-11 registrerede ungepar.

Trækfugtagelser:

Moesgård Strand: 9/3-18/4 313 trk (Moes, m.fl), max 18/3 104 N (AJ),

Gjerrild: 15/4 1 P, resten trækkende: 12/4 2, 13/4 5, 14/4 5, 16/4 1

17/4 1, 18/4 3, 8/6 10 (Stl, RD, HP), Fornæs: 29/3 13 (EH), 31/3 1

(HLL), 5/4 1 (B+JRR, KEH), 6/4 2 (HLL), 8/4 2, 9/4 10, 12/4 1 (NT),

14/4 1 (Stl), alle trk. Øvrige: Kysing Fjord: 9/8 1 trk (SH), 21/8

23/8 1 (JF, BHJ, FL), Tåstrup Sø: 7/4 1 (AJ), Sletterhage: 18/10 8 trk

(JTL), Stubbe Sø: 16/4 1 N (Stl), Anholt: 25/4 2, 26/4 10 (NT).

Se Grafen

Se appendix II 1980.

Ringdue (Columba palumbus)

Arten er meget almindelig i amtet, men forekommer i træktiden (ult. marts

med. maj) og okt i store tal på enkelte lokaliteter, som bør nævnes

Brabrand Sø: 31/1 2200 N (ØBF), Moesgård Strand: 31/1-15/5 ialt 313

(Moes, m.fl) max 13/3 1214 N (HLL), og 18/3 1191 N (AJ), Gjerrild og

Fornæs: 13/4-18/4 6194 trk (Stl), Sletterhage, Helgenæs: 18/10 1863

trk (JTL).

Turkedue (Streptopelia turtur)

Den er trækfugl, følgende to obs foreligger:

Bjersregrav Mose: 25/4 1 (Gejrf), Skæring v. Aarhus Planteskole: 1/6 2

NØ (EH).

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Arten er hovedsagelig standfugl, følgende træk obs er derfor lidt



Natugle (Strix aluco)

Ca. 35 par er indrapporteret, men mangler på mange potentielle lokaliteter, især mange skovområder. Arten må antages at være ret almindelig - almindelig ynglestandfugl.

Kysing Fjord: 13/3 2 (NT), Nørreskov: nær Torrild 1 par, Vilhelmsborg: 2 par (BHJ), Mårslet: 1 par (BHJ, FL), Hørret Skov: 2 par (BHJ), Obakke v. Mårslet 20/10 1 (BHJ), Moesgård Strand: 9/4 1 hørt (NA), Dørup: 1 par (ET, PMT), Dørup Mølle: 1 par, Bodil Mølle: 1 par, Pinds Mølle: 1 par (ET), Edslev Knude: 5/9 1 hørt (BHJ), Store Ravnsbjerg i Viby: 1 par (BHJ, FL), Storskoven: 1 par (DOF's kassegruppe), Konstatinskoven: 10/3 1-2 hørt, Sørskoven: 10/3 1 hørt (DOF), Stautrup Skov: 10/3 1 (AJ), Brabrand: ses og høres jævnligt (LaB), Risskov: 1 par (ET, PMT) + 26/3 1 (NA) - nov-dec 1 (LPJ), Norring Mølle: 23/1 1 hørt (DOF), Nørrens: 24/5 3 juv, Hår Skov: 15/5 1 ad. v. rede (SMJ), Alsrode: 1 par (OF), Kolindsund v. Sivestedodde: 9/8 1 trafikdræbt, Tøstrup: 1 par, Vallum Skov: 1 par m. 2 pulli, Ryomgård Slot: 1 par (JJP), Gjerrild: 15+16/4 1 (St1), Grenå Plantage: 4+9/11 1 (CO), Fussingø Skov: 23/1 1 juv. (JRR), Randers: Tøjhushaven 8/2 1, Skovbakken 2/5 1 ad + 6/11 1 (JRR).

Skovhornugle (Asio otus)

Stælden ynglefugl (dog ingen indsendt fra Syddjursland) og fåtallig træk- og vintergast (pr. nov-med. april).

Ynglefund:


Sørre Skov: Odder Kasse: 12/6 1 (BHJ), Mårup Skov, Samsø: 8/3 1 (AJ), 11. 21. 47 (JJP), Norringure: 14/6 2 pulli i gl. kragerede (SMJ), 20/11 1: fund rede forladt af unger (SMJ), Grenå Plantage: 18/5 1 hørt (JRR).

Rest. træk- og vintertagttagelser:

Brabrand Sø: 0/1 2, 6/1 7, 10/1 5, 19/1 min 8, 25/1 8, 27/1 2, 30/1 1, 31/1 7, 1/2 1, 2/2 2, 4/2 6, 5/2 10, 9/2 6, 11/2 3, 14/2 7, 15/2 5, 16/2 7, 18/2 3, 21/2 5, 22/2 5, 26/2 1, 1/3 4, 4/3 3-4, 5/3 3, 10/3 3, 12-16/3 2, 17-19/3 3, 20-22/3 1, --- 1/11 1, 10/11 3, 12/11 2, 15/11 3, 29/11 2, 6/12 3, 8/12 2, 1+10/12 3, 13/12 4, 15/12 9, 20/12 6, 22/12 7, 28/12 8, 30/12 11. (ØBF, PH, EH, KJH, BHJ, PJJ, JØK, FL, PNN, NT, NA og især AJ).

Øvrige: Gjerrild: 18/4 1 trk (St1), Dørup Mølle: 4/11 1 Ø (ET, PMT), Viby v. Søndervangsalle: 1 indiv. iagtt. ved juletid (meddelt PH). Se fig. over Brabrand Sø.





Figur 39 Brachyramphus, Brabrand 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser maksimum pr. periode.

#### Brachyramphus (Arenaria) fuscicauda

1981: 1/12: ynglefugle og æg i trægeær i ynglebælt på lokalitet 1 (sødet m.m.).

Første og sidste iagttagelse: 1/12 1981.

1982: 1/12: 1 iagttagelse i 4 lokaliteter: 1 i Sønderby, 1 i Sønderby, 1 i Sønderby, 1 i Sønderby. Boals Rev: 30.10 i træ (CZS). Lysing Fjord: 1/12 i træ (JJP).

#### Brachyramphus fuscicauda

1982: 1/12: måske ynglebælt i trægeær i Sønderby og Skovsø. Første og sidste iagttagelse: 1/12 i træ - nord i Sønderby (Ejgaard).

#### Brachyramphus fuscicauda

1982: 1/12: 1 iagttagelse i Sønderby, kun en iagttagelse:

1 iagttagelse i Sønderby, kun en iagttagelse: 1 iagttagelse i Sønderby (meddelt JJP).

Er arten forsvundet fra Grenå Plantage?

#### Mursejler (Apus apus)

Første og sidste iagttagelser nævnes. De to første 20/4 i Randers

(EH) og 1/5 1 Viby v. Søndervangen (PH), er usædvanligt tidlige, dette skyldes nok SØ-vindene i april.

De "normale":

8/5 Åbyhøj: 1 (HET), Aarhus: 1 (PN), Brabrand Sø: 21 (HLL, AJ), Tåstrup Sø: 4 (HP), Sortesø: 1 (HP), Lushage, Samsø: 1 (LB). 9/5 Brabrand Sø: 22 (PH, BHJ), Moesgård Strand: 1 N (Moes). 10/5 Brabrand Sø: 2 (JDE), Lundbyesgade i Aarhus: 3 (NÅ). 13/5 Gammel Mose v. Galten: 3 (BH). Den sidste: 3/10 1 SV Dørup (ET, PMT).

Nogle store tal: Brabrand Sø: 2/6 110, 4/6 190 (EH), Fornæs: 18. eller 19/7 200 trk (Meddelt BHJ).


### Isfugl (Alcedo atthis)

Sjælden ynglefugl og fåtallig træk- og vintergæst (nov- marts).

Følgende er indsendt:

Klostermølle: 6/12 1 (ØBF), Brillerne v. Silkeborg: 6/8 1 (Jakob Bønløkke), Salten Langsø: 19/7 1 (PN), 25/10 (HB), Giber Å: pr. marts 2 (meddelt BEJ), Aarhus Å: Dørup Mølle: 21/11 1-2 hørt, 4/12 1 hørt (ET, PMT), Bodis Mølle: 7+8/11 2, 30/11 1-2, 10/12 1 (ET, PMT), Palle Mølle: 14/2 2-3 (ØBF), v. Carl Blochsgade: 16/3 1 (HM), v. Ceres: 25/1 1 (HET), Brabrand Sø: 2/1 1-2 (HLL), 15/3 1 (AJ, JDK), 9/11 (JDE), 12/12 1 (KHe), Fussing Sø: 7/2 1, 26/3 1 (PER), Fussing Vands mølle: 5/9 1 (ØBF).

Se Appendix II 1973, 1978, 1980.



Figur 40. Isfugl, Århus Amt 1981.

Figuren viser summeret månedlig forekomst.

### Isfugl (Alcedo atthis)

Denne pragtfulde fugl optræder helt usædvanligt i amtet, noget overraskende er det derfor, at hele 17 individer blev iagttaget på Annolt i tidsrummet 27/5 (hvor de ankom om aftenen) - 31/5, dette er den største flok, der er registreret i Danmark! Tidspunktet falder sammen med de øvrige iagttagelser af sydøstlige arter i amtet, hvilket som nævnt under disse skyldes vejrforholdene.

Harlequin Duck (Colinus harrisi)

Den eneste registrering er fra 1981, lignende tilfælde ligger vist nok væksten i tiden.

Den har tidligere hele tre registreringer af denne meget sjældne og ustrukturerede trækfugl:

Boesgård Strand: 18/9 1 par (JEP). Alsrode: 18-25/9 1 rast opholdt sig i haven, heri der var en trægerede på hillelærver i køkkenhaven (JEP). Der kan være tale om en anden fugl.

Grønnebjerg (Parus viridis)

Stående yngletand- og par (JEP). Arten er registreret på følgende lokaliteter:

Kors Sø: 12/4 1 hørt. Bævrebjerg Dyrehave: 11-28/4 1 hørt. Vold:

14/1 1 hørt (HMH). Mose N for Stenvad 24/10 1 (SH). i Boes Skov

11/1 1 hørt (HMH). Sønderbo 5/4 og 6/4 1 par (JEP). 1 hørt (JEP)

11/4 1 (SH). Silkeborg 11/4 1 (ME). Skov 11/4 1 (SH). Fjeld

11/4 1 (SH). 26/10-28/10 1 par (JEP). Vilhelms-

11/4 1 (SH). Mose N for Stenvad: 1 par (JEP). Boesgård

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Forstaver

11/4 1 (SH). Storskoven 11/4 1 (SH). Brabrand 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). 9/9 1. 15/9

11/4 1 (SH). Værlby: 17/4 1 (SH). Lysrup Å: 11/11 1 (JEP). Nørrebo:

11/4 1 (SH). Mose N for Stenvad: 1 par (JEP). Fjeld

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Stubbe sø: 4/4 1 hørt.

11/4 1 (SH). Mose N for Stenvad: 1 par (JEP). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).


11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH). Skov 11/4 1 (SH).

Sortspætte (Dryocopus martius)

Arten er sjælden - fåtallig i amtet, men der foreligger ingen sikre ynglefund. Der er 6 obs fra okt-nov, hvilket nok skyldes en mindre invasion.

4/3 1 (?) Gjerrild Skov (JJP), 14/3 1 hørt svagt Velling Skov (JB),  
6/5 1 hørt Gjerrild Nordstrand (RD), 14/10 1 Vrads Sande (HUSM, PH-M),  
14/10 1 Hampen Sø (HUSM), 22/10 1 Fussing Skov (PER), ?/11 1 hun  
Salten Langsø (Lars Hansen), 29/11 1 Fussing Skov (B+JRR, KEH), 27/11  
1 St. Hjøllund Plantage (HUSM)

Se appendix II 1977, 1978, 1980.



Figur 41. Sortspætte, Århus Amt 1981.  
Figuren viser summeret månedlig forekomst.

Vendehals (Jynx torquilla)

landsynligvis fåtallig ynglefugl, dog ingen sikre fund i år. Desuden  
efterårs- og forårs-gæst (red. april-ult. maj) og sjælden efterårs-gæst  
(aug-sept).


Vedår:

Grindstrup, Skanderborg: 14/4 + 9/5 1 (GG). Sepstrup: 13/5 2 (ME). Sande  
1/5 1 (LE). Næsgerd Strand: 5/5 1 rast (JTL), 23/5 1 hørt (JTL, PH-M),  
24/5 1 hørt (BP). Rødschaven, Aarhus: 6/5 1 (NA). Risskov: 24/5 1  
(PH-M). Alsø: 9/5 1 (delt OF). Alsrode: 9/5 1 (OF).

EFuerår:

Vested Kuse: 13/8 1 hørt (AJ).

Se appendix II 1980.



Figur 42. Vendehals, Århus Amt 1981.  
Figuren viser summeret månedlig forekomst.

Topilærke (Sialia sialis)

Vårtil, sanglærke og skovfugl, ca. 30-40 par.

Udvalgte lokaliteter og antal individer: 1-2 par, Søndervangs Alle 3, Høje Taastrup, Skovlyngvej: 1, Høje Taastrup Ringgade: 1, Tilly Vest: 1, Frøbjergsvej: 1, Værk Sønderby, 1, Skejby Industriråd: 1, Vejby Vest: 2, Høje Taastrup 1.

Øvrige lokaliteter: Høje Taastrup, Højskole, Hørning: 1, Tranbjerg: 1, Galten: 1, Skovlyng: 1, Sønderby, Tofindbro: 1, Randers Rutebilstation 1-2. (L&B, H&K, FF, ER, PH, BR, JDK, JTL, CC, JGF, JRR, ET, NT, PM, NA).

Se appendix II 1978.

Hedelærke (Sylvia arvensis)

Hjælpede ynglefugl, fåtalling, kvinderegnest (med. næsts-pr. maj) og nialde kvæget om efteråret. (1978), oversat

fra yngleperioden foretaget

25/1 1 par Sønderby 21/1 1 syngende (LB), 26/1 1 i syngende (NE), 30/1 1 i syngende (WR), 31/1 1 par (OF), Hedelærke, Høje Taastrup: 1/1 1 par (OF), 2/1 1 i strand: 13/1 1 syngende (OF).

2/1 1 i strand.

25/1 1 i strand Sønderby 2/1 1 i strand (ENP), 26/1 1 i strand: 2/5 1 i strand

25/1 1 i strand Sønderby 6/1 1 i strand, Østerby Sønderby 13/4 1 i strand (BR), 26/1 1 i strand Sønderby 25/1 1 i strand Sønderby 13/4 1 i strand (BR), 26/1 1 i strand Sønderby 25/1 1 i strand Sønderby 13/4 1 i strand (BR), 26/1 1 i strand Sønderby 25/1 1 i strand Sønderby 13/4 1 i strand (BR).

Østerby Sønderby

Østerby Sønderby 2/1 1 i strand Sønderby 13/4 1 i strand Sønderby 13/4 1 i strand (BR).

Sanglærke (Sialia arvensis)

Vinter obs + de første trækiagttagelser (1/1-10/2) + (dec) nævnes, desuden obs over 500 individer.

25/1 5 N Søften (SMJ), 25/1 hørt Brabrand Sø (AJ), 26/1 2 Kysing Fjord (CQP), 26/1 4 Kysing Fjord (HLL) - samme som CQP?, 31/1 2 N Moesgård Strand (SS), 2/2 9 hørt Brabrand Sø (AJ), 4/2 1 syngende + 2 Vilhelmsborg (BHJ), 8/2 11 N Kysing Næs (PH, BHJ, FL), 8/2 2 N Silkeborg (ME),

9/2 6 N Moesgård Strand (NA), 9/2 2 syngende Kolindbro (JJP), 8/12  
1 Aarhus Havn (HLL).

Fornæs: 29/3 900 trk (HC). Moesgård Strand: 8/3 1957 trk (Moes), 9/3  
550 N (NA), ialt 31/1-9/5 6332 trk (Moes).

#### Bjerglærke (*Eremophila alpestris*)

Sjalden træk- og vintergæst, to iagttagelser foreligger:

Moesgård Strand: 14/3 9 rast (CQP), Fornæs: 28/12 1 (SH).

#### Landsvale (*Hirundo rustica*)

Første iagttagelser fra april:

10/4 1 Tapdrup Enge (HeP), 11/4 1 Brabrand Sø (AJ), 11/4 1 syd for  
Viborg (KeH), 12/4 1 trk Gjerrild (St1), 15/4 1 Hesselholm (LB), 16/4  
S Kysing Fjord (JF), 16/4 1 Kasted Mose (SH), 22/4 1 Brabrand Sø (HE),  
23/4 1 Brabrand (LaB), 25/4 1 Ramten-Dystrup Sø (DOF), 26/4 1 Brabrand  
(LaB), 27/4 1 Hinnerup (PN), 27/4 1 Dørup (ET, PMT), 28/4 3 Brabrand  
Sø (LaB, AJ), 29/4 6 Brabrand Sø (AJ).

Sidste iagttagelser fra efter 10/10:

11/10 7 S Kysing Næs (HP), 11/10 28 SV Kysing Fjord (HP), 13/10 12  
Dørup (ET, PMT), 14/10 2 Østerby Mose (BHJ), 22/10 1 S + 2 rast  
Skatterhage Fyr (JTE).

Moesgård Strand: 4/5-29/5 557 trk (Moes).

4. appendix II 1978.

#### Opvalse (*Delichon urbica*)

Opvalse er nævnt 1/1-10/5 og oktober nævnes:

1. Opvalse Strand: 6/5-29/5 134 N, max: 9/5 106 N (Moes).

2. Opvalse Brabrand Sø (AJ). 8/5 Lisbjerg Bro: 1 (PN), Brabrand Sø: 1  
(HE), AJ, Østerby Mose: 2 (PH, BHJ). 9/5 Norsminde: 1 (EH), Brabrand  
Sø: 7 (PH, BHJ), Hesselholm: 1 (LB). 10/5 Brabrand Sø: 2 (PNN),  
Botanisk Have, Aarhus: 1 (NA). 3/10 Dørup: 2 (ET). 11/10 Kysing  
Fjord: 3-4 (DOF) + Kysing Næs: 4 SV (HP).

#### Digesvale (*Riparia riparia*)

19/4 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU),  
19/4 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU), 6/5 1000 Samsø (LB).

19/4 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU), 26/5 (Moes).

19/4 1000

19/4 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU). Fremover bør alle ynglefund ind-  
sendes.

### Svale sp (Hirundinidae sp)

Gjernild Nordstrand: 10/5 omkring 1500 (RD).

### Pir. (Hirundinidae sp)

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).  
10/5 1000

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).  
10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

### Nest (Hirundinidae sp)

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).


10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).  
10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).  
10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).  
10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).

10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU) og 10/5 1000 (L. Langballe Grusgrav (BHU).



Figur 43. Raven, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sortkrage (Corvus corone corone)

Meget sjælden yngletrækfugl, meget sjælden vintergæst (med. nov-feb) og fåtallig trækgæst (ult. marts-maj og sept-okt). Alle sommer og vinterobs nævnes:


Sommer: Ynglepar Vilhelmsborg (BHJ) og 5/7 1 Sondrup (HLL).

Vinter: 8/2 1 Kysing Fjord (BHJ, FL, PH), 26/11 1 Dørup (ET, PMT) og 29/12 2 Åbyhøj (HET).

Forår: Moesgård Strand har flest trækgæster med ialt 17 trk og 1 rast i perioden 18/3 - 15/5. Trækkets forløb kan aflæses af figur

Efterår: Maximum var 12/9 4 Kysing Fjord (PH, BHJ).

Se appendix II 1980.



Figur 44. Sortkrage, Århus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

Sortkrage (Corvus corone cornix)

Ynglestandfugl og almindelig trækgæst. Kun få oplysninger. En vinterflock og trækoptællinger fra Moesgård og Gjerrild.

Vinter: 11/2 300 Kysing Fjord (SH).

Forår: 31/1-18/5 ialt 3316 trk Moesgård (NA, Moes), flest 18/3 1850 (AJ, HLL) og 13/4 - 18/4 ialt 430 trk Gjerrild, flest 15/4 128 (Sti).

Sortkrage (Corvus frugilegus)

Rat almindelig (-almindelig?) ynglestrejfugl og almindelig trækgæst. Nogle optællinger af kolonier og forårstrækket.

Ynglefund:

75 par Kolindsund (JJP), 80 par Tingskoven ved Tranbjerg (BHJ), 184 par Grønlukkeskov ved Tranbjerg (BHJ), 9 par Tre Broer, Brabrand Sø (AJ), og 126 par Stautrup Skov (AJ).

Forår: 17/2-5/5 306 trk Moesgård (NA, Moes), flest 18/3 189 N (AJ, HLL). 31/3 172 trk Fornæs (HLL) og 13-18/4 32 trk Gjerrild/fornæs (Sti).



Allike (Larus argentatus)

Yngl. i 1978 og 1979. I 1978 set ved Mølleparken. Få oplysninger. En vinterflok af 16. 1979 i Rydgård (Stl).  
1978 set 11/1 200 (Yngl. i 1978, SH).  
1979 set 12/2 100 (Yngl. i 1979, SH).  
1978 set 18/3 100 (NA, AB, Moes), flest 18/3 100 (NA, AB, HET).  
1979 set 14/4 128 (Stl) og 18/5 100 (Stl).

Hørdedue (Columba palumbus)

1978 set 11/1 200 (Yngl. i 1978, SH).  
1979 set 12/2 100 (Yngl. i 1979, SH).  
1978 set 18/3 100 (NA, AB, Moes), flest 18/3 100 (NA, AB, HET).  
1979 set 14/4 128 (Stl) og 18/5 100 (Stl).  
De nævnte år 1978, 1979.

Grønvald (Corvus glandarius)

Yngl. i 1978 og 1979. I 1978 set ved Mølleparken. Få oplysninger. En vinterflok af 16. 1979 i Rydgård (Stl).  
1978 set 11/1 200 (Yngl. i 1978, SH).  
1979 set 12/2 100 (Yngl. i 1979, SH).  
1978 set 18/3 100 (NA, AB, Moes), flest 18/3 100 (NA, AB, HET).  
1979 set 14/4 128 (Stl) og 18/5 100 (Stl).

Skarpsid (Aspithalos caudatus)


Yngl. i 1978 og 1979. I 1978 set ved Mølleparken. Få oplysninger. En vinterflok af 16. 1979 i Rydgård (Stl).  
1978 set 11/1 200 (Yngl. i 1978, SH).  
1979 set 12/2 100 (Yngl. i 1979, SH).  
1978 set 18/3 100 (NA, AB, Moes), flest 18/3 100 (NA, AB, HET).  
1979 set 14/4 128 (Stl) og 18/5 100 (Stl).  
1) Hørdeduen er meget udbredt i lige øst for yngleparerne (her er beskrevet den danske rede). 2) Den nævnte strejfer arten om i større flokke, set i 1978 og 1979. 3) I næste-maj måned er der set en flokke af 100 skarpsider - desuden er der set en flokke af 100 skarpsider, når der ikke er løv på træerne. Begge Hørdeduenes racer yngler i Aarhus amt, men noget klart udbredelses mønster kan ikke ses ud fra de kun 17 obs, hvor raceforholdet er om- talt. Rene nordlige ynglepar (A. c. caudatus) er set ved Rydgård, Stubbe Sø, Aarhus Stadion og Moesgård Strand (NA, JJP, Moes, Stl) Rene sydlige ynglepar (A. c. europaeus) er set ved Kollens Mølle og Rømer- haven i Aarhus (NA, HET), mens blandingspar og bastardfugle er set ved

Vallum Skov, Forstbotanisk Have i Aarhus, Moesgård Strand og Brattingsborg på Samsø (NA, LB, JJP).

Følgende flokke med mindst 20 fugle er set: 9/2 20 + 15/2 20 + 27/3 ca. 25 Moesgård Strand (NA, H+JE, NT), 26/11 21 Pinds Mølle (ET, PMT), 26/12 26 Gudensø (HHH) og 27/12 22 Brabrand Sø (H+JE).

Premover bedes alle se efter og indsende racen på de iagttagne Halemejsler.

Se appendix II 1978.



Figur 45. Halemejsle, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimalt rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

#### Spøtmejsle (*Habia pendulirostris*)

Se appendix II 1978.

#### Spøtmejsle (*Sitta europaea*)

Englestandfugl. Ifølge JJP yngler den hvidbugede race (*S. e. caesia*) ved Ryomgård Slot. Vi troede ellers kun, vi havde den rødbugede race (*S. e. europaea*) her i Jylland. Vi opfordrer alle til at race-bestemme de Spøtmejsler, de ser - især potentielle ynglefugle.

Korlede (Lopholaima) (Lopholaima branchyactyla)

En af de mest almindelige og (som) altså en trælgøber sp. Vi opfordrer til at være opmærksomme på denne art, der er i spredning (eller over-  
 spredning) i Horsens Kommune og ved Snaptun, men ender ikke i træer. Der bør bemærkes, at iagttagelser nord  
 for Horsens (f.eks. i Skovene) er sjældne og uvelkomne.

Vandstær (Cinclus cinclus)

Fåtalig (ret almindelig?) og vintergæst (med. okt-pr. april).  
 Tidligste fund i Horsens Kommune (Moesgård) og i første halvdel af året.

Årsgennemsnitligt antal fund:

1/11 i Horsens Kommune (Moesgård) 5 Lysstrup 3 (JB), 14/11 6 Aarhus 1  
 1/11 i Horsens Kommune (Moesgård) 6 Klostermølle, Møssø (DOF) og  
 2/11 i Horsens Kommune (Moesgård)

1/11 i Horsens Kommune (Moesgård)



Figur 46. Vandstær, Aarhus (Januar - 31/12 1981).

Kurven viser det samlede antal og maksimalt antal pr. måned i Aarhus Kommune (5-dagsperiode).

Vistelduggel (Turdus viscivorus)

Fåtalig (ret almindelig) og vintergæst (ret almindelig) og ret almindelig (ret almindelig) i maj og ult. sept-pr. novl.

Vistelduggel.

1 Vistelduggel (Turdus viscivorus) fundet i Horsens Kommune (Moesgård) og i første halvdel af året (par med 3 unger), Gudvang og Søften Langsø (Moesgård), største antal 6/9 11) (NA, BE, OF, SNE, AJ, FN, CO, DOF).

Vinter: 21/2 i Søften Langsø (JB) - kan være tidlig trækgæst - og 5/12 i Fuglsø Bæk Enge (JRR).


Forår: Kurven er som sædvanlig stærkt præget af tallene fra Moesgård og Norddjursland. Ved Moesgård er i perioden 9/3-5/5 set 113 trk

og 11 rast (Moes, m.fl), flest 18/3 26 N (AJ, HLL) og 10/3 23 N (NA, AJ, HLL). Ved Gjerrild-Fornæs er på 11 dage i perioden 25/3-15/4 set 15 trk og 9 rast (EH, HLL, HP, JRR, St1), flest 29/3 3 trk og 6 rast (EH).

Efterår: Arten er tilsyneladende her i amtet fåtallig på efterårstrækket. Alle obs nævnes: 29/9 1 Hesselholm (LB), 4/10 21 Salten Langsø (DOF), 24/10 1 Fuglebakkevej, Aarhus V (NA) og 6/11 2 Den kommunale Højskole, Grenå (meddelt OF).

Vi har nu et vist kendskab til forårstrækket, mens materialet fra de øvrige årstider er meget lille. Vi efterlyser alle obs (det var måske en ide at genopfriske kendetegnene?)

Se appendix II 1980.



Figur 47. Misteldrossel, Århus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser den særlige træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

#### Sjægger (Surdus pilaris)

Meget støjende yngletrækkfugl og almindelig trækfugl. Uregelmæssig, få- og almindelig almindelig vintergæst.

Ynglefund:

14-16/7 1 juv Fuglebakkevej 62, Aarhus V (NA). Måske overset, da arten ikke gør meget væsen af sig i yngletiden.

Vinter:

4/11 30-40 og 31/1 30 Brabrand Sø (ET, PMT) samt 17/1 15 Moesgård Strand (BHI). Ingen dec-obs trods de mange fugle i efteråret. Antallet af vintergæster er afhængigt af snemængden.

Fazan

Se i perioden 12-18/4. 1968 trak observeret ved Moesgård. Ved gjernekæderne trak i perioden 12-18/4 178 ex., flest 13/4 66 (Stl). Antal over 20 i øvrigt: 18/4 15 Tranemoen, Samsø og 13/4 29 Ramten-Dystrup (Stl). Sidste 9/5 i Hasselholm (LB).

Efterår:

Første 12/9 10 Skotte (Langsø (SB)), herefter få indtal med. okt. da store flokke var over og nedslid. nov sås endnu småflokke, men i dec var det kun få indiv. over 100 ex.: 18/10 600 Bjerregrav Moss (SB), 17/10 500 BSV Dørup (ET), 27/10 200 Pinds Mølleedal (ET), 7/11 200 Søskeløslund (SM), 10/11 300 Dørup (ET), 11/11 350 Brabrand Sø (NA) og 13/11 200 Pinds Mølleedal (ET). De sidste 30/11 50 J. Søskeløslund, Aarhus S (NA).

Sangerrossel (Turdus philomelos)

Første 21/3 i nat. forude af efterår i Brabrand Sø (AU). Sidste 17/4 i Søskeløslund (NA). 35 Gjerrild Skov og 17/4 50 Gjerrild (begge Stl).

Vindrossel (Turdus iliacus)

Opstår vintergæst og almindelig strækgæst især om efteråret.

Første 4/3 3-3 Brabrand Sø (ET, PMT) og 18/11 1 Søskeløslund, Aarhus (AU). Sidste 17/4 1 Søskeløslund (NA), 17/4 1 Søskeløslund (ET, PMT) og 15/4 50-80 Søskeløslund Skov (NA). Sidste 17/4 Søskeløslund, Aarhus (NA). Efterår.

Første 29/9 3 Hasselholm (LB). Herefter store flokke igennem oktober. Efter 10/11 kun få tilbage og kun små angreb. Indtællinger over 50 ex. nævnes: 6/10 200 Dørup (ET), 13/10 75 og med. kult. okt 50-100 Botanisk Have, Aarhus (NA), 10/10 1 Søskeløslund (GG), 13/10 1500 BSV + 20/10 700 BSV + 10/10 100 + 17/10 100 + 27/10 200 + 2/11 50 + 4/11 100 Pinds Mølleedal (ET). Sidste 21/11 i Dørup (ET).

Ringdrossel (Turdus torquatus)


Fåtalig forårstrækgæst og meget sjælden - sjælden efterårstrækgæst. Alle obs nævnes.

Forår:

(22 ex), 9/4 1 hun + 10/4 1 han Fornæs (NT), 11/4 1 Hesselholm (LB), 12/4 1 han Brabrand Sø (AJ), 13/4 1 Permelille, Samsø (Svend Dybkjær via LB), 13/4 1 + 15/4 2 + 18/4 1 Gjerrild Strand (St1), 17/4 1 hun + 18/4 1 Gjerrild (HP, St1), 21/4 2 Alsrode (OF), 25/4 1 han Løvenholm Skov (DOF), 27/4 3 Anholt (NT), 3/5 1 Alsrode (OF), 3/5 2 (ad. han + ) Botanisk Have, Aarhus (NÅ), 7/5 1 han syngende Rød Sø (Vib) (HeP) og 10/5 1 han Dejret Øhoved (KHe).

Efterår: eneste 11/10 1 Alsrode (OF).

Se appendix II 1980.



Figur 48. Ringdrossel, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

#### Stenslakker (Oenanthe oenanthe)

Formentlig fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl og ret almindelig trækfugl. Meget uensartet indrapporteret, især mangler rastobservationer f.eks. fra Anholt.

Englefund:

Eneste rapporteret er Aarhus Østhavn 1 par (NÅ).

Forår:

Eneste 12/4 1 Gjerrild (St1) og 1 Hesselholm (LB); herefter forblev den uil med. max 10/5 10 Hesselholm (LB).

Efterår:

Alle obs nævnes. 22/8 1 Kysing Fjord (SH), 18/9 1 + 19/9 1 + 25/9 1 Hesselholm (LB) og 14/10 1 Kysing Fjord (EH).

Se appendix II 1972.


#### Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata)

Meget sjælden, men muligvis regelmæssig trækfugl. Truffet i amtet i oktober 1974, marts 1975, oktober 1977, oktober 1978 og marts 1979.

Årets obs: 23/3 1 juv. vandværket i Risskov (NT). Det kan stærkt anbefales at lære denne arts kendetegn.



1-2 Hesselholm, Samsø (LB), 26/4 1 syngende Stautrup (HM), 21/7 1 juv. indtræk-rast Fornæs Fyr (RD), 31/7 1 hun/juv. Grenå (RD), 15-16/10 1 juv. Alsrode (OF) og ult. okt. 1 han + 3 hun/juv. Aarhus Havn (CQP).



Figur 49. Husrødstjert, Aarhus Amt 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede træk og maksimal rastforekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.

### Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*)

Se appendix II 1973 og 1976

### Nattergal (*Luscinia luscinia*)

Ret almindelig yngletrækfugl og formentlig trækfugl.

Arten er truffet i maj-juni på følgende potentielle ynglelokaliteter. antallet af syngende hunner i parentes:

Kysing Fjord (2) (JF, FH, BHJ), Vilhelmsborg (4) (BHJ), Dørup Nølle (1) (RT, PMT), Brabrand Sø (12) (NA, KJH, EH, AJ, HLL, HM), Tåstrup Sø (1) (EH), Kasted Mose (20) (SH, EH, ØBF), Kysmose v. Mundelstrup (2) (NA, JF), Tønder Gammelose (2) (BH), Lading Sø (3) (EH), Damsbro Mose v. Sønder (1) (JW), Engerose v. Sønder (4) (EH), Vallum Sø v. Ryomgård (1) (JF), Sønder (1) (JF), Skarpe Sø (1) (JJP), Hadrup Skov (1) (DLJ), Høngård v. Randers (3) (YKR), Ejerregrav Mose (56) (AJ, JRR, Gejrf) og Pussing (1) (PER).

1. Strand Fugle kor 6/5 1 syngende Ankersgade, Aarhus (AJ), 1 syngende Ejerregrav Mose (AJ) og 1 syngende Tre Broer, Brabrand Sø (NA).

De sidste indrapporterede er 16/6 10 syngende Kasted Mose (EH).

### Cettisanger (*Cettia cetti*)

Se appendix I.

### Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Det er interessante på den grund af den høje forekomst i Aarhus Amt.



Talbyggesang: 2/12/1980 7 syngende i 1980.

Dansker: 8/10 1 syngende (PN), 7/7 4 syngende + 9/7 5 syngende (SND), 15/7 1 syngende (SND).

Sjundeang: 22/12 2 syngende (HP), 7/6 2 syngende (HP), 18/6 2 syngende (SND).

Øvrige: 2/7/5 2 syngende Konge Sø Randers (JRR), 23/5 1 syngende Sorte Sø Skanderborg (BBH), 23/5 1 syngende Strand Sø (HLL).

Se appendix II 1988.

#### Flodsanger (Coccyzus fluvialis)

Se appendix II.

#### Savisanger (Coccyzus leucopteryx)

1/12/1980 1 syngende i Sø Skanderborg Tapdrup Sø (SND), 1/12/1980 1 syngende i Strand Sø (BBH) + (BBH d. 24/6).

#### Svartbjergsanger (Acrocephalus melanopeus)

Se appendix II 1978 og 1979.

#### Største partibjergsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Største partibjergsanger er først set i Danmark af Nose i 1971. Den optalling foretaget af ØRF nummer 15 betragter de syv første Danmark. Den optalling i Solindsund på Sjursland (JJP) viser 5-8 ynglerepar. Øvrige optallinger viser 5 eller færre syngende fugle.

De første blev registreret 18/10 i hørt Brabrand Sø (JDK) og Lading Sø (SH). 15/13 1 syngende Ryslinge Fjord (BRJ, FL, JF), 17/5 1 syngende Endersdal, Brabrand Sø (SH).

Den første set af indvandreren er meget sen: 17/10 i Kysing Fjord (HP). Den anser sig selv som indvandrers fra Norge, hvor den ses indtil 14. av (Haftorn 1971).

#### Kærsanger (Acrocephalus palustris)

Minder i antal og ankomsttider om ovenstående art. Ligeledes største

yngeleokalitet: Bjerregrav Mose med 50 par.

De første hørtes: 10/5 10 Brabrand Sø (HLL), 10/5 1 Lading Sø (SH),  
12/5 2 syngende Astrup Mose (BHJ, FL, PH), 19/5 2 syngende Moesgård  
Strand (Moes). På Samsø (Hesselholm) blev den første registreret  
30/5 (LB).

#### Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)

Se appendix I.

#### Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Bjerregrav Mose og Kolindsund er indrapporteret med de største tal for  
optælling i yngletid. 15 territoriehævdende hanner Bjerregrav Mose  
(Gejrf), 5 par Kolindsund (JPP).

Et forholdsvis stort antal, lokalitetens størrelse taget i betragtning  
er: 22/5 10 syngende Kogslund, Randers. Tidspunktet er lige omkring  
artens "form-kulmination" - så der er sikkert tale om rastende hanner.  
Den første hørtes 6/5.

Brabrand Sø: 6/5 1 syngende (AJ, HM), 9/5 3 syngende (BHJ, PH), 14/5  
21/5 2 syngende (EH), 2/6 1 syngende (EH).

Hæstrup Sø: 8/5 1 syngende (HF).

Yderligere iagttagelser fra flg. lokaliteter: Tornsbjerg-Hadrup Skov  
(JPP), Moesgård Strand (Moes), Lading Sø (BH), Smørmosen v. Auning  
(EH), Grund Fjord (EH), Kare Holm, Randers Fjord (EH).

Indberetninger på grund af indrapportering at notere om du mener, at du  
har fundet dem på de lokaliteter, du besøger.

Se appendix II 1983.

#### Sivensanger (Sylvia icterina)

Alle bidragsydere til denne art har de første i tidsrummet 15-29/5  
De "fælleførste": 15/5 1 syngende Moesgård Strand (Moes), 15/5 1  
Søfåen (SMF), 17/5 2 syngende Grundfør Vdm (PN).

#### Munk (Sylvia atricapilla)

En art, der i de seneste år har vist fremgang.

De første: 11/4 1 syngende Høskoven (BHJ, PH, FL), 23/4 1 han Brabrand

Sø (S)

Vindmålingstasjonen 21+23 1/2 i hun M. Drachmannsvej, Aarhus (H+JE),  
28-31/3 i Mosegårdstrand i Brabrand (ETN)

Hørsanger (Sylvia borin)

Ligesom ovenstående i fremgang:

De første: 5/5 i Kasted Mose (AJ), 10/5 i Brabrand Sø (JDK, AJ), 11/5  
i syngende Mosegård Strand (Moes) og i Brabrand Sø (HLL).

Tornsanger (Sylvia communis)

De første iagttager ved Brabrand Sø 5/5 1 (AJ), 6/5 1 (HLL), 8/5 2 (AJ).  
På Gammel Hesselholm og på Mosegård 5/5 (LB).  
Kun en iagttagelse: 17/5 i syngende Fjord (HF).

Kvadesanger (Sylvia curruca)

De første: 28/4 i Brabrand Sø (HLL), 28/4 i syngende Reginehøj, Aarhus  
(PNN), 28/4 i Mosegård Strand (Moes + BHJ), 29/4 i syngende Mårslet  
(BHJ), 29/4 i syngende i Aarhus (AJ).

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

De første: 11/4 i Lading Sø (SH), 14/4 i syngende Bryrup Langsø (JB),  
15/4 i Brabrand Sø (AJ), 15/4 i syngende Tåstrup Sø (PNN), 15/4 i rast  
Fornæs Fyr (SH), 16/4 i syngende Mosegård Strand (Moes).  
De sidste: 20/9 i Brabrand Sø (AJ), 29/9 Hesselholm, Mamsø (LB).

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides)

Se appendix 1.

Gransanger (Phylloscopus collybita)

De første: 24/3 i syngende Brabrand Sø (AJ), 25/3 hørt Kysing Fjord  
(NT), 29/3 i syngende Vilhelmsborg (BHJ), 30/3 2 Brabrand Sø (LaB, EH,  
AJ), 30/3 hørt Kasted Mose (NT).

De sidste iagttagelser: 15/10 i syngende Brabrand Sø (PNN).

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

De første: 6/5 1 syngende Skovbakken, Randers (JRR), 9/5 1 syngende Moesgård (Moes, EH), 12/5 1 hørt Norring Vesterskov (JDK).

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

Fåtalig yngletrækfugl, som ankommer i maj, samt trækgæst.

Kun 6 oplysninger indrapporteret.

Første obs: 15/5 1-2 Brabrand Sø (AJ), 14/5 1 samme sted (EH) og 15/5 1 par Søften (SMJ). Desuden 14/6 1 hørt Brabrand Sø (EH), 15/6 1 Hesselholm Seminarium (NA), 4/8 Hesselholm, Samsø (LB).

Bloget Fluesnapper (Muscicapa hypoleuca)

Sjælden til fåtalig yngletrækfugl (primo maj-aug) og trækgæst (maj og aug/sept).

6/5 1 han Rømerhaven (NA), 1 Brabrand Sø (HLL), 8/5 1 par Hesselholm Samsø (LB), 9/5 1 par Brabrand Sø (BHJ, PH), 1 han Bjerregrav Mose (JRR), 1 Hinnerup (SMJ), 10/5 1 hun Hesselholm (LB). Desuden en trækiagttagelse fra Samsø: 29/9 1 Hesselholm (LB).

Almindelig Fluesnapper (Muscicapa albicollis)

Se appendix II 1977.

Træsbuvug (Prunella modularis)

Almindelig yngletræk- og standfugl samt trækgæst i amtet. Alle indrapporterede er trækiagttagelser.

10/3 1 syngende Moesgård Strand (NA), 11/4, 12/4 og 15/4 er enkelte obs v. Hesselholm Samsø (LB). Endelig er gjort 18 obs ved Fornæs og Gjerrild i Påsken (13-18/4) med max 31 17/4 v. Gjerrild Strand (Stl).

Engpiber (Anthus pratensis)

Almindelig yngletrækfugl, som findes på amtets endnu uopdyrkede eng-, moser- og græsarealer. Ses almindeligt på træk (marts/maj og okt). De

(endelig) i den sidste halvdel af vinteren tyder på, at den også kommer tilbage til landet som ynglefugl (se Sørvadse 1/31). Kun max 1 indberetning og efterretninger samt alle vinterlagttagelser.

Mar. 1961 og:

Opd. 14 6 575 v. Gjesrild NB; efterår 3/10 210 v. Fornæs (HC).

Alle vinterlagttagelser

4/1 1 Skovgaard SE (SE), 11/1 1 Brabrand SE (HLL), 11/1 1 Vysø; Njerd 11/1 1 Gjesrild (HLL), 13/1 1 Astrup Mose (AJ), 20/1 3 Aarhus Ege (NÅ), 5/2 1 på udsen v. Rysing Næs (HLL), 1/11 1 Vang S. (OCF), 17/11 1 Klostermølle (HHL), 1/12 5-6, 4/12 4, 6+8/12 10, 9/12 10, 29/12 15, 13/12 11 alle Skovgaard SØ (AJ), 10/12 2 Skanderborg SE (HHL), 22/12 6 Fornæs (SE).

Se appendix II 14-75

#### Markpiber (Anthus campestris)

Sjældent trækfugl (april maj), meget sjælden sommergast/ynglefugl.

1 indberetning indrapporteret (1 af øvrigt Gejrfuglen 2/79).

14/4 1 Bakken Gjesrild og 16/4 1 Fornæs Fyr (Stl), 13/5 og 16/5 1 @ Gjesrild Fyr (SE); 8/5 1 @ Gjesrild Nordstrand (SD).

#### Skovpiber (Anthus trivialis)

Formentlig ret almindelig yngletrækfugl og almindelig trækfugl (april maj). Kun 10 forårsfugle (1 er indrapporteret, hvoraf 10 er foretaget i Påsken (Stl)).

Trækfugttagelser:

Tidligste 9/4 og 12/4 1 N Moesgård (NÅ), hvor også max 122 N (Moes) er talt den 6/5. Desuden 10 fagttagelser fra Fornæs/Gjesrild i Påsken (13-18/4) af 1-4 fugle (Stl).

Øvrige indrapporteringer:

11/4 1 Væk v. Ørting (SE), 12/4 1 Tornsbjerg-Hadstrup Skov (DLJ), 15/5 1 sporerede Vilhelmsensvej 100 1 22/5 1 ved skovfogedboligen "Frederiksbåb" Samsø (LB).

#### Skarpiber (Anthus spinoletta littoralis)

Meget sjælden ynglefugl (stand/strejff/trækfugl?) i amtet, som ses fåtalligt på træk (marts/april og sept/nov). Træffes ligeledes fåtalligt

overvintrende ved kysterne og meget sjældent på indlandslokaliteter.

Ynglefugle:

1 par Hov Røn (FC).

Vinteriagttagelser:

5/1 1 Aarhus Havn (HLL), 11/1 3 og 26/1 2 Kalø Slotsruin (HA), 26/1 1 Kysing Næs (HLL), 6/2 2 Egå Marina (NA), 9/2 1 Kysing Næs (HLL), 22/2 2 (JDK) og 1 (EH) ved Fornæs, 24/2 3 Aarhus Havn (NA), 27/2 1 Kysing Næs, 8/12, 11/12 og 18/12 1 Aarhus Havn (HLL), 20/12 3 syd for Grenå (CO), 20/12 og 27/12 1 Døde A, Brabrand Sø (H+JE).

Øvrige obs:

2/3 2 Aarhus Havn (HLL), 6/3 8 Kysing Næs (HLL), 29/3 19 på træk Fornæs (EH), i Påsken (13-18/4) 5 obs af 1-7 fugle Fornæs Fyr (St1), 18/4 2 Bakken Gjerrild (St1), 15/9 3 Overgård v. Mariager Fjord (KjH), 3/10 1, 8/11 4 og 22/11 5 alle Fornæs (CO), 14/10 1 syd for Grenå (CO), 23/10 3 Kalø Slotsruin (HA).

#### Alvid Vipstjert (Motacilla alba)

Formodentlig almindelig yngletrækfugl og trækfugl (marts-sept) i hele amtet.

Første: 12/3 1 Kysing Fjord (JF), 19/3 1 Brabrand (KjH), 23/3 1 Søby (SMJ), 26/3 1 Hinnerup (PN), 28/3 1 Fussing Sø (PER).

Sidste: 30/9 Hesselholm Samsø (LB), 4/10 1 Alrø (PN), 6/10 1 Brabrand Sø (AJ).

Max trækobs: 14/4 23 Fornæs N (St1).

Besuden foreligger to oplysninger om fugle på overnatningsplads: 15/4 1 på Rønbæksgården Hinnerup (SMJ), 8/5 35 Tåstrup Sø (HP).

#### Sjærgvipstjert (Motacilla cinerea)

Sjælden (-fåtalig?) yngletræk-(stand?)fugl (marts/april-okt?), som især forekommer ved vandløb i den sydlige og vestlige del af amtet. Der få oplysninger om yngel i år, men det kan ikke betragtes som reelt (se f.eks. Lokalrapporten 1980). Træffes sjældent (?) overvintrende.

Ynglefund:

Lilleåen v. Hinnerup (PN), Glenstrup Sø (JRR).

Vinteriagttagelser: 4/1 og 10/1 1 Noring Enge (JDK), 22/2 2 Pinds Mølle (ØBF), 2/12 3 Pinds Mølle (ET).

Øvrige: 14/3 1 Kollens Mølle (ET, PMT), 17/3 3 Brabrand Sø (JR), 23/3

y Vedde Mølle (PH), 1 par Tarskov Mølle (AJ), 1/3 1 hun Ciber Å  
 (NT), 2/3 1 par Ciber Å v. Vindelushovg (BHJ, PH, FL), 29/3 2 og 30/3  
 1 Pinds Mølle (ET), 30/3 1 Torsø, Alsrode (OF), 31/3 2 N Moesgård Strand  
 (NA), 1/4 1 hun Tarskov Mølle (AJ), 8/4 2 ØSØ Veggørslev (RD), 10/4 2  
 Hassing Sø (PER), 5/4 1 par Kollens Mølle (ET, HET), 4 trækobs i Påsken  
 (max 5) v. Kornæs/Gjerrild (STL), 15/4 1 han Glenstrup Sø (JRR, BRR),  
 1/5 2 Pinds Mølle (HEU), 10/5 1 Vindelushov Mølle (JTL), 31/7 1 Grundfør  
 Mølle (SMO), 12/8 1 Sønderby Mølle (ØBF), 5/10 1 Dørug v. Hørning (ET),  
 9/11 og 13/11 1 Pinds Mølle (HEU).  
 Se appendix II 1975, 1978.

#### Gul Vandsnede (Botacilla alava)

2 hannar set i Østjylland. Hvis ikke andet er nævnt af indrapportøren  
 er observationen betragtet som tilhørende nominatformen (Almindelig  
 Gul Vandsnede). Ialt foreligger 27 indrapporteringer.

#### Almindelig Gul Vandsnede (M.f. alava)

Trækfugl set almindelig yngletrækfugl (med. april-aug) og ret al-  
 mindelig trækfugl.

#### Heglesund

Sæls: 1 adsk. v. Vorret (2) (JB), Kolindsund (JJP), 3 par Bjerregrav  
 Mose (Gejrf).

Første obs. 16/4 1 Kysing Fjord (JF), 21/4 1 Kolindsund (JJP), 23/4  
 1 han Østerby Mose (BHJ), 27/4 1 han Brabrand Sø (AJ).

Sidste obs. 29/7 12 Aarhus Havn (CQP), 15/8 8-10 Salten Å v. Vorret (JB),  
 Max træk: 205 Ø Gjerrild Nordstrand (RD).

Forrige: 2/5 1 Brabrand Sø (AJ), 4/5 1 han Døde Å Brabrand Sø (NA), 5/5  
 1 Hinnerup (PN), 9/5 21 N Moesgård Strand (Moes), 10/5 7 Hesselholm,  
 Samsø (LB), 11/5 10 hanner + 2 hanner Aarhus Østhavn (NA), 14/5 25  
 Bjerregrav Mose (Gejrf), 18/5 1 N Moesgård Strand (Moes), 18/5 15-25  
 Aarhus Østhavn (NA), 18/5 35 Galtens Gammelmosen (BH), 23/5 4 N Moesgård  
 Strand (Moes), 29/5 set Møgelmosen Samsø (LB), 29/7 12 Aarhus Havn (CQP).

#### Nordlig Gul Vandsnede (M.f. thunbergii)

Fåtalig - ret almindelig trækfugl som ses i maj undervejs til yngre-  
 områdernes mod nord. 4 indrapporteringer foreligger.

9/5 og 10/5 5 Hesselholm, Samsø (LB), 14/5 39 Bjerregrav Mose (Gejrf),  
 18/5 4 han + 2 hun Aarhus Havn (NA).


Se appendix II 1980.

Silkehale (*Bombycilla garrulus*)

Fåtalig - ret almindelig udbredt (i invasionsår almindelig - meget almindelig) træk og vintergæst (okt/nov-marts) spredt i amtet, dog med de største koncentrationer i Aarhus: Den udeblev fundstændigt i vinteren 80/81, hvorfra der slet ingen oplysninger foreligger (se også Lokalrapporten 1980), mens der må siges at være foregået en mindre invasion i efteråret 81. Der foreligger således 77 indrapporteringer, hvoraf de 49 er fra det centrale Aarhus. De århusianske flokke når i november en størrelse på 100-500 fugle, mens flokstørrelsen aftager meget i december (mindre end 10 fugle pr. flok) (se figur ). Alle obs udenfor Aarhus C nævnes, samt første og største obs, Aarhusobs er indtegnet i figuren.

Første obs: 11/10 ca 15 Busgaden Aarhus (PNN), 1/11 15 Dr. Margrethes vej Aarhus (HB), 2/11 25 Kolind (JPP), 6/11 >100 Mølleparken Aarhus (JTL, SH).

Øvrige: 7/11 17 på træk Stavns Fjord (DOF), 12/11 21 Hinnerup (PN), 12/11 ca. 15 Tranbjerg (BJH), 13/11 15 Kolind (JJP), medio nov. 1 på Børup v. Hørning (ET), 16-25/11 208 Randers (JRR), 19/11 1 Hammer (JL), 23/11 1 Alsrode (OF), 23-27/11 93-500 Viby Amtsgymnasium (BHJ, PN), 25/11 1 Brabrand (LaB), 1/12 200 Risskov (PJJ), 1/12 4 Bryrup (JB), 4/12 60 Aarhus N (PN), 10/12 10 Risskov (HLL), 10/12 5 Brabrand Se (AN), 11/12 5 Brabrand (LaB), 11/12 4 Aarhus Havn (NA), 20/12 >10 Bønde (ET), 20/12 5 Havknuden s.f. Grenå (CO), 22/12 2 Hørning (ET), 23/12 23 Brabrand (JTL), 26/12 2 Grenå (CO).  
Se appendix II 1978.



Figur 50. Silkehale, Storåarhus 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser maksimal forekomst pr. lokalitet pr. 5-dagsperiode.




### Stor Tornskade (Lanius excubitorides)

Ses fåtalligt som værest og vi-sejst (primo okt.-april) (figur).  
 11/1 1 (GG), og 2 (MF Mose) 1 Ry (GG), 22/2 og 1/3 1 Bjerregrav  
 Mose (Gøjrsø, JRR, EH, BRR, KEH), 31/3 1 Gjerrild (HLL), 4/4 1 Gjerrild  
 Nordskov (OF), 5/4 1 Salten Langsø, 3/10 1 Stansmark v. Fornæs (CO),  
 4/10 1 Mols Bjerge (HB), 17/10 1 Kysing Fjord (GG, PH), 18/10 2 S  
 Sletterhage Fyr (JTL), 20/10 1 Pletten Mariager Fjord (JRR, BRR, KEH),  
 6/11 1 Salten Langsø vest. (MF), 12/11 2 Salten Langsø (MF), 28/11 1 Pletten  
 Mariager Fjord (JRR, JM, AV), 3/12 1 Fugleø Bæk Enge (JRR), 6/12 1  
 Rye Møllekov (DOF), 28/12 1 Bjerregrav Mose (NÅ).  
 Se appendix II 1976.

### Rødrygget Tornskade (Lanius borealis)

Forekommer fåtalligt som ynglefugl spredt i amtet (maj-aug). Ses få-  
 talligt (=net almindeligt?) på væk forår (primo maj/juni) og efterår  
 (aug/sept). Af figurer ses at Stor Tornskade og Rødrygget  
 Tornskade sandsynligvis ikke foretrækker samtidig i Østjylland. Ialt  
 foreligger 73 indrapporteringer  
 Ynglefand.

St. Tornbjerg Samsø (LB), Øberup Skov (JJP), Borum Stormose (JTL), Nød-  
 ager (JJP), 2 par Kysing Fjord (BHJ, FL, KHe), 8 par Salten Langsø  
 (JTL, DOF, JB), 2 par v. Mols Løb (JTL), 1 par Øer-området (FF), 1-2  
 par Norring Vesterskov (JDK, SMJ), 3 par Katholm Skov (OF), 1 par  
 Tornsbjerg-Hadrup Skov (DLJ), 2 par Lading Sø (BH, LPJ).



Figur 51. Stor Tornskade og Rødrygget Tornskade, Århus Amt  
 1/1 - 31/12 1981.

Figuren viser det samlede antal Stor Tornskade (lukket søjle) og  
 Rødrygget Tornskade (åben søjle) pr. 5-dagsperiode.

### Rødhovedet Tornskade (Lanius senator)

Se appendix II 1972

Grønsisken (Carduelis spinus)

Sjældnen (Måske fåtallig) ynglefugl meget spredt i amtet. Ret almindelig til almindelig træk- og vintergæst (medio sept-april), som kan optræde invasionsagtigt. Der foreligger 85 obs, hvoraf de 35 er fra Brabrand Sø (figur 52), 10 er trækobs fra Moesgård (Moes), mens 14 er fra Fomse Gjerriild, hvor der i Påsken (14-19/4) er set fra 1 til 107 fugle (fra Gjerriild 17/4) på træk (St1). Kun ynglefund, sommeriagttagelser og større flokke (over 40 individer) nævnes.


Ynglefund:

Nørreris og Norring Vesterskov (SMJ), 1 par Vrold Skanderborg (SC), muligvis ynglepar Dråby Sø (JTL).

Sommeriagttagelser: 5/7 1 Sondrup Bakker (HLL), 14/7 ca. 25 Nørreris (SMJ), 17/7 ca. 50 Norring Vesterskov (SMJ), 23/7 2 hørt Salten Løngård (NA).

Større flokke: 4/1 100 Aarhus Å v. Aby Eng (HET), 23/9 81 Riiskov (HLL), 30/9 50-60 Løgten (AJ), 11/10 45 Fornas (HLL), 19/10 150 S Slettevej Ege (JTL), 20/10 ca. 50 Bryrup (JB), 26/10 125 Pinds Mølle (ET), 28/10 88 Janesvej Brabrand (LaB), 28/12 60 Galten (AJ).

Se appendix II 1978, 1980.



Figur 52. Grønsisken, Brabrand Sø 1/1 - 31/12 1981. Figuren viser maksimal forekomst pr. 5-dagsperiode.

Tornirisk (Carduelis cannabina)

Almindelig yngletrækfugl og trækgæst (marts/maj og nov?), ligesom den optræder som fåtallig vintergæst (dec-feb). Bortset fra en yngle-

mulig vintertid i p. Bayrup (SMJ), Kønnerelis (SMJ), Bjørnholm Kær og Alsønderup (OF).

tidligere obser: 5/5 1 han Aarhus Rådebane (NA), 15/5 Lading Sø (BH).

1977: 19/5 1 han Brabrand Sø (JR), 19/5 1 han Kysing Fjord (KHe).

tidligere obser: 14/8 1 han Skærbæk (AJ), 23/8 1 juv. Sønderdal (SMJ), 7/9 1

juv. Fornæs (CO), 12/9 1 juv. Kysing Fjord (BRR, FL).

Øvrige: 21/5 1 Brabrand Sø (NA), 21/5 1 han Åskelund v. Aarhus Å (KHe), 21/5

1 hun Mindeparken Aarhus (AJ), 21/5 1 han Pindes Mølle (ET), 23/5 1 par

Skærbæk Plantage (JB), 24/5 1 par Brønderskov N-Djursland (HB), 24/5

1 han Brabrand Sø (NA), 29/5 1 han Vestborg Fyl (DOF, LB), 29/5 1 han

Klapskov (SMJ), 30/5 1 han Måne Skov og Nørup Havn (DOF, LB), 31/5

1 han Sæding (JRR, EH), 31/5 1 han Sø og 1 han Tollekke Skov (ØBE).

5/6 1 han Tomkær, Alsønderup (OF), 6/6 Hesselholm Samsø (LB), 13/6 1 par

Gjerrild Strand (OF), 25/6 1 han Kysing Fjord (BRR), 2/7 1 par Åleø

(OF), 4/7 1 par Glatved (OF) og 1 han Lyngebæk (AJ), 5/7 4 Lading Sø

(BH), 9/7 1 han Ajstrup (KHe), 14/7 1 han Nørningøre (SMJ), 14/7 1 han

Kysing Fjord v. Nørning (BRR), 2 Salten Langsø, nord siden (DOF).

1978 Hesselholm Samsø (LB), 2 Salten Langsø og 1 juv. Kysing Fjord og 1 juv.

Kysing Næs (JDK), 23/7 1 par 1 han + 1 juv. Salten Langsø (NA, OF),

24/7 1 v. Tinning Skov (PM), 28/7 1 han + 1 juv. Gjerrild Strand (BRR,

FL), 29/7 1 han Brøndstrup (BRR), 1/8 5 Kysing Fjord (H+JE).

Se appendix II 1978.

#### Nærubåder (Coccothraustes coccothraustes)

Forekommer som fåtallig ynglefugl i amtet (Gejrfuglen 1/81), og ses fåtalligt - ret almindelig (P) som træk- og vintergæst (nov. - ultimo nov.). Ingen yngleplysninger fra i år, men et enkelt sommerfund.

Sommerfund: 7/6 2 Salten Langsø (DOF).

Øvrige: 2/1 1 Botanisk Have (NA), 6/2 og 17/2 1 Skovbakken Randers (JRR), 18/2 1 Brabrand Sø (KHe), 21/2 8 Vrold Skanderborg (GG), 17/4 1 Dystrup-Ranten Sø (HP), 4/5 1 Skovbakken Randers (JRR), 22/5 1 han Dørup v. Hørning (ET), 23/5 1 trak v. Brøndstrup (EH), 18/11 1 Pindes Mølle (ET), 5/12 Brabrand Sø (AJ), 5/12 5 Ndr. Kirkegård Aarhus (PJJ), 9/12 5 Botanisk Have (NA), 12/12 1 Brabrand Sø (KHe), 15/12 1 Åby Eng v. Brabrand Sø (AJ), 18/12 1 Langenæs Alle Aarhus (AJ), 19/12 3 Schleppegrellsgade Aarhus (HLL), 28/12 1 hun Åbyhøj (HET).

oplysning (1 par Hesselholm Samsø (LB) foreligger kun forårstræk-  
 iagttagelser og enkelte vinterobs. Ialt er 30 indrapporteringer, hvoraf  
 af 20 er fra Påsken (Fornæs/Gjerrild) med 3-77 fugle (Stl).  
 Vinteriagttagelser: 16/2 hørt Brabrand Sø (EH), 3/12 2, 8/12 3, 26/12  
 15-20 og 27/12 5-10 Aarhus Havn (PH, HLL).  
 Øvrige: 9/3-9/5 278 på træk Moesgård Strand (max 56 N 14/4) (Moes, NA),  
 28/3 110 Fornæs (HC).

### Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Ret almindelig træk- og vintergæst (sept/okt - medio marts) langs  
 amtets kyster. Forekommer sjældnere (i mindre flokke?) på indlands-  
 lokaliteter. 45 obs foreligger.

Indlandsiagttagelser: 4/1 1 Vilholt Mølle (DOF), 4/1 10 Brabrand Sø  
 (PMT, ET), 6/1 5 og 11/1 15 Brabrand Sø (HLL), 7/1 1 Mølleparken Aarhus  
 (NÅ), 10-18/2 15 Kemisk Institut, Aarhus (JE), 3/2 40 (JTL) og 11/2  
 30-50 + 16/3 20 (AJ) og 30/8 16 Brabrand Sø (LPJ), 13/10 10 Østerby  
 Mose (BHJ), 21/10 40 Solbjerg Sø (BHJ), 25/10 60 Mygind Marker (O),  
 10/11 5 Botanisk Have Aarhus (NÅ), 20/12 6 Brabrand Sø vestenden (NÅ).  
 Aarhus Havn: 5/1 4 (HLL), 17/1 26 (PH, BHJ), 20/2 50 (NT), 24/2 30 (NT),  
 10/11 25 (NT), 3/12 - 27/12 er foretaget 9 obs af 9-90 fugle (HLL, NÅ,  
 NÅ, KHe).

Øvrige: 11/1 10 Mariager Fjord (H+JE), 22/2 6 Horsker (LPJ), 15/3 50  
 Overgård v. Mariager Fjord (ØBF), 22/3 115 Kure Holm og 6 Sødringsø  
 Randers Fjord (JRR, BRR, EH), 28/3 18 Fornæs (HC), 14/4 22 N Moesgård  
 Strand (Moes), 14/4 32 Moesgård Strand (NÅ), 12-15/4 1-2 Fornæs/Gjerrild  
 (Stl), 23/10 12 Kysing Fjord (BHJ, FL), 24/10 17 Pletten Mariager Fjord  
 (JRR, BRR, KEH), 28/11 275 Ajstrup Bugt Mariager Fjord (JRR, AJ, SM),  
 13/12 8 Randers Fjords udløb (JRR).

### Gråsirken (Carduelis flammea)

To racer optræder (Almindelig Gråsirken (C.f. flammea) og Lille Grå-  
 sirken (C.f. cabaret)), men de er næsten umulige at skæle fra hinanden,  
 hvilket der derfor ikke er gjort. Ynglefundene skulle dog være Lille  
 Gråsirken, mens vinterfundene skulle være Almindelig Gråsirken. Grå-  
 sirken optræder som meget sjælden til sjælden yngletrækfugl, mens den  
 ses ret almindeligt - almindeligt som træk- og vintergæst (sept?/nov-  
 april/maj). Den kan med års mellemrum optræde som invasionsfugl.

Engelmann: 1 var Bjerregrav Mose (Gejrf).

Mållø Langsø 2/5 1 syngende Mossø (DOF), 31/5 5 syngende Hassenø (JRR).

Andre: 1/2 1 Støvringgård Skov (JRR), 5/4 1 hørt Vold (GG), 5/4 1 N Moesgård Strand (Moes), 6/4 3 Fornæs (HLL), 12-19/4 1-31 Fornæs/Gjerrild (Stl), 24/4 20 Anholt (NT), 4/5 1 N Moesgård Strand (Moes), 9/5 1 Støvringgård Skov (JRR), 27-1 1 N Moesgård Strand (Moes), 13/6 1 Fuglsø (HLL), 18/6 1 Bjerregrav Mose (JRR, ØBF, SH), 19/7 2 Fornæs og Gjerrild Strand (JDK), 21/7 5 trk Fornæs (HC), 23/7 1 Søften (SMJ), 27/7 2 Gjerrild Strand (BHJ), 27/7 1 Møtteriis (SMJ), 1/8 1 S Boels Rev (JRR, BRR, KEH), 6/9 1 Salten Langsø (DOF), 19/9 8 Brabrand Sø (HLL), 3/11 2 trk Gudenaen v. Randers (JRR), 15/11 4 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 19/11 12 Bodil Mølle (ST), 26/11 1 Flads Mølle (ET), 28/11 10 Sødvinghede (JRR, AJ, JM), 1/12 2 Brabrand Sø (AJ), 5/12 1 Fuglsø Bæk Enge (JRR), 10/12 2 Brabrand Sø (AJ), 28/12 12 Bentesvej Brabrand (BHJ, PH).  
Se appendix II 1980.

#### Karindompap (Carpodacus erythrinus)

Optræder som meget sjælden gæst i det sene forår, hvor den kommer med milde østlige vinde. Kun en undrappotertering foreligger: 13/6 2 hanner sang ved Fornæs (CO).

Se appendix II 1980.

#### Korsnæb sp (Loxia sp.)

14/11 9 Gjerrild (CO), 6/12 1 hørt v. Øjesø (CO).

#### Lille Korsnæb (Loxia curvirostra)

Sjælden ynglestrejffugl i amtet. Optræder spredt som trækgæst året rundt, dog hyppigst i forbindelse med invasioner. Kun 6 observationer foreligger.

17/1 1 rast Moesgård Strand (Moes), 1/3 2 Salten Langsø (HP), 5/4 5 syngende Salten Langsø (DOF), 23/5 5 trk Bjerregrav Mose (Gejrf), 7/6 10 Salten Langsø (DOF), 15/11 2 Fuglsø Bæk Enge (JRR).

Se appendix II 1978.

Hortulan (*Emberiza hortulana*)

Meget sjælden-sjælden (men regelmæssig?) forårs- og sommergast (april-juni). Der foreligger 2-3 iagttagelser.

16/4 1 Gjerrild Strand (St1), 8/6 1 syngende Gjerrild Strand (RD).  
Desuden muligvis 1 17/4 Gjerrild (St1).

Pileværting (*Emberiza rustica*)


Se appendix II 1977.

Oværgværting (*Emberiza pusilla*)

Se appendix II 1974

Kørspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Meget almindelig forekommende ynglefugl ved søer og moser i amtet. Spredt almindeligt på træk og mødes overvintrende. Kun 20 oplysninger er indsendt.



## Yngletand:

1 par Kesselholm Samsø (LB), 1 par Tornbjerg-Hadrup Skov (DLS), 1 par Søby Rev (FC), 1-2 par Galten Gammelmose og 2-3 par Galten Sømose (BH), 48 par Bjerregrav Mose (Gejrø)

## Trækobs:

af 1-8 fugle (12 obs) 13-18/4 - Fornæs/Gjerrild (StL).

Snespurv (Plectrophenax nivalis)

Ret almindelig træk- og vintergæst (nov - marts/april) langs amtets kyster. Sjælden på indlandslokaliteter.

5/1 4 Aarhus Havn (HLL), 28/2 30 Skirø (HP), 6/3 1 hun + 1 juv. Kysing Næs (HLL), 13/3 25 Thorsø Næs (HLL), 14/3 12 Aarhus Havn (HLL), 27/3 1 og 6/11 2 Kysing Fjord (HLL), 8/11 2 Kysing Fjord (BHJ, FL), 15/11 69 Fuglsø Bæk Enge (JRE), 15/11 4 5 Fornæs (JRR, BRR, KEH), 28/11 9 Randers Fjords udløb og 29 Ejersrup Bugt Mariager Fjord (JRR, JM, AJ), 2/12 ca. 40 og 3/12 2 hun + 1 juv. Aarhus Havn (HLL), 11/12 42 Aarhus Havn (AJ), 8/12 55 Aarhus Havn (HLL), 9/12 2 Aarhus Fælled (NA), 10/12 4 hun + 2 hun Døde & Brabrand Sø (AJ), 11/12 54 Aarhus Havn (HLL), 13/12 6 Randers Fjords udløb (JRR).

Se appendix II 1980.

## Appendix I

Nedenstående observationer skal forelægges Sjældenhedsudvalget (SU) til godkendelse.

To foreign readers. The species in this appendix have not yet been accepted by the rarity committee.

Stor Skrigeørn (*Aquila clanga*)

17/4 1 trk Gjerrild (GG, HP) og 4/7 1 Stubbe Sø (AJ)

Små Skrigeørn (*Aquila pomarina*)

15/5 1 Ø Gjerrild Fyr (RD)

Hvidvinget Måge (*Larus glaucooides*)

2/3 1 3K N Moesgård Strand (NA)

Sørhovedet Måge (*Larus melanocephalus*)

13/5 1 juv. Brabrand Sø (JTh)

Pungmejse (*Remuz pendulinus*)

14/5 1 han + 1 Bjerregrav Mose (Gejrf)

Flodsanger (*Locustella fluviatilis*)

22/5 1 hørt Bjerregrav Mose (GG, HP, Gejrf)

Lettisanger (*Cettia cetti*)

7/6 1 syngende Gjerrild Nordstrand (RD)

Baskrørsanger (*Acrocephalus dumetorum*)

22/5 1 syngende Aarhus Å v. Søren Frichs Vej (NA)

Lundsanger (*Phylloscopus trociloides*)

7/6 2 syngende Gjerrild Nordstrand (RD)



## APPENDIX II (Eldre iagttagelser)

1972

- \*Nathejre (*Nycticorax nycticorax*): 23-24/5 1 ad. Ry Møllesø (H.N. Garner).
- \*Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*): 1/4 1 han Nordisamsø (Hans Vohlmuth).
- \*Grønlandsk Stenpikker (*Oenanthe oenanthe leucorhoa*): 22/5 1 rnk. Hjelm (KjH).
- \*Rødhovedet Tornskade (*Lanius senedon*): 6/6 1 ad. hun Aarhus (Knud Pedersen).

1973

- \*MellemkjoVe (*Stercorarius pomarinus*): 23/5 1 ad. lys Hjelm (KjH).
- Isfugl (*Alcedo atthis*): Har ynglet ved Fussing Sø siden 1973 (PER).
- \*Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): 23/5 1 ad. rnk. Hjelm (KjH).

1974

- \*Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 6/6 1 Sangstrup Klint (Tove Skjødt og Steen Kjærlund Hansen).
- \*Dværgværting (*Emberiza pusilla*): 22/5 1 rnk. Hjelm (KjH).

1975

- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 30/3 og dagene derefter i Fussing Sø (PER). Bringer totalen op på 13 eks. dette forår.
- \*Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus*): 27/4-12/5 1 ad. Hjelm (KjH), 7/9 i skudt Brabrand Sø (rnk. 19/6 1975 ved Sortehavet, USSR).
- Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): har ynglet ved Fussing Sø siden 1975 (PER).

1976

- Pibesvane/Sangsvane (*Cygnus bewickii/cygnus*): 4/3 4 Pibesvaner Brabrand Sø (AJ), rettes til Pibe-/Sangsvaner.
- Bramgås (*Branta leucopsis*): 12/11 200 S Brabrand Sø (AJ), rettes til "12/11 ....., formodet Bramgæs".
- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 27/4+29/4+13/6 1 Fussing Sø (PER). Bringer

totalen op på 20 ex.

- Skovsneppe (*Scolopax rustica*): 27/3 5 St. Ravnsbjerg, Viby, 27/3 3  
 Arslevskoven, 29/3 1, 30/3 1, 3/4 1, 4/4 1, 5/4 1 alle St. Ravnsbjerg  
 Viby, 7/11 1 Arslevskoven (alle Søren Loft).
- \*Pungmejse (*Remiz pendulinus*): 9/8 1 han, rnk. Brabrand Sø (Michael  
 Anker).
- \*Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): 9/5 1 rnk. Hjelm (KjH).  
Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): 9/5 1 Mariendal Havbakker (AJ).

1977

- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 31/7 1 Salten Langsø (JB).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 16/12 1 Kvindsø-Kulsø (JB).
- \*Hvidhalset Fluesnapper (*Muscicapa albicollis*): 8/5 1 han, rnk. Anholt  
 (Michael Anker, NA), 14/5 1 han, Sønderby Skov, Alrø (Niels Anton  
 Petersen, AJ), 15/5 1 han Lisbjerg Skov (Carsten Janus Andersen, Børge  
 Skriver, Michael og Søren Brinch Pedersen).
- Desuden en mundtlig meddelelse om endnu en fugl med. maj, som bør  
 lægges SU).
- \*Pileværbling (*Emberiza rustica*): 23/5 1 hun, rnk. Anholt (Michael Anker  
 NA).

1978

- Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 7/5 1 Salten Langsø (JB).
- Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 6/5 1 Bryrup - sætter sig i en græs-  
 løst (JB).
- Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 2/11 7 ad. Mørke Kær (JTL).
- Pibesvane (*Cygnus bewickii*): 2/12 5 Salten Langsø (JB).
- Grågås (*Anser anser*): 18/4 1 V Aarhus (JTL), 21/4 min. 5 og 7/5 2 par  
 Salten Langsø (JB), 4/8 12 S og 8/8 9 Ø Helgenæs (JTL).
- Knortegås (*Branta bernicla*): 25/3 4 rast Kalø Vig (JTL).
- Fjeldvåge (*Buceo lagopus*): 4/11 1 Salten Langsø vest (JB).
- Havørn (*Haliaëtus albicilla*): 20/10 1 ad. (Ebbe Teibel) og 22/10 1 ad.  
 (JTL) Kysing Fjord.
- Hvepsevåge (*Fernis apivorus*): 29/7-12/8 ialt 12 S Helgenæs (JTL).
- Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 2/11 1 brun Løvenholmskovene (JTL), 4/11  
 1 hun Salten Langsø (JB).
- Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 22/4 1 Salten Langsø vest (JB). Forårs-  
 totalen bliver herefter 10-11 ex.

- Dværgfalk (*Falco columbarius*): 21/4 1 han Vinding (JB), 21/4 1 han Katrinedal (JB) og 22/4 1 han Salten Langsø vest (JB). Måske samme fugl? Bringer forårstotalen op på (12-)14 ex.
- Fjord-/Havterne (*sterne hirundo paradisaes*): 1/8 30-40 Bryrup Langsø (JB).
- Isfugl (*Alcedo atthis*): 1 par Lyngbygård Adal (JTL).
- Grønspætte (*Picus viridis*): 1 par Trige Skov (JTL).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 18/10 1 Velling Skov (JTL). Iflg. lokale 1-2 fugle set siden foråret 1978 og 17/10.
- Toplærke (*Galerida cristata*): 8/10 9 Vejlbj Kirke (JTL).
- Landsvale (*Hirundo rustica*): 25/9 1 albino Bryrup (JB).
- Ravn (*Corvus corax*): 5/7 1 par med 3 juv. syd for Fløjstrup Skov (JTL).
- Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): ult. jan 1 i have i Risskov (Henning Jensen).
- Halemejse (*Aegithalos caudatus*): 1 par Søsken, Brabrand Sø (JTL).
- Skægmejse (*Panurus biarmicus*): 1/3 1 nordsiden af Brabrand Sø (JTL) 3. obs fra 1978.
- Drosselrørsanger (*Accrocephalus arundinaceus*): 15/6 1 syngende Mørke Kær (JTL) har nu fået en eksakt dato. Var nævnt som pr. juni i 1978-rapporten. Ved Brabrand Sø sang fuglen kun til 16/6 og samme steds gennem hele perioden fra 20/5 - 16/6.
- Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 1/4 1 @ Gjerrild (JTL), 1 par Madse Bæk, Constantinsborg ved Brabrand Sø (JTL).
- Silkehale (*Bombycilla garrulus*): 1/1 ca 90 og 25/12 6 nordsiden af Brabrand Sø (JTL).
- Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): 1 par Kysing Fjord, 1 par Lading Sø, 3 par Hinnerup, 1 par Helgenæs (3/8 1 han Fuglsølejrer, Djursland (alle JTL)).
- Grønsisken (*Carduelis spinus*): 3/8 1 Sletterhage Fyr, Helgenæs (JTL).
- Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): 5/8 ca 65 SV Helgenæs (JTL).

1979

- \*Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 12/4 1 dødfundet Karlby Klint, Djursland (EH), 13/4 1 dødfundet Anholts nordkyst (Mads-Perter Heide-Jørgensen)
- Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 6/5 3 og 16/5 2 ad. Salten Langsø (JB).
- Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 28/5 1 Salten By (JB).
- Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 16/12 2 ad + 3 juv. Lykkendalsvej, Brabrand (LaB).
- Kongeørn (*Aquila chrysaëtus*): To iagttagelser af formodentlig samme

Fugl. 8-30/11 1 Syd-Djursland (JTL), okt/nov 1 juv. Katholm Skov (aer/delt OF).

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 1 par Fusingø (PER).

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 21/8 2 juv. Kvind Sø (JB).

Hvidklire (*Tringa nebularia*): 20/8 1 Salten Langsø vest (JB).

Drosselrørsanger (*Accrocephalus arundinaceus*): 3/6 1 Brabrand Sø (JTB).

Engpiber (*Anthus pratensis*): 18/10 100 SSV Helgenæs (JTL).

1980

Nordisk/Sorthalset Lappedykker (*Podiceps auritus/nigricollis*): 30/12 1 S Fornæs (RD).

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps griseigena*): 5/4 6 Horskær (SH).

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 21-26/4 1 Brabrand Sø (KHe), 21/7 2 Vråds Sande (JB), 16/11 2 Salten Langsø vest (JB).

Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): Yderligere 2 ynglefund. 1 par Randlev-Ørting Mose (SS), 1 par Vilhelmsborg - 2 kuld med henholdsvis 3 og 4 pulli - (BRJ). Desuden 30/10 4 Brabrand Sø (KHe).

Gule (*Morus bassanus*): 12/8 1 2K Aarhus Havn, ydermolen (Carsten Gannu Andersen) og 22/11 1 adl. fundet skudt! Kysing Strand (Johannes Sørensen).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): 6-7 ynglepar ved Moesgård (SH).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 16/11 18 Salten Langsø vest (JB).

Pibesvane (*Cygnus bewickii*): 16/11 14 Salten Langsø vest (JB).

Grågås (*Anser anser*): 24/10 175-200 Grund Fjord (FFa).

Rustand (*Tadorna ferruginea*): 20/7 1 Brabrand Sø (KHe).

Gråand (*Anas platyrhynchos*): marts 70 Grund Fjord (FFa) og 2/11 ca 100 (løst anslået) Salten Langsø vest (JB).

Krikand (*Anas crecca*): et ynglefund, 29/6 1 hun på rede Begtrup Røn (SH). Desuden 19/4 60 Brabrand Sø og 2/11 ca 100 Salten Langsø (SR).

Atlingand (*Anas querquedula*): 16/5 1 par Lading Sø (SH).

Pibeand (*Anas penelope*): april 125 Grund Fjord (FFa), 12/10 3-10 Salten Langsø vest (JB).

Spidsand (*Anas acuta*): 1-4/4 1 Brabrand Sø (KHe).

Taffeland (*Aythya ferina*): 16/5 1 han Lading Sø (SH).

Hvinand (*Bucephala clangula*): 14/7 2 hunner Kulsø (JB).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): 14/12 ca 100 (JB) og 26/12 min 100 (SH) Salten Langsø.

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): 13/4 1 par Bjerregrav Mose (Gejrf) - indlandsiagttagelse.

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): 2/3 19 Kysing Fjord (SH).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): 20/1 1 Odder (KB).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 11/4 1 Ålsrode (OF), 14/5 3 Alsø (OF), 15/5 1 N Constantinsborg Enge, Brabrand Sø (KHe). Bringer forårstotalen op på 15 ex. mellem 16/3-15/5.

Havørn (*Haliaëtus albicilla*): 26/10 1 juv. (HB), 2/11 og 21/12 1 juv. (JB) alle fra Salten Langsø.

Hvæpsevåge (*Pernis apivorus*): 8/7 1 par Anholt (Martin Seeberg Lembe). NÅ kommentar: Kan næppe være yngel. Der er ikke større sammenhængende løvskov af passende alder til Hvæpsevåge på Anholt.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 3/5 1 han Tåstrup Sø (SH), 4/5 3 (1 han + 2 hunner) Brabrand Sø (LaB).

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 6/1 1 Kysing Fjord (SH), 14/3 1 hun Ålsrode (OF) og 15/3 1 han Tomkær (OF). Nu 31 iagttagelser for hele 1980.

Duehøg (*Accipiter gentilis*): Mulig yngel Fussig Ø (PER) og 16/11 1 hun Salten Langsø (JB).

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): 13/4 1 Katholm Skov (OF), 10/5 1 Tomkær (OF), 3-4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), aug/sept 1 Grund Fjord (FFa), 10/9 1 og 19/9 1 Fussing Sø (PER) bringer totalen på 46 ex.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 27/3 1 Ålsrode (OF). Nu med korrekt observatørnavn.

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 16/5 1 N Constantinsborg Enge, Brabrand Sø (KHe).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Yderligere 5 indrapporteringer, der ændrer det viste skema til maj 17, juni 8, december 10.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 2/2 1 og 24/8 1 Brabrand Sø (KHe).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): Hesselholm: 3-5 ynglepar. Set på stedet i tiden 3/4-8/8. 4/4 70 Barnekold, 7/9 4 Armhoved og 25/10 1 Issehoved. Alt er fra Samsø og skyldes (LB).

Vibe (*Vanellus vanellus*): Hesselholm: 5-6 ynglepar. Set på stedet i tiden 3/4-26/10 (LB).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): 23/5 ca. 50 NØ kl. 21.40 + ca. 100 NØ kl. 21.45 Mårup Plantage, Samsø. Hesselholm, Samsø: 26/7 1, 2/8 1, 3/8 1 + 5 SV, 4/8 18 V, 7/8 5, 22/8 1, 23/8 3, 24/8 ca. 15, 7/9 7, 20/9 1. Alle iagttagelser skyldes (LB). Disse obs var beklageligvis gledet udi 1980 rapporten.

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): Følgende fra Samsø: 24/7 2 Hesselholm, 29/7 4 Barnekold, 23/8 3 Hesselholm, 23/8 9 SV + 4 og 24/8 1 Hesselholm, 4/10 5 ved Nørreskifte (alle LB).

- Skovsnepe (*Scolopax rustica*): 2/3 1 Brabrand Sø (KHe) og 23/5 2 ~~Plantage~~ Plantage (LB).
- Stor Regnspove (*Numenius arquata*): 5/4 100 Morskær (SH) og 1/5 1 ~~Plantage~~ grav Mose (Gejrf).
- Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 4/5 1 Bjerregrav Mose (Gejrf).
- Svæleklixe (*Tringa ochropus*): Hele maj + 27/7 - hele august 2 Vilhelmsborg (BHJ), 3/6 + 4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Tinksmed (*Tringa glareola*): 9/5 3 Brabrand Sø (KHe), 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Sortklixe (*Tringa erythropus*): 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Hvidklixe (*Tringa nebularia*): 29/6 1 Begtrup Røn (SH).
- Mudderklixe (*Tringa hypoleucos*): 4/6 1 Bjerregrav Mose (Gejrf), multi yngel, idet 2 ad + 1 juv. blev set 16/6 + 5/7 Vilhelmsborg (BHJ).
- Islandsk Ryle (*Calidris canutus*): 5/10 180 Grund Fjord (FFa).
- Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): 29/6 2 Begtrup Røn (SH).
- Brushøne (*Philomachus pugnax*): 29/4 20 Brabrand Sø (KHe), 29/6 50 Begtrup Røn (SH).
- Alkefugl sp. (*Alcidae*): 30/12 958 N + 2808 S Fornæs (RD).
- Lunde (*Fratercula arctica*): 30/12 1 N Fornæs (RD).
- Huldue (*Columba cenas*): 6/4 2 Moesgård ved Hejrekolonien (SH).
- Skovhornugle (*Asio otus*): 15/6 2 juv. Kasted Mose (SH).
- Isfugl (*Alceda atthis*): 1 par Stubbe Sø (observatøren ukendt), 31/11 1 og 5/12 1 Brabrand Sø (KHe).
- Sortspætte (*Dryocopus martius*): 16/3 1 Vrad's Station (JB).
- Vendehals (*Jynx torquilla*): 24/5 + 29/5 1 Bryrup (JB) og 28/5 1 Gludsted Plantage (JB).
- Sortkrage (*Corvus corone corone*): 24/8 1 Brabrand Sø (KHe).
- Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 2/11 1 mellem Ørum og Grenå (JY).
- Vandstar (*Cinclus cinclus*): 2/2 8 Aarhus Å, Bodil Mølle-Tarskov Mølle (SH).
- Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 7/12 min 1 Salten Langsø vest (JB).
- Ringdrossel (*Turdus torquata*): 9/5 1 han Brabrand Sø (KHe).
- Grøshoppesanger (*Locustella naevia*): 0-1 par Ørting Mose (SS), 15/5 1 syngende Kasted Mose (SH), maj 1 hørt Grund Fjord (FFa), 10/6 + 15/6 1 syngende Kasted Mose (SH).
- Sivsanger (*Acrocephalus palustris*): 16/5 3 hørt Lading Sø (SH).
- Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava thunbergi*): 16/5 30 Lading Sø (SH).
- Grønsisken (*Carduelis spinus*): 2/2 120 Pinds Mølle (SH).
- Gråsisken (*Carduelis flammea*): 15/5 1 hørt Kasted Mose (SH) og 21/12 50-100 Salten Langsø vest (JB).

Karrhönsgräs (*Carpodacus erythrinus*): 5/6 1 yngende, 6/6 1 ♀ + 6  
yngende + 1 hun rast Gjerdild Nordstrand (RD).

Skarv (*Electroplana nivalis*): 21/12 10 Brabrand Gø, Eskelund (KHe).

---

NOTATED

## LITTERATUR

- Laursen, Jørgen Terp 1981: Gråstrubet Lappedykker - Gejrfuglen 17: 78-83.  
Laursen, Jørgen Terp 1981: Kærnehider - Gejrfuglen 17: 9-13.  
Nielsen, Peter 1981: En ugle i badekarret - Gejrfuglen 17: 89.  
Forening, Østjysk Biologisk 1981: Bjerregrav Mose - Gejrfuglen 17: 42-64.  
Dybbro, Tommy 1978: Oversigt over Danmarks fugle 1978.  
Danmarks dyreverden, bd. 7.

- Søravnen 1-1973: Efterårsrapport 1972 fra Århus amt.  
- 2-1973: Lokalrapporten.  
- 1974: Lokalrapporten 2: 73.  
- 1-1975: Lokalrapporten 1974.  
- 2-1975: Lokalrapport 1/1 - 30/6 1975.  
- 1-1976: Lokalrapport 1/7 - 31/12 1975.  
- 2-1976: Lokalrapport 1/1 - 30/6 1976.

Lokalrapporten 1/7 - 31/12 1976 (duplikeret rapport)

- |   |                 |    |   |   |
|---|-----------------|----|---|---|
| - | 1977            | (- | - | ) |
| - | 1978            | (- | - | ) |
| - | 1979            | (- | - | ) |
| - | 1980, Århus amt | (- | - | ) |

Yderligere rapporter er udsolgt: 1/7 - 31/12 1976, 1977 og 1978.