



Lokalrapporten

1984



DOF - ÅRHUS AMT

LOKALRAPPORTEN 1984, DOF ÅRHUS AMT

Redaktion: Eigil Thomasen (ansv)

Renskrivning: Hanne Eriksen

Figurer: Erik Hørring

Forsidetegning: Marcel Rahner

Lay-out: Eigil Thomasen, Flemming Lundberg

Oplag: 150 eksemplarer

Pris (incl porto): kr 40,00 (kr 30,00 for bidragsydere)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning (Eigil Thomasen, Flemming Lundberg)	3
Artsbehandling (Niels Aagaard)	4
Ikke behandlede arter (Niels Aagaard)	4
Sjældne fugle (Niels Aagaard)	5
Retningslinier for indsendelse (Flemming Lundberg)	5
85-arter (Flemming Lundberg)	5
Lommer - Gæs (Flemming Lundberg)	6
Svømmeænder - Dykænder (Per Henriksen)	16
Rovfugle (Eigil Thomasen)	25
Hønsfugle - Klyde (Niels Aagaard)	38
Kjover - Spætter (Bjarke Huus Jensen)	59
Lærker - Solsort (Lars Borup)	73
Stenpikker - Jernspurv (Jeppe Kajgaard)	82
Pibere - Væverfugle (Svend Møller Jensen)	89
Appendix I + II (Niels Aagaard)	102
Bidragsyder-liste (Niels Aagaard)	103
Indsamlingsarter (rapportgruppen)	104

Lokalrapporten er udgivet af Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Århus amt og kan bestilles på postgiro nr. 551 09 61 ved DOF, Viborgvej 29, 8000 Århus C.

Pris (incl porto): kr 40,00 (kr 30,00 for bidragsydere).

Henvendelser til lokalrapportgruppen bedes venligst foretaget på lokalafdelingens adresse eller på tlf 06 - 92 37 73 (Eigil Thomasen).

INDLEDNING

November 1985. Kære læser,

Endnu engang er lokalrapporten for Århus amt på gaden. 1984-udgaven er en realitet, og en stor tak skal rettes til alle bidragsydere samt til alle, der i øvrigt har haft med rapporten at gøre.

Igen i år er det maksimale sideantal udnyttet. Dette sidetal er valgt i erkendelse af, at ikke alle observationer kan bringes, men må udgives som generelle kommentarer.

Ingen indrapporteret iagttagelse af nogen art går dog tabt af den grund. Hver eneste observation er at finde i lokalrapportgruppens skemaer, hvorfra de kan lånes. Vi håber, at ingen undlader at indsende materiale om de fuglearter, vi har behandlet i en mere komprimeret form.

Arbejdet med rapporten blev påbegyndt 1/8-85, hvor bidragsyderne senest skulle indsende deres materiale. Herefter er det gået stærkt - så stærkt at vi ca. 3 1/2 måned senere er klar med det færdige produkt. Dermed er vi på højde med tiden og vil straks efter Nytår gå igang med 85-rapporten, som forhåbentlig vil udkomme i foråret 1986 og der præsentere de nyeste fugledata fra amtet, et af lokalrapportens hovedformål.

Det er vort håb, at den hurtige udgivelse har kunnet afskaffe den troværdighedskløft, der efterhånden fandtes mellem bidragsyderne og lokalrapportgruppen. Det er vort ønske, at bidragsyderne udformer deres indrapporteringer til rapportgruppen i fast tillid til, at materialet behandles hurtigt og sobert.

Bidrag til 1985-rapporten sendes til Rapportgruppen, Viborgvej 29, 8000 Århus C - senest 20. januar 1986.

Go' læselyst.

ARTSBEHANDLINGEN

Efter artsnavnet beskrives på 1-3 linier artens status i det behandlede år. Status består af 3 dele: 1) Den/de faunistiske kategori(er) (ynglestandfugl, vintergæst osv) arten det pågældende år optrådte i. 2) Ved hver kategori er anført den periode, indenfor hvilken arten normalt optræder i Århus amt. Ved trækperioder gælder, at ca 95% af trækket skal falde i det nævnte tidsrum. Men enkelte obs kan altså ligge udenfor. De anførte perioder er gennemsnit af forekomsten i amtet de sidste 5-10 år. 3) Ved hver kategori angives den hyppighed, arten det pågældende år har optrådt med i amtet. Til at beskrive hyppighed anvendes følgende udtryk:

meget sjælden	1-2	individer eller par
sjælden	3-10	individer eller par
fåtalig	11-100	individer eller par
ret almindelig	101-1000	individer eller par
almindelig	1001-10000	individer eller par
meget almindelig	over 10000	individer eller par

behandling af yngel bruges udtrykkene om antal par, andre steder om antal individer.

diagrammerne består som sædvanlig af 7-dages perioder gående fra 1/1.

IKKE BEHANDLEDE ARTER

Ifølge indrapporteringerne er der set 237 arter i amtet i 1984. Heraf skal de 7 forelægges SU til godkendelse. De resterende 230 tangerer rekorden fra 1983. Set i året er f.eks subrariteter som Almindelig Skråpe, Kongeørn, Pomeransfugl og Tredækker, mens bl.a. Nordisk Lappedykker, Plettet Rørvagtel, Drosselrørsanger og Hortulan mangler.

Af de 230 arter er de 203 behandlet i rapporten. De resterende 27 arter, som der ikke foreligger tilfredsstillende eller interessant materiale om, er følgende:

Toppet Skallesluger	Skovskade	Gårdesmutte	Dompap
Fasan	Musvit	Solsort	Bogfinke
Svartbag	Blåmejse	Rødhals	Gulspurv
Sølvmåge	Sortmejse	Fuglekonge	Rørspurv
Havterne	Sumpmejse	Jernspurv	Gråspurv
Stor Flagspøtte	Spøtmejse	Grønirisk	Skovspurv
Husskade	Træløber	Tornirisk	

SJÆLDNE FUGLE

Grundet arbejdspress hos Sjældenhedsudvalget (SU) har vi desværre ikke kunnet indføre den lovede fornyelse af sjældne arters behandling i lokalrapporten. Det betyder, at vi endnu et år kører med den gamle metode: alle tvivlsomme obs opremses i appendix I med dato, lokalitet og observatør.

Men fra 1985-rapporten sker det! Fremover vil iagttagelser af arter på SU-listen (se SU-årsoversigterne i DOFT) kun blive udspecificeret med dato etc., såfremt beskrivelse er modtaget af SU senest 1. februar det efterfølgende år. I modsat fald hedder det "et udokumenteret obs" ved arten i lokalrapporten.

RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE

For at lette det videre arbejde for os bedes du som bidragsyder overholde nedenstående fire punkter:

- 1) iagttagelserne skal være samlet hver art for sig
- 2) skriv kun på den ene side af papiret
- 3) send alle enkeltiagttagelser af I-arter (se bagsiden af Rapporten)
- 4) send alle enkeltiagttagelser af 85-arter (se næste afsnit)

85-ARTER

Af tidsmæssige grunde lader vi 84-arterne være lig med 85-arterne, men vil hurtigst muligt søge at bringe orden i tingene.

De valgte arter er som følger: Gråstrubet Lappedykker, Klyde, Splitterne, Huldue, Topmejse, Vindrossel, Bynkefugl, Sivsanger, Rødrygget Tornskade og Stillits. Se endvidere Lokalrapporten 1983 eller ring til Rapportgruppens kontaktperson.

Rød/Sortstrubet Lom (Gavia stellata/arctica)

Fåtalig både vinter, forår og efterår.

Flest med sept - med nov.

Forår:

9/3 8-10 Kattegat ved Vejro (TB), 28/4 1 set fra Hou-Sælvig færgen (PC), 29/4 1 set fra Århus-Kalundborg Færgen (ET).

Efterår:

Østre Hedekrog: 19/11 1 (SP)

Kysing Næs: 15/9 2 N (HP), 22/9 2 N (HP), 24/9 7 (HLL), 13/10 1 S (FL), 20/10 2 S (HP), 21/10 1 N (FL)

Risskov: 8/11 1 S (FL, BHJ, HLL), 10/11 1-2 (HP, HLL).

Øerhage: 23/9 3 S (PH).

Fornæs: 17/10 4 trk (LTP), 28/10 1 S (TB), 29/10 9 N + 4 S (HP), 4/11 2 S (NÅ), 11/11 23 S (ØBF).

Vinter:

26/2 7 Kattegat ved Vejro (TB), 3/1 1 og 10/12 5 Kysing Næs (HLL), 1/12 3 S Fornæs (BHJ).

I alt 94.

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Fåtalig efterårstrækgæst og sjælden sommer- og vintergæst.

12/2 2 Lyshage (LeB), 10/6 1 Issehoved (LeB), 27/7 2 Anholt (OT), 4/11 4 S + 1 N Fornæs (NÅ), 11/11 5 S Fornæs (ØBF), 19+20/11 2 Østre Hedekrog (SD), 24/11 1 Århus-Kalundborg (NÅ), 1/12 2 S Fornæs (BHJ).

Islom/Hvidnæbbet Lom (Gavia immer/adamsii)

1 iagttagelse: 19/2 1 Fornæs (SH).

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Fåtalig efterårstrækgæst, sjælden forårs- og vintertrækgæst.

18/2 1 rst Århus Havn (MCR), 26/2 1 Kattegat ved Vejro (TB), 5/3 1 rst Moesgård (Moes), 4/5 1 (død) Århus Havn (NÅ), 12/5 1 2K rst Sletterhøge (ØBF), 13/3 1 rst Moesgård (Moes), 18/5 2 SV Sælvig Bugt (ØBF, DOF), 19/5 1 (død) Endelave (JCN), 20/10 1 N Kysing Næs (HP), 21/10 1 rst - trk Kysing Næs (HLL), 4/11 3 Fornæs (JP), 20/11 1 Østre Hedekrog (SP), 24/11 4 set fra Århus-Kalundborg Færgen (H+JE, NÅ), 1/12 1 S Fornæs (BHJ).

I alt blev det til 134 små-lommer i 1984.

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

Fåtalig til ret almindelig yngletrækfugl, fåtalig trækgæst og ret almindelig ynglestandfugl/vintergæst.

Sikre samt formodede ynglepar:

Silkeborg Langsø 6, Rønbæk Sø 1, Ørnse ?, Lyngsø 1, Salten Langsø 8, Emborg Odde 7, Kragemosen 1, Kysing Fjord 1, Brabrand Sø 23, Solbjerg Sø 30, Mørke Kær ?, Hampen Sø 10, Tåstrup Sø ?, Smømosen 1, Ramten/Dystrup Sø ?, Bjerregrav Mose ?, Grund Fjord ?, (HP, ME, SMJ, JCN, JTL, FL).

Større tal:

Ørnse: 11/3 + 26/3 30 (JCN), efterår 40-50 (SFP)

Salten Langsø, vestenden: 14/10 75-100 (JCN)

Emborg Odde: 31/3 100 (LM)

Brabrand Sø: 31/3 103 (AJ), 19/4 110 (AJ), 27/4 94 (JTL), 5/5 69 (AJ), 27/5 30 (PH), 9/9 60 (PH), 3/10 25 (PH)

Grund Fjord: 29/4 110 (FFa), 17/9 55 (FFa)

Trækiagttagelser:

19/3 11 rst (NÅ) + 9/4 16 rst Moesgård (Moes), 3/5 6 Bogens Strand (PNN), 9/5 2 Femmøller Strand (PNN), 21/10 4 trk Kysing Næs (HLL) og 10/11 1 Alrø (AJ)

Vinteriagttagelser:

30/12 55 Ørnse (JCN), 1/1 1 Remstrup Å (JCN), 2/1 25 Salten Langsø, 8/1 4 (PH) + 15/1 2 (PH, FL) + 7/12 8 (PH) + 9/12 9 (PNN) + 13/12 4 (LB) alle Brabrand Sø, 8/1 1 Århus Havn (PNN).

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena)

Fåtallig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst.

Sikre samt formodede ynglepar. Sidstnævnte står i parentes:

Vrads Sande 1, Silkeborg Langsø (1), Ørting Mose (1), Tranemosen (1), Østerby Mose 2, Brabrand Sø (1), Langå Sø 2, Hornslet Mose 2, Mose ved Hinnerup 1, Tåstrup Sø (1), Mørke Kær (1), Tornsbjerg 1, Bølling Sø (1), Rønbæk Sø 2, Smørmosen 4-5, Auning Kær (2), Ramten/Dystrup Sø (2), Skaføgård Sø 6-7 (JB, BHJ, PN, TBP, DLJ, SH, SMJ, JCN, JTL). I alt 21-23 sikre og 11 formodede. Der er en del af fuglene, der har haft yngleproblemer pga ødelagte reder.

Trækiagttagelser:

7/3 1 set fra Ebeltoft-Sjællands Odde Færgen (NÅ), 22/3 1 S Kysing Næs (NÅ), 19/4 3 N Fornæs (HC), 3/5 1 Bogens Strand (PNN), 6/8 1 ad Kysing Fjord (HLL), 2/9 1 Stavns Fjord (LeB), 15/9 1 SØ Kysing Næs (HP), 16/10 2 rst Tangkrogen (NÅ), 20/10 2 Issehoved (SD), 27/10 1 N + 1 S Fornæs (HP), 11/11 1 S Fornæs (ØBF), 24/11 1 S set fra Århus-Kalundborg Færgen (NÅ).

Og så et par super-obs:

19/11 108 + 23/11 24 Østre Hedekrog, Samsø (SD).

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Formentlig ret almindelig yngletrækfugl. Fåtallig træk- og sommergæst.

Yngleiagttagelser:

Vrads Sande 26/5 2 på rede (JB), Mossø ?? ingen yngleoptællinger indsendt; 200 par ??, Brabrand Sø 16/6 2 + 1 par med 2 juv (MCR), 5/7 1 ad med 1 pull (HLL).

Mulige lokaliteter:

Kragelund, Kysing Fjord, Østerby Mose, Ramten/Dystrup Sø, Fussing Sø.

Første, største og sidste:

Vrads Sande: 13/5 1 (JCN), 26/5 5 (JB), 10/6 3 (JCN)

Salten Langsø: 6/5 1 (TB)

Lindholm Hoved: 31/3 2 (LM)

Mossø (Emborg Odde): 2/6 26 (ØBF), 14/7 64 (FL)

Kysing Fjord: 6/8 2 ad + 1 juv, 16/8 4 ad + 7 juv, 24/9 1, (alle HLL)

Østerby Mose: 1-2 fra 13/4 - 22/8 (BHJ, PH m.fl)

Brabrand Sø: 17/4 3 (HP), 11/5 9-11 (AJ), 27/5 6 (PH), 5/7 2 (HLL)

Ramten/Dystrup Sø: 21/4 20 (HP, BHJ), 29/4 30 (JP), 19/5 6 (HP)

Fussing Sø: 2/9 1 juv (TBr)

Kragelund: 29/4 1, 14/5 7, 30/5 4, 3/7 1 (JCN)

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Fåtalig til ret almindelig yngletrækfugl, ret almindelig tærgæst samt fåtalig om vinteren.

Sikre ynglelokaliteter med antal par:

Møgelmosen 1, Kragemosen 1, Brabrand Sø 1-3, Pinds Mølle 1, vandhul ved Bjertrup Skov 1, Estrup ved Auning 1, Kongslund og Grund Fjord + Smørmosen 2, La Cour Sø 3, Fejtrup Mose 3, Kasted Mose 3.

Formodede ynglelokaliteter med antal par:

Bjerregrav 1, Kysing Fjord 20, Østerby Mose 1, Brumenge 2, Gudenå ved Birk Hede 2, Rønbaksøen 1, Ørting Mose 1, Ramten/Dystrup Sø 2, Skaføgård Sø 1, Langå Sø 1, Hattemager 1, Kragelund 2, Funder Mose 3, Kolse 1, Lystrup Å 1, Hornslet Mose 1.

Større tal:

Kysing Fjord: 22/1 13, 6/8 40, 26/8 60, 24/9 65, 8/10 60 (OGJ, ET, SH, HLL)

Norsminde Havn: 6/3 15, 10/12 14 (HLL)

Mallemuk (Fulmarus glacialis)

1 sommer- og 1 efterårsagttagelse: 23/6 1 nær Grenå (Erik Enevoldsen) 19/10 1 ved Issehoved (LeB).

Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus)

1 iagttagelse: 15/9 (7.05) 1 N Kysing Næs (HP).

Sule (*Morus bassanus*)

Fåttallig efterårstrækgæst (pr sept - med nov).

Alle obs nævnes:

Issehoved: 1/9 2 ad + 1 imm + 4 juv (LeB)

Kysing Næs: 15/9 2 N + 3 SØ (HP), 11/10 1 ad rst + 1 ad N (LB), 20/10 1 N (HP), 28/10 1 juv (LPJ), 4/11 1 juv S (PL)

Risskov: 10/11 1 S (HP, HLL)

Fornæs: 27/10 3 N + 1 S (HP), 28/10 1 2K N (TB)

I alt 23 fugle

Skarv (*Phalacrocorax carbo*)

Almindelig træk- og strejfgæst (feb - nov). Ret almindelig sommergæst (juli - aug).

Indlandsiagttagelser:

Emborg Odde, Mossø: 10/4 10(TBP), 2/6 16 (ØBF), 21/8 19 (BHJ)

Kysing Fjord: 12/2 10, 17/6 7, 9/12 6 (alle H+JE)

Solbjerg Sø: 23/4 15 (BHJ), 4/5 27 (FL, BHJ)

Brabrand Sø: 13/5 4-7 (AJ), 17/7 11 (HLL), 26/7 23 (HLL), 19/8 5 (LB), 2/9 9 (LB), 16/10 1 (MCR)

Stubbe Sø: 4/11 10 (NÅ)

Fussing Sø: 7/4 14 (TBr), 16/6 60 (JT), 16/8 220 (LTP), 2/9 250 (TBr), 12/9 over 500 (TBP), 10/10 95 (TBr), 3/11 70 (JP), 9/12 2 (TBr)

Nørre Sø: 29/9 80 (TB)

Randers Fjord: ret almindelig i august/september (LTP)

Saltvandsiagttagelser (større tal):

Alrø: 12/5 100 (LB), 13/5 40 (FL)

Hou Røn: 28/4 30 (PL)

Kysing Næs: 3/1 20 (HLL), 18/3 8 (JP)

Issehoved: 26/3 135 (LeB)

Vejrø: 26/2 50 (TB), 9/3 350 (TB), 19/7 120 (NÅ), 24/11 450 (NÅ, H+JE)

Kalø: 16/8 30 (JT)

Femmøller Strand: 20/9 174 (PNN)

Dejret Øhoved: 29/9 55 (TB)

Sødring: 22/7 35 (JP)

Træk:

18/2 - 11/6 108 trk Moesgård (Moes), 13/10 - 19/10 1824 trk Sletterhage (JTL), 4/11
93 Fornæs (NÅ), 5/9 14 Ø Vorup, Randers (LTP).

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*)

Meget sjælden sommer- og efterårstrækgæst.

2 fund.

Se appendix I

Fiskehejre (*Ardea cinerea*)

Fåtalig ynglefugl. Ret almindelig træk- og vintergæst samt strejfgæst.

Ynglepar:

Velling Skov: 2/6 1 ad med min 1 pull i rede (HP), Pinds Mølle 7 par (ET), Moesgård
9 par (SH).

Øvrige:

Flest ved Kysing Fjord: 8/1 30 (PL), 17/6 20 (H+JE), 26/8 36 (SH), 7/10 57 (FL, BHJ),
9/12 25 (H+JE).

10/1 20 Salten Langsø (TB), 25/2 26 Ørnø (JCN), 4/3 15 Havnsø, Mariager Fjord (TB),
19/5 26 Smørmosen (SH), 8/6 20 Grund Fjord (LTP), 13/6 20-25 Fussing Sø (JT), 18/8
23 Brabrand Sø (AJ), 22/8 25 Dejret Øhoved (PC), 13/10 21 Hesselholm (LeB), 4/11 25
Stubbe Sø (NÅ), 29/12 18 Salten Ådal (JCN).

Rørdrum (*Botaurus stellaris*)

Meget sjælden - sjælden træk- og sommergæst.

Paukende hanner er hørt på to lokaliteter i amtet i 1984.

Brabrand Sø: 1 hørt 10/4, 11/4, 12/4, 14/4, 15/4 22/4 (PL, LB, PNN, AJ, H+JE, BHJ).
Bjerregrav Mose: 1 hørt 14/4, 15/4, 22/4, 27/4 (JP), 1/6 (ØBF), 10/6 (HP, GG), 11/6
1-2 hørt (TBr).

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Meget sjælden yngletrækfugl. Sjælden forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst og vintergæst.

Trods den mindre fremgang, der var at spore i Storke-bestanden i 1983, gik det atter tilbage i 1984. Med en lands-total på kun 19 par og 21 unger, der kom på vingerne, var en ny og trist rekord en realitet, det laveste antal i Danmark nogensinde.

Ynglefund:

I Randers fik Storke-parret 3 unger på vingerne og trods det danske klima valgte hunnen at overvintre.

Forår:

Igen i år holdt en enlig Stork til i Langå: 14/4 + 1/5 + 2/5 + 5/5 + 20/5 1 (TBP).
Træk: 27/4 1 o/Århus Midtby (JT), 30/4 1 o/Hinnerup By (PN), 3/5 1 NV-S AFN Lisbjerg (AJ), 4/5 1 N Anholt (HE).

Efterår:

en meget sen iagttagelse: 23/9 2 o/Silkeborg (JCN).

Sort Stork (Ciconia nigra)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

12/5 1 N 12.30 Kysing Fjord (OGJ).

Knopsvane (Cygnus olor)

Det meget sparsomme materiale, der er indsendt, giver ikke noget realistisk billede af, hvad der må være af ynglepar (11 par), derfor må Rapport-gruppen på det kraftigst opfordre alle til næste gang at indsende alle obs, og specielt oplysninger om ynglepar for 1985. Den var også gal i 1983 !!

Store tal:

28/1 300 Alrø (SH), 28/1 250 Splidholm (SH), 19/2 450 Overgård ved Mariager Fjord (PL), 15/9 291 Hesselholm (SD), 25/11 300 Alrø (SH).

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Almindelig træk- og vintergæst (med okt - pr april). Meget sjælden sommergæst.

87 indsendte iagttagelser fordeler sig på ca 2300 individer.

Sommer:

16/6 1 imm Salten Langsø (TBP)

Forår, efterår og vinter:

Der er især mange iagttagelser fra Brabrand Sø, Randers Fjord samt Mariager Fjord. Her nævnes kun største antal pr. lokalitet. Forårets sidste var 30/4 1 Brabrand Sø (JTL) og efterårets første 17/10 37 ved Vrold, Skanderborg (GG).

Forår:

Solbjerg Sø 3 (FL, BHJ), V for Ålum 27 (TBr), Bjerregrav 5 (TBr), Lindholm Hoved 8 (LM), Kloster Kær 6 (LM), Silkeborg Nordskov 20 Ø (LM), Sødring Kær, Mariager Fjord 1200 (ØBF), Stubbe Sø 32 (ØBF), Mørke Kær 17 (TB), Nørre Å ved Ålum 13 (TB), Kongslund 4 (JP), Sminge Sø 50 (BRS), Salten Langsø 16 (JCN), Grund Fjord 64 (LTP), Gudenå ved Langå 18 (TBP), Brabrand Sø: set ved Døde Å samt i Vestenden, flest 17/3 15 (JTL).

Efterår:

Tåstrup Sø 10 Ø (ET), Kysing Fjord 3 S (OGJ), Fussing Sø 6 (TBr), Bønnerup Havn 5 (PM), Tangkrogen 6 (MCR), Horskær 26 (AJ), Damsbro Mose 13 NV (SMJ), Hesselholm 2 (SD), Brabrand Sø 1 (HLL), Vrold ved Skanderborg 37 V (GG), Kulsø 3 (JB).

OBS: 7/1 1 Tranevig, med hvide vinger og rød krop (JCN)

Pibesvane (Cygnus beewickii)

Sjælden forårs- og fåtallig efterårstrækgæst (marts + okt/nov). Meget sjælden vintergæst.

Forår:

29/2 3 Als Odde, Mariager Fjord (LB), 9/3 1 Grund Fjord (LTP), 28/4 1 ad Dagstrup Enge, Midtdjursland (JTL).

Efterår:

15/10 8 ad Kysing Fjord (HP, GG), 20/10 9 Grenå Enge (JNK), 20/11 10 S Øster Hede-
krog (SD), 24+25/11 1 rst Hesselholm (SD).

Vinter:

4/12 1 ad Brabrand Sø (HLL).

Grågås (anser anser)

Sjælden til fåtallig yngletrækfugl og ret almindelig træk- og sommergæst (pr marts
- med nov).

Antal ynglepar. Formodede ynglepar i ():

Brabrand Sø (1-2), Emborg Odde (1), Bjerregrav Mose 5, Silkeborg Langsø (1-2),
Dagstrup Mose (1), Hadrup Skov (1).

Øvrige obs:

Brabrand Sø: mange obs, set fra 6/3 - 2/5 med 1-8 individer, flest 10/3 5, 8/4 8.

Bjerregrav Mose: 15/4 18 (JP), 13/5 10 ad + 15 pull

Grund Fjord: 31/3 10 (FFa)

Skanderborg Sø: 14/4 15

Kloster Kær Enge: 1/4 30 (JB)

Træk:

5/5 21 NV Vrold, Skanderborg (GG), 26/5 8 NV Moesgård (Moes), 26/9 50 SV + 12/10 33
V Vorup, Randers (LTP), 10/11 40 S Horskær (AJ) og 10/10 7 trk Fornæs (ØBF).

Kortnæbbet -/Sædgås (Anser brachyrhynchus/fabalis)

8/6 8 N Strandkær, Mols (PNN), 7/11 180 SV Almind Sø, Silkeborg (LM).

Sædgås (Anser fabalis)

Fåtallig træk- og vintergæst (nov/dec - marts/april)

Forår:

11/3 1 Brabrand Sø (JWJ), 12/3 1 juv Brabrand Sø (HLL), 25/3 19 N Tangkrogen (NÅ,
OGJ), 8/4 2 Ø Kysing Fjord (NÅ).

Efterår:

10/11 35 S Risskov (HP, HLL).

Vinter:

22/12 40 S Døde Å, Brabrand Sø (BHJ), 26/12 1 Kysing Fjord (SH).

Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)

Meget sjælden vintergæst og fåtallig efterårstrækgæst (ult sept - med nov).

Vinter:

2/1 1 Salten Langsø (JPK).

Efterår:

26/9 22 SV Vorup, Randers² (LTP), 8/10 2 V (ET) + 11/11 3 S (OGJ) Kysing Fjord.

Knortegås (Branta bernicla)

2 racer er truffet i amtet i år.

Lysbuget Knortegås (B.b.hrota)

Træffes normalt kun i Mariager Fjord. I 1984 er kun indsendt een iagttagelse:
29/2 500 Mariager Fjord (LB).

Mørkbuget Knortegås (B.b.bernicla)

Herunder er også medtaget de iagttagelser, der ikke er racebestemt!!

Fåtalig forårstrækgæst (pr marts - med maj) og almindelig efterårstrækgæst (pr okt - med nov).

Forår:

4/3 400 Boelsrev/Sødringholm (TB), 17/4 22 S Fornæs (HC), 18/4 97 + 19/4 130 + 20/4 132 + 21/4 8 Hesselholm (SD), 18/5 663 Stavns Fjord (AJ).

Efterår:

1/10 5 S Glatved Strand (LB), 11/10 1 S (LB) + 13/10 9 S + 6 S Kysing Næs (FL, BHJ),
27/10 1 N Fornæs (HP, HLL), 10/11 4 rst Horskær (AJ), 10/11 2 juv Kysing Fjord (OGJ),
10/11 1 N Risskov (HP, HLL), 18/11 1 + 25/11 1 Hesselholm (SD), 17/12 4 rst Stavns-
hoved (PM):

Brangås (*Branta leucopsis*)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårsgæst.

10/11 1 rst Horskær (AJ).

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Fåtalig forårs- og vintergæst.

Ynglede i år i Uldum Kær, 20 km syd for Århus amt. Den må snart nå frem til os. Alle
obs nævnes:

17/2 26 Fussing Sø (TBr), 29/2 13 Mariager Fjord (LB), 4/3 12 Overgård Marsk (TB),
10/3 5 (TB) + 14/4 1 (AJ) Brabrand Sø og 9/12 2 Fussing Sø (TBr).

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Efterhånden mange indrapporteringer, men stadig for få. Ynglefund meddelt fra
Brabrand Sø, Langør, Egholm, Flakket, Hesselholm (min 4) og Grund Fjord (4-5).
Eneste store forekomst: 19/2 2260 Mariager Fjord (PL).

Gråand (*Anas platyrhynchos*)


Et par store tal (over 500) nævnes:

januar + februar 1000 Ørn Sø (JCN), 26/8 500 Kysing Fjord (H+JE), 15/10 500 Kysing
Fjord (HP, GG), 4/11 500 Stubbe Sø (NÅ) og 26/12 700 Kysing Fjord (SH).

Krikand (Anas crecca)

Ret almindelig forårs- og efterårstrækgæst (ult feb - med maj og med juli - med nov). Sjælden - fåtallig sommergæst og ret almindelig vintergæst. Meget sjælden (uregelmæssig ?) ynglefugl.

Fra 1984 kun: sandsynligvis ynglende Grund Fjord (FFa).

Atlingand (Anas querquedula)

Et dårligt år. Sjælden (fåtallig?) forårstrækgæst (pr april - pr juni) og sjælden efterårstrækgæst (aug og okt).

Brabrand Sø: tilsyneladende et par gennem hele april og maj måneder. Derudover 4/6 5 (HLL) og 15/10 3 (MCR).

Alle øvrige obs nævnes:

Ramten/Dystrup Sø: 29/4 1 han (JP), 6/5 1 par (LB) og 30/8 2 (BHJ)

Øvrige: 23/4 2 Kysing Fjord (OGJ), 19/5 1 han Møgelmosen (PH, AJ) og 19/8 2 Østerby Mose (OGJ).

Knarand (Anas strepera)

Meget sjælden - sjælden forårstrækgæst (med marts - med maj).

Alle obs nævnes:

11/3 2 Brabrand Sø (JWJ), 27/3 1 han og 29/3 1 han Hesselholm (LeB), 24/4 1 han Dråby Sø (IHO), 28/4 1 par Skaføgård Sø (JTL), 29/4 1 han Kragelund og 15+19/5 1 han Ramten/Dystrup (IHO, GG, HP, HLL).


Pibeand (Anas penelope)

Ret almindelig forårs-, efterårs- og vintergæst (ult aug - ult apr). Sjælden sommergæst (juni - juli).

Sommerfund:

8 - 11/6 4 han Hesselholm (LeB) og 27/7 2 hun Smørmosen (JTL).

Kysing Fjord dominerer totalt, således ingen større tal uden for fjorden.



Spidsand (anas acuta)

Sjælden (fåtalig?) - tilsyneladende året rundt.

Alle obs nævnes:

Universitetsparken, Århus: 6/1 og 28/9 1 hun, 15/10 2 hun/juv, 16/11 + 19/11 + 10/12 1 hun (alle NÅ)

Brabrand Sø: 6/3 3 han 3 hun (MCR), 14/3 1 han (MCR), 11/4 1 par (LB) og 31/8 2 hun (HLL)


Kysing Fjord: 29/7 2 (GG, HP), ult august 1 (ET), 9/9 12 (TB), 22/9 1-2 (AJ), 6/10 8 han 4 hun (LB), 15/10 11 (GG, HP), 17/10 1 (OGJ), 21/10 2 (BHJ) og 29/12 5 han (ET).

Hesselholm: 19/4 1 han (SD), 18/5 4 han Ø, 2/8 1 og 1/9 1 (alle LeB).

Øvrige: 14/4 1 han, 1 hun Bjerregrav Mose (JP), 17/4 2 rst Grenå Enge (?), 20/4 1 han Møgelmosen (LeB), 30/8 3 Grund Fjord og 4 dage i september 1 han (FFa), 22/9 1 S Kysing Næs (PH, HP) og 1-2 Kysing Fjord (AJ), 13/10 1 N Sletterhage Fyr (JTL) og 27/10 1 S Fornæs (HLL, HP).

Skeand (Anas clypeata)

Fåtalig (ret almindelig) forårs- og efterårstrækgæst (pr april - ult juni og ult juli - ult okt). Sjælden ynglefugl.



SKEAND

Ynglefund:

Møgelmosen 1 par (LeB) og Grund Fjord min 1 par (FFa).

Næsten daglig indrapportering fra Brabrand Sø i april og maj, første her 31/3 1 par (AJ, LB) og sidste 23/9 1 han 3 hun (JTL, LB). Max den 17/4 11 og den 20/4 10 (HLL, AJ).

Desuden iagttaget ved (max-tal i parentes): Kysing Fjord (31), Kongslund (2), Hesselholm (2), Møgelmosen (7), Ramten/Dystrup (12), Grund Fjord (8), Østerby Mose (19), Mørke Kær (1), Rørbæk Sø (2), Bredningen (2), Søen i Langå (4), Fornæs (2), Auning Kær (1), Emborg Odde (2), Dråby (3) og Horskær (6).

Se desuden figur.

Mandarinand (Aix galericulata)

2 obs af disse fangenskabsfugle: 5/4 1 par Langsøhus (ME) og 17/4 1 par Katrinedal (JB).

Taffeland (Aythya ferina)

Ingen ynglefund indrapporteret.

Ret almindelig træk- og vintergæst (med sept - pr maj) og fåtallig sommergæst (maj - sept).

Se desuden figur.


Troldand (Aythya fuligula)

Sjælden (fåtallig?) ynglefugl. Ret almindelig (almindelig?) træk- og vintergæst (med sept - ult maj). Fåtallig sommergæst.

Ynglefund:

Østerby Mose (BHJ), Langå (TBP), Tomsbjerg/Hadrup (DLJ), Hornslet Mose (JTL), Smørmosen (2 par) (JTL), Mørke Kær (2 par) (JTL) og Skaføgård Sø (JTL). I alt 9 ynglepar.


Se desuden figur.



TAFELØYA

□ KYSING FJORD

■ HELE AMTET



TROLØYA

Bjergand (*Aythya marila*)

Fåtallig træk- og vintergæst (pr okt. - ult april). Sjælden ved ferskvand.

Alle obs nævnes:

Indlandsobs:

15/1 1 hun Brabrand Sø (JTL), 30/10 1 hun Gudenå ved Randers (LTP), 4/11 3 hun Stubbe Sø (NÅ) og 30/12 1 han Ørn Sø (JCN).

Havobs:

Østre Hedekrog: 23/4 1 han 2 hun (LeB), 18/11 34 (SD), 20/11 23 (SD), 23/11 79 (SD) og 1/12 2 han (LeB).

Fornæs: 4/11 1 hun (JP, NÅ) og 1/12 4 S (BHJ)

Kysing Fjord: 20/1 1 han (FL) og 11/11 2 (OGJ).

Kysing Næs: 3/1 5 trk (HLL) og 10/12 6 trk (HLL)


Århus Havn: 22/3 6 (LB) og 27/10 1 hun (H+JE)

Horskær: 7/10 11 (HE)

Hvinand (*Bucephala clangula*)

Ret almindelig træk- og vintergæst (med okt - med april).

Ses i stigende grad i årets øvrige måneder. I år således sjælden - fåtallig sommergæst.



HVINAND

Havlit (*Clangula hyemalis*)

Sjalden trækgæst (nov - dec og marts)

Tangkrogen: fra 8/3 - 25/3 1 han (NÅ, OGJ, MCR, PH).

Desuden: 11/1 1 han Vejre (TB), 29/3 2 han Østre Hedekrog (LeB), 31/3 1 han Moesgård (MCR), 11/11 1 han S Fornæs (BHJ, PH), 10/11 1 Kysing Næs (OGJ), 20/11 2 han Østre Hedekrog (SD), 1/12 2 N Fornæs (BHJ).

En enkelt indlandsobs: 7/3 1 han Brabrand Sø (MCR)

Fløjlsand (*Melanitta fusca*)

En enkelt større forekomst: 28/4 400-500 Mårup Vig (PC). Desuden en sen obs: 19/5 1 han Brattingborg (PH, AJ).

Sortand (*Melanitta nigra*)

En indlandsobs: 4/5 3 han, 1 hun Brabrand Sø (MCR)

Ederfugl (*Somateria mollissima*)

Kun ynglefund fra Stavns Fjord (120 pulli 18/5 (LeB)) og Tunø (min 9 hunner med pulli 16/6 (PH)).

Desuden et par store forekomster:


Fra Kalundborg-færgen: 9/3 6000-7000 (TB) og 24/11 2000 (H+JE). Fornæs: 4/11 2700 (JP) og 18/11 4500 (JP). Desuden 19/10 1820 Sletterhage Fyr og 23/11 min 3000 Issehoved (SD).

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*)

Ret almindelig træk- og vintergæst (ult okt - pr maj). Meget sjalden sommergæst.

Sommerfund: 8/8 1 N Fornæs (JNK).

Se desuden figur.



Lille Skallesluger (Mergus albellus)

Fåtalig træk- og vintergæst (ult dec - ult marts).

Som altid dominerer Kysing Fjord totalt, kun 2 obs udenfor fjorden: 26/1 6 Rye Mølle (LM) og 30/12 1 hun Gudenå ved Kongslund (?).

Kysing Fjord: Månedsmax: januar 10, februar 6 han 9 hun, marts 2 han 7 hun, og december 7 (PL, FL, PNN, OGJ, H+JE, JFT, TB, JP, SH, ET, PH).

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Meget sjælden træk- og vintergæst.

29/5 1 juv. Ejer Bavnehøj (PN) er en sen efterårsobs.

Steppeørn (Aquila rapax)

Se appendix I.

Lille Skrigeørn (Aquila pomeraia)

Se appendix I.

Musvåge (Buteo buteo)

Formentlig fåtallig/ret almindelig ynglestandfugl. Almindelig forårstrækgæst (marts - maj) og ret almindelig på efterårstræk (med sept ÷ pr nov).

Summering fra forårstrækstederne:

Moesgård: total 1189 trk, store dage 18/3 105, 29/3 170, 8/4 166.

Risskov: total 93 trk, største dag 29/3 43.

Gjerrild: total 840, største dag 19/4 207.

Anholt: total 84, største dage 26/4 30, 29/4 33.

(NB: 29/4 besøgtes Gjerrild Nordstrand, kun 1 Musvåge sås (JP)).

Efterår:

Foruden de sædvanlige indtrækkende våger ved Kysing Næs og andre forholdsvis sporadiske trækbevægelser i amtet sås et bemærkelsesværdigt N - NV-gående træk i okt på Samsøs nordlige del af Leif Brauer (Se SØRAVNEN 1984.4). Heldige omstændigheder bevirkede, at flere andre har fulgt trækket:

15/10 26 N - NV Nordsamsø (LeB).

16/10 (9.55 - 12.08) 208 N - NV Nordsamsø (LeB).

(8.50 - 12.10) 123 MNV Helgenæs (JTL).

(12.15 - 12.45) 83 N - NV Nordsamsø (LeB).

(12.10 - 14.00) 111 MNV Helgenæs (JTL).

(13.40 - 14.15) 191 - 196 SV Brabrand Sø (MCR). Denne obs er angivet som

"Våge sp".


Fjeldvåge (*Buteo lagopus*)

Fåttallig trækfugl (med marts - pr maj og med sept - nov) og vinterfugl.

Efter forrige vinters invasion er mængden af vinteriagttagelser igen til at genkendes. Foråret bød på nogle store tal, især fra Gjerrild, sammen med Påskeferien, hvor alle feltornitologer får "kikkertkuller" og aktiviteten øges. Det er meget svært ikke at falde for fristelsen og udnævne påskeferien til trækets kulmination, så det gøres med forbehold

I oktober slog vinteren til fra den ene dag til den anden i Nordøsteuropa, mens nattefrosten i Danmark lod vente på sig til omkring juletid. Bemærk derfor det pæne tiltræk af våger i denne måned (se også Musvåge).

Fra jan - juni sås 109 ex. Fra sept - dec sås 68 ex.



Forår:

Store dage: 21/4 16 Gjerrild (HC, EH), 23/4 10 Ø - NØ Gjerrild (HP, GG), 24/4 5 N Gjerrild (IHO), 2/5 10 indtrk fra SØ Anholt (HE).

Summering fra trækstederne:

Moesgård 8 trk, Gjerrild 66 trk, Anholt 14 trk.

Sidste obs: 26/5 1 Søsterhøj (FL), 11/6 1 N Moesgård (Moes).

Efterår:

Første obs: 26/8 1 Wilhelmsborg (OGJ), 29/9 1 S Salten Langsø (JTL) og 2/10 1 Virklund (HCh).

Obs over 1 ex: 14/10 9 trk Sletterhage (JTL), 16/10 6 S Sletterhage (JTL), 16/10 1 N + 2 NV + 1 V Nordsamsø (LeB), 16/10 2 SV Brabrand Sø (MCR), 25/10 2 juv Brabrand Sø (LB), 26/10 2 juv trk V - VSV Dørup (ET), 21/11 1 S + 1 juv S Hesselholm, Samsø (SD).

Største vinterobs:

8/1 2 Klosterengen (PB, LN).

Fjeldvågerne i juni og august er ekstremer i amtet.

Rød Glente (Milvus milvus)

Måske meget sjælden yngletrækfugl. Fåtalig forårstrækgæst (ult marts - med maj) og meget sjælden efterårstrækgæst (sept - okt).

13 iagttagelser. 12 fra foråret og 1 fra efteråret. Desuden er der indrapporteret et uspecificeret yngleforsøg fra amtet, hvilket er overordentligt glædeligt.

Sommer:

1 yngleforsøg (JTL).

Forår (alle obs):

24/3 1 R Moesgård (Moes), 26/3 1 udtrk Lyngen, Samsø (LeB), 1/4 1 N Moesgård (Moes), 6/4 1 N Moesgård (Moes), 13/4 1 SV Pinds Mølledal (medd ET), 15/4 1 NV Norringure (SMJ), 17/4 1 Trustrup (HP), 18/4 1 SV Gjerrild (HC, EH), 29/4 1 Emmedsbo (JP), 30/4 1 N Moesgård (Moes), 3/5 1 N Søsterhøj (Moes, JTL) og 19/5 1 imm trk.f Gjerrild (BHJ).

Efterår (eneste obs):

1/11 1 NV Århus Universitet (BHJ).

Sort Glente (*Milvus migrans*)

Meget sjælden trækgest (med april - med maj).

22/4 1 NV Moesgård (Moes) og 3/5 1 N Søsterhøj (JTL, Moes).

Havørn (*Haliaeetus albicilla*)


Meget sjælden sommergæst.

5/7 1 juv Østjylland (HP).

Hvæpsevåge (*Pernis apivorus*)

Formentlig fåtallig yngletrækfugl. Fåtalig/ret almindelig forårstrækgest (maj - juni) og fåtalig efterårstrækgest (aug - sept).

I alt 157 iagttagelser. Der er kun indrapporteret 1 trækdag fra Gjerrild og ingen fra Hjelm, men mange gode iagttagelser fra Århus-området og Samsø. I løbet af juli er der observeret træk af Hvæpsevåger et par steder. Ingen ynglefund.



Sommer (alle obs fra juli-trækket):

Hesselholm, Samsø: 7/7 4 N, 16/7 1 N, 24/7 9 N, 25/7 2 N (alle LeB). Desuden 8/7 7 NNV Brabrand Sø (JTL).

Forår (97 iagttagelser):

Første: 3/5 1 NV Strandkær, 5/5 4 N Moesgård (Moes).

Største dage: 19/5 18 trk + 1 trk.f Gjerrild (HP, GG), 20/5 11 Sælvig (PH, AJ), 26/5 19 trk Moesgård (Moes) og 9 trk Risskov (HLL), 31/5 19 trk Hesselholm, Samsø (LeB).

Summering fra trækstederne: Moesgård 30 trk, Risskov 20 trk, Hesselholm 28 trk, (Gjerrild og Hjelm, se ovenfor).

Efterår (30 iagttagelser):

Sidste: 23/9 1 S Ansø enge (TB), 26/9 2 S Sondrup (PC).

Største dage: 6/8 4 Kysing Fjord (HLL), 21/8 7 S Lyngbygård Skov (JTL), 25/8 12 Risskov (HLL), 31/8 4 Salten Sø (ET).

Selv disse ret små trækter fra efteråret er bemærkelsesværdige, eftersom der normalt kun indrapporteres enkelte Hvepsevåger her og der om efteråret, men meget sjældent noget, der minder om "trækdage".

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Fåtalig yngletrækfugl (april - pr sept). Fåtalig trækfugl (april - maj), måske efterårstrækfugl (aug - pr sept).

Rørhøg er bredfronttrækker. Tallene er små fra forårstrækstederne og fra efteråret ses enkelte rastende Rørhøge i hele amtet. Dvs at trækket er vanskeligt at definere.

Der er færre observationer af ynglepar end i 1983, men om der er tale om en reel nedgang, står hen i det uvisse. Århus amt har efterhånden en række kystnære, klassiske Rørhøge-lokaliteter, der måske var knap så godt besat i 1984.

Forår:

Første obs: 1/4 1 ad hun Brabrand Sø (PNN), 7/4 1 par Skaføgård Sø (TB, ET) og 7/4 2 hun (MCR) og 1 ad han (AJ, ET) Brabrand Sø.

Moesgård: 30/4 - 11/6 6 trk (Moes). Gjerrild: 16/4 - 23/4 4 trk (HC, EH, PH, GG).

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Fåtalig trækfugt (april - med maj og sept/okt - dec). Sjælden vintergæst.

Der er indrapporteret 66 ex, og det er et meget stort antal. En af årsagerne hertil er det store forårstræk, der blev registreret ved Gjerrild. I øvrigt er der gjort flere indlandsiagttagelser i 1984, og der er igen feltaktivitet i amtets nordlige del.

1984 blev speciel, fordi efterårstrækket begyndte ved septembers begyndelse, som i 1981. 6 af 19 efterårstrækfugter er fra september. Normalt indledes trækket i oktober.

Det er vanskeligt nøjagtigt at fastsætte grænsen for efterårstrækkets ophør. Men da observationerne ebber ud ved decembers midte regnes dette tidspunkt for efterårstrækkets afslutning. Derefter ses Blå Kærhøg sjældent indtil april, hvilket er taget som udtryk for, at fuglene er ustationære vintergæster i amtet.



Forårstrækket:

Indledes 28/3 1 hun/juv Risskov (HLL) og 28/3 1 "brun" Frederikshåb, Samsø (LeB).

Sidste obs: 7/5 1 hun/juv Moesgård (Moes).


Største trækdage: 14/4 1 han + 2 hun/juv Moesgård (Moes), 19/4 6 trk Gjerrild (HC, EH).

Efterårstrækket:

Indledes 4/9 1 han + 1 hun/juv Anholt (Olle Hemdorff), som desuden er den største obs, og ebber ud 1/12 1 hun/juv rst NØ for Tirstrup, 2/12 1 hun/juv Brabrand Sø (ET), 13/12 1 hun Brabrand Sø (LB).

Vinter (alle obs):

1/1 1 hun/juv Dørup (ET), 15/1 1 Brabrand Sø (JTL), 8/2 1 han ad Læsten (TBr) og 20/2 1 hun/juv Brabrand Sø (HLL).



BLÅKERHØG

Hedehøg (Circus pygargus)

Meget sjælden trækgæst (maj og august).

7/5 1 hun/juv trk Risskov (HLL) og 12/8 1 ad han trk V Kare Holm (TB, ET).

Fundet fra foråret falder indenfor det normale mønster, hvorimod august-fuglen er det 3. efterårsobs i de sidste 15 år (jfr SØRAVNEN 1983.3). De tidligere fund: 18. aug 1973 1 han ad Hassenør og 5. aug 1979 1 brun fundet død Tunø.


Duehøg (*Accipiter gentilis*)

Måske sjælden eller fåtallig ynglestandfugl. Fåtalig trækfugl (ult feb - med maj).

Duehøgens status er meget vanskelig at udrede. Der er indrapporteret 1 ynglefund og nogle trækobservationer fra Gjerrild og Moesgård. Ligesom de foregående år ses der meget få Duehøge i efteråret helt frem til årets slutning. Derimod er der en del iagttagelser i vinteren, foråret og sommeren.

83 ex er iagttaget i en meget ulige fordeling over amtet, hvilket fremgår af prik-kortet. Arten er givetvis overset mange steder, men er nok også reelt fraværende andre steder.

DUEHØG



Spurvehøg (Accipiter nisus)

Formentlig fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl eller ynglestandfugl og vintergæst. Ret almindelig på forårstrækket (ult marts - pr maj) og fåtallig på efterårstrækket (okt).

Der er igen konstateret et mindre efterårstræk i amtet under efterårsferiens aktiviteter, dvs medio oktober. Trækket forløber givetvis både før og efter denne uge, men der vides ikke meget herom. Med mere regelmæssige observationer ved Sletterhage og måske ved Kysing Næs samt evt andre lokaliteter vil vor viden om Spurvehøgens efterårstræk i amtet kunne øges.

Forår (udpluk fra trækstederne):

Moesgård: 13/3 - 26/5 128 trk (Moes). Største dage: 8/4 og 14/4 15 trk (Moes).

Gjerrild: 16/4 - 19/5 333 trk. Største dage 21/4 106 trk (EH, HC), 23/4 34 Ø - NØ (HP, GG).

Anholt: 24/4 - 4/5 12 trk (HE). Største dag 26/4 6 trk.

Efterår (alle trækkende fugle nævnes):

29/9 1 S + 1 R Gyllingnæs (H+JE), 8/10 4-5 trk Kysing Fjord (ET), 13/10 1 S Søndervangen, Viby (PH), 14/10 11 trk Sletterhage (JTL), 15/10 13 trk Sletterhage (JTL), 15/10 2 indtrk Kysing Næs (PH), 15/10 6 Kysing Fjord (HP, GG), 16/10 9 S - SV Helgenæs og 3 trk Sletterhage (JTL), 18/10 1 trk Sletterhage (JTL), 19/10 4 trk Sletterhage (JTL), 21/10 1 SV Hesselholm, Samsø (SD), 26/10 2 V Dørup (ET).

Fiskeørn (Pandion Haliaetus)

Måske meget sjælden yngletrækfugl. Meget sjælden sommergæst. Fåtalig trækgæst (april - maj og aug - med sept).

Der er indrapporteret et formodet ynglepar (JTL), hvilket er en nyhed i forhold til tidligere år, hvor man blot har iagttaget oversomrende eksemplarer.

Antallet af iagttagelser er omtrent som i 1983, dvs meget stort, nærmest samme cifre, forår (27 - 29 ex) og efterår (27 ex), samt uforandret tidsmæssig fordeling af iagttagelserne. Udover det formodede ynglepar ligger forskellen fra 1983 dels i 2 sene efterårsiagttagelser, dels i den enlige sommeriagttagelse. Alle obs nævnes.

Sommer:


15/7 1 Kysing Fjord (OGJ).

Forår:

6/4 1 NØ Moesgård (Moes), 8/4 1 NØ + 1 Ø Moesgård (Moes), 8/4 2 trk Risskov (HLL),
 8/4 1 Grund Fjord (FFa), 11/4 1 R - Ø ...? (LM), 15/4 2 N Moesgård (H+JE, FL, BHJ,
 MCR), 17/4 1 Gudenå v/Randers (LTP), 18/4 1 N Hesselholm, Samsø (SD), 19/4 1 N
 Hesselholm, Samsø (LeB), 21/4 1 N + 1 SV Gjerrild (HC, EH), 22/4 1 N Gjerrild
 (HC, EH), 22/4 1 NØ Moesgård (Moes), 24/4 1 Ø Gjerrild (IHO), 25/4 1 rst Stubbe Sø
 (BH), 28/4 1 ad Silkeborg Skov (BH), 1/5 1 Anholt (HE), 3/5 2 N Søsterhøj (JTL),
 5/5 1 N Moesgård (JDJ), 6/5 1 Brabrand Sø (JDJ), 12/5 1 N + 1 rst Salten Langsø
 (HP), 13/5 1 N Malling (OGJ), 23/5 1 four. Mossø (MCR).

Efterår (kronologisk):

Pr aug - pr sept max 2 Grund Fjord (FFa), 12/8 2 Salten Langsø (BRS), 13/8 1
 Malling (OGJ), 18/8 1 Hinnerup (PN), 21/8 1 Emborg, Mossø (BHJ), 23/8 1 Dronning-
 borg Bredning (LTP), 25/8 1 Gl. Estrup (LTP), 26/8 1 Norsminde (PH), 26/8 1 SV
 Strandkær (PNN), 31/8 2 ad Salten Langsø (ET), 4/9 1 Anholt (Olle Hemdorff), 9/9
 1 ad Solbjerg Sø (FL), 16/9 1 S Dragsmur, Helgenæs (BHJ), 6/10 1 S Moesgård (JTL),
 15/10 1 indtrk - S Kysing Næs (PH).



Falk sp (Falco sp)

16/5 1 N Moesgård (Moes) (Lærke/Aftenfalk).

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Meget sjælden sommergæst. Sjælden trægæst (apr - med maj og okt - med nov).

11 iagttagelser er det største tal nogensinde, hvor måske sommerfundet påkalder sig særlig interesse som noget nyt.

Alle obs nævnes.

Sommer:

2/6 1 Salten Å (JTL).

Forår:

8/4 1 ad han + 1 "brun" N Moesgård (Moes), 10/4 1 "brun" N Moesgård (Moes), 17/4 1 Gjerrild (EH, HC), 18/4 1 V Gjerrild (EH, HC), 23/4 1 N Gjerrild (HP), 23/4 1 juv Gjerrild (IHO), 15/5 1 N Moesgård (Moes).

Efterår:

8/10 1 S Rådhuspladsen, Århus (OGJ), 14/10 1 Bjerregrav Mose (JP), 11/11 1 juv Framlev (HP).

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Meget sjælden trægæst (maj).

5/5 1 han N Moesgård (Moes).

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Meget sjælden sommergæst. Fåttallig forårstrækgæst (med april - med maj) og sjælden efterårstrækgæst (aug - med sept).

17 iagttagelser er knap så mange som sidste år.

Alle obs nævnes:

Sommer:

4/6 1 Mårup, Samsø (TBr), 10/7 1 Kysing Fjord (OGJ).

Forår:

17/4 1 Gjerrild (HC, EH), 19/4 1 SV Gjerrild (HC, EH), 20/4 1 V + 1 S Gjerrild (HC, EH), 21/4 1 S Gjerrild (HC, EH), 21-22/4 1 juv + 1 ad Anholt (HP), 23/4 1 N Moesgård (Moes), 26/4 1 N Moesgård (Moes, TB), 29/4 1 N Moesgård (Moes), 3/5 1 N Søsterhøj (Moes, JTL), 20/5 1 ad N Møgelstår, Samsø (ØBF, PH).

Efterår:

6/8 1 ad Kysing Fjord (HLL), 26/8 1 Wilhelmsborg (OGJ), 17/9 1 four. Strandkær (PNN).

Dværgfalk (Falco columbarius)

Fåttallig trækfugl (april - med maj og med sept - nov).

39 iagttagelser er mange. Tallet fremkommer dels fra gode trækdage i foråret ved Moesgård og NØ-Djursland og dels ved ret mange efterårsiaagttagelser. Alle nævnes.

Forår:

Moesgård: 8/4 3 N, 13/4 1 N, 22/4 1 N, 5/5 1 R, 14/5 1 N (alle Moes).

Gjerrild: 16-22/4 11 trk (HC, EH), 21/4 1 han + 1 hun/juv NØ (HLL, BHJ, HP), 23/4 1 hun/juv N (HP, GG), 24/4 1 han N (IHO), 6/5 1 Gjerrild Nordstrand (LB).

Anholt: 23/4 1 Ø (HE), 25/4 1 (HE), 4/5 1 (HE).

Øvrige: 5/5 1 NNØ Vrold (GG).

Efterår:

15/9 1 hun indtrk Kysing Næs (HP), 29/9 1 han Dejret (TB), 4/10 1 S Sabro (TB), 6/10 1 trk Risskov (HLL), 7/10 1 han S Haarvadsbro (SMJ), 12/10 1 hun/juv Hesselholm (LeB), 13/10 1 VNV Sletterhage (JTL), 14/10 1 S Sletterhage (JTL), 27/10 1-2 Kysing Fjord (OGJ, LPJ), 13/11 1 hun Veng Sø (ET), 24/11 1 Enslev (JNK).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*)

Formentlig fåtallig yngletrækfugl og ynglestandfugl. Fåtallig trækfugl (marts - maj og sept - okt).


Der er givet meddelelse om 292 ex, hvilket er overordentligt meget, uden at det af den grund anses for udtømmende. Forekomsten er uhyre vanskelig at beskrive.

Ynglefund (alle 1 par):

Thorsager, Strandkær, Bogens Strand, Skelhøj ved Ebeltoft, Anholt, Silkeborg nord, Edslev Knude, Hesselholm på Samsø.

Forårstræk:

Moesgård 10 trk, Gjerrild 29 trk. Der er ikke berettet om store trækdage.



TÅRNFALK


Agerhøne (*Perdix perdix*)

Ynglestandfugl.

Det mest bemærkelsesværdige ved årets forekomst er, at der ingen vinteriagttagelser foreligger. Alle obs er gjort mellem 4/3 og 25/11.

Det er omsonst at beskæftige sig med bestandsstørrelse o.l., når arten årligt udsættes i 100.000'vis. Vi henviser til den årlige jagtstatistik.

Tidligste kuld er 17/6 6 ad, 10 pull Kysing Fjord (DOF).

Vagtel (*Coturnix coturnix*)

Meget sjælden og uregelmæssig forårgæst (maj - juni)

Er i de seneste 10 år truffet juni 1977, juni 1978 og juni 1981 (3 fund).

19/5 1 hørt Brattingsbrog Skov (DOF)

Trane (Grus grus)

Sjælden forårstrækgæst (ult marts - ult maj) og meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst (ult aug - pr okt).

Årets efterårsfund er amtets hidtil seneste.

17/4 1 SØ + 19/4 4 N, 21/4 1 SØ + 1 Ø Gjerrild (HC, EH), 6/5 3 NNV Flakket, Anholt (HE) samt 10/11 - kl. 15.57-16.04 - 4 V Søby Strand (AJ, Erling Nielsen).

Vandrikse (Rallus aquaticus)

Sjælden eller snarere fåtallig yngletrækgæst (april - maj og aug - sep) og meget sjælden/sjælden vintergæst eller standfugl.

Formodede ynglepar (dvs fugle set/hørt i yngletiden ult april - juli) er meldt fra Klosterkær ved Mossø (JB). Kasted Mose (SH). Mørke Kær (JTL), Auning Kær (JTL). Termestrup Enge (JTL). Gudenå-bredningen ved Randers (LTP). Gjerrild Nordstrand (Bhj, JP). Bjerregrav Mose (JP). Kragemosen på Samsø (DOF, ØBF, LeB). Samt Brabrand Sø, hvor der meget jævnligt fra 23/4-19/5 er hørt 2 i Vestenden (NÅ, LB, NÅ, JDJ, OGJ, PH, H+JE, PNN).

Træk:

Ankomst 4/4 2 hørt Brabrand Sø (PNN). I øvrigt er eventuelle forårstrækgæster ikke adskilt fra potentielle ynglefugle. Det er en svær art!

Efteråret gav kun 11/8 1 hørt Øer-området (TB) - kunne osse nemt være yngleområde - og 29/9 1 hørt Salten Langsø (JTL) - kunne osse nemt

Vinterobs:

Haves kun fra Brabrand Sø: 21/1 3 (JWJ), 12/2 + 22/2 + 16/3 1 (PNN, HLL, JTL) samt 23/11 + 4/12 1 (HLL).

Engsnarre (Crex crex)

Meget sjælden forsommergæst.

Er de seneste 10 år truffet i maj + juli 1975, juni 1976, maj (3) + juli 1981, maj 1982 og maj (2) 1983.

1/7 1 hørt Funderholme (LTP).

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)

Yngletrækfugl (marts - okt) og vintergæst eller standfugl.

Yngler ved små og større mængder ferskvand - især talrigt i byparker. Maksimum således 31/3 45 Brabrand Sø (AJ). Kun få obs fra salt/brakvand (Kysing Fjord + Stavnsfjord).

Eneste vinterobs 21/1 set Brabrand Sø (JWJ) og 15/12 15 Brabrand Sø (H+JE) - der må være flere!

Blishøne (Fulica atra)

Yngletrækfugl og ynglestandfugl. Almindelig/meget almindelig træk- og vintergæst (med aug - med apr).

Kysing Fjord er hovedlokalitet med konstant over 500 fugle fra ult juli - pr marts. Alle obs over 1000 nævnes. 9/2 1593 (PL), 12/2 2000 (H+JE), 16/2 1500 (PL), 29/7 2000 (GG, HP), 23/9 2000 (H+JE), 3/10 4000 (LB), 6/10 5100 (LB), 15/10 4950 (GG, HP) og 26/12 1100 (SH).

Af øvrige obs nævnes maksimumtallet for lokaliteter med over 100 fugle, dog alle obs af over 500 fugle: 19/2 1300 Mariager Fjord (ØBF), 17/11 660 + 1/12 800 + 2/12 8-900 Stavnsfjord v/Hesselholm (LeB, SD), 24/3 525 Ramten-Dystrup Sø (ØBF), august 4-500 Grund Fjord (FFa), 31/3 368 Brabrand Sø (AJ) og 29/7 216 Østerby Mose (BHJ).

Strandskade (Haematopus ostralegus)

Fåtalrig/ret almindelig yngletrækfugl (ult feb - ult aug), ret almindelig træk-gæst (ult feb - maj og juli - sept) og meget sjælden, men velnok sjælden vintergæst.

Ynglefund:

2-3 par Århus Havn (NÅ), 1 par Borum Stormose (JTL), 1-2 par Grund Fjord (FFa) og 6-8 par Hesselholm, Samsø (LeB). Derudover en række iagttagelser i yngletiden (april - juni) givetvis af ynglefugle. Fra indlandslokaliteter foreligger 6/5 2 Stubbe Sø (LB) og 1/6 1 Bjerregrav Mose (PH, AJ).

Forårstræk:

Ankomst 12/2 2 Hesselholm (LeB) og 25/2 2 Århus Havn (OGJ). Større antal (over 20) var 28/4 78 rst Mårup Vig (PC), 18/5 20 Stavnsfjord ved Stavns (AJ), 19/5 25 Møgelmosen (AJ, PH) og 20/5 31 Alrø (SH). Sidste trækere blev 1/6 2 N Moesgård Strand (Moes).

Efterårstræk:

Større antal (over 10) var 12/8 53 SV Kare Holm (TB, ET) og 8/9 14 V Brabrand Sø (AJ). Sidste fugle 15/9 1 rst Kysing Næs (HP) og 23/9 2 trk Øer (PH).

Vinter:

Eneste obs, der kan holde liv i teorien om Strandskade som regelmæssig vintergæst, var 29/12 hørt Alrø (JWJ).

Vibe (Vanellus vanellus)

Formentlig ret almindelig/almindelig yngletrækfugl og almindelig/meget almindelig trækfugl (pr marts - april og jul - okt/dec), måske sjælden vintergæst.

Forår:

Ankomst 1/3 1 Brabrand (LB), 1/3 1 N Moesgård (Moes), 5/3 1 N Edslev (ET) og 5/3 4 N Søsterhøj (FL). Større antal (over 125) var 31/3 152 trk Moesgård (Moes), 1/4 150 Kysing Fjord (H+JE) og 8/4 128 Brabrand Sø (AJ).

Efterår:

Større antal (over 500) var 6/8 730 (HLL) + 16/8 1500 (HLL) + 26/8 1300 (SH) + 8/10 1500 (ET) + 15/10 2400 (HP, GG) Kysing Fjord samt 15/9 + 20/9 500 rst Dørup (ET), 20/9 5-600 Lyngbygård (TB), 22/9 800 Frijsenborg (TB) og 29/9 600 Gylling Næs (H+JE). De sidste i november var 18/11 70 Grenå Enge (JP) og 22/11 18 Hadrup Skov (DLJ).

Vinter (alle obs dec - feb nævnes):

9/12 200 (DOF) + 26/12 52 (SH) + 29/12 36 (ET, OGJ) + 30/12 3 (OGJ) Kysing Fjord samt 7/12 150 Skovby (ET), 9/12 9 Grund Fjord (FFa) og 19/12 3-5 Alrø (JWJ).

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*)

Fåtalig (ret almindelig?) yngletrækfugl (marts - aug) og ret almindelig trækfugl (pr marts - maj og aug - sep/okt).

Ynglefund:


1-2 par Østerby Mose (BHJ), 7-10 par Århus Havn (NÅ) og 7-8 par Anholt Nordstrand (HE). Der må være mange flere!

Forårstræk:

Sen ankomst 11/3 4 Århus Havn (PH, JFT) og 17/3 1 N Moesgård (Moes). Op til 20 ex. jævnlige set på Århus Havn (NÅ, PH, LB, MCR, JFT). Flest i øvrigt 20/5 14 Alrø (SH). Indlandsobs: Ved Østerby Mose set 8/4 - 5/6 og 20/8 (BHJ, PH). Desuden 7/4 1 Brabrand Sø (AJ), 12/4 1 rst Yderup (HE) og 17/4 1 Brabrand Sø (HLL).

Efterårstræk:

Max-tal 2/8 12 rst Århus Havn (NÅ) og 2/8 8 Kysing Fjord (H+JE). Sidste fugle - tidlige - blev 22/9 2 Kysing Næs (HP, PH), 22/9 1 Kysing Fjord (AJ) og 24/9 1 Kysing Næs (HLL).



STOR PRÆSTEKRAVE

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*)

Sjælden yngletrækfugl og fåtallig trækfugl (med/ult april - maj og juli - med aug).

Ynglefund:

I yngletiden (ult maj - pr juli) er arten truffet på 5 lokaliteter. Østerby Mose (0-1 par): 25/4 - 16/6 jævnlige 1-2 fugle, dog 12/5 3 (OGJ, FL, BHJ, H+JE). Kolt Skole (0-1 par): 6/7 et par (HE). Brabrand Sø (0-2 par): daglig 17/4 - 17/5 op til 4 fugle, derefter kun set 2/6 1 og 13/6 2 (LB, JWJ, MCR, HLL, PH, BHJ, PNN, JTL, AJ). Vrads Sande (0-1 par): 26/5 et par (JB). V. Gundestrup (1 par): 26/6 1 ad + 1 pull/juv (PH).

Forårstræk:

Ankomst 15/4 1 Randlev ved Odder (JWJ). Øvrige obs uden for ynglepladserne var 23/4 1 Kysing Fjord (OGJ), 3-7/5 2 + 16/5 1 + 21/5 1 Århus Havn (NÅ, OGJ, PH) og 19/5 4 Ramten-Dystrup Sø (GG, HP).

Efterårstræk:

15/7 2 + 2/8 1 + 16/8 2 + 18/8 1 - årets sidste - Kysing Fjord (OGJ, DOF, HLL, H+JE) og 26/7 9 Dronningborg Bredning (LTP).

Pomeransfugl (*Euchomias morinellus*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækfugl.

30/8 1 Nordby Bakker, Samsø (Hanne Møller).

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*)

Fåtalig forårstrækfugl (ult april - ult maj) og ret almindelig efterårstrækfugl (ult juli - pr nov). Sjælden og uregelmæssig sommergæst og sjælden og uregelmæssig vintergæst.

Vi efterlyser igen flere obs fra Randers og Mariager Fjorde.

Forår:

I år hele 5 obs. 22/4 1 V Gjerrild Stenværk (HC, EH), 22/4 9 + 25/4 35 Grund Fjord (FFa), 18/5 3 Kysing Fjord (OGJ) og 20/5 11 Alrø (SH).

Sommer:

3/6 - 9/6 op til 4 Hesselholm (LeB) samt 23/6 8 SSV Sletterhage Fyr (JTL) - kan også være meget tidlige trækfugle.

Efterår:


Første 15/7 1 Hesselholm (LeB), herefter 23 obs. Største antal (over 10) var 26/8 350 (!) Kysing Fjord (SH), 29/9 30 Gylling Næs (H+JE), 7/10 35 Horsker (HE) og 28/10 Sødring (JP). Sidste 10/11 3 Alrø + 8 Lerdrup Vig (AJ).

Vinter:

26/12 1 Kysing Fjord (SH). Vinterfund kendes hidtil fra vinter 1972/73 (5 fund), december 1978 og januar 1983.

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Almindelig forårstrækfugl (ult marts - ult maj) og meget almindelig efterårstrækfugl (ult juli - nov/dec).



Forår:

Første: 1/4 40 Kysing Fjord (H+JE).

Større tal (over 100): 12/5 121 Alrø (LB) og 20/5 200 Alrø (SH), som også var forårets sidste.

Efterår:

Første 20/7 1 rst Hesselholm Made (LeB) og 22/7 2 Brabrand Sø (AJ):

Største antal (over 200): 16/8 200 + 16/9 300 + 22/9 275 + 24/9 300 + 9/12 400 + 9/12 950 Kysing Fjord (HLL, OGJ, PH, DOF, JTL), 17/9 200 Kare Holm (FFa), 22/9 250 Frijsenborg (TB), 29/9 3000 (mange) Gylling Næs (H+JE), 28/10 1000 Overgård (JP), 31/10 400 (PN) + 10/11 350 (AJ) Horsker, 10/11 800 Alrø (AJ, Erling Nielsen) og 6/12 220 Norring (PN).

Årets sidste blev 19/12 30-50 Alrø (JWJ).

Stenvender (Arenaria interpres)

Meget sjælden forårstrækgæst (ult marts - med april) og sjælden efterårstrækgæst (ult juli - pr sep).

Der er en tendens til færre forårsfund de senere år. Er det på grund af færre ornitolog-besøg ved Alrø, Søby Rev og Stavnsfjord ?

21/4 1 trk Fornæs (HC, EH), 22/8 1-2 ad Århus Havn (PH), 31/7 1 Kysing Fjord (ET), 28/8 2 Kysing Fjord (OGJ, H+JE) og 7/9 1 Anholt (Olle Hemdorff).

Antal fund af Stenvender i Århus amt i 10 år:

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Forår	1	2	5	4	4	2	4	1	0	1
Efterår	1	5	5	3	9	6	5	7	1	12

Dobbeltbekkasin (Galinago galinago)

Fåtalig - ret almindelig yngletrækfugl, ret almindelig trækgæst (med marts - ult maj og med juli - nov) og sjælden - fåtalig vintergæst.

Ynglefund (sikre og sandsynlige par):

Brabrand Sø (2), Kasted Mose (2), Klosterkær (2-4 h), Funderholme (3), Engetved Sø (h), Salten Å (1) og Bjerregrav Mose (1).

Forår:

Første: 18/3 1 Brabrand Sø, Vestenden (NÅ) og 18/3 3 Kysing Fjord (JP).

Største antal (over 25): 1/4 mindst 41 Brabrand Sø (AJ) og 13/5 230 Alrø (FL) - det var mange!


Efterår:

Største antal (over 25): 3/8 50 + 8/8 40 + 7/10 25 + 6/11 30 Kristrup Enge (LTP), 28/8 50 (OGJ, H+JE) + 8/10 26 (ET) Kysing Fjord og 28/10 30 (AJ) + 3/11 55 (LB) Brabrand Sø.

Sidste: 30/11 12 Funderholme (JCN).

Vinter:

22/1 1 Haarvadbros (SMJ), 20/2 1 Brabrand Sø (HLL) samt 18/12 5 Kristrup Enge (LTP), 19/12 3 Alrø (JWJ), 26/12 15 + 28/12 7 + 29/12 5 Kysing Fjord (SH, PH, ET), 27/12 3 Skødshoved (PH) og 30/12 1 Funderholme (JCN).



Tredækker (*Gallinago media*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækgæst.

23/9 + 29-30/9 1 Kysing Fjord (OGJ, H+JE).

Er i de sidste 10 år kun set august + november 1974 og september + oktober 1976

Enkeltbekkasin (*Limnocryptes minimus*)

Fåtalig efterårstrækgæst (ult sep - nov/dec). Sjælden og uregelmæssig vintergæst (dec - feb).

Som i 1983 ingen forårsagttagelser. Alle obs nævnes.

Kysing Fjord: 9/9 1 (OGJ, DOF) - meget tidlig + 23-24/9 1 + 29-30/9 5 + 6/10 6 (LB, OGJ, H+JE, HLL).

Århus Havn: 14/10 1 + 20/10 4 + 21/10 1 (NÅ, PH).

Kristrup Enge: 6/11 1 (LTP).

Vinter:

15/12 2 + 26/12 1 Malling Mose (OGJ) og 19/12 1 Alrø (JWJ).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*)

Fåtalig - ret almindelig yngletrækfugl (marts/april - okt/nov) og formentlig fåtalig - ret almindelig trækgæst. Meget sjælden og uregelmæssig vintergæst.

I de sidste 5 vintre mangler vinterobs fra 1979/80, 1980/81 og 1982/83. Alle obs nævnes:

Ynglefund (med maj - aug):

12/5 1 Salten Langsø (JCN), 18/5 3 Mårup Plantage (LeB), 19/5 2 Brattingsborg (PH, ØBF, AJ), 27/5 1 Ørnsø (JCN), 30/5 5 Mårup Plantage (LeB), 2/6 2 Norringure (SMJ) og 5/7 2 Norring Vesterskov (SMJ).

Forår:

21/3 1 Mølslaboratoriet (PNN), 23/3 1 Risskov (HLL), 24/3 1 Gjerrild Nordstrand + 1 Gjerrild Nederskov (ØBF), 24/3 1 SV Botanisk Have, Århus (BHJ), 31/3 1 trafikdræbt Lystrup (TB), 2/4 1 Fuglesangs Alle, Århus (TB), 8/4 1 Åby-øst rensningsanlæg (PNN) og 24/4 2 Hadrup Skov (DLJ).

Efterår:

15/9 1 Fussing Vandmølle (TBr), 27/9 1 mellem Torup og Vrads (HCh) og 3/10 1 Silkeborg Nordskov (HCh, BRS).

Vinter:

27/1 1 Forsthaven, Århus (PH).

Stor Regnspøve (Numenius arquata)

Ret almindelig trækfugt (pr marts - med maj og ult juni - ult okt).


De 2 første og 2 sidste forår og efterår samt større antal nævnes.

Forår:

Sen ankomst 26/3 - kl. 13.20 - 1 + 27/3 2 Hesselholm (LeB), 14/4 flok 20 S Moesgård (Moes), 20/4 76 trk Fornæs (HC, EH), 12/5 1 Dejret Øhoved (PH) og 12/5 1 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår:

16/6 1 NV Strandkær (PNN), 25/6 5 Alrø (TBr), 25/6 1 S Norringure (SMJ), 25/8 26 Kysing Fjord (OGJ), 28/10 7 Sødring (JP) og 10/11 2 Alrø (AJ).



STOR REGNSPØVE

Lille Regnspove (Numenius phaeopus)

Fåtalig forårstrækgæst (ult april - med maj) og ret almindelig efterårstrækgæst (ult juni - pr sep).

Alle obs uden for Hesselholm nævnes.

Forår:

20/4 1 Fornæs (HC, EH), 28/4 1 h + 1 Ø + 29/4 2 Ø + 4/5 1 S + 5/5 1 h Anholt (HE),
3/5 2 Bogens Strand (PNN) og 12/5 5 + 16/5 1 Kysing Fjord (H+JE, OGJ).


Sommer:

1/6 1 N Moesgård (Moes) og 12/6 1 Skanseparken (NÅ) - velsagtens meget tidlige efterårsgæster.

Efterår:

Hesselholm: 7/7 - 3/8 i alt 576, set dagligt i flokke på op til 31, dog 23/7 flok 36, største dagstotal 14/7 53 (LeB).

Øvrige: 25/7 ca. 25 Østre Hede, Samsø (LeB), 31/7 4 Kysing Fjord (ET), 2/8 2 V Århus Havn (NÅ), 12/8 1 Kysing Fjord (OGJ), 18/8 3 SV Vorup, Randers (LTP), 18/8 14 S Sabro (TB) og 22/8 1 Dejret Øhoved (PC) - sidste ikke sen.



Stor Kobbersnepe (Limosa limosa)

Sjælden trækfugt (med april - med maj og aug - sep, muligvis enkelte senere).


Et normalt forår, men ingen "normale" efterårsfugle. Et oktober-obs kan ses i appendix I.

14-15/4 1 Grund Fjord (FFa) og 24/4 1 (LB) + 3/5 1 (PNN) + 5/5 1 (BHJ) Brabrand Sø ved Dødeå.

Lille Kobbersnepe (Limosa lapponica)

Ret almindelig forårstrækfugt (ult marts - ult maj) og fåtallig - ret almindelig efterårstrækfugt (jul - okt).

Ikke 1000-tals flokkene fra Alrø i år, til gengæld et par meget sene efterårsgæster. Det er højst usædvanligt, at også efteråret næsten kun bragte fugle til Samsø og Alrø.



LILLE KOBBERSNEPPE

Forår:

Ankomst 28/3 2 Sælvigbugten, Samsø (LeB) og 18/4 1 SØ Tunø (BHJ). Herefter er op til kun 39 set jævnlige ved Alrø og i Stavnsfjord, dog 12/5 200 (LB) + 20/5 350 (SH) Alrø - denne lille største-flok blev forårets sidste.

Efterår:

Første 25/6 35 Alrø (TBr) og 12/7 12 V Hesselholm (LeB). Eneste fugl uden for Samsø/Alrø var 29/9 4 Dejret Øhoved (TB). Sidste og ultrasene 10/11 2 Lerdrup Vig (AJ).

Svaleklire (Tringa ochropus)

Fåtalig trækfugl (ult marts - med maj og ult juni - pr sep).

Forår:

Første 1/4 1 N Moesgård Strand (PH, TB) og sidste 18/5 (Auning) var ganske normalt.

Efterår:

Første 29/6 (Anholt) normalt. Sidste 29/9 (Gylling Næs) småsent, mens den aller-sidste 4/11 (Norring) nærmest er en vinterobs.

Alle obs nævnes:

Brabrand Sø: Set næsten dagligt 8-27/4 1-4, dog 18/4 5 (TB, LB, MCR, HLL, PNN, JTL, AJ) samt 17/7 2 (HLL) og 26/8 1 (AJ).

Moesgård: 1/4 1 N, 8/4 2 N, 13/4 2 N, 22/4 1 N, 15/5 1 N (TB, PH, Moes).

Hesselholm: 8/7 - 2/9 jævnlige 1-3 ex, dog 2/8 5. I alt 28 (LeB).

Kysing Fjord: 12/7 1, 29/7 1, 31/7 1, 2/8 2, 6/8 2 og 25/8 2 (OGJ, GG, HP, HLL, ET, H+JE).

Øvrige: 16-22/4 i alt 17 trk Gjerrild/Fornæs (HC, EH), 25/4 1 Vrold (GG), 25/4 1 Østerby Mose (OGJ), 29/4 2 Kragelund (JCN), 18/5 2 Auning Kær (JTL) samt 29-30/6 2 Flakket, Anholt (JDJ), 11/7 1 Østerby Mose (OGJ), 18/7 3 Kragemosen (JTL), 19/7 6 Højsletvej Randers (JP), 23/7 1 Vrold (GG), 26/7 2 + 2/8 6 + 8/8 2 + 19/8 1 Krstrup Enge (LTP), 2/8 1 + 9/8 2 Dronningborg Bredning (LTP), 6/8 2 + 11/8 1 Århus Havn (NÅ), 16/8 2 Boes Mose (LM), 9/9 1 Trige Skov (LLH), 29/9 1 Gylling Næs (H+JE) og vinterobsen 4/11 1 Norringure (SMJ).

Tinksmed (Tringa glareola)

Fåtalig trækgæst (pr maj - med maj og med juli - pr sep).

Normale trækperioder 4/5 - 14/5 og 5/7 - 26/8. Alle obs nævnes.

Forår:

Brabrand Sø: 4/5 3, 5/5 1, 6/5 4, 8/5 1, 10/5 1, 12/5 1, 13/5 3-4 og 14/5 5 (LB, AJ, HLL, BHJ, PNN, PH, JTL).

Øvrige: 6/5 1 Dystrup Sø (LB), 6/5 2 Østerby Mose (H+JE) og 12/5 1 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår:

Dronningborg Bredning: 11/7 2, 26/7 2, 2/8 2, 3/8 3 og 9/8 9 (LTP).

Kristrup Enge: 18/7 3, 26/7 15, 27/7 25, 2/8 5, 3/8 25 og 8/8 30 (LTP).

Kysing Fjord: 28/7 1, 31/7 2, 2/8 1, 6/8 2, 16/8 2, 22/8 1 og 26/8 1 (OGJ, H+JE, ET, HLL, SH).

Øvrige: 5/7 1 Brabrand Sø (HLL), 18/7 1 Hesselholm (LeB) og 8/8 1 N Fornæs (JNK).

Rødben (Tringa totanus)

Fåtalig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst (ult marts - ult maj og med juli - ult sep) og sjælden - fåtalig vintergæst (nov - feb).

Yngletiden (20/5 - 1/7):

Brabrand Sø 0-2 par (LB, PH), Hesselholm Made 5-6 par (LeB), Kysing Fjord 0-1 par (H+JE, PH), Alrø 0-5 par (SH), Følle Bund 2 par (ET) og Bjerregrav Mose 0-1 par (AJ, PH, ØBF). Det giver i alt 7-17 par. Der må være mindst 50!

Forår:

Ankomst 28/3 6 Hesselholm (LeB) og 29/3 1 Brabrand Sø (PNN). Eneste antal over 12 var 29/4 18 Kysing Fjord (LB).

Efterår:

Kun større tal fra Kysing Fjord, hvor der 12/7 - 16/8 ofte ses over 20 ex, flest 12/7 30 (OGJ, GG, HP, H+JE, HLL).

Vinter:

Alle obs nov - feb nævnes: 21-22/1 1 (PNN, OGJ) + 12-18/2 1 (JFT, H+JE, PL, OGJ) + 9/12 2 (DOF) Kysing Fjord, 10/11 25 Alrø + 1 Lerdrup Vig (AJ) samt 20/11 2 + 24/11 10 SV + 25/11 6 SV Hesselholm (SD).

Sortklire (*Tringa erythropus*)

Sjældnen forårstrækgæst (ult april - med maj) og fåtallig efterårstrækgæst (pr juni - ult sep).

Årets første 31/3 er ekstrem tidlig. Der kendes dog enkelte tidligere marts-obs, men iagttagelser fra før 10/4 burde nok forelægges DOF's Sjældenhedsudvalg. I øvrigt meget få forårsobs. Alle obs nævnes.

Forår:

31/3 1 "Holbakken", Emborg (LM), 22-23/4 1 Brabrand Sø (PNN) og 12/5 1 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår:

Hesselholm: 10/6 14 + 12/7 5 + 23-24/7 1 + 2/9 1 (LeB).

Kysing Fjord: 12/7 1 + 15/7 1 + 6/8 2 + 11-12/8 2 + 16/8 3 + 25/8 10 + 26/8 2 + 28/8 2 + 9/9 2 + 24/9 1 + 29/9 1 + 3/10 1 juv - årets sidste (LB) - (LB, TB, OGJ, SH, HLL, ET, H+JE, DOF).

Øvrige: 10/6 1 Skaføgård Sø (JTL), 25/7 6 Horskar (PH), 8/8 2 Krstrup Enge (LTP), 12/8 3 + 2/9 3 Brabrand Sø (AJ, LB) og 1/9 2 Langør Kirke (LeB).

Hvidklire (*Tringa nebularia*)

Fåtallig forårstrækgæst (med april - ult maj) og ret almindelig efterårstrækgæst (pr juli - pr okt).

Her nævnes 2 første og 2 sidste forår og efterår samt alle obs af mindst 5 fugle.

Forår:

15/4 1 Brabrand Sø (AJ) og 16/4 1 Gjerrild (HC, EH), 29/4 16 Kysing Fjord (LB) samt 1/6 1 hørt Moesgård (Moes) og 1/6 1 + 3/6 1 Hesselholm (LeB).

Efterår:


7/7 3 + 9/7 2 Hesselholm (LeB).

Kysing Fjord (10/7 - 31/10): 10/7 40 + 12/7 42 + 29/7 29 + 31/7 10 + 2/8 5 + 6/8 10 + 12/8 5 + 16/8 12 + 26/8 15 + 28/8 6 (LB, OGJ, GG, HP, SH, HLL, ET, PH, H+JE).

Hesselholm (7/7 - 9/9): 22/7 9 + 24/7 9 + 25/7 9 + 27/7 5 + 28/7 6 - i alt 105 her - (LeB).

Krstrup Enge: 26/7 7 + 2/8 5 + 3/8 7 + 8/8 10 (LTP).

Øvrige: 22/7 15 Overgård (JP), 26/7 - 23/9 i alt 49, flest 4/8 17 Grund Fjord (FFa), 9/8 12 Dronningborg Bredning (LTP), 22/8 5 Dejret Øhoved (PC), 23/9 6 Skødshoved (PH), 23/9 15 + 7/10 7 Horskær (HE) samt 31/10 1 Kysing Fjord (LB) - denne sidste er rekord.



Mudderklire (*Tringa hypoleucos*)

Ret almindelig trækfugt (ult april - ult maj og pr juli - med sep).

Her nævnes 2 første og 2 sidste forår og efterår samt alle obs af mindst 5 fugle.

Forår:

16/4 1 Brabrand Sø (PNN) og 22/4 1 Brabrand Sø (AJ).

Brabrand Sø (16/4 - 29/5): 3/5 7 + 6/5 6 + 8/5 5 + 13/5 8 (LB, MCR, HLL, PL, PH, JTL, AJ).

Århus Havn (29/4 - 26/5): 5/5 6 + 13/5 5 (NÅ, LB, PH).

Øvrige: 18/5 15 "Grusgraven", Samsø (LeB) og 19/5 5 Nordklinten på Tunø (JCN) samt 27/5 1 (PH) + 29/5 2 (LB) Brabrand Sø og 30/5 1 Halle Sø (HCh) - men det er da vist Vejle amt!

Efterår:


5/7 1 Brabrand Sø (HLL) og 8/7 3 Århus Havn (NÅ).

Brabrand Sø (5/7 - 8/9): 22/7 5 + 13/8 14 (LB, HLL, PH, JTL, AJ).

Århus Havn (8/7 - 6/9): 2/8 8 + 6/8 5 + 7/8 5 + 22/8 8 + 26/8 6 (NÅ, LB, PH).

Kysing Fjord (12/7 - 16/9): 12/7 6 + 29/7 12 + 31/7 20 + 6/8 14 + 12/8 10 + 16/8 15 + 26/8 14 + 28/8 8 (H+JE, OGJ, GG, HP, SH, HLL, ET, PH).

Øvrige: 11/7 10 Dronningborg Bredning (LTP og 14/7 32 S Issehoved (JTL) samt 20/9 1 Dronningborg Bredning (LTP) og 22/9 1 rst Kysing Næs (PH, HP).



MUDERKLRE

Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Fåtalig efterårstrækgæst (med juli - ult okt).

Ingen forårsfund og dårligste efterår siden Ruder Konge var Knægt. Alle obs nævnes.

Kysing Fjord: 29/7 1 (GG, HP) + 2/8 1 (H+JE) + 6/8 2 (OGJ) + 11/8 1 (OGJ) + 16/8 1 (HLL) + 5/10 5 (GG, HP).

Øvrige: 15/8 3 Alrø (BHJ), 7/10 1 Horskar (HE) og 14/10 5 Hesselholm (LeB) + 5 N Østre Hedekrog, Samsø (LeB) + 1 S Sletterhage (JTL).

Sortgrå Ryle (Calidris maritima)

Meget sjælden træk- og vintergæst.

Blot det 3. vinterfund i lokalrapportens tidsalder (13 år).

27/12 1 Skødshovedgård (PH).

Dvergryle (Calidris minuta)

Fåtalig efterårstrækgæst (med juli - pr okt).

Jævnt dårlig sæson ! Alle obs nævnes.

11/7 1 Dronningborg Bredning (LTP), 15/8 4 Alrø (BHJ), 16/9 5 (OGJ) + 24/9 1 (HLL)
Kysing Fjord, 29/9 1 Gylling Næs (H+JE) og 7/10 4 Kysing Fjord (FL).

Temmincksryle (Calidris temminckii)

Sjælden efterårstrækgæst (med juli - med sep).

Dårligt efterår og rædselsfuldt forår! Samtlige obs nævnes.

15/7 1 + 18/8 1 Kysing Fjord (OGJ) og 28/7 1 ad + 2/8 1 ad Århus Havn (NÅ).

Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Velsagtens stadig sjælden yngletrækfugl, desuden ret almindelig - almindelig træk-
gæst (marts/april - ult maj og pr juli - ult nov) og fåtalig vintergæst (dec - feb).

Sommer- og vinterfund samt flokke over 49 ex nævnes.

Yngel:

Det eneste obs, der lugter derhenad, er 25/6 2 Alrø (TBr).

Forår:

Første 1/4 3 Kysing Fjord (H+JE), derefter 12/5 450 (LB) + 20/5 400 (SH) Alrø.

Efterår:

Første 30/6 1 Århus Havn (NÅ), og derefter

Kysing Fjord: 12/7 61 (OGJ) + 29/7 69 (GG, HP) + 2/8 125 (OGJ, H+JE) + 26/8 76 (HLL)

Øvrige: 22/7 75 Overgård (JP), 15/8 200 Alrø (BHJ), 29/9 400 Gylling Næs (H+JE),
28/10 300 Overgård (JP) og 10/11 70 Alrø + 120 Lerdrup Vig (AJ).

Vinter:

Kysing Fjord: 21-22/1 9 (PNN, OGJ), 15/12 2 (OGJ) og 28/12 6 (PH) samt 27/12
35-40 Skødshoved (PH).

Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea)

Sjælden efterårstrækgæst (ult juli - med sep).

Som næsten sædvanligt ingen forårsfund og efteråret satte rekord - som hidtil
dårligste. Vi nævner rub og stub.

15/7 1 Århus Havn (OGJ) samt 1 ex ved Kysing Fjord hver af dagene 29/7, 31/7, 2/8,
6/8 og 16/8 (GG, HP, ET, OGJ, H+JE, HLL).

Sandløber (Calidris alba)

Fåtalig efterårstrækgæst (ult juli - okt).

Så er det vist ovre med Århus Østhavn som Sandløber-lokalitet. Det var en dejlig
tid! Og alle obs nævnes.

1/9 3 Issehoved (LeB) og 23/9 9 Øerhage (PH).

Brushane (Philomachus pugnax)

Fåtalig forårstrækgæst (pr april - ult maj), ret almindelig efterårstrækgæst
(pr juli - okt) og sjælden sommergæst.

Et skidt forår og et normalt efterår. Sommerobs, første og sidste forår og efterår
samt obs af mindst 5 fugle nævnes.

Forår:

20/4 2 Møgelmosen (LeB), 3/5 5 + 6/5 5 Brabrand Sø (LB, AJ).


Sommer:

17/6 1 han Brabrand Sø (DOF) og 25/6 2 Alrø Polder (TBr).

Efterår:

Kysing Fjord: 29/7 5, 31/7 6, 2/8 5, 6/8 5, 16/8 37, 25/8 25, 26/8 31, 28/8 70 og 24/9 10 (OGJ, GG, HP, SH, HLL, ET, PH).

Øvrige: 18/7 5 + 26/7 5 Kristrup Enge (LTP), 3/8 13 Dronningborg Bredning (LTP) og 23/9 16 S Grenå Enge (JNK). Sidste og meget sene blev 18/11 2 enge vest for Grenå (JP).



BRUSHANE

Klyde (*Recurvirostra avosetta*)

Fåtalig (?) yngletrækfugl og fåtalig trækfugl (ult marts - med aug).

Alle obs uden for ynglepladserne nævnes.

Ynglefund:

Hesselholm (28/3 - 15/7): 3-4 par, max 17-18/4 10 (LeB, SD).

Alrø (12/5 - 15/8): ukendt antal par, max 20/5 25 og 3/6 25-30 (TB, LB, SH, PH, FL, BHJ).

Stavnsfjord (28/4 - 18/5): ukendt antal par, max 18/5 17 (PH, ØBF, PC, DOF, AJ).

Forår:

Første 28/3 7 Hesselholm (LeB) og på træk: 14/4 1 Kysing Fjord (OGJ), 19/4 2 trk Fornæs (HC, EH) og 12/5 2 Skødshoved (PH, ØBF).

Efterår:

12/7 10 + 29/7 7 juv + 31/7 6 Kysing Fjord (OGJ, GG, HP, ET) og de sidste 15/8 5 Alrø (BHJ).

Ubestemt Kjove (Stercorarius sp)

Tre efterårsagttagelser af vanskelige kjover:

15/9 1 SØ Kysing Næs (HP), 27/10 1 S Fornæs (HLL, HP) og 1/12 1 N Fornæs (BHJ).

Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus)

Sjælden efterårsgæst (sept - nov).

Også i 1984 blev Kysing bedste lokalitet for arten, dog med noget færre fugle end i 1983.

22/9 1 juv N Kysing Næs (PH, HP), 24/9 1 juv trk Kysing Næs, 3/11 1 ad Kysing Fjord (OGJ) og 10/11 1 ad S - rst - S Risskov (HLL, HP).

Sildemåge (Larus fuscus)

Fåtallig (?) ynglefugl, samt ret almindelig gæst (marts - sept).

De fleste iagttagelser er af racen L.f. intermedius (Norsk Sildemåge), mens den britiske ikke er indrapporteret, og der kun er en iagttagelse af L.f. fuscus (Baltisk Sildemåge): 27/3 1 ad Århus Havn (LLH).

I alt foreligger der 31 marine iagttagelser af 75 individer, flest fra Århus Havn og Sjællands-færgerne.

Ynglefund: "Yngler i Stavns Fjord" (LeB). Desværre ingen tal fra Anholt.
Første og sidste: 7/3 1 ad Ebeltoft Havn og 6/9 1 ad Århus Havn (NÅ).
Max: 25/7 15 ad Århus-Kalundborg (NÅ).

Indlandsiagttagelser:

Brabrand Sø: 31/3 2, 1-7/4 1, 8-14/4 2, 1/9 3, 2/9 1 (AJ, PNN og især LB).
Ørnsø: 26+27/3 3-4 (JCN).

Stormmåge (Larus canus)

Kun ynglefund nævnes, men disse dækker givetvis kun en brøkdel af bestanden.

Tunø: 10-20 par (BHJ, JCN).

Hesselholm, Samsø: 12-15 par (LeB).

Gråmåge (Larus hyperboreus)

Meget sjælden træk- og vintergæst.

Kun to obs, begge af helt unge fugle.

29/2 1, 1K, Århus Havn (NÅ) og 15/10 12.05 - 12.10, 1K, Issehoved, Samsø (LeB).

Hvidvinget Måge (Larus glaucooides)

Se appendix I

Dværghmåge (Larus minutus)

Sjælden gæst (maj og sept - okt).

12/5 2 ved Kragelund (JCN), 15/9 1, 1K, Fussing Sø (TBr), 21/10 2 ad Kysing Fjord (HLL) og 24/11 1, 1K, Århus Havn (JTL) - temmelig sent.

Hættemåge (Larus ridibundus)

Almindelig ynglefugl.

Øvrige forekomster er ikke behandlet.

Ynglefund:


I Midtjylland: Emborg Odde "koloni" (BHJ), Vrads Sande 10-25 par (JCN), ved Krage-
lund 250 par (JCN), Brudesø ca. 15 par (BHJ), Alø i Julsø "koloni" (JCN), Mose N
for Silkeborg 165 par (ME).

Øvrige: "Søen" ved Langå "koloni" (TBP), Brabrand Sø min 2000 par (BHJ), Tjerrild
Mose 24 par (JTL), Mørke Kær min 500 par (BHJ), Ramten-Dystrup Sø min 200 par
(IHO, BHJ).

Første udfarvede hætte/sommerdragt: 26/2 Århus (LM), 4/3 Lyngsø (JCN).

Ride (Rissa tridactyla)

Ret almindelig efterårsgæst (okt - nov) og fåtallig vintergæst (dec - feb).



RIDE

Efterår (187 individer):

Kysing Næs: 11/10 6 (LB), 15/10 23 N (PH), 20/10 1 N + 4 S + 1 rst (HP) og 21/10 1 S (BHJ).

Ud for Risskov: 27/10 17 N + 58 S (HLL, HP), 9/11 10 juv (BHJ) og 10/11 15 N + 10 S (HLL, HP).

Øvrige: 15/10 12 S + 3 rst Issehoved (LeB), 17/10 1 + 19/10 4 Sletterhage Fyr (JTL), 21/10 15-20 Grenå-Varberg (PH), 11/11 5 S Fornæs (BHJ, PH) og 24/11 2 ad + 2 juv Århus-Kalundborg (H+JE, NÅ).

Vinter (13 individer):

2/1 1 NØ for Samsø (LB), 3/1 9 trk Kysing Næs (HLL), 21/1 1 subad Norsminde Havn (PNN), 23/1 1, 2K, ud for Grenå (LM) og 10/12 1 ad Kysing Næs (HLL).

Sortterne (*Chlidonias niger*)

Sjælden forårs- og efterårsgæst (maj-juni og aug-sept).

Brabrand Sø: 19/5 2 (JDJ), 4/6 2 (AJ), 8/7 3 ad og 16/9 1 ad v.d. (JTL).

Øvrige: 30/5 1 Grund Fjord (TBP), 26/6 1 Flakket, Anholt (JDJ) og 27/8 1 juv rst Dråby Strand (JPK).

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*)

Sjælden og uregelmæssig efterårsgæst.

Tidligere iagttaget i 1980 og 1983.

1/9 2-3 ad + 1 juv Issehoved kl. 16.50 (LeB).

Rovterne (*Hydroprogne caspia*)

Meget sjælden gæst, men knapt så uregelmæssig som Sandternen.

De fleste iagttagelser gøres med aug - pr sept ved Kysing Næs og Samsø. Er siden 1977 iagttaget i 1980, 1982 og 1983.

15/9 1 juv N Kysing Næs (HP).

Fjordterne (*Sterna hirundo*)

Meget sjælden - sjælden yngletrækfugl. Ret almindelig trækfugl (med juni - sept).

Kun en forårsiagttagelse! Alle obs nævnes.

Ynglefund:

Mørke Kær 1 par og Hornslet Mose 1 par (JTL).

Mulige ynglefund: 1/6 2 ad Bjerregrav Mose (PH) og 21/6 1 par Dråby Sø (FF).

Brabrand Sø: 26/7 8, 23/9 1 (MCR, HLL).

Dronningborg Bredning: 11/7 5, 2/8 5, 28/8 2, 4/9 6, 10/9 3, 20/9 4, 27/9 1 juv - årets sidste - (LTP).

Øvrige: 22/4 1 Fornæs (HC, EH), 17/6 3 Kysing Fjord (H+JE), 26/7 30 Grund Fjord - max-tal her fra - (FFa), 28/7 3 Gudenå + 28/7 2 Fussing Sø (LTP), 27/8 6 S Dråby Strand (JPK), 1/9 2 Issehoved + 2/9 24 V Hesselholm (LeB), 9/9 1 Solbjerg Sø (BHJ), 15/9 1 Tangkrogen (MCR) og 22/9 1 Randers Havn (LTP).

Dværtterne (*Sterna albifrons*)

Meget sjælden, fåtallig yngletrækfugl samt fåtallig - ret almindelig trækfugl (ult april - aug).

Ynglefund: Århus Havn 1, Følle Bund 0-1, Anholt ?, Samsø ?.

Første og sidste: 21/4 1 Mørke Kær (BHJ, HP, HLL) og 5/9 2 Århus Havn (MCR).

Alle obs nævnes:


Århus Havn: 29/4 2, 6/5 4, 16/5 1, 20/5 1, 21/5 1, 26/5 1, 3/6 2 skældende (1 med føde), 4/6 min 3 ad, 10/6 1 ad, 12/6 1 par, 17/6 5-6, 18/6 4, 19/6 2, 30/6 2 ad + 1 juv skældende 1/7 1, 8/7 4 + 2 ad + 1 juv, 5/9 2 (NÅ, PH, MCR, FF, FL, OGJ, LB).
Djursland: 27/5 3 (2 i fødeafleveringssituation) Følle Bund (ET), 6/6 1 NØ Strandkær Mols, 22/6 1 Ebeltoft Fægehavn (FF).

Anholt, Flakket: 3/5 15 (HE) og 29-30/6 33 (JDJ).

Samsø: Stavnsfjord: 18/5 1, 1/6 1, 10/6 1 (AJ, PH, LeB). Issehoved: 7/6 1, 14/7 4 (JR, TBr). Mårup Strand: 7/6 1 (TBr).

Indland: 21/4 1 + 24/5 2 Mørke Kær (H+JE, BHJ, HP, HLL), 5/7 1 Brabrand Sø (AJ).

Øvrige: 10/7 1 Ballehage, Århus (NÅ) og 2/8 2 Kysing Fjord (H+JE).



Splitterne (Sterna sandvicensis)

Muligvis ynglefugl på Samsø, Anholt og Norddjurs, ellers ret almindelig gæst (marts - sept).

Første og sidste: 15/4 1 Moesgård (MCR, FL) og 15/10 1 Sletterhage Fyr (JTL) - ret sen.

Større antal (over 10): 20/4 21 Møgelmosen, Samsø (LeB), 29/4 10 Gjerrild Nordstrand, 29-30/6 11 Anholt (JDJ), 15/9 18 N + 4 SØ Kysing Næs (HP).

Desuden 23 iagttagelser af 68 individer på en lang række kystlokaliteter. Arten er totalindsamlingsart 1984 + 1985.

Alkefugle (Alcidae)

Også i år rummer denne rubrik både ubestemte alkefugle og fugle bestemt til Alk/Lomvie, men jeg opfordrer stadig til, at man adskiller disse.

Kysing Næs (157 ex): 3/1 53 trk, 15/9 4 S, 11/10 1 S + 1 rst, 20/10 7 N + 28 S, 21/10 21, 10/12 42 (LB, BHJ, HLL, FL, HP).

Sletterhage (239 ex): 13/10 1, 14/10 76, 15/10 1, 16/10 14, 17/10 21 S + 4 N + 18/10 15 S, 10/10 106 S + 1 N (JTL).

Fornæs (min 4817): 17/10 8 trk, 27/10 1047 N + 2576 S, 28/10 112 N + 7 S, 4/11 274 N + 218 S, 11/11 min 500 trk, 18/11 12, 1/12 19 N + 14 S, 30/12 30 i flok (TB, ØBF, SH, BHJ, PH, HLL, JP, HP).

Øvrige (55 ex): 2/1 5 NØ for Samsø (LB), 7/3 1 Ebeltoft-Odden (NÅ), 7/3 1 rst Århus Østhavn (MCR), 9/3 2 Vejro (TB), 21/10 min 30 Grenå-Varberg (PH), 4/11 13 Gjerrild Nordstrand (JP), 10/11 3 N Risskov (HLL, HP), 24/11 8 Århus-Kalundborg (NÅ).

Alk (Alca torda)

Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (okt - maj).

14 iagttagelser af 318 artsbestemte Alke.

Kysing Næs: 3/1 9 trk, 11/10 1 S, 20/10 1 N + 5 S, 21/10 12 trk (LB, FL, HLL, HP).

Fornæs: 17/10 2 trk, 27/10 71 N + 31 S + 1 rst, 4/11 25 N + 90 S + 8 rst, 11/11 17 S, 1/12 2 S (ØBF, BHJ, HLL, HP, LTP, NÅ).

Øvrige: 14/1 2 S + 1 V Århus-Kalundborg (JFT), 27/5 31 kredsede - S Løgten Bugt (ET), 14/10 1 Sletterhage (JTL), 20/11 7 + 23/11 1 Øster Hedekrog, Samsø (SD).

Søkonge (Alle alle)

Fåtallig efterårsgæst (okt) nov - dec.

1984 var invasionsår for arten, således blev der 6/11 iagttaget 517 på 6 timer på Skagen, hvilket passer fint med vores iagttagelser fra 8/11 og frem. Oktober-iagttagelsen må tages som et forvarsel for invasionen.

14/10 1 NNV Sletterhage Fyr (JTL).

Risskov Badeanstalt: 7/11 2 (Henrik Brandt), 8/11 2-3 (nogen uenighed) (NÅ, BHJ, FL, HLL, OGJ, H+JE), 9/11 2 (PNN, BHJ, HLL) og 10/11 2 (LB).

Øvrige: 10/11 1 Kysing Næs (OGJ), 11/11 1 S Fornæs (ØBF), 16/11 1 Århus Østhavn (Lars Witting), 20/11 2 ØSØ Østre Hedekrog, Samsø (SD), 20/11 - 1/12 1 rst Skødshoved Lystbådehavn (JTL), 25/12 1 S + 1 S - rst - S Fornæs (HC).
Desuden: 10. eller 11/11 1 Begtrup Vig (meddelt BHJ), en dag med 8 trk Fornæs (FUGLE), og 7 indleveret på Vildtbiologisk Station Kalø, pr. 25/11 (N. E. Franzmann).

Lomvie (*Uria aalge*)

Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (okt - marts/april).

14 iagttagelser af 317 artsbestemte Lomvier. Det kunne tyde på, at Alk og Lomvie var lige almindelige.

Kysing Næs: 20/10 1 S + 2 rst, 21/10 2 (HLL, HP).

Fornæs: 17/10 2 trk, 27/10 1 N + 8 S + 3 rst, 28/10 1 rst, 4/11 5 S + 3 rst, 11/11 261 S, 1/12 4 S (TB, ØBF, BHJ, HLL, HP, LTP, NÅ).

Øvrige: 2/1 1 Vejre (LB), 16/10 14 Sletterhage (JTL), 20/10 1 rst Issehoved (SD), 21/10 3 Grenå-Varberg (PH), 17/11 3 S + 1 rst ud for Samsø (SD), 23/12 1 død Århus Havn (JTL).

Tejst (*Cephus grylle*)

Fåtalig ynglestrejffugl samt fåtalig træk- og vintergæst.

Ynglefund: Tunø min 10 par, Anholt 0-1 par.

Tunø: 18/4 10, 19/5 25-30, 15-16/6 23, 17/6 1 (Tunø-Hov) (JB, BHJ, PM, JCN).

Anholt Havn: 2/5 1 par, 6/9 1 ungfugl (HE, Olle Hemdorff).

Vejre: 26/2 1, 9/3 4, 7/7 1 (TB, ET).

Fornæs: 16-22/4 i alt 15 trk Gjerrild-Fornæs, 17/10 2, 27/10 2 N, 11/11 3 S, 1/12 2 S (HC, ØBF, EH, PH, BHJ, HLL, HP, LTP).

Øvrige: 8/6 1 Selvig (TBr), 5-7/8 1 juv Tangkrogen (NÅ), 24/9 1 juv rst Kysing Næs (HLL), 14/10 2 og 15/10 1 Sletterhage (JTL), 16/10 1 Issehoved (LeB), 21/10 1 S Kysing Næs (FL).

Lunde (*Fratercula arctica*)

Meget sjælden trækgæst.

Fornæs: 20/4 1 S (HC, EH), 27/10 1 N (HLL, HP).

Huldue (*Columba oenas*)

Fåtalig yngltrækfugl (18-21 par indsendt). Ret almindelig træk-gæst (marts - april og aug - okt).

JT anslår amsbestanden til 90 par i 1984. Meget få obs fra efterårstrækket.

Første og sidste: 5/3 5 N Moesgård (Moes) og 15/10 1 Sletterhage (JTL).

Ynglelokaliteter:

Brattingborg Skov, Bistrup Skov, Østrestenhule Skov, Silkeborg Sønderskov, - Vesterskov, - Nordskov, Fløjstrup Skov, Moesgård Skov, - Park, Constantinsborg Skov, Høskoven ved Viby, Søsken Brabrand Sø, Forsthaven Århus, Tolløkke Skov, Gjerrild Nederskov og - Overskov (TB, LB, PC, HCh, PH, AJ, JCN, og især JTL).

Yngleperioden i øvrigt:

24/4 h Torvesø, Funderholme (JCN), 19/5 2 Vesborg, Samsø (LeB), 28/5 1 og 10/6 2 Volstrup Mose, 10/6 2 Fussing (TBr) og 27/7 1 Auning Kær (JTL).

Trækperioden (ynglefuglene undtaget):

Moesgård: 5/3 - 23/4 95 trk (Moes, MCR, PH, H+JE, FL, LB).

Gjerrild: 16-23/4 i alt 124 trk (HC, EH, ØBF).

Fornæs: 2/4 8 trk, 7/4 5 rst, 29/4 1 (ET, TB, LB, HLL).

Risskov: 30/3 2 trk, 31/3 4 trk, 8/4 4 trk (HLL).

Øvrige: 21/3 2 N Strandkær, Mols (PNN), 17/9 1 V Højris Bøge, Ry (LM), 29/9 2 Gylling Næs (H+JE) og 14/10 1 + 15/10 1 Sletterhage Fyr (JTL).

Ringdue (*Columba palumbus*)

Sandsynligvis almindelig ynglefugl. Meget almindelig træk- og vintergæst.

Invasionsagtig optræden i årets første måneder, flittigt indrapporteret: 63 iagttagelser af knapt 40.000 individer (med et vist hensyn til gengangere). Man kan forestille sig, at den øgede dyrkning af ærter har indflydelse, men også den hårde vinter kan have presset især svenske fugle herved. På grund af det store antal iagttagelser nævnes kun antal over 500:

1/1 500 + 7/1 2000 + 9/1 3000 + 23/1 2000 Pinds Mølle (ET), 26/1 2200 N Risskov (HLL), 12/2 800 Smørmosen (SH), 12/2 5-10.000 Brattingsborg (LeB), 29/3 550 Brabrand Sø (PNN), 8/4 675 N Risskov (HLL). 16-22/4 14.997 trk (max 19/4 4471) Norddjursland (HC, EH).

Turteldue (*Streptopelia turtur*)

Sjælden gæst.

De mange iagttagelser i 1980 og 1982 skyldes yngel eller -forsøg.

To iagttagelser: 17/6 kl. 12.00 1 S Kysing Fjord (H+JE) og 2/8 2 Saksild-Dyngby (Wolfgang Lübcke til H+JE).

Turteldue i Århus amt:

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
0	0	1	7	3	6	2

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*)

Blev sidst på året iagttaget i stort antal på Århus Havn.

16/11 150 (Korn og Foderstof) (Lars Witting), 8/12 88 og 24/12 98 (JTL).

Skoggerdue (*Streptopelia risoria*)

Denne art, der ligner en lille cremefarvet Tyrkerdue, undslipper ofte fra fangenskab.

Skanseparken Århus: 27/1 1, 3-4/2 1 (NÅ).

Gøg (*Cuculus canorus*)

De 5 første:

28/4 1 h Skaføgård (JTL), 4/5 Langå (TBP), 5/5 1 Hinnerup (PN) + 1 Kongslund (JP) og 6/5 1 Gjerrild Nordstrand (LB).

Den sidste:

12/7 1 Hesselholm, Samsø (LeB).

I øvrigt:

En større koncentration fra Lilleå, Haarvadbros 30/6 8 inden for 100 meter (SMJ).

Slørugle (*Tyto alba*)

Meget sjælden yngle- og strejffugl.

1 par på en lokalitet samt en enlig fugl på en anden lokalitet i Århus amt, iflg. JTL.

Kirkeugle (*Athene noctua*)

Fåtallig ynglestand- og -strejffugl, 13 par indberettede.

Ynglefund (med antal par):

Borum 1, Lyngby 1, omkring Randers 8 (JTL), Grund Fjord 1 (FFa).

Alle andre enkeltobs nævnes:

Lyngby: 18/2 1, 20/3 2, 31/3 1, 14/4 1, 6/10 1 (LB, PH, OGJ, H+JE).

Øvrige: 21/3 1 Grimhøjvej, Brabrand (JFT), 23/4 1 Tranbjerg, 21/9 1 h Malling (OGJ) og 28/10 1 Sabro Korsvej (JTL).

Natugle (*Strix aluco*)

Fåtallig ynglestand- og -strejffugl.

Sikre og sandsynlige ynglefund:

Silkeborg Vesterskov 1, Pindsmølle 1, Forsthaven, Århus 1, Moesgård Skov 2, Haar Skov 1, Nørre Riis 1, Borum Mose 1, Brabrand Sø 3-4, Langå 1, Thorsager Plantage 1, Funder 1, Stenvadhede 1, Skaføgård 2 (JTL, BHJ, ET, JT, TBP, SMJ).

Skovhornugle (*Asio otus*)

Sjælden ynglefugl. Sjælden forårgæst (april - maj) og sjælden efterårgæst (aug - dec).

Ynglefund:

22/7 1 ad med 1 unge Mårup Plantage, Samsø (JTL), 5-8/6 3 pulli skrigende Strandkær Mols (PNN). Desuden 1 par med 3 unger ved Ebeltoft (JTL).

Øvrige:

21/1 1 Langballe Mårslet (BHJ, FL, NGA, PH), 6/4 1 Kongslund (JP), 16-22/4 i alt 3 Norddjursland (HC, EH), 3/5 + 28/5 1 Kongslund, Randers (JP), 14/5 1 Brabrand Sø (PH), 8/6 1-2 Hesselholm (LeB), 18/8 1 død Øer (JTL) og 1/12 1 Brabrand Sø (OGJ)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Muligvis meget sjælden ynglefugl, i øvrigt sjælden træk- og vingergæst (okt - april). Sjælden og uregelmæssig sommergæst.

Kun 6 iagttagelser i år og ingen fra vintertiden. Faktisk var arten mest sommergæst i år.

Sommer:

26/5 1 moppet af 150 Stære Hattemager Mose (SMJ), 11+18/6 1 Mossø (BRS) og 13/8 1 Store Troldhøj (BRS).

Træk:

22/4 1 NØ Gjerrild Nordstrand (HC, EH) og 15/10 1 nord for Amstrup (PH).

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst (aug).

Meget usædvanligt med de manglende maj/juni-obs.

3/8 1 jagende 21.45 Kysing Fjord (OGJ, H+JE) og 11/8 1 Grenå Plantage (JNK).

Mursejler (Apus apus)

Ankom til normal tid, men hele 4 oktober-iagttagelser må betegnes som ret usædvanligt.

De første:

5/5 2 Brabrand Sø (BHJ) og 1 N Vrold (GG).

De sidste:

3/10 1 S Kysing Fjord (LB), 5/10 14.45 1 N Århus Forbrændingsanlæg (AJ), 15/10 1 Sletterhage (JTL) og 20/10 1 Kysing Næs (OGJ, HP).

I øvrigt:

17-27/6 yngleforsøg i redekasse, Silkeborg (JCN) og største tal 12/5 ca 40 Brabrand Sø (PNN).

Alpesejler (Apus melba)

Se appendix I

Isfugl (Alcedo atthis)

Sjælden ynglestandfugl samt fåtallig træk- og vintergæst.

Pinds Mølleådal (1 ynglepar): 1/1 1-2 h, 2/1 1, 7/1 h, 6/3 1-2, 7/3 1, 12/5 1, 22/5 1, 18/6 2 ved redegul, 17/7 1 besøgte reden 4 x/time, 18/7 1 ved redegul, 26/7 1-2, 1/8 1, 13/8 1-2, 25/8 3, 26/8 2-3, 17/9 3, 27/10 1, 31/10 1, 19/11 1, 21/11 2, 25/11 2 (ET).

Fussing (0-1 par): 17/2 2 Vandmøllen, 17/3 2 søen, 8/4 1 Vandmøllen, 10/6 1 juv Vandmøllen, 18/8 1 Vandmøllen, 11/11 1 søen (TBr, LTP).

Øvrige (intet angivet = 1 individ): 7/1 Kongslund (JP), 8/1 Hinge Sø (ME), 16/2 1 ad Lilleå (Bidstrup - Esendrup) (BRS), 8-24/3 Malling Mose (OGJ), 17/3 Rye Mølle Sø, 31/3 3 Klostermølle (LM), 16/4 Mørke Kær (JTL), 20/4 2, 2K, Silkeborg Østerskov, Avnsøerne (BRS), 29/4 Birkhede (LM), 12/5 Gedde Sø, 23/5 Mørke Kær (JTL), 23+27/5 Funder Å (JCN), 4/6 Kolsø (TBr), 4/6 Skarbak Plantage (BRS), 12/6 Birkhede (LM), juni - juli Grund Fjord (meddelt FFa), 3/8 2 Lemming Dambrug (JTL), 21/8 Dronningborg Bredning (JTP), 26/8 Brabrand Sø (AJ), 15/9 Funderå + Tranevig (JCN), 16/9 Brabrand Sø (JTL), 22/9 Kristrup Enge (LTP), 21/11 Silkeborg Langsø (BRS) og 27/11 samme (ME).

Hærfugl (Apupa epops)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

11/4 kl. 10.40 1 V Lykkensdalvej, Brabrand (LB).

Grønspætte (Picus viridis)

Fåtallig ynglestand- og -strejffugl.

67 observationer af 90 individer. Øjensynlig atter i fremgang.

Ynglefund:

Floes Skov, Randers (FFa), Strandkær, Mols, min 2 par (PNN).

Mulige ynglelokaliteter (iagttaget 21/1 - 27/12):

Salten Langsø, Emborg Odde, Gudensø, Engvej S for Gl. Rye, Velling Skov, Funder Holme, Ørnsø, Købskoven Silkeborg, Birkhede, Tranevig, Silkeborg Vesterskov, Silkeborg Nordskov, Lindå Vesterskov, Pøt Sø, Veng Sø, Ajstrup Skov, Storskoven Moesgård, Moesgård Strand, Haraldslund, Skærsø Plantage, Helgenæs, Skødshovedgård, Skaføgård Skovsø, Ruggård Sønderskov, Gjerrild Skovene, Stenvad Hede, Smørmosen, Fussing Skov, Udbyhøj. (LB, TB, TBr, PB, HC, HCh, PC, FFa, EH, PH, OGJ, BHJ, SMJ, FL, HLL, PL, JTL, LM, PM, JCN, PNN, JP, MCR, ET, JFT, SFP)

I øvrigt siger HC, EH at der i Gjerrild Skovene er "flere end normalt".

Strejffere:

Silkeborg: 15/6 1 myrejagt på fortov, 5/9 1 hoppede på P-plads (JCN).

Risskov: 30/7, 10/8, 24/8, 21/9, 24/9 alle 1 (HLL).

Lykkensdalvej, Brabrand: 22/4 1 (LB).

Naturhistorisk Museum, Århus: 10/10 1 (BHJ) og

Kysing Fjord: 23/9 1 (OGJ).

Sortspætte (Dryocopus martius)

Fåtallig ynglestandfugl og strejffugl. 16-18 par samt muligvis sjælden trækgæst.

46 iagttagelser.

Ynglefund (med antal par):

Silkeborg Vesterskov 2, Silkeborg Nordskov 2, Silkeborg Sønderskov 1, Ry Nørreskov 1-2, Ry Sønderskov 1, Nygårde Skov 1, Lindå Vesterskov 1, Hemstok Skov 1, Bidstrup Skov 1, Højkol Skov 1, Bidstrup Skov 1, Løndal Skov 1, Velling Skov 1-2, Ormstrup Skov 1, Fussing Skov 1 (JB, LB, ØBF, PM, LM, JP, PER og især JCN, HCh og BRS).

Øvrige obs:

Tørvessø, Funderholme 4/2 h, 18/3 h, 1/4 4 huller (JCN).

Gjerrild Nordstrand: 19-20/4 1-2 (HC, EH).

Gludsted Plantage: ca. 20/9 1 (meddelt HCh).

Vendehals (*Jynx torquilla*)

Meget sjælden forårgæst (ult april - ult maj).

Der var meget få Vendehalse i hele landet i 1984.

7/5 1 Fuglesangsalle, Århus (TB) og 13/5 1 sy Mindeparken, Århus (NÅ).

Toplærke (*Galerida cristata*)

Fåtallig ynglestandfugl. Kun truffet i Århus- og Randersområderne. Fra Silkeborg foreligger en negativ indberetning (ME).

Formodede ynglepar i Århus-området:

1 Århus Havn (NÅ), 1 Bilka, Tilst (SMH, SH), 1 Veri-centret, Risskov (PC, FF, PNN), 1 Viborgvej/Hasle Ringvej (LB), 1 Rosenhøjcentret (PH, BHJ), 1 Tranbjerg-centret (BHJ, OGJ, H+JE).

Enkeltagtagelser i Randers-området:

18/7 1 Krstrup (LTP), 25/6 3 Randersbrog (JP).

Hedelærke (*Lullula arborea*)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl. Fåtallig trækgæst (marts - ult april og sept/nov).

I yngletiden:

19/5 1 Brattingsbrog (LeB), 27/5 1 sy Vrold (GG), 2/6 1 sy Additsøerne/Salten Langsø (ØBF), 15/6 1 sy Skærsø Plantage (FF).

I traktiden:

Moesgård: 14/3 1 NV, 31/3 1 N, 2/4 2 N, 8/4 1 N, 15/4 1 N, 17/4 1 N (Moes, MCR, FL).
Øvrige: 16-22/4 10 trk NØ-Djursland (max 19/4 5 trk) (HC, EH), 23/9 1 h Ansø Enge (TB), 25/10 3 og 16/10 1 Sletterhage (JTL), 28/10 1 Løvenholm Skov (TB), 23/11 1 Issehoved (SD).

Sanglærke (*Alanda arvensis*)

Formentlig almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst. Ses året rundt.

Største træktal:

12/2 55 Norsminde Fjord (JFT), 4/3 200 Århus Havn (H+JE), 6/3 ca 100 N og 7/3 110 N Strandkær (PNN), 17/3 ca. 100 Brabrand Sø (PNN), 13/10 360 Romalt Bakker (LTP).

Moesgård: perioden 12/2 - 16/5 i alt 2676 trk, max 13/3 674 NNØ (Moes).

Januar + december:

14/1 8 Kulhavnen (PNN), 18/1 8 Brabrand Sø (HLL), 13/2 1 V Brabrand Sø (LB), 16/12 4 og 21/12 6 Århus Østhavn (JFT), 21/12 1 trk Risskov (HLL), 26/12 5 Norsminde Fjord (SH).

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*)

Meget sjælden trækgæst (april og oktober).

6/4 2 Grenå Hede (JNK), 20-22/10 1 Århus Havn (PH, NÅ, OGJ).

Siden 1982 set hvert år på Århus Havn i oktober.

Ubestemt svale (*Hirundinidae*)

Store træktal af de 3 almindelige svalearter fra Kragemosen, Samsø.

18/5 1000-1200 (AJ) og 20/5 "tusindvis" (ØBF).

Landsvale (*Hirundo rustica*)

Formodentlig almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst (med april - ult okt).

Mange obs i april.

De første:

15/4 1 Odder (JWJ), 15/4 1 Langå (TBP), 17/4 ca 10 Ansø Dambrug og ca 8 Krude Mølle (JB), 19/4 2 Silkeborg Vesterskov (JCN), 19-22/4 9 trk NØ-Djursland (HC, EH), 20/4 1 Kragemosen (LeB), 20/4 2 Brabrand Sø (AJ) og 21/4 5 Brabrand Sø (LB).

De sidste:

20/10 1 rst Mårslet (BHJ), 22/10 1 Mårslet (FL), 27/10 1 Århus Havn (OGJ), 27/10 1 Kanehave, Samsø (LeB) og 28/10 2 juv Risskov (HLL).

Største tal i øvrigt:

6/5 190 Brabrand Sø, 2/8 400 og 12/8 100 Kysing Fjord (H+JE), 8/9 min. 900 Brabrand Sø (AJ).

Bysvale (*Delichon urbica*)

Sandsynligvis almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst (ult april - med sept).

De første:

19/4 1 trk Gjerrild (HC, EH), 29/4 1 N Moesgård (Moes), 2/5 1 Langå (TBP), 4/5 1 Strandkær (PNN), 5/5 1 Kongslund (JP) og 6 Haraldslund (SMJ), 6/5 3 Brabrand Sø (AJ).

De sidste:

8/9 1 Hesselholm (LeB) og min 100 Brabrand Sø (AJ), 9/9 10 Kongslund/Gudenåen (JP).

Digesvale (*Riparia riparia*)

Formodentlig almindelig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst (ult april - ult sept).

Ingen kolonier er optalt i år.

Alle april-obs nævnes:

20/4 4 Brabrand Sø (AJ), 21/4 1 Brabrand Sø (LB) og 1 Hesselholm (LeB), 23/4 1 Brabrand Sø (PNN), 25/4 2 Hinnerup (PN), 29/4 1 Langå (TBP).

De sidste:

8/9 1 Brabrand Sø (AJ), 9/9 20 Kongslund (JP), 22/9 8 Krstrup Enge (LTP), og en meget sen 19/10 1 Brabrand Sø (MCR).

Øvrige:

12/8 1500 rst Kare Holm (TB).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Meget sjælden yngletrækfugl og sjælden trækgest.

Alle iagttagelser nævnes:

26/5 2-3 hanner + 2 hunner Tølløkke Skov (TB), 27/5 1 sy Forstbotanisk Have (NÅ), Søby Fredskov: 26/5 2 hanner + 1 hun (OGJ), 16/6 1 par (BHJ), 20/6 1 par (FL).

I Søby Fredskov er der sandsynligvis tale om et ynglepar.

Ravn (*Corvus corax*)

Sjælden - fåtallig ynglestandfugl. Strejfer omkring uden for yngletiden.

Sikre ynglepar:

1 Kollskov (ET), 2 Hinnerup (SMJ), 1 Fussingø Skov (PER), 1 Haraldslund Skov (PN).

Formodede ynglepar:

1 Skaføgård (ET), 1 Fløjstrup Skov (LB, TB), 1 Silkeborg Sønderskov (BRS), 1 Rath Skov (JP).

Desuden 48 iagttagelser af 1-2 strejfende fra hele amtet.

Træk:

4/10 8 + 2 SV Emborg Odde (LM), 8/4 1 NV Brabrand Sø (JTL), 25/4 6 N og 5/5 1 N Moesgård (Moes).

Sortkrage (*Corvus corone corone*)

Fåtallig trækgest og meget sjælden vintergæst. Ingen sommeriagttagelser.

15 fugle er set. Alle nævnes.

2/1 1 Århus Østhavn (MCR), 29/2 1 Århus Havn (NÅ), 13/3 1 S og 31/3 2 N Moesgård (Moes), 22/4 3 Anholt (SØRAVNEN/DOF), 16/9 1 Brabrand (LB), 14/10 1 Maden, Samsø (LeB), 15/10 2 Sletterhage (JTL), 26/10 1 Maden, Samsø (LeB), 4/11 1 Norsminde Fjord (PL), 17/11 1 Maden, Samsø (SD).

Gråkrage (*Corvus corone cornix*)

Kun et meget beskedent materiale indsendt. Af dette nævnes:

Træktal:

18/2 - 7/5 1594 trk (max 8/4 582 N) Moesgård (Moes), 8/4 600 trk Risskov (HLL),
16/10 98 V Sletterhage (JTL).

Råge (*Corvus frugilegus*)

Ret almindelig - almindelig ynglestandfugl. Trækgæst.

Kun få kolonier optalt.

10-15 par Slotsholmen, Silkeborg Langsø (JCN), 75 par Tingskoven (BHJ), 187 par
Grønlykke Alle, Tranbjerg (BHJ), 306 par Bolskov, Solbjerg Sø (BHJ).

Træk:

23/3 - 26/5 104 trk (max 11/4 21 N) Moesgård (Moes).

Allike (*Corvus monedula*)

Almindelig ynglestandfugl samt almindelig træk- og vintergæst.

Af det sparsomme materiale skal nævnes:

24/2 - 1/6 1806 trk (max 8/4 361) Moesgård (Moes), 6/3 420 trk Kysing Næs (HLL),
1/4 min 260 og 7/4 min 200 Brabrand Sø (AJ), 26/10 100 rst Dørup (heraf 1 individ
med lys krave) (ET), 27/10 ca. 400 rst Hesselholm Made (LeB),

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*)

Meget sjælden - sjælden efterårstrækgæst (vintergæst?).

2/9 - 3/10 min 2 Sejs (PB), 16/10 2 og 20/10 1 Silkeborg (JCN).

Siden 1978 (-1982) er enkelte individer set om efteråret, vinteren og foråret
hovedsagelig i Silkeborg-området.

Topmejse (*Parus cristatus*)

Formodentlig ret almindelig ynglestandfugl.

Ses jævnt fordelt over hele amtet.

Få ynglefund:

12/6 1 par + 3-4 juv Skærsø Plantage (FF), 3-4 ynglepar Strandkær (PNN).

Er totalindsamlingsart i 1984 + 1985.

Halemejse (*Aegithalos caudatus*)

Formentlig fåtallig - ret almindelig ynglestandfugl.

Strejfer rundt i flokke på op til 25 uden for yngletiden.

Formodede og konstaterede ynglepar:

1 Lyngbygård Å (NÅ), 1 Forstbotanisk Have (NÅ, PH), 1 Hattemager (SMJ), 1 Narring Vesterskov (SMJ), 1 Rathlousdal, Odder (PC), 1 Haderup Skov (DLJ), 4-5 Pinds Mølle + Jeksendalen (ET), 1 Moesgård (ET, Moes), 1 Dystrup-Ramten Sø (ET), 1 Brabrand Sø (H+JE, PNN, AJ), 1 Auning Kær (H+JE), 1 Vorup, Randers (LTP), 4 Molslaboratoriet (PNN), 1 Salten Langsø (JTL), 1 Rosenholm Slotspark (JTL), 1-2 Smørmosen (JTL).

Flokke på 10 individer og derover:

4/1 ca 20 Brabrand Sø (PNN), 15/1 20 Haderup Skov (DLJ), 9/2 20-25 Forsthaven (MCR), 12/2 15-20 Salten Langsø (JCN), 26/2 15 Haderup Skov (DLJ), 20/3 10 Haderup Skov (DLJ), 19/4 16 trk Gjerrild (HC, EH), 23/9 15 Veng Skov (LB), 2/11 10 Brabrand (LB).

Pungmejse (*Remiz pendulinus*)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl (med april - sept).

Arten fortsætter tilsyneladende sin fremgang.

Der er konstateret 4-8 ynglepar i amtet. 3-6 par har fået unger på vingerne.

Usikkerheden skyldes hemmeligholdelse af 4-5 lokaliteter. Redebygning er yderligere iagttaget på 3 lokaliteter.

Ynglepar:

1 Kasted Mose (SH), 1 Bjerregrav Mose (TBr, JTL, JP), min 1 Mørke Kær (HP), 1 Brabrand Sø (JTL, meddelt HP), 1 på hemmeligholdt lokalitet (PNN), min 3 på hemmeligholdte lokaliteter (HP).

Øvrige:

19/5 1 han redebyggende Hornslet Mose (JTL), 1 rede Kongslund (JP), 28/5 1 rede S for Auning Kær (JTL).

Brabrand Sø: 22/4 1 AJ, 9/6 1 (AJ).

Mørke Kær: 21/4 3 (BHJ), 29/4 3-4 (JTL), 19/5 3 (Søren Skriver), 21/5 1 (OGJ, NÅ).

Bjerregrav Mose: 3/6 1 (JP), 11/6 3 (TBr).

Korttået Træløber (Certhia brachydactyla)

Meget sjælden ynglestandfugl.

Stationær i Moesgård Slotspark siden 1982.

Alle obs:

7/1 1 Moesgård (OGJ), 1/4 1 Moesgård (H+JE), 31/10 1 set og hørt Vilhelmsborg (BHJ).

Vandstær (Cinclus cinclus)

Fåtalig træk- og vintergæst (ult okt - pr april).

Ca 41 fugle spredt ud over amtet ÷ Djursland.

Forårets sidste:

1/4 1 Pinds Mølle + 1 Kollens Mølle + 1 Fusvad (ET), 4/4 1 Millingebæk, Silkeborg Sønderkov (BRS).

Efterårets første:

27/10 1 Vilhelmsborg (FL, BHJ), 28/10 1 Nye bro, Salten Å (LM), 28/10 Klostermølle (LM).

Største tal:

14/1 5 Jeksendalen (PL), 29/12 7 Lystrup Å - Salten Å (JB).

Misteldrossel (Tardus viscivorus)

Fåtalig - ret almindelig yngletrækfugl (ult feb - med nov), ret almindelig træk-gæst og sjælden vintergæst.

I yngletiden:

Mange iagttagelser af par eller syngende fugle fra det midtjyske område. Derudover skal nævnes:

6/5 2 Anholt (HE), 28/4 3 Brattingsborg Skov (PC), 7/5 1 sy Bidstrup Skov (TBP), 12/5 3 Søby Fredskov (LB), 19/5 1 sy Skaføgård Sø (HP), 19/5 4 sy Rosenholm Skov (JTL), 27/6 1-2 Kastbjerg Ådal (TB), 30/7 1 Stubbe Sø (JTL), min 2 ynglepar Strandkær (PNN), 23/8 1 Stenvad Hede (BHJ), 1-2 par Skaføgård Skov (JTL), 1 par Thorsager Plantage (JTL), 5 par Sandmark Skov (JTL), 2 sy Hedeskov N for Thorsager (JTL).

I traktiden:

ca. 220 individer indrapporteret fra hele amtet.

Første: 25/2 2 Moesgård (H+JE)

Største traktal: 16-22/4 42 trk NØ-Djursland (HC, EH), 2/4 13 trk + 1 rst Fornæs (HLL), 13/3 - 15/4 37 (max 14/4 13 N) Moesgård (Moes).

Vinterforekomster:

22/1 1 Salten Langsø (PH), 25/1 1 Mindeparken, Århus (FF).

Sjagger (Turdus pilaris)

Sjælden ynglestandfugl eller yngletrækfugl. Almindelig træk- og vintergæst (pr sept - pr maj).

Der foreligger et ynglefund:

20-21/8 1 par + 6 juv Molslaboratoriet (PC, PNN)

Øvrige iagttagelser i yngletiden:

6/5 1 Funderholme (JCN), 11/5 1 Sepstrup Krat (JCN), 18/5 1 Stavns Fjord (AJ), 19/5 - 5/6 1-2 Hesselholm, Samsø (LeB), 20/5 1 Mariendal (JDJ), 21/8 20 Strandkær (PNN), 21/8 2 Brabrand Sø (HLL).

Træk- og vinterforekomster, flokke på 300 og derover nævnes:

2/1 600-700 NØ Mårslet (BHJ), 3/1 350 Mårslet (BHJ), 18/1 2500 - 3000 Kommunespi-

talet, Århus (PNN), 23/1 2450 Brabrand Sø (HLL), 12/4 300 - 400 Gjessø (JCN),
16-22/4 984 trk NØ-Djursland (HC, EH), 22/10 300 S Søften (SMJ), 19/11 350 Dørup
(ET), 21/11 400 S Pinds Mølle (ET).

Sangdrossel (Turdus philomelos)

Formodentlig almindelig yngletrækfugl og trækgæst (med marts - ult okt). Meget
sjælden vintergæst.

Første: 25/3 1 sy Ryhus, Ry (LM).

Sidste: 30/10 1 Gudenåen (LTP).

Vinterforekomster: 26/2 1 Tomsbjerg/Hadstrup Skov (DLJ), 10/12 1 Universitetsparken (NÅ).

Vindrossel (Turdus iliacus)

Almindelig træk- og vintergæst (ult sept - ult apr).

Flokke på 50 og derover:

4/1 50 Skanseparken (NÅ), 5/1 200 Botanisk Have (NÅ), 16-22/4 108 trk NØ-Djursland
(HC, EH), 19/4 50 Tebbestrup (LTP), 24/10 85 Emborg Odde (LM), 25/10 52 Brabrand
Sø (LB), 28/10 85 Brabrand Sø (AJ), 31/10 60 Vorup, Randers (LTP), 21/11 120
Pinds Mølle (ET), 25/11 100 Pinds Mølle (ET), 4/12 50 Pinds Mølle (ET).

Sang-/Vindrossel (Turdus philomenos/iliacus)

8/4 89 N Moesgård (Moes).

Ringdrossel (Turdus torquatus)

Fåtalig - formentlig ret almindelig forårstrækgæst (med april - pr maj) og meget
sjælden efterårstrækgæst (sept - okt).

Forår:

Kulgård + Åby Øst Rensningsanlæg: 22/4 2 hanner + 3 hunner (PNN), 23/4 1 han (PNN),
26/4 1 han (PNN).

Hesselholm: 18/4 2 (LeB), 19/4 2 (LeB, SD), 21/4 2 (LeB, SD), 22/4 1 (SD), 27/4 1 (LeB).

Anholt: 18-22/4 ca 10 (HP m.fl.), 19/4 4 (DOF), 24/4 1 han (HE) og 1/5 1 hun (HE).

Øvrige: 14/4 1 Grund Fjord (FFa), 16-22/4 55 trk (max 19/4 24) NØ-Djursland (HC, EH), 19/4 2 Bønnerup (PM), 22/4 1 Tranevig (JCN), 25/4 1 han Gjerrild (IHO).

Efterår:

12/9 1 hun rst Moesgård (JTL).

Stendrossel (*Monticola saxatilis*)

Meget sjælden, sporadisk gæst.

5/5 1 hun Anholt (HE m.fl.).

Forekomsten er godkendt af Sjældenhedsudvalget.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*)

Fåtalig - ret almindelig yngletrækfugl (med april - pr okt) og formentlig ret almindelig trækgæst (med april - med maj) og (med aug - pr okt).

Forårstrækket startede lidt senere end normalt.

Første: 16-22/4 i alt 9 trk og rastende Gjerrild (HC, EH) endvidere 29/4 3 Århus Østhavn (LB) og samme dag 1 Fornæs (JP) og 30/4 2 Århus Havn (NÅ).

Ingen store rasttal.

Efteråret:

Sidste: 9/9 2 Hesselholm (LeB) og 15-16/9 1 rst Hesselholm (SD) afsluttende med 7/10 1 Lilleåen, Hinnerup (PN).

21/10 er der set et eksemplar af Grønlandsk Stenpikker (*O.o.leucorrhoa*) på Århus Havn (NÅ).

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*)

Meget sjælden trækgæst, men ses dog næsten hvert år.

En enkelt obs:

5/5 1 han Skarbak plantage i et krat ved Kolsø's nordlige del (BRS) - er så sent, at man gerne må få mistanke om yngel!

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*)

Sjælden yngletrækfugl og fåtallig - ret almindelig trækgæst (ult april - pr juni og ult aug - ult sept).

Ynglepar:

1 par Kasted Mose (SH) og 4 par Lille/Haarvadsbro (SMJ).

Træk:

Første obs 4/5 3 Solbjerg Sø (FL, BHJ) og 6/5 7 Gjerrild Nordstrand (LB) og samme dag 1 par Salten (JCN).

Efterår:

Sidste obs 20/9 1 rst Dørup, Hørning (ET).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl og ret almindelig forårstrækgæst (ult april - maj og aug - sept).

Ynglepar:

1 Fuglslev (DLJ), 1 par Molslaboratoriets gård (PNN) samt 1 par Norringure (SMJ) - der er helt sikkert mange flere!

Forårstræk:

Første 17/4 1 Gjerrild (EH, HC) og 22/4 1 han sy Rugård på Djursland (PC) + 1 han Hesselholm (SD, LeB) + 1 Brabrand Sø (AJ) og 1 han Kulgård/Åby Øst renseri (PNN).

Og sidste 1/9, 5/9, 13/9 og 22/9 1 Brabrand (LB).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*)

Fåtallig yngletrækfugl og trækgæst (pr april - okt).

Yngel:

Der er bl.a. indrapporteret et redefund ved Børglumkollegiet (PC). Uden for Stor-Århus er der meldt formodede ynglepar på Ry Helsekost (!) (LM), Karsangervej i Langå (TBP) og Kongslund i Randers (JP).

Første:

15/4 1 Odder Træløst (JWJ) og 18/4 1 rst Gjerrild (HC, EH).

Efterår; alle obs efter 20/8 nævnes:

26/8 2 juv Århus Havn (NÅ), 25-27/9 1 sy Holme Træløst (BHJ), 6/10 1 han Århus Østhavn (PH) og 22/10 1 Århus Havn (OGJ).

Nattergal (*Luscinia luscinia*)

Fåtalig - ret almindelig yngltrækfugl (pr maj - ult jun).

Første:

12/5 1 sy Brabrand Sø (PNN) og de efterfølgende 4 dage også Kongslund Bjerregrav Mose, Hattemager og Funderholme (JP, ET, OGJ, SMJ, ET, TBP, NÅ, JCN).

De største ansamlinger i Mørke Kær 10 sy (NÅ), Ørting Mose 20 sy (HP), Bjerregrav Mose 30 sy (GG, HP) og Kasted Mose 15 sy (SH).

Sidste:

16/6 4 Kongslund (JP).

Blåhals (*Luscinia svecica*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækfugl.

Eneste observation:

22/4 1 rst efter indtræk Fornæs (HC, EH), hvilket er tidligt.

Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Sjælden yngltrækfugl og sjælden/fåtalig forårstrækfugl (pr maj - pr juni - enkelte senere).

Første:

3/5 1 Kongslund (JP) og sidste 12/6 1 sy Knudsø (LM).

Er set eller hørt på følgende lokaliteter i maj og juni:

Kongslund, Kastbjerg Å, Brabrand Sø, Bjerregrav Mose, Lilleåen i Hinnerup, Knudse, Gudenåen ved Randers, Lindholm Hoved, Dagstrup Mose og Lading Sø (HE, LB, PH, ET, PN, JP, LM, GG, HP, LTP, BRS, TB, PNN, JTL, AJ)

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Ret almindelig yngltrækfugl og ret almindelig trækgæst.

Første:

30/4 1 sy Brabrand Sø (MCR) og 3/5 2 Kongslund (JP)

Afgang fra amtet:

4/8 1 Kongslund (JP) og langt senere 25/9 1 Kongslund (LTP).

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*)

Fåtallig (ret almindelig ?) yngltrækfugl og fåtallig (ret almindelig ?) trækgæst.

Ingen yngleobservationer, men 10/6 hørtes 40 synge i Bjerregrav Mose (GG, HP).

Første:

21/5 1 sy Funderholme (JCN).

Sidste:

16/6 4 Kongslund (JP).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fåtallig - ret almindelig yngltrækfugl og fåtallig trækgæst.

Ankomst:

27/4 1 Randers Bredningen, Gudenå (LTP) og 1/5 1 sy viadukten ved Ringvejen øst for Brabrand Sø (PNN).

Større antal:

13/5 7 sy Brabrand Sø (AJ, PH).

Senest set:

20/9 1 Dronningborg Bredning (LTP).

Gulbug (*Hippolais icterina*)

Ynglefugl og trækfugl (med maj - aug)

Første: 15/5 1 Langå (TBP) og 18/5 1 Besser (AJ).

Sidste: 17/6 1 sy ved Remstrup Å (JCN).

Munk (*Sylvia atricapilla*)

Yngletrækfugl og trækfugl (ult april - okt) og desuden sjælden vintergæst.

Første:

20/4 1 Vorup Randers (LTP) og i øvrigt er Munken iagttaget indtil 1. maj på flg. lokaliteter: Ravn Sø, Langå, Gudenåen, Forsthaven, Risskov, Brabrand Sø, Odder, Nr. Boulevard og Bakkestien begge Randers (LM, TBP, MCR, HLL, PL, PC, JP).

Sidste oktoberobs:

25/10 1 han Søften (SMJ) og 29/10 1 han Risskov (HLL).

Vinteriagttagelser:

1/1 til forår op til 2 hanner og 1 hun Holger Drachmannsvej i Århus ved foderbræt (H+JE), 26 + 28/1 + 4/2 1 han ved foderplads i Langå (TBP) og 5/12 1 han Dørup (ET).

Havesanger (*Sylvia borin*)

Yngletrækfugl og trækfugl (pr maj - ?)

Aprilobs:

29/4 1 Valløvej Randers (JP)

Og første måneden efter:

11/5 1 Rønbæksøen, Hinnerup (PN) og 13/5 2 sy Åby Øst Rens (PINN).

Sidste:

12/8 1 Valløvej Randers (JP).

Tornsanger (*Sylvia communis*)

Yngletrækfugl og trækgæst (pr maj - pr sept).

Første: 11/5 4 Astrup Mose (BHJ) og 1 h (JTL) + 2 (AJ) Brabrand Sø.

Sidste: 3/8 1 Hesselholm (LeB) og 26/8 1 Århus Havn (NÅ).

Gårdesanger (*Sylvia curruca*)

Yngletrækfugl og trækgæst (ult april - sept)

Ankomst til amtet:

23/4 1 sy Kulgård (PNN), 24/4 4 Hinnerup by 1 (FL), og 27/4 2 Valløvej i Randers (JP) + 2 sy ved Ravn Sø (LM) + 1 sy Egåen Lystrup (PC).

Og afgang:

2/8 1 Hesselholm (LeB).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Ynglefugl og almindelig trækgæst (ult april - okt)

Ankomst:

19/4 2 Bønnerup (PM) + 1 Gjerrild (HC, EH) og derefter 21/4 2 Kongslund (JP) + 1 Vorup Randers (LTP) + 2 sy Brabrand Sø (BHJ).

Sidste obs:

8/9 1 Brabrand Sø (AJ).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ankomst: 1/4 1 sy Brabrand Sø (AJ, PNN) + 2 Fløjstrup Skov (H+JE)

Afgang: 13/10 1 Kongslund (JP) og 24/10 Emborg Odde (LM)

Se også appendix I

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl og fåtallig forårstrækgæst (pr maj - pr juni)

Ynglefund:

3 par Molslaboratoriet (PNN) og sandsynlig yngel 15/6 1 sy Fløjstrup Skov (PH) og juli 3 sy Silkeborg (ME).

Første trækgæst:

5/5 1 sy Rugård Sønderkov (PNN) og 7/5 1 sy Vennelystparken Århus (NÅ).

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*)

Meget sjælden trækgæst.

To observationer af arten i 1984:

19/4 1 sy Gjerrild (HC, EH) og på optimal yngleplads er der 2/6 set 1 i Velling Skov (JTL).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*)

Yngletrækfugl og trækgæst (pr maj - aug/sept)

Ynglefugle:

Bl.a. 6-8 par set sommeren igennem i Ry og omegn bl.a. ved Ry Højskole og "Ryhus" (LM)

Træk:

Første: 4/5 1 sy Fløjstrup Skov (PH) og 6/5 1 Pinds Mølle (ET)

Sidste: 3/9 4-5 Pinds Mølle (ET) sluttende med 8/9 1 Brabrand Sø (AJ).

Broget Fluesnapper (*Muscicapa hypoleuca*)

Yngletrækfugl og trækgæst (ult april - sept)

Ynglefugle:

Bl.a. 1 par Mindeparken (PH) og 1 par 28/5 i kasse ved Femmøller (PNN).

Første træk:

19+21/4 1 han Bønnerup (PM) og legeledes 21/4 1 Gjerrild (HC, EH)

Sidste:

3/9 1 Pinds Mølle (ET) og 8/9 1 Brattingsborg (LeB).

Lille Fluesnapper (Muscicapa parva)

Sjælden forårstrækgæst (med maj - pr jun) og meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst

Alle obs nævnes:

31/5 1 hun/2K han Addithus Skov (BRS, HCh), 5/6 1 2K han sy Silkeborg Sønderskov ved Slænsø (BRS, HCh) og 6/9 1 hun Anholt (Olle Hemdorff).

Engpiber (Anthus pratensis)

Almindelig yngletrækfugl (marts - maj og sept - ult nov) og fåtallig vintergæst.

I alt 76 obs.

Ynglefund:

8/7 7-8 par, Århus Havn (NÅ)

Forårstræk; største antal:

13/3 - 17/5 i alt 246 Moesgård (Moes), 1/4 40 Kysing Fjord (H+JE) + max 50 Grund Fjord (FFa), 16-22/4 i alt 1283 Gjerrild, max 20/4 327 (HC, EH), 21/4 75 Gjerrild (BHH, HP, HLL) + min 50 Hesselholm (SD) + 42 Brabrand Sø (AJ), 22/4 55 Bjerregrav Mose, 24/4 40 Gudenå ved Randers (LTP) + 414 trk N. Gjerrild (IHO), 29/4 50 Fornæs (JP).

Efterår, få obs, største tal:

12/9 60 Moesgård (JTL), 16/9 73 Hesselholm (SD), 13-19/10 i alt 184, max 15/10 77 Sletterhage Fyr (JTL) og 27/10 36 Fornæs (HLL, HP).

Vinter:

I alt 17 obs, hvoraf de fleste under 10 fugle. Største: 26/1 41 Brabrand Sø (JTL), 28/1 10 Horskær (ØBF), 22/2 12 Brabrand Sø (HLL) og 18/12 12 Krstrup Enge (LTP),

Markpiber (Anthus campestris)

Meget sjælden yngletrækfugl og sjælden trækfugl (april - maj og aug - sept).

Som sædvanligt kun få obs:

19/4 1, 22/4 1 Gjerrild (HC, EH) og fra yngletiden: 16/7 1 Hesselholm, Samsø (LeB).

Desværre ingen obs fra Anholt.

Skovpiber (Anthus trivialis)

Formentlig almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst (med april - ult maj og pr aug - pr okt).

19 obs. Som sædvanligt få obs, men denne gang hele 2 fra efteråret.

Ynglefund:

10-12 par Molslaboratoriets areal (PNN).

Forår:

Første 16/4 1 Gjerrild (EH, HC), 22/4 1 N Moesgård (Moes) og 23/4 5 Grund Fjord (FFa). 16-22/4 i alt 155, max 19/4 72 trk Gjerrild (EH, HC) og 22/4 - 11/6 ialt 145 max 5/5 57 trk N Moesgård (Moes).

Efterår:

26/8 65 (mange ?), Brabrand Sø (AJ) og sidste 8/9 1 Brattingsborg (LeB).

Skærpiber (Anthus spinoletta littoralis)

Formentlig sjælden yngletrækfugl, der også træffes som fåtallig vinter- og trækgæst ved kysterne (ult feb - april og sept - nov).

I alt 29 obs, er noget flere end sædvanligt.

Ynglefund:

19/6 1 par, yngleuro + F.U. Ebeltoft Færgesø (FF) og 15/7 1 viste tydelig yngleuro, Langør, Samsø (JTL).

Forår:

6/3 1 Kysing Næs (HLL), 22/3 1 Norsminde Havn (NÅ), 30/3 1 N Moesgård (Moes) og 8/4 4 Fornæs (JP).

Efterår:

Første 29/9 2 Fornæs (TB). Desuden nævnes antal på min 3. 15/10 3 Hesselholm (LeB), 17/10 5 Fornæs (LTP), 21/10 3 Kysing Næs (HLL), 27/10 5 N + 45 S + 2 indtrk Fornæs (HLL, HP), 28/10 6 Overgård (JP), 4/11 3 S Fornæs (NÅ) og 11/11 3 fornæs (PH, BHJ).

Vinter:

8/1 1 Kulhavnen (PNN), 18/1 1 Tangkrogen, 9/2 2 Århus Havn (NÅ), 26/1 2 Risskov (HLL), 1/12 1 Fornæs (BHJ), 10/12 2 Kysing Næs (HLL) og 16/12 1-3 rst Århus Østhavn (JFT).

Hvid Vipstjert (Motacilla alba)

Almindelig yngletrækfugl og trækfugl (med marts - april og ult aug - nov).

I alt 91 obs.

Første obs, samtlige fra marts:

24/3 1 Hattemager (SMJ), 29/3 2 Bedervej (FL) + 1 Grønnegade, Århus (PC) + 2 N Moesgård (Moes), 30/3 2 Havnen, Silkeborg (JCN), 4 Dronningborg Bredning (LTP) og 31/3 1 "Ryhus", Ry (LM).

Forårstræk:

29/3 - 3/5 i alt 174 trk Moesgård (Moes) og 16-22/4 i alt 451 Gjerrild (EH, HC).

Efterårstræk:

25/8 ca 100 Sletterhage Fyr (JTL) og sidste 20/10 1 juv Issehoved og 20/11 1 juv Hesselholm (SD)

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)

Fåtalig yngletrækfugl (marts - april og aug - nov) og sjælden vintergæst.

89 obs er rekord for arten, der også har vist sig i større tal end vanligt ved trækstederne.

Ynglefund:

31/5 1 par fodrer juv Addit Skov (HCh), 16/6 1 ad + 3 juv Kollen Mølle (ET, LB, TB),
1 par Lemming Dambrug (JTL), 2 par Femmøller (PNN), 5/5 1 ynglepar Grundfør Mølle,
7/5 1 par med rede Rønbæksøen (SMJ), 11/6 1 par + 4 juv Bidstrup (TBr, BRS) og 1-2
par Fussingø (LTP, TBr, JT).

Forårstræk:

16/4 - 22/4 12 trk Gjerrild (EH, HC), 15/4 1 N Moesgård (H+JE), 10/4 1 S Moesgård
(NÅ) og 1/4 - 17/5 i alt 17 N, max 10/4 5 N Moesgård (Moes)

Efterårstræk:

3/10 1 S Skanseparken (NÅ) og 14/10 1 S + 15/10 3 + 16/10 2 Sletterhage Fyr (JTL).

Vinter:

Ingen obs fra januar. 3/2 1 Krstrup Enge (LTP), 10/12 1 Clausholm (PN), 18/12 1
Krstrup Enge (LTP) og 29/12 1 Salten Å (JCN, JB).

Gul Vipstjert (Motacilla flava)

2 racer træffes i Århus amt.

Almindelig Gul Vipstjert (M.f. flava)

Ret almindelig yngletrækfugl (med april - med maj og aug - sept).

I alt 79 obs, er flere end sædvanligt.

Ynglefund:

Som sædvanligt kun obs fra Århus Havn. Træffes arten ikke andre steder? 30/6 8-9
ynglepar Århus Havn (NÅ).

Fra foråret:

Første: 15/4 1, 15/4 - 22/4 11 Gjerrild (EH, HC), 23/4 2 Brabrand Sø, 29/4 1 han
Østhavnen (LB) og 25/4 1 Brabrand Sø (BHJ).

I øvrigt: 29/4 - 1/6 i alt 13 trk Moesgård (Moes), 3/5 18 Brabrand Sø (LB), 6/5 9
Brabrand Sø (AJ), 13/5 10 Bjerregrav Mose (JP) og 20/5 10 Pindstrup Mose (JTL).

Fra efteråret nævnes:

2/8 - 26/8 4 obs med 10 - 40 fugle Århus Havn (NÅ), 11/8 12 Hassenøre (TB), 5/8 10 Alrø, 20/8 12 Funderholme (BHJ), 21/8 10 Molslaboratoriet (PC), 25/8 40 rst Stubbe Sø (IHO) og sidste 16/9 1 Ormslev (ET), 22/9 1 Kysing Næs (HP).

Nordlig Gul Vipstjert (M.f. thunbergi)

Fåtalig trækgæst, der passerer indenfor maj måned.

I alt 10 obs, svarer til sidste års antal. Alle obs nævnes:

4/5 2 Døde Å, 10/5 1 Brabrand Sø (PNN), 7/5 7 + 10/5 8 Brabrand Sø (LB), 15/5 1 han rst Langballe Eng (ET), 16/5 1 Moesgård (Moes), 18/5 flok på 35 Kasted Mose (SH) + 2 Auning Kær (JTL) og 20/5 1 Møgelskår, Samsø (ØBF, PH, AJ).

Silkehale (Bombycilla garrulus)

Almindelig træk- og invasionsfugl, der træffes fra okt/nov - marts.

I alt 99 obs er absolut rekord for arten inden for de seneste år. Skønt efteråret 1983 har meget få obs af arten, foregår der i januar 1984 helt tydeligt en mindre invasion. Overalt i Århus ses småflokke på 10 - 25 fugle. Max nåes 17/1 105 - 115 Søndervangen (PH), hvorefter sidste i foråret er 16/4 4 Brandstrupvej (HE), 22/4 3, 25/4 14 Silkeborgvej/Åbyhøj (PNN).

I foråret få uden for Århus: 20/1 1 Assenstoft (LTP), 4/2 24 Mariendal Strand (OGJ), 6/3 20 Rønde (ET), 8/3 30 Femmøller Strand (PNN) og 2 Allingåbro (FFa).

I efteråret ses de første 27/10 4 Strandkær (PNN), hvorefter en større invasion udvikler sig, således at arten også træffes med i alt 14 obs uden for Århus. I november er flokkene små (max 28), dog 30/11 75 - 80 Ellebjergvej, Århus (PNN). Gennem december måned vokser flokkene og når max i dagene 28/12 - 30/12.

Flokke på min. 100 nævnes:

18/12 ca 250, 19-31/12 ca 100 dagligt, Søndervangen (PH), 13/12 550 Viby, 29/12 300 Søndervangen, 525 Højbjerg (HP), 29/12 150 Holme (FL, BHJ) og fra Ry nogle interessante obs: 29/12 fra 16.00 - 16.15 9 flokke på i alt 525 og 30/12 16.00 - 16.20 22 flokke på i alt ca 915 fugle - alle til overnatning ved Birkesø (LM).

Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Fåtallig træk- og vintergæst (pr okt - ult april).

Kun 17 - 18 fugle iagttaget i 1984. Samtlige obs nævnes.

1. halvår:

8/1 1 Klosterengen (PB), 1 Kloster Kær (LM), 2/3 1 Løvenholm Skov (TB), 7/3 1 han Tranevig, 1/4 1 han Funderholme (JCN), 17/3 2 Høsskoven/Silkeborg (JFT), 25/3 1 Ry ved Lynghøj (LM) og 19/4 1 rst Gjerrild Stenværk (EH, HC).

2. halvår:

29/9 1 Paderup Mose (LTP) er nogle dage tidligere end normalt, 8-9/10 1 Solbjerg Sø, 24/11 1 Rodelund (ET), 28/10 1 Løvenholm Skov (TB), 30/10 1 han Silkeborg Vesterskov, 25/11 1 han Klosterkær (JCN), 24/11 1 Frederiksdal Hede (ME), 1/12 1 Øje Sø (BHJ) og 29/12 1 jog livet af en piber ved luftjagt, Salten Å (JCN, JB).

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)

Fåtallig yngletrækfugl og fåtallig til ret almindelig trækgæst (pr maj - pr juni og aug - med sept).

I alt 40 obs.

Rødrygget Tornskade markerer sig meget lidt under trækket. Det første obs om foråret er mange gange på en mulig yngleplads, og lige så sporløst er den væk om efteråret, hvor der traditionelt er få obs.

Ynglefund:

22/7 1 hun + 1 juv, 15/8 1 hun + 4 juv Pinds Mølleedal (ET), 1 par ved Århus Skov, 1 par + 3 juv Strandkær, 1 par Bogens (PNN), 27/8 1 par + 2 juv Stubbe Sø (JPK), 5/7 1 par Norring Vesterskov (SMJ), 4/8 1 par med juv Granslev Ådal (TB).

Af mulige nævnes: 15/6 2 hanner Kolsø (BRS), 16/6 1 han Mosen på Tunø (PH), 27/6 1 par Kastbjerg Ådal (TB), 11/7 1 han Sælvig, 13/7 1 han Østerby, Samsø (JTL).

Arten kommer igen sent til amtet, idet 1. obs er 3 fugle den 19/5: 1 han Vester Løkker (LeB) + 1 han sy Rosenholm Slotspark (JTL) + 1 han Nørreris (SMJ) og 20/5 2 Møgelskær, Samsø (ØBF).

Sidste obs: Er meget betegnende de to ynglefund fra 15/8 og 27/8.

Stær (*Sturnus vulgaris*)

Formentlig meget almindelig yngletrækfugl (pr marts - ult maj og ult aug - ult nov), der optræder i vekslende antal som strejf- og vintergæst.

I år har Stæren været en ret almindelig vintergæst i december måned. December 1984 var meget mild, og det lokkede måske lokale Stære til at blive, men det kan også dreje sig om fugle fra Nordøst-Europa.

Et meget tidligt ynglefund: 8/5 unger i redekasse, 30/5 unger fløjet af reden, Silkeborg (JCN).

Fra forår og efterår nævnes:

12/4 2000 - 4000 overnattende Brabrand Sø (JWJ), 12/4 min 4000 + 15/4 4110 + 21/4 min 8100 Brabrand Sø (AJ) og 14/10 5000 - 10000 Salten (JCN).

Vinter:

12/2 1 Mårslet (BHJ), 21/2 3 Ry (LM), 1/12 50 Søften, 25/12 10 Nørreriis, 30/12 250 Grundfør Mølle + 50 Haarvadbros (SMJ), 16/12 70 + 21/12 75 Århus Østhavn (JFT), 26/12 ca 100 Funderholme (JCN), 10/12 25 Århus Østhavn + 11/12 3 Gellerup (LB) og 30/12 150 Grund Fjord (FFa).

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fåtalig til ret almindelig ynglefugl og ret almindelig træk- og vintergæst.


I alt 91 obs af 298 fugle er absolut rekord for fuglen, der ydermere er set i et par usædvanligt store flokke.

Ynglefund:

1/8 4, hvoraf 1 ad + min 1 juv Dørup Mølle (ET), 13/7 1 + 2 juv Søften, 18/5 1 par (yngleplads) Nørringure, 16/7 1 par + juv Hattemager og 20/7 1 par + 3 juv Nørreriis (SMJ). Desuden 3 par i territoriekampe, Kollskov og 1/8 3, måske par med juv Pinds Mølle (ET).

Fra træksteder:

31/3 4 N + 1/4 1 N Moesgård (Moes), 16 - 22/4 i alt 10 Gjerrild (EH, HC) og fra efteråret: 16/10 14 Sletterhage Fyr (JTL).



Flokke på min 5 nævnes:

26/1 25, 10/3 15, 7/4 11 Risskov (HLL), 17/2 55 Fussingø (LTP) er over normalen for Jylland, 26/3 9, 27/3 7, og 28/3 5 Silkeborg (JCN), 1/4 5-6 Kollens Mølle (ET) og 29/12 6 Tornsbjerg/Hadrup Skov (DLJ).

Stillits (*Carduelis carduelis*)

Formentlig ret almindelig yngletrækfugl (marts - april og aug - okt) samt regelmæssig vintergast.

68 obs med i alt ca 270 fugle. Obsmængden er steget næsten 100%, men mængden af fugle er ca 33% mindre end sidste år. De indsendte obs tyder på en udbredt, men gennemgående ret fåtallig bestand.

Stillits er specialindsamlingsart og vil blive behandlet i SØRAVNEN, når indsamlingen er afsluttet.

Grønsisken (*Carduelis spinus*)

Sjælden ynglestrejffugl og almindelig træk- og vintergæst (med sept - april).

I alt 82 obs. Arten optræder talrigere end sædvanligt og med oktober er der tale om invasionsagtig optræden.

Ynglefund:

1-2 par Vrold (GG) og 12/5 1 sy Salten Langsø (JTL) er eneste sommerfund.

Sidste i foråret:

6/4 40 Århus Universitet (PC) og 14/4 1 N Moesgård (Moes).

Første i efteråret:

16/9 30 Dørup (ET), 24 Salten Langsø (LM).

Flokke på min 100 nævnes:

7/1 100 rst Pinds Mølle (ET), 2/4 102 N Moesgård (Moes), 22/9 100 Kysing Næs (HP), 16/10 164 Sletterhage Fyr (JTL), 26/10 200 Risskov (HLL), 28/10 - 31/10 200 - 400 Pinds Mølle (ET), 19/11 - 25/11 100 - 200 Pinds Mølle (ET), 31/11 100 Fussing Skov (JP), 4/11 400 - 600 S Fornæs (NÅ), 22/12 200 Kongslund (JP).

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*)

Ret almindelig træk- og vintergæst (ult sept - med april).

Bjergirisk har som vanligt de fleste obs i Århus området, men i år dog mere spredt i amtet. Som sædvanligt få obs i indlandet. I alt 36 obs.

Sidste i foråret:

16/3 17 Århus Østhavn (JFT) og 17/3 4 Gudenåen ved Randers (LTP) er tidlig afrejse.

Første i efteråret:

14/10 2 Århus Havn (PH) og 15/10 ca 30 Kragemosen, Samsø (LeB) + 80 trk + 75 rst Sletterhage Fyr (JTL).

Flokke på min 100:

25/11 ca 100 Århus Østhavn (JP), 11/12 250 Århus Kulhavn (ET), 16/12 ca 100 Overgård (JP), 19/12 50 - 100 Alrø (JWJ), 23/12 ca 100 Århus Havn (JTL) og 18/2 250 overnatning, Århus Domkirke (TB) er åbenbart et ret konstant antal på denne lokalitet.


Øvrige uden for Århus:

28/1 7-8 Splidholm (ØBF, PH, SH), 12/2 1 Langå (indland), (TBP), 17/10 15 Fornæs (LTP), 27/10 35 Fornæs (HLL, HP), 28/10 4 Overgård (JP), 2/11 3 Strandkær (PNN), 10/11 2 Alrø (AJ), 2/12 9 Issehoved (LeB), 27/12 ca 15 Skødshovedgård (PH).

Gråsiskan (*Carduelis flammea*)

Formentlig fåtallig ynglefugl (C.f.cabaret) og almindelig træk- og vintergast (C.f.flammea) (sept/okt - april).

107 obs med ca 3830 fugle. 1984 blev et invasionsår for Gråsiskan. Forløbet minder om det under Grønsiskan nævnte. Dvs i årets første halvdel meget få fugle, hvorefter der fra ult okt og året ud kommer mange flokke, som tømmer birketræerne for frø.



Ynglefund:

Ingen sikre, men flere sommerfund er uden tvivl ynglefund: 2/6 4 sy Rye Bro, 2/7 8 - 10 Øer (JTL), 2/6 2 Salten Å (BJJ), 7-8/6 1 Mårup, Samsø (TBr), 29/6 - 30/6 set Anholt (JDJ) og 30/6 1 sy "Ryhus" Ry (LM).

Største flokke:

25/10 90 Søften (SMJ), 6/11 85 "Ryhus" Ry (LM), 4/11 450 Gjerrild (JP), 8/11 175 Randers (JP), 11/11 250 Fussing (TBr), 23/11 245 Brabrand Sø (HLL) + 87 trk S Hesselholm (SD), 24/11 275 Randers (JP), 25/11 150 - 200 Lindholm Hoved (JCN), 22/12 ca 100 Funderholmevej, Silkeborg (SFP) og ca. 100 Kongslund (JP).

Gulirisk (*Serinus serinus*)

Meget sjælden trækgæst (maj - juni).

Kun en observation: 20/4 2 trk Gjerrild (EH, HC) er meget tidligt.

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*)

Meget sjælden trækgæst (ult maj - pr juni).

Eneste observation er 26/5 1 juv han sy Øer (TB).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*)

Formentlig sjælden ynglestrejffugl og ret almindelig invasionsfugl, der kan træffes året rundt.

61 obs er rekord for arten siden 1976, men mængden af fugle (ca 570) er lidt mindre end sidste års invasion. De fleste obs er under 10 fugle.

Ingen sikre ynglefund.

Største flokke (min 20) nævnes:

10/1 60 - 80 Salten Sø (TB), 20/5 25 Norring Vesterskov (SMJ), 2/6 20 Klapskov (SH), 28/10 20 Løvenholm Skov (TB), 4/11 20 Kollskov (ET) og december 15 - 20 Strandkær (PNN).

Fra træksteder:

5/3 - 1/6 i alt 31, max 7/5 17 rst Moesgård (Moes) og 16-22/4 i alt 30 Gjerrild (EH, HC).

Stor Korsnøb (*Loxia pytyopsittacus*)

Fåtalig træk- og invasionsfugl, der er obseret 6 gange - ligesom sidste år.

25/3 1 Rye Møllekov (LM), 8/4 1 han Skærbæk Plantage (JB), 16-22/4 i alt 19 trk Gjerrild (EH, HC), 25/4 1 Anholt (HE), 12/5 1 han Salten Langsø (HP) og 16/7 4 Issehoved (JTL).

Korsnøb (*Loxia sp*)

16 obs, hvoraf 16-22/4 60 trk Gjerrild (EH, HC).

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*)

Meget almindelig træk- og vintergæst (sept/okt - april), der kan optræde invasionsagtigt.

69 obs. Den store invasion fra efteråret 1983 blev i de første måneder af 1984 yderligere forstærket, så det samlede antal i år når ca 256.400 fugle, hvoraf 650 i andet halvår.

Sidste i foråret:

24/4 1 Hesselholm (LeB) og 24/4 205 N Gjerrild (IHO).

Første i efteråret:

23/9 2 trk N Pinds Mølleedal (ET) og 29/9 1 Salten Langsø (JTL).

Største flokke (min 2500):

25/1 5000 N Skanseparken, Århus, (NÅ), 27/1 15000 (PH) + 28/1 3000 (MCR) Mindeparken, Århus, 7/2 130.000 - 150.000 Dronningestolen, Silkeborg N-Skov (LM), 8/2 30.000 N Skanseparken, Århus (NÅ), 13/2 2500 Kollskov (ET), 26/2 2500 Tornsbjerg/Hadrup Skov (DLJ), 3/3 4000 N Skanseparken, Århus (NÅ), 12000 Mindeparken (MCR), 2000-3000 Skovbakken, Randers (JP), og 4/3 20.000 Moesgård (FL) + 7000 Mindeparken (PH) + ca 5000 Almindse (JCN).

Eneste lidt større flok i efteråret var 28/12 300 Hørning (ET).

omlærke (*Emberiza calandra*)

Kun 12 obs af denne let registrerbare fugl. Send dine obs ind, så vi kan få artens forekomst belyst.

Fra Samsø: 28/4 1 Sælvig, 1 Onsbjerg, 4 Permelille til Kolby, alle syngende (PC), 18/5 1 Besser, 1 Kragemosen (AJ).

Desuden 22/4 2 Bjerregrav Mose (JP), ? 1 Solbjerg Sø, synger dagligt, ? Syd for Adslev synger dagligt, 29/5 1 Blegind Mose (ET).

Fra vinteren:

12/2 22 Obstrup (BHJ), 19/2 80 Fornæs (SH) og 22/12 4 Bjerregrav Mose (JP).

Laplandsværpling (*Calcarius lapponicus*)

Fåtalig trægæst (marts - april og okt).

7/4 1 Ø Fornæs (TB), 16 - 22/4 11 trk Gjerrild, max 16/4 7, (EH, HC), 16/5 1 N Moesgård (1. forekomst her) (Moes) er sent og et vinterfund, 9/12 1 Kysing Fjord (OGJ, H+JE, JTL) er ikke almindeligt for amtet.

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*)

Almindelig trak- og vintergæst (okt/nov - marts/april).

42 obs af 1462 fugle. Mængden af fugle er større end sidste år, men 28 af 42 obs fra Århus Havn er vanligt.

Sidste obs i foråret:

27/3 9 Østhavnen (LLH) og 18/4 1 trk Gjerrild (EH, HC) er sent.

Første i efteråret:

18/10 10 Issehoved (SD) og 21/10 1 Århus Havn (OGJ).

5/2 3 Brabrand Sø er eneste på indlandslokalitet.

Største flokke (min 50):

Århus Havn: 2/1 ca 50 (MCR), 8/1 50 (JP), 4/3 60 (H+JE), 24/11 210 (JTL) er lidt af en rekord, 25/11 55 (JP), 8/12 105 (JTL), 9/12 70 (PNN), 11/12 60 (ET), 16/12 80 (JFT) og 23/12 80 - 120 (JTL).

Desuden 19/2 90 Sødring Kær (PL) og 18/2 105 Overgård (PH).

APPENDIX ITopskary (*Phalacrocorax aristotelis*)

8/7 1 juv S Århus Havn (NÅ) og 4/11 1 Fornæs (JP)

Steppeørn (*Aquila nipalensis*)

18/4 1 2-3K SØ-SV Gjerrild (HC, EH)

Lille Skrigeørn (*Aquila pomarina*)

18/4 1 3-4K NØ-SV Gjerrild (HC, EH)

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*)

10/10 1 Kysing Fjord (JP) - meget sen

Sortklire (*Tringa erythropus*)

31/3 1 N "Holbakke", Emborg (LM) - meget tidligt

Hvidvinget Måge (*Larus glaucooides*)

15/10 2 ad Issehoved (LeB)

Alpesejler (*Apus melba*)

9/10 1 Langå (TBP) - ny i amtet

Korttået Træløber (*Certhia brachydactyla*)

7/1 1 Moesgård (OGJ), 1/4 1 Moesgård (H+JE) og 31/10 1 set/hørt Vilhelmsborg (BHJ)

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)5/1 1 kaldende Højgårdsvej i Hørning (PC) og 1/12 1 (tavs) Kongslund, Randers (JP)
- i Sverige henfører man alle vinterobs af Gransanger til racen "P.c.tristis".APPENDIX II

Rettelser til Lokalrapporten 1983

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*)

Rettelse: Første 13/6 rettes til 13/3

Ubestemt Glente (*Milvus sp*)

Tilføjelse: 29/4 1 Moesgård (Moes)

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*)

Rettelse: Sommerobs "31/7 2 juv Mossø" rettes til "... Brassø"

BIDRAGSYDERE.

Følgende initialer/forkortelser er benyttet i rapporten.

JB	Jørgen Ballegaard, Bryrup	LPJ	Lars P. Johansson
LB	Lars Borup	OGJ	Ole Gylling-Jørgensen, Malling
LeB	Leif Brauer, Skodsborg	SMJ	Svend Møller Jensen, Hinnerup
PB	Preben Bach, Silkeborg	JNK	Jesper Nelby Kristiansen, Grenå
TB	Torben Bøgeskov	JPK	Jørgen Peter Kjeldsen, Tipperne
TBr	Thorkild Brandt, Bjerringbro	FL	Flemming Lundberg, Mårslet
HC	Hans Christophersen, Ålborg	HLL	Henning Lykke Larsen
HCh	Hans Christensen, Tønder	JTL	Jørgen Terp Laursen
PC	Preben Clausen	PL	Peter Lange
SD	Svend Dybkjær, Hellerup	LM	Lars Mogensen, Ry
EE	Erik Enevoldsen, Ringkøbing	PM	Peter Mogensen, Silkeborg
HE	Henning Ettrup	Moes	Rapport over forårstræk ved Moesgård v/HP
H+JE	Hanne og Jens Eriksen	JCN	Jalmer C. Nielsen, Silkeborg
ME	Mogens Erlandsen, Silkeborg	PN	Peter Nielsen, Hinnerup
DOF	Dansk Ornitologisk Forenings turreferater	PNN	Peder Nygaard Nielsen
FF	Finn Frandsen	IHO	Ib Helles Olesen, Holstebro
ØBF	Østjysk Biologisk Forenings turreferater	HP	Hans Pinstrup, Horsens
FFa	Flemming Falk, Randers	JP	Jørgen Pagter, Randers
GG	Georg Guldvang, Skanderborg	LTP	Lars Tom-Petersen, Randers
Gejrf	Gejrfuglen v/ØBF	SFP	Stig Frøjk Pedersen, Silkeborg
BH	Bjørn Holmskjold, Galten	TBP	Thomas Brandt-Pedersen, Langå
EH	Erik Hørning	PER	Per E. Rasmussen, Randers
LLH	Lars Lund Hansen	MCR	Marcel C. Rahner
PH	Per Henriksen	BRS	Bo Ryge Sørensen, Silkeborg
SH	Søren Højager, Mundelstrup	Sør	Soravnen v/DOF
AJ	Allan Jannicke	ET	Eigil Thomasen, Dørup
BHJ	Bjarke Huus Jensen, Mårslet	JT	Jesper Tofft
DLJ	Dinna Lønbak Jensen, Horsens	JFT	Jens Ditlev Fromsejer Thomsen
JDJ	Jens Dejgaard Jensen	OT	Ole Thorup, Tipperne
JWJ	Jens Wolf Jespersen	NÅ	Niels Aagaard

INDSAMLINGSARTER

Af følgende arter ønsker vi alle iagttagelser fra Århus amt
indsendt til Rapportgruppen:

alle lommer	Sortklire
Sorthalset Lappedykker	alle ryler
Sangsvane	Brushane
alle gæs	Dværgterne
Atlingand	alle alkefugle
Spidsand	alle ugler
Skeand	Grønspatte
Bjergand	Vendehals
Lille Skallesluger	Toplærke
Fjeldvåge	Hedelærke
Hvepsevåge	Ravn
Rørhøg	Sortkrage
Blå Kørhøg	Vandstær
Duehøg	Misteldrossel
Tårnfalk	Husrødstjert
Vandrikse	Skovsanger
Agerhøne	Skærpiber
Lille Præstekrave	Bjergvipstjert
Strandhjejle	Silkehale
Enkeltbekkasin	Stor Tornskade
Skovsneppe	Kærnebider
Stor Regnspeve	Bjergirisk
Lille Regnspeve	Gråsisken
Lille Kobbersnepe	Lille Korsnæb
Svaleklire	Snespurv