

LOKALRAPPORTEN

1985



DOF - ARHUS

LOKALRAPPORTEN 1985 , ÅRHUS AMT.

Redaktion: Eigil Thomasen (ansv.)
 Renskrivning: Hanne Eriksen
 Tegninger: Jacob Salvig
 Figurer: Erik Hørning
 Lay-out: Eigil Thomasen, Thor Bue
 Oplag: 150 eksemplarer
 Pris (incl.porto): kr 40,00 (for bidragsydere kr 30,00)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning	3
Artsbehandling	4
Sjældne fugle	5
Behandlede arter	6
Retningslinjer for indsendelse	7
Det indkomne materiale	7
Lommer - Gæs (Flemming Lundberg)	8
Ænder (Per Henriksen)	18
Rovfugle (Eigil Thomasen)	27
Vadefugle (Niels Aagaard)	42
Kjover - Terner (Lars Lund Hansen)	61
Duer - Spætter (Bjarke Huus Jensen)	69
Lærker - Drosler (Lars Borup)	75
Sangere - Pungmejse (Peter Lange)	86
Pirol - Bomlærke (Svend Møller Jensen)	91
Appendix I	102
Appendix II	103
Appendix III	104
Bidragsynderliste	107
Indsamlingsarter	108

Lokalrapporten kan bestilles hos Dansk Ornitologisk Forening
 i Århus amt giro nr. 551 09 61, DOF, Gellerupvej 111, 8220
 Brabrand (pris se ovenfor).
 Henvendelser til lokalrapportgruppen bedes venligst foretaget
 på lokalafdelingens adresse eller tlf. 06 92 37 73 (Eigil
 Thomasen).

ISSN nr. 0902-0489

Udgivet af DOF-salg
 Dansk Ornitologisk Forenings
 forlag og salgsorganisation

Vesterbrogade 140
 1620 København V

tlf. 01 24 92 20

giro nr. 7 16 61 41

september 1986

Forlaget påtager sig intet
 ansvar for rigtigheden af
 oplysningerne i denne rapport.

INDLEDNING

Maj 1986.

Dette er den 15. lokalrapport fra Århus amt og den 6. i rækken, der forsøger at beskrive den enkelte arts forekomst i en fastlagt terminologi og disposition. Denne artsbehandling er meget tidkrævende for de enkelte skribenter og er iblandt såre problematisk at gennemføre. Ganske særligt volder de almindeligste arter, der kun flygtigt indberettes, nok de største kvaler. Derimod har systemet sin force ved behandlingen af i-arterne samt de endnu sjældnere arter, hvor vi formoder, at en stor del af fuglenes reelle forekomst finder vej til lokalrapporten.

For hver udgivelse præciseres artsbehandlingen og vor viden om fuglenes forekomst i amtet. Under arbejdet med nærværende lokalrapport har forskellige gruppemedlemmer i konsekvens heraf omtalt muligheden af og behovet for en akkumulation af vor indsigt i et samlende værk a la Nordjyllands Fugle. Indtil noget sådant kan præsenteres er imidlertid den regelmæssige udgivelse af lokalrapporterne den bedste ornitologiske reference for Århus amt, og derfor behandles så mange arter som muligt.

Mange er involveret i lokalrapporten og alle skal have en varm tak, selv de 65 bidragsydere og kilder, som har leveret de mange bidrag, der gav natters arbejde. Vi har udvidet gruppen med Lars Lund Hansen, Peter Lange og Lars Juhler, mens Jeppe Kajgård trak sig tilbage. Lokalrapportens trofaste renskriver, Hanne Eriksen, har meddelt, at hun er ude af stand til at fortsætte sit arbejde for os. Samtidig med at vi sender den varmeste tak for mange års slid, må vi opfordre alle til at finde afløseren til dette store og vigtige arbejde.

Aktiviteten i amtet har været meget stor i 1985. Således var Moesgård særdeles velbesøgt og Gjerrild Fuglestation oprettedes. Begge forårstræksteder fremviste meget store og spændende forekomster. Midtjylland har sine faste indrapportører, og Randers-området er ved at komme godt med. Kysing Fjord og Brabrand Sø er nok de mest besøgte områder; men fra efteråret er gode, regelmæssige optællinger foretaget omkring Horsens Fjord (Ramsar-område 13). Derimod har vi ikke mange oplysninger fra en linje nord for Randers - Grund Fjord og der mangler ligeledes indberetninger fra det centrale Djursland.

Sluttelig skal det anføres, at der i denne lokalrapport er indført en ny systematik i overensstemmelse med den nye udgivelse af R. Petersons "Europas fugle".

ARTSBEHANDLINGEN

Hver art er søgt behandlet efter en fast skabelon med seks afsnit.

- 1) artens forekomstmønster (ynglestandfugl, vintergæst, trækfugl osv) angivet med den normale forekomstperiode. Denne del fremkommer ved at kombinere informationerne fra det behandlede år med de nærmest foregående år. Til forekomstmønstret knytter sig en hyppighedsangivelse for det behandlede år.
- 2) kommentarer til 1), typisk afvigelser fra tidligere år.
- 3) yngleforekomst
- 4) trækforekomst
- 5) vinterforekomst
- 6) eventuelle generelle kommentarer.

Til pkt 1) kan tilføjes, at definitioner på "forekomstmønster" eller "faunistisk kategori" findes i T. Dybbro - Oversigt over Danmarks fugle 1978.

Til at beskrive artens hyppighed inden for en kategori har vi valgt at bruge følgende udtryk:

meget sjælden	=	1-2	individer eller par
sjælden	=	3-10	individer eller par
fåtalig	=	11-100	individer eller par
ret almindelig	=	101-1000	individer eller par
almindelig	=	1001-10000	individer eller par
meget almindelig	=	over 10000	individer eller par

Under behandlingen af yngleforekomst bruges udtrykkene om antal par,

Ved en række arter er der desuden udarbejdet søjlediagrammer over artens forekomst. Disse indeholder 7-dages perioder gående fra 1/1.

Det er desværre ikke muligt at udgive alle enkeltobservationer i lokalrapporten. For visse arters vedkommende er det endog kun et ringe antal obs, der gives læseren. Artsbehandlingen er den enkelte skribents udvælgelse, kommentering og måske problematisering af årets materiale. Selv det mindste bidrag får på denne måde sin egen betydning, endskønt det ofte ikke er at finde på tryk. Derfor må ingen undlade at indsende bidrag alene af den grund at tidligere bidrag tilsyneladende var uinteressante. Alle indkomne bidrag anvendes.

Se i øvrigt "Det indkomne materiale".

SJÆLDNE FUGLE

Fund af meget sjældne fugle skal godkendes af DOF's sjældenhedsudvalg (SU) for de må nævnes i DOF's publikationer. Denne regel udtrykker forningens officielle holdning, og den binder naturligvis i, at man ikke ønsker, at falske/fejlbestemte fund bliver offentliggjort og derved måske forrykker billedet af enkelte sjældne arters forekomst. Så må man tage med, at også en del autentiske fund med utilstrækkelig beskrivelse bliver bortcensureret.

Denne regel har vi dog i næsten alle lokalrapportgrupper set stort på op gennem 70'erne. Bl.a. fordi man frygtede, at spændende materiale om nyindvandrede arter m.v. skulle forsvinde i diverse lokalredaktørers dybe papirkurve.

Mindst to forhold har gjort, at man fra landsrapportgruppens side har besluttet at få lokalgrupperne til at ændre kurs og undlade offentliggørelse af ubeskrevne/ikke godkendte fund af sjældenheder. Dels har den "løse" kurs mange steder medført en lavine af mildelst talt mystiske obs (f.eks. Kermadec-Skråpe, Rødpandet Gilirisk, overvintrende Hvepsevåger og Biædere, Gulgrå Værling, kæmpeflokke af Rovterner og Gulirisker osv, osv) helt uden dokumentation. Dels har næsten alle grupper nu et kartotek, hvorfra man f.eks. om 25 år kan udtage de første usikre, ubeskrevne obs af Cistussanger eller Syrisk Flagspætte - arter der er på vej mod Danmark.

I Århus amt gør vi foreløbig følgende:

Alle indsendte arter nævnes i artsgennemgangen. Arter på SU-listen samt nye arter for landet og helt specielle fund (flok på 30 Høgesangere, vinterfund af Gøg etc) har henvisning til appendix I. Dog bringes fund, der er godkendt af SU naturligvis i selve artsgennemgangen.

Fund af arter, der med sikkerhed er undsluppet fangenskab (Sort Svane, Undulat, Chileflamingo etc) henvises til appendix II. Her kræves normalt ikke beskrivelse, så de nævnes på normal vis.

I appendix I er fund, som er beskrevet til SU, men endnu ikke færdigbehandlet eller måske forkastet, nævnt på vanlig vis med dato, antal, lokalitet og observatør. Det nye er så, at der ved ikke beskrevne fund blot står: "et (eller flere) udokumenteret fund"

Det væsentlige for os er altså - indtil videre da - ikke om fundet godkendes af SU, men at det bliver beskrevet og indsendt. Vi har sat skæringsdatoen til 1. februar det efterfølgende år. Inden denne dag skal SU have modtaget beskrivelse af dit fund af Islom, Krognøb, Skovstork eller lignende - ellers kommer obsen ikke med i lokalrapporten. Og det ville jo være en skændsel!

BEHANDLEDE ARTER

Hvis vi medtager revl og krat, er der indrapporteret 256 arter fra Århus amt i 1985. Herfra skal dog straks fratrækkes 3 arter, der utvivlsomt er undsluppet fangenskab. Blandt de øvrige 253 er der 14 arter, som er på SU-listen, dvs de skal godkendes af SU inden offentliggørelse. To af disse (Gåsegrib og Lille Skrigeørn) er allerede (pr. 1/4 1986) godkendt. Resultatet af regnestykket bliver, at mindst 241 arter er set i amtet i årets løb - en klar fremgang fra 230 i 1984.

Blandt årets mange arter kan nævnes Sort Stork, Rødhovedet And, Kongeørn, Hvidbrystet Præstekrave, Kærløber, Odinshane, Storkjove, Sandterne, Lille Flagspætte og Rødstrubet Piber. Og jeg kan ikke komme på nogen rimeligt almindelige arter, der mangler i år. Hvad med 1986??

Af årets 241 arter er de 216 behandlet her i rapporten (også rekord - i 1984 medtog vi 203). De resterende 27 har vi ikke kunnet skrive noget fornuftigt om. Dette gælder følgende:

Gråand	Solsort	Gråspurv
Agerhøne	Fuglekonge	Skovspurv
Fasan	Sumpmejse	Bogfinke
Grønbenet Rørhøne	Topmejse	Grønirisk
St. Flagspætte	Sortmejse	Tornirisk
Sanglærke	Spætmejse	Dompap
Gårdesmutte	Træløber	Gulspurv
Jernspurv	Husskade	Rørspurv
Rødhals	Gråkrage	Bomlærke

RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE

Principielt modtager vi med glæde alle obs, som man kan overkomme at indsende, men er man selektivt indstillet, vil vi bede om i-arterne (se bagsiden) samt de sjældnere arter. Øvrige bidrag af særlig interesse er f.eks. yngleobs, første- og sidsteobs af trækfugle, rast- og træktaf ande-/vadefugle, invasionsforekomster, flokiagttagelser samt diverse former for ekstremer.


Lokalrapportgruppen påregner at fremtidige indberetninger vil kunne foretages på særligt udformede skemaer for at aflaste gruppen fra et stort tidskrævende arbejde. Samtidig vil muligheden for afskrivningsfejl reduceres.

Vi håber at kunne præsentere vort skema i Søravnen, hvorefter man selv vil kunne fotokopiere sit nødvendige antal eller måske rekvirere det hos lokalrapportgruppen.

Bidrag til lokalrapporten 1986 sendes senest 20. januar 1987 til Lokalrapportgruppen, DOF, Sølyst, Gjellerupvej, 8220 Brabrand.

DET INDKOMNE MATERIALE

Det indkomne materiale opbevares af lokalrapportgruppen, hvor det akkumuleres år for år. Herved fremstår et unikt avifaunistisk kildemateriale fra Århus amt, som foreningens medlemmer vil kunne anvende ved at rette henvendelse til lokalrapportgruppen. For enkelte sårbare arters vedkommende må man dog påregne en form for clausulering af materialet.



Rød-/Sortstrubet Lom (Gavia stellata/arctica)

Fåtalig vinter-, ret almindelig forårs- og fåtalig efterårstrækgæst.

Forår: Langt de fleste er set i perioden 3/3 - 15/4, hvor hele 396 trak ved Gjerrild Strand (GF). Desuden 22/3 2 SV Århus - Kalundborg (JFT), 4/4 3 trk + 1 rst Hov - Sælvig (PH), 7/4 2 Ø Issehoved (PH), 14/4 2 S + 1 N Moesgård (PH, Moes) og 3/4 1 Fornæs (HLL).

Efterår: Kysing Næs 12/10 4 trk (LB, BHJ, HP), 13/10 1 S (HP, ET), 10/11 3 (H+JE), 14/11 10 (HLL) og 17/11 3 S (LB).

Fornæs: 27/10 1 S (JNK), 10/11 1 S + 1 N (TB) og 16/11 3 N + 9 S (HP).

Øvrige: 29/9 2 N Trekanten, Samsø (SD), 30/11 1 Øster Hedekrog (SD), 28/9 1 V Issehoved (SD), 12/10 1 + 14/10 2 Sletterhage (JTL) og 9/11 6 Ø Gjerrild Strand (JSP, KNM).

Vinter: 2/1 4 (LB), 18/1 2 + 1/2 1 + 15/2 2 (JFT), alle Århus - Kalundborg samt 29/12 1 Vesborg Fyr (LEB).

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Sjælden i alle perioder i træktiden.

16/2 5 (NÅ) + 31/3 2 (OGJ) Århus - Kalundborg, 4/4 1 rst Hov - Sælvig (AJ, PH), 14/4 1 S (LPJ) + 27/4 1 ad (LLH) + 18/5 1 rst (Moes) Moesgård, 7/9 1 Kysing Næs (JVS), 27/10 1 N Fornæs, 9/11 1 Ø Gjerrild Strand (JSP, KNM), 9/11 1 Øster Hedekrog (SD), 12/11 1 rst + 17/11 1 + 22/12 1 + 25/12 1 + 29/12 1 + 31/12 1 rst Kysing Næs (OGJ, LB, JVS).

Og en indlandsiagttagelse: 14/4 1 Borre Sø (JCN).

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Sjælden forår og sommer, fåtalig efterår og meget sjælden om vinteren.

31/3 1 v/Samsø (OGJ), 2/4 1 død Øster Hedekrog (SD), 16/4 1 Dronningborg Bredning (LTP), 4/8 2 + 9/8 2 Øster Hedekrog (LeB), 12/9 2 N + 10/11 2 + 16/11 1 S Fornæs (RD, NÅ, HP), 18/10 1 Sletterhage (JTL), 9/11 2 rst Gjerrild Strand (KNM, JSP), 16/11 3 S Kysing Næs (NÅ), 17/11 3 rst Tangkrogen (MCR) og 15/12 1 Århus Havn (LW).

Islom/Hvidnæbbet Lom (Gavia immer/adamsii)

De tre iagttagelser er alle fra Gjerrild Nordstrand. 9/3 1 NV, 23/4 1 NV og 4/5 1 Ø (GF).

Islom (Gavia immer)

Se appendix I.

Lappedykker sp (Podiceps sp)

Gråstrubet/Toppet: 23/1 1 Lisbjerg (AJ), 16/2 6 Århus - Kalundborg (NÅ) og 20/3 12 Ø Gjerrild Strand (GF).


Gråstrubet/Nordisk: 6/2 2 Århus - Kalundborg (JFT).

Nordisk/Sorthalset: 26/2 1 Egåens udløb (MB) og 17/11 3 S Kysing Næs (LB).

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Fåtalig ynglefugl. Ret almindelig hele året.

Ynglepar: 1 vandhul v/Kragelund (JCN), 1 vandhul v/Funder Kirke (JCN), 1 vandhul v/Christianshede (JCN), 1 Essenbæk Mose (LTP), 1 Kragemosen, Samsø (LeB), 3-5 Gjerrild Strand (GF), 1 Ramten/Dystrup Søer (GF), 1 Eskelund (KeH), 1 Brabrand Sø (KeH), 1 Agri Gadekær (JTL), 1-3 Mørke Kær (JTL, FK), 3 Fejrups Mose (JTL), 1 Torup Mark (HE), 1 Grund Fjord (FFa), 3-4 Kasted Mose (SH), og mon ikke også der har været yngleforsøg/-succes i Mossø, Salten Langsø, Kysing Fjord, Smørmosen, Skaføgård Sø og en del steder langs Gudenåen!



LILLE LAPPEDYKKER · ■ KYSING FJORD □ BRABRAND SØ

For Brabrand Sø og Kysing Fjord - se figur.

Store koncentrationer: 6/1 32 Gudenåen v/Kongslund (JP), 15/1 20 Kristrup Enge (LTP), 19/1 30 Studstrupværket (AJ), pr. feb 10 Grenå Havn (GF) og 10/2 12 Remstrup Å (JCN).

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

Ret almindelig yngletrækfugl. Om vinteren fåtallig og resten af året ret almindelig.

Ynglepar: 1-2 Almind Sø (JCN), 5-10 Dronningborg Bredning (LTP), 3-5 Bjerregrav Mose (LTP), 1 v/Klausholm (LTP), 10-12 Ørnø (SFP), 5 Thorsø (SFP), 2-3 Vejlsø (SFP), 20-30 Brassø (SFP), 1-2 Lyngsø (SFP), 2 Almind Sø (SFP), 5 Fussing Sø (PER), 3 Kysing Fjord (LPJ), 7 Kulso (JTL), 2 Dystrup Sø (JTL), 3 Ramten Sø (JTL), 4 Lange Sø (JTL), 3 Øje Sø (JTL), 1 Astrup Mose (FL), 20-30 Solbjerg Sø (FL), 1 Remstrup Å (PB), 67 Brabrand Sø (KeH), 5 Thorup Sø (JTL) og 4 Udbyover Sø (JP). Desuden er lappedykkeren truffet i yngletiden ved bl.a. Silkeborg Langsø, Salten Langsø, Sminge Sø og Juulso (SFP), og der er konstateret flere ynglepar ved Grund Fjord (FFa). Hvad med Mossø??

Træk: Enkelte individer er set ved kysten. Flest 13/3 - 6/4 21 trk Gjerrild (GF).
Store tal: 21/11 193 Salten Langsø (LPJ), 4/5 235 Mossø (HP) og 19/5 167 Brabrand Sø (KeH).

Vinter: ult. jan 1 Silkeborg Langsø (PB), 25/1 1 Egå's udløb (FF), 10/2 1 Remstrup Å (JCN) samt 15/12 1 Århus Havn (LW), 22/12 1 Brabrand Sø (LB), 24/12 2 Fussing Sø (PER) og 26/12 6 Ørnø (JCN).

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena)

Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig trækfugl og sjælden - fåtallig standfugl.

Kun små og spredte obs i traktiden samt sommerperioden.

Ynglepar: 1 nær Assentoft (LTP), 1 Kolsø (JCN, BRS, GW), 1 Tranemosen (LeB), 5 Skaføgård Sø (JTL), 2 Rønbæksøen (SMJ), 1 nær Bølling Sø (JCN), 1-2 Kysmosen (FF), 1 nær Båstrup (NH), 1 Smørmosen (JTL), 2 Ring Sø (JTL), 1 Dystrup Sø (JTL), 1 Langå Sø (JP) og 2 Højslet v/Randers (JP).

De lokale observatører må i 1986 kigge godt efter tegn på yngel ved: Tåstrup Sø, Brabrand Sø, Kragemosen, Østerby Mose og Virring Sø, samt alle andre steder, hvor der er mulighed for at støde på arten til Lokalrapporten!!

Træk: 13/3 - 23/3 19 trk Gjerrild (GF) og 20/10 10 N Fornæs. Ellers kun enkeltiagttagelser.

Vinter: 19/1 1 Kysing Fjord (OGJ), 24/1 1 Studstrup (FH), 16/2 6 Århus - Kalundborg (NÅ) og 25/12 2 Kysing Næs (OGJ).

Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus)

Sjalden forårsgæst, meget sjalden sommer og efterår. I alt 10 fund.

Forår: 11/3 1 vd Ø, 15/3 1 vd Ø, 19/3 1 vd Ø, 23/3 2 sd Ø og 6/4 1 sd rst + 1 sd Ø, alle Gjerrild Nordstrand (GF).

Sommer: 28/7 1 sd Mossø (OGJ).

Efterår: 20/10 1 S Fornæs (RD) og 17/11 1 rst Kysing Næs (OGJ).

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Fåtallig (ret almindelig ?) yngletrækfugl. Fåtallig - ret almindelig forårsgæst (pr/med apr - pr maj) og fåtallig efterårsgæst (aug - pr nov).


Ynglepar: 2-3 i Hattemåge-koloni ved Frederiksdal Hede (SFP), 1 nær Funder Kirke (JCN), 5 Dystrup Sø (GF, JTL) blev 14/7 set med henholdsvis 1, 1, 1, 1 og 2 pulli (JTL) og 5 par Brabrand Sø (KeH). Fra Mossø er der ingen indsendte yngle-obs!!

Træk: Brabrand Sø - se figur.

Mossø: 4/5 43 (HP), 24/5 1 (BHJ), 1/6 5 (JTL), 16/6 2 (FK), 6/7 15 (FL), 27/7 2 (H+JE), 17/8 9 (FL) og 28/8 10 (ET).

Ranten/Dystrup Søer: 14/4 6 (JP), 21/4 5 (HP), 3/5 14 (GF), 11/5 16 (HP) og 27/5 7 (TB).

Øvrige: 18/4 5 + 12/5 9 Hedese v/Kragelund (JCN), 30/4 2 Nørremose v/Nisser (SFP), 4/5 2 Lading Sø (TE), 27/5 2 Mørke Kær (SH) samt 1/9 1 Østerby Mose (BHJ) og 10/8 1 S + 8/11 1 N Fornæs (RD).



SORTHALSET LAPPEDYKKER · BRABRAND SØ

Ubekendt Albatros (Diomedes sp)

Se appendix I

Stor Stormsvalde (Oceanodroma leucorhoa)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårsgæst.

Et fund: 14/11 1 S kl. 8.10 Kysing Næs (LB, HLL). Iagttagelsen var ca 1 uge efter en næsten orkanagtig storm fra vest.

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Ret almindelig - almindelig hele året.

I år ret mange indlandsiagttagelser: Ørnso: 9/3 1 (SFP). Julsø: 14/4 1 (JCN). Birkesø: 24/8 3 (JT). Borre Sø: 4/6 2 (GW), 11/6 1 (JCN) og 2/8 1 (PB). Gudcn Sø: 17/10 2 (SFP). Salten Langsø: 5/4 5 (H+JE) og 1/6 3 (BHJ). Emborg Odde: 1/6 1 (BHJ), 6/7 17 (FL), 27/7 10 (H+JE) og 17/8 12 (FL). Fuldbro: 8/6 4 (ET). Skanderborg Sø: 21/6 1 (ET). Solbjerg Sø: 9/8 4 (BHJ). Kysing Fjord: 7/4 4 (PL), 28/7 10 (H+JE), 7/8 14 (HLL) og 8/9 15 (H+JE). Brabrand Sø: 2/4 1 (KeH), 7/4 3 (HLL), 12/5 6 (AJ), 26/5 4 (NÅ) og 23/9 3 (JWJ). Stubbe Sø: 10/11 25 (NÅ). Fussing Sø: 14/7 200 (KNM), 22/8 225 (JP) og 14/11 6 (PER). Udbyovre Sø: 17/5 1 (JP) og 16/6 1 (JP). Grund Fjord: 21/7 - 31/8 alm (FFa), 9/8 12 (LTP), 25/8 23 (FFa) og 8/12 1 (FFa). Mariager Fjord: 27/10 1 (KNM).

Store flokke: Kolderne, Samsø: 24/7 145, 25/7 188 og 26/7 273 (LeB). Issehoved: 5/4 90 (AJ) og 28/9 170 (SD). Hesselholm: 1/8 122 og 28/9 120 (SD). Alrø, Egehoved: 30/5 244, 2/6 476 og 4/6 251 (LPJ). Alrø, pollerne: 30/5 291 (LPJ). Vadegrund, Alrø: 6/7 64 (LPJ). Hov - Sælvig: 15/2 100 (PL). Århus - Kalundborg: 18/1 600 (JFT). Besser Rev: 8/8 130 (KB). Vejrs: 16/3 75 (LB). Bosserne: 16/3 300 (LB). Moesgård: 8/2 - 8/6 394 de fleste kommer fra Vorsø (Moes). Studstrup: 8/3 150 (LB). Sletterhage: 13/10 149 (LPJ). Gjerrild Strand: 5/3 110 og 7/3 185 (GF).

Træk: 5/4 100 trk + 7/4 24 trk Issehoved (AJ), 26/7 100-150 Ø Ørnso (SFP) og 12/10 - 20/10 2437 N + 72 S Sletterhage (JTL).

Topskarv (Phalacrocorax aristotelis)

Se appendix I.

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Er hørt/set på de to mest kendte lokaliteter, Brabrand Sø og Bjerregrav Mose. Desuden blev 1 observeret i januar på Engen, Anholt, men den døde blot få dage efter (medd HE), og den 4/4 blev et stærkt forrådneth ex fundet ved Tåstrup Sø (BHJ).

Bjerregrav Mose: 12/5 1, 21/5 1, 26/5 1, 4/6 1, 5/6 1 og 19/6 1 (SH, JTL, JNK, HP, LTP, JP).

Brabrand Sø: 21/7 1 set four (BHJ) og nov 1 ved Døde Å (John Loft).

Fiskehejre (Ardea cinerea)

Fåtalig ynglefugl. Ret almindelig hele året.

Ynglefund: 3 par Assing Hoved, Brasse (JCN), 10 par Tved Øhoved (JSP), 5 par Findes Mølledal (ET), 4 par Moesgård (SH).

Træk: 27/2 - 29/5 73 trk Gjerrild (GF), 10/3 - 22/5 47 trk Moesgård (Moes) og 1/9 14 S + 16/11 8 SØ Hesselholm (LeB).

Større tal: Kysing Fjord: 14/4 10, 26/6 30, 28/7 30, 29/9 25, 13/10 30, 10/11 25 og 30/11 35 (ET, HP, JVS, FL).

Øvrige: 24/2 30 + 5/3 48 + 28/12 42 Ørnse (SFP), 10/3 11 Brabrand Sø (AJ), 9/8 15 Grund Fjord, 3/10 28 Pøtse (SFP) og 6/10 43 + 20/10 20 Horskjær (HFj).

I alt 200 indsendte iagttagelser, hvilket er meget fint.

Sort Stork (Ciconia nigra)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

17/8 1 ad Alrø (JVS, OGJ).

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Meget sjælden yngletrækfugl og vintergæst. Sjælden forårstrækgæst.

I Randers fik storkeparret 3 unger på vingerne (HF). Storcken blev set i området fra med marts til pr sept og en enlig ved Kongslund 27/12.

Øvrige: 4/4 1 rst grenå (GF), pr apr 2 rst Engen, Grenå (GF), 22/4 1 N + 17/5 1 N + 23/5 1 N Moesgård (Moes), 17/5 1 N for Alrø (JDJ) og 19/6 1 Bjerregrav Mose (HP).


Knopsvane (Cygnus olor)

Ret almindelig - almindelig standfugl. Fåtalig ynglefugl.

Ynglefund: 1-2 par Kysing Fjord (LPJ), 1 par Mosse (LPJ), 4 par Mørke Kær (FK), 2-3 par Astrup Mose (FL), 1 par mose v/Vilhelmsborg (FL), 1 par Tranevig (JCN), 1 par Kolsø (JCN), 1 par Ørnse (JCN), 1 par vandhul v/Kragelund (JCN), 1 par Hedese v/Kragelund (JCN), 1 par Grund Fjord (FFa), 2 par Brabrand Sø (KeH), 1 par Lading Sø (KeH), 3 par Bjerregrav Mose (JP), 1 par Kongslund (JP), 1 par Højslet i Randers (JP), 3 par Udbyover Sø (JP), 1 par Laven (SFP), 1 par Tåstrup Sø (ET), 4 par Fussing Sø (PER), 1 par Fussing Vandmølle (PER), 2 par Hesselholm (LeB), 1 par Besser Rev (LeB), 1 par Gjerrild Nordstrand (GF), 5-10 par Ramten/Dystrup Søer (GF), 13 par Alrø Poller (KB) og 11 par Søby Rev (KB).

Store tal: 18/1 900 Assens, Mariager Fjord (LB), 19/1 358 Egå Marina (AJ), 9/2 900 Mariager Fjord (SH), 15/1 375 Egå Strand (HP), 8/3 200 Skøring Strand (LB), 6/4 130 Alrø (SH), 24/7 270 Stavns Fjord (LeB), 8/8 228 Besser Rev (KB) og 3/11 + 1/12 145 Alrø Poller (HFj).

Kysing Fjord - se figur.

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Fåtalig forårstrækgæst, sjælden om efteråret.

Forår: 6-7/4 8 rst på mark v/Gjerrild (GF), 8/4 9 Kysing Fjord (OGJ) og 14/4 7 NØ Gjerrild Nordstrand (GF).

Efterår: 20/10 + 3/11 5 Horskær (HFj) og 20/10 2 Kysing Fjord (OGJ).


Sangsvane (Cygnus cygnus)

Almindelig træk- og vintergast. Træffes i perioden med sep - ult apr.

Hele 160 iagttagelser af ca 2200 fugle er indsendt, hvoraf de 50 er fra Brabrand Sø. Denne gode dækning af "Søen" med 33 obs-dage giver et godt billede af Sangsvanens hyppighed her. Se figur.

I øvrigt er arten især set rastende ved Mossø, Salten Langsø, Studstrupværet, Kysing Fjord, Randers Fjord og Mariager Fjord. Trækkende flokke er observeret ved alle træksteder nær kysten.

Større obs i dato-orden: 12/1 75-83 Salten Langsø (SH, BRS), 12/1 81 Sminge Sø (BRS), 18/1 500 Assens, Mariager Fjord (LB), 27/1 125 Dania, Mariager Fjord (JP), 9/2 50 Mariager Fjord (SH), 9/2 60 Mossø (ET), 12/2 33 Studstrup (KeH), 18/2 65 Salten Langsø (TB), 18/2 35 Gudenå v/Lindholm (TB), 5/3 - 10/4 174 trk, max 1/4 52 NØ Gjerrild (GF), 9/3 60 Velle Mose (PH), 9/3 61 Langå (SH), 10/3 28 Kolindsund (GF), 12/3 36 Årslev Enge (JTL), 14/3 18 Kasted Mose (HE), 25/3 20 N Sabro (TB), 26/3 25 NØ Silkeborg Vesterskov (SFP), 2/4 25 Kolindsund (GF) samt 18/12 20 Sminge Sø (SFP) og 29/12 23 Hesselholm (LeB).

Ubekendt gås (Anser/Branta sp)

Der er i perioden 9/3 - 15/10 set 755 ubestemte gæs. Dog har de fleste observatører et bud på, hvad det er, de har set, men disse "gæt" vil af pladshensyn blive udeladt her.

Største flokke: 13/4 150 Ø + 320 NØ Brabrand Sø (LB, JTL), 26/7 29 Alrø Pølser (SFP), 29/9 60 SV Bryrup (JB) og 15/10 108 SØ + 26 S Helgenæs (JTL).

Sædgås (Anser fabalis)

Fåtallig forårstrækgæst og fåtallig - ret almindelig efterårstrækgæst.

Forår: 10/3 - 8/4 23 trk Gjerrild (GF), 16/3 4 N Kysing Næs (AJ), 28/3 1 N Moesgård (Moes), 3/4 2 trk Fornæs (HLL) og 16/4 2 V Århus Universitet (BHJ, LW).

Efterår: 13/10 98 Sletterhage (JTL).

Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)

Meget få sikre iagttagelser. Sjælden i trækperioden.

3/2 4 Mossø (HP), 10/3 2 NØ Gjerrild (GF) og 17/11 2 S Hesselholm (LeB).

Blisgås (Anser albifrons)

Sjælden og uregelmæssig forårstrækgæst.

11/3 5 Kysing Fjord (FF), 4/4 1 SV Hesselholm (LeB) og måske samme fugl 5/4 1 N Fornæs (GF).

Grågås (Anser anser)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl, ret almindelig forårstrækgæst og fåtallig sensommergæst (jul-aug). Måske sjælden vintergæst.

Usædvanligt med manglende obs sep-nov.

Ynglefund: 1 par Emborg Odde (BHJ, SH, JTL), 2 par Bjerregrav Mose (SH, JTL).

Formodede par ved: Brabrand Sø, Klosterkær Enge, Alrø og Mørke Kær. Kig godt efter her i 1986!

Forår (flokke på over 20 nævnes): 3/3 27 Mossø (TB), 3/3 - 27/5 104 trk Gjerrild (GF), 3/3 - 21/5 56 trk Moesgård (Moes), 8/3 25 Salten Langsø (JVS), 9/3 36 N Kysing Næs (LPJ), 9/3 26 Klosterkær Enge (OGJ), 11/3 27 Kysing Fjord (FF), 4/4 21 V Blid Sø (LB), 19/5 25 Alrø Poller (NH) og 5/6 28 ad + 24 pull Bjerregrav Mose (JTL).

Sensommer: Er ikke set senere end 7/8!!? 18/7 6 + 6/8 4 Hesselholm (LeB), 20/7 2 + 26/7 4 Alrø (OGJ, TB, ET), 31/7 hørt Tolykke Skov (BHJ) og 7/8 2 Kysing Fjord (HLL).

Vinter: 19/1 4 (parkfugle?) Salten Langsø (JCN).

Snegås (Anser caerulescens)

Een yderst sjælden iagttagelse for amtet: 20/1 kl 12.28 4 SØ Studstrupværket (AJ).
Undslupne ?? - ellers den rigtige årstid for de "rigtige".

Kanadagås (Branta canadensis)

Fåtallig forårgæst, meget sjælden - sjælden sommergæst og fåtallig vintergæst.

Forår: 10/3 4 + 27/3 4 Råby Odde (JP), 14/3 - 24/5 5 trk Gjerrild (GF) og 27/4 7 NV
Kalø Vig (LLH).

Sommer: 1/8 1 rst Hjortsholm, Samsø (SD) og 1/8 1 + 4/2 1 Hesselholm (LeB). Disse 3
obs drejer sig muligvis om samme fugl.

Vinter: 9/2 3-4 Mossø (ET), 9/2 1 Mariager Fjord (SH) samt 8/12 5 NØ nær Fussing (AJ).
Og så er der set en større flok i Århus-området. 9/12 27 + 10/12 25 + 11/12 25
Brabrand Sø (J. Loft), 28/12 23 Århus Østhavn (JFT), 30/12 22 NØ Egå (H. Christiansen).

Bramgås (Branta leucopsis)

Sjælden og uregelmæssig forårstrækgæst.

13/3 2 Ø Gjerrild (GF), 4/4 2 Issehoved (PH, AJ) og 25/5 1 Flakket, Anholt (OGJ).

Knortegås (Branta bernicla)

To racer er igen truffet i år.

Lysbuget Knortegås (B. b. hrota)

Kun to iagttagelser! Kan det da være rigtigt?

7/3 11 rst Gjerrild Strand (GF) og 27/3 ca 200 Sødring, Randers Fjord (JP).

Mørkbuget Knortegås (B. b. bernicla)

Tallene indeholder også de ikke racebestemte!!

Ret almindelig i trækperioden (ult sep - pr maj). I alt er 696 individer set.

Flest: med mar - med maj 21 trk Ø Gjerrild Strand (GF), 27/3 ca 50 Sødring, Randers
Fjord (JP), 2/4 15 + 7/4 86 + 8/4 85 + 2/5 14 + 4/5 65 NØ + 4/5 115 rst Hesselholm
(LeB), 7/4 30 Besser Rev (KH) og 12/10 37 S Ørting (HP).

Rustand (*Tadorna ferruginea*)


En iagttagelse: 27/11 1 han Gudenå Bredningen, Randers (KNM). Skyldes sandsynligvis en undsluppen fangenskabsfugl.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Fåtalig ynglefugl, ret almindelig træk- og sommergæst (pr mar - nov/dec) og sjælden - fåtalig om vinteren.

Yngel: i alt 19-23 par indrapporteret: Brabrand Sø 2-3 (6, 5 og 8 pulli set) (FK, MCR, KeH), Kysing Fjord 1 (3 pulli set) (ET, LPJ, H+JE), Ørnse 0-1 (parringsadfærd, men ingen pulli) (SFP), Lilleå/Haarvadbros 1 (2 pulli set) (SMJ), Øer 1 (pulli set) (FF), Ahlhage 1 (pulli set) (FF), Kalø Ruin 1 (8 pulli set) (JT), Kyholm 2 (PHH), Vejre 2 (PHH), Fussing Sø 5 (PER), Grund Fjord min 3-5 (FFa).

Overvintring: Eneste større forekomst er 29/12 132 Alrø Poller (HFj).

Mandarinand (*Aix galericulata*)

Se appendix II.

Pibeand (*Anas penelope*)

Ret almindelig træk- og vintergæst (ult aug - apr) og meget sjælden sommergæst.

Sommerfund: 14/7 1 par i fældning Ring Sø (JTL).

De sidste forårsobs: 3/5 2 Kysing Fjord (OGJ), 5/5 4 Alrø (SH) og 4/5 2 Brabrand Sø (AJ).

De første efterår: 20/8 25 Grund Fjord (FFa) og 24/8 4 Kysing Fjord (OGJ).

Et par store tal: Brabrand Sø 27/3 21 (AJ), Alrø 6/4 350 (SH) og fra Kysing Fjord max forår 7/4 350 (PL) og max efterår 27/10 893 (FL).

Knarand (Anas strepera)

Sjælden forårstrækgæst (mar/pr apr - med maj), meget sjælden, uregelmæssig sommergæst (juni) og sjælden efterårstrækgæst (aug - sep/pr okt).


Alle obs nævnes: medio april 1 han Ramten-Dystrup (GF), 19/6 1 hun Brabrand Sø (KeH, FK), 18/8 1 Kysing Fjord (OGJ) og 20/9 2 hun Brabrand Sø (Vagn Jakobsen).

Krikand (Anas crecca)

Meget sjælden - sjælden ynglefugl, ret almindelig forårstrækgæst (ult mar - pr maj), fåtallig sommergæst (med maj - ult aug), ret almindelig - almindelig efterårstrækgæst (pr sep - med nov) og fåtallig vintergæst (ult nov - med mar).

Ynglefund: i alt 1-3 par: Gjerrild Nordstrand 1 (GF), Ramten Dystrup 1 muligt (GF) og Grund Fjord 1 muligt (FFa).

Årets største forekomst: 30/9 1010 Kysing Fjord (LPJ).



Spidsand (Anas acuta)

Sjælden - fåtallig forårs- og efterårstrækgæst (med mar - pr maj og pr okt - pr dec).
Sjælden sommergæst (med maj - ult sep).

Kysing Fjord: 17/3 1 han (AJ), 29/3 13 (HP), 16/8 1 (HLL) og fra 30/9 12 til 8/12 2 par (LB). Herimellem 13 obs max 27/10 9 han, 3 hun (BHJ, FL).

Hesselholm: fra 30/3 2-4 til 27/4 1 par. Herimellem 4 obs, max 31/3 4 han, 5 hun. Desuden en sen obs 25/5 1 han Ø (LeB, SD).

Brabrand Sø: 2/5 - 7/5 1 par (HLL, PNN, KeH) og en sommerobs 19/6 1 hun (FK).

Øvrige (alle obs nævnes): 27/3 3 hun, 3 han Sødring (JP), 14 - 15/4 1 han, 1 hun Assedrup Enge (ET), sep op til 10 (min 4-5 skudt, iflg jæger) Grund Fjord (FFa) og 19/10 1 Sletterhage (JTL).

Atlingand (Anas querquedula)


Sjælden forårstrækgæst (apr - maj) og meget sjælden efterårstrækgæst (aug).

Som 1984 et dårligt år, men denne gang helt katastrofalt! Kun fire observationer i alt: 30/4 1 hun Vilhelmsborg Sø (OGJ), 16/5 1 han Døde Å, Brabrand Sø (HP), 30/5 1 hun Ramten-Dystrup (GF) og 7/8 1 han Kysing Fjord (HLL).

Skeand (Anas clypeata)

Meget sjælden yngltrækfugl. Fåtalig forårstræk- og sommergæst (ult mar - med jun) og fåtalig - ret almindelig efterårstrækgæst (ult jul - med nov).

Ynglefund: Vesterkær v/Auning 1 par (8 pulli set) (JTL).



SKEAND

Træk: Første obs 25/3 2 N Moesgård (Moes) og 26/3 1 han, 1 hun Brabrand Sø (HLL).
Og de sidste 17/11 6 (SH) og 30/11 1 han (ET) Kysing Fjord.

Årets største forekomst var 27/10 102 Kysing Fjord (FL, BHJ).

Rødhovedet And (*Netta rufina*)

Sjælden og uregelmæssig gæst.

1/3 2 han, 2 hun rst syd for Grenå Havn (GF).



Taffeland (*Aythya ferina*)

Fåtalig ynglefugl, ret almindelig træk- og vintergæst (med sep - ult maj) og fåtalig sommergæst.


I alt 10-13 ynglepar er indrapporteret: Brabrand Sø 1-2 (31/7 1 hun m 4 pulli (KeH) og 4/8 1 hun m 5 pulli (LB)), Nørremose 1 (2/7 hun m pulli (SFP)), Ring Sø 1 (13/7 hun m 3 pulli (JTL)), Dystrup Sø 2 (14/7 2 hun m 5 og 6 pulli (JTL)), Ramten-Dystrup 3-5 par (GF), Mørke Kær 1 (20/7 1 hun m 5 pulli (JTL)), Kragemosen 1 (21/7 3-4 pulli (LeB)), Auning Gavl 1 (27/7 1 hun m 6 pulli (JTL)) og Hesselholm 1 (18/7 - 6/8 hun m 6 pulli (LeB)).

Årets største forekomst: 29/9 315 Kysing Fjord (HP).

Troldand (*Aythya fuligula*)

Fåtalig ynglefugl. Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (sep - maj).
Fåtalig - ret almindeligt oversomrende.

I alt 10-16 ynglepar er indrapporteret: Ring Sø 2-3 (13/7 1 hun, 4 pulli og 14/7 2 par m 6 og 8 pulli (JTL)), Eskelund 1 (16/7 1 hun, 5 pulli (KeH)), Østerby Mose 1 (21/7 1 hun, 3 pulli (BHJ)), Ramten-Dystrup 5-10 par (GF) og Varna, Marselisborg Skov 1 (21/5 pulli set (FK)) - er meget tidligt.



Bjergand (Aythya marila)

Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (okt - apr).

Den hårde vinter drev i jan - mar mange fugle ind til kysterne, derfor opstår det høje månedstal i februar. Heri findes dog sandsynligvis mange gengangere.

Indlandsobs, kun tre iagttagelser i år: 10/2 1 hun (AJ) og 19/2 1 hun (HLL) Brabrand Sø samt 21/4 1 par Ramten-Dystrup (HP).

Forår: Mange obs fra en mængde lokaliteter, især Tangkrogen, Århus Havn, Egå og Studstrup. Mere spredt i resten af amtet. Antal over 1000 nævnes: 16/1 162 Hassensør (LPJ), 30/1 350 Studstrup (HLL), 6/2 650 Studstrup (HLL), 15/2 650 Egå Strand (HLL, HP) og 20/2 150 Studstrup (AJ). Fuglene forsvinder langsomt i slutningen af marts og i april ses kun få fugle.

Trækket ved Gjerrild Nordstrand: 7/3 - 31/3 402 trk, max 13/3 170 Ø (GF) og 14/3 110 Ø (GF).

Forårets sidste var 3/5 1 han sommerdragt, Kysing Fjord (OGJ).

Efterår: Langt færre observationer og fortrinsvis fra enkelte lokaliteter: Fornæs, Østre Hedekrog, Kysing Næs og Gjerrild Nordstrand. Eneste store forekomst 8/12 140 N + 10 rst Kysing Næs (LB).

Se desuden tabellen, som viser summeret antal fugle pr måned.

jan	feb	mar	apr	maj	okt	nov	dec
656	1755	662	116	1	12	55	289

Ederfugl (Somateria molissima)

Almindelig ynglefugl og meget almindelig trækgest.

Ynglefund: Stavns Fjord: første pulli 15/5 7 (LeB), 16/5 35 (LeB), bestanden ikke optalt, men sandsynligvis på ca 2000 par. Alrø Egehoved 30/5 4 + 8 + 16 pulli (LP) og 4/6 107 pulli (LP), Alrø Poller 30/5 5 pulli (LP), Alrø Vadegrund 6/7 2 par m 3 og 2 pulli (LPJ), Søby 30/5 35 pulli (LP), Hov Havn 15/6 1 hun m 9 pulli (BHJ), Hjelm 3 par (PHH), Kyholm flere m kuld (PHH), Øer 2 par 15/7 2 hun m pulli (JTL), Søby Rev 260 par (KB, JG), Alrø Poller 242 par (KB) og 238 par (JG), Hov Røn 1283 par (JG), Svanegrunden 165 par (JG). Bestanden tæller således næsten 4000 par.

Desuden mange meget store forekomster. Her kan nævnes 71146 trækkende mellem 1/3 og 10/5 ved Gjerrild Nordstrand (GF) med 20/3 8105 Ø og 22/3 8505 Ø som de største dage.

Store flokke af rastende fugle: 15/3 8000 Gjerrild Nordstrand (GF), 16/3 min 2000 Kysing Næs (AJ), 27/3 25500 Gjerrild Klint (GF), 20/10 10000 N Fornæs (RD), 3/11 2250 N Fornæs (JSP), 17/11 min 5000 mellem Hov og Sælvig (Chr. Lange) og 30/11 25000 Issehoved (SD, LeB).

Kongeederfugl (Somateria spectabilis)

Se appendix I.

Havlit (Clangula hyemalis)

Fåtalig træk- og vintergæst (med nov - pr apr), dog i år ret almindelig trækgest i marts v/Gjerrild Nordstrand.

Meget sjælden, uregelmæssig gæst ved ferskvand og følgende obs er derfor meget usædvanlige: 15/11 1 han, 1 hun (JTL) + 17/11 1 han (Vagn Jakobsen) Brabrand Sø.

Kysing Næs: 17/1 1 han (JFT), 16/3 1 han (OGJ), 14/11 2 hun S (LB, HLL), 16/11 1 hun rst, 2 han S (NÅ) og 17/11 2 S (LB).

Fornæs: 23/3 1 han S (ØBF), 3/4 1 han (HLL), 10/11 3 han N (OGJ, NÅ), 16/11 16 trk (HP) og 17/11 4 trk (HC).

Gjerrild Nordstrand: 11/3 - 12/4 386 trk, max 19/3 181 Ø, 20/3 58 Ø og 22/3 78 Ø (GF).
Er meget høje tal.

Østre Hededkrog: 1/4 2 + 16/11 1 han + 30/11 5 han (LeB).

Øvrige: 16/2 2 par Århus - Kalundborg (NÅ), 31/3 1 han, 1 hun Århus - Kalundborg (OGJ), 7/4 6 Svanegrunden (KH), 9/4 3 S Moesgård (Moes) og 25/4 6 N Århus Havn (LLH).

Sortand (Melanitta nigra)

Almindelig træk- og vintergæst (sep - apr) og meget sjælden - sjælden sommergæst. Sjælden - fåtallig ved ferskvand.

Indlandsobs: 6/2 1 han Kysing Fjord (JFT), 4/4 1 han Reservatet, Kysing Fjord (brakvand) (LPJ) samt 7/4 6 han 5 hun (PNN, LB, HLL, KeH) - er helt usædvanligt og sandsynligvis uden fortilfælde - 10/4 - 13/4 1 par (KeH) og 15/6 1 han (LB) alle Brabrand Sø.

Kun enkelte store forekomster (over 1000): 1/2 2500-3000 V for Samsø (JFT), 20/3 1620 Ø (GF), 28/3 2300 (GF), 5/9 2328 Fornæs (RD) og 9/11 12 Ø + 250 2 rst Gjerrild Nordstrand (KNM).

Fløjlsand (Melanitta fusca)

Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (sep - apr) og sjælden sommergæst.

Sommerfund: 15/7 1 han N Øer (JTL) og 22/7 2 Østre Hedekrog (LeB).

Store forekomster (over 100): 15/2 400 Århus - Kalundborg (JFT), 16/2 422 Århus - Kalundborg (NÅ), 1/3 - 17/4 1005 trk, max 19/3 177 Ø + 20/3 188 Ø Gjerrild Nordstrand (GF), 4/4 123 Hov - Sælvig (AJ) og 15/10 min 150 Sælvig Bugt (Chr. Lange).

Hvinand (Bucephala clangula)

Ret almindelig - almindelig træk- og vintergæst (sep - maj) og sjælden sommergæst.

Sommerfund: 9/6 1 par Kysing Fjord (LPJ), 8/7 3 juv Kongslund (JP), 11/7 1 imm (hun) Flakket, Anholt (JB) og 14/7 2 Grund Fjord (FFa).

Store forekomster (over 250): 26/1 min 300 SØ for Samsø (SD), 9/3 44 Studstrup + 390 Studstrup - Egå Marina (AJ), 6/4 1000 Alrø (SH).

Træk: 1/3 - 10/4 727 trk, max 7/3 255 Ø Gjerrild Nordstrand (GF).

Lille Skallesluger (Mergus albellus)

Fåtalig vintergæst (med nov - med apr).

Helt usædvanligt mange obs i årets første halvdel og som sædvanligt få i sidste. Desuden set på usædvanligt mange lokaliteter.


Kysing Fjord - se figur. Max 10/2 4 han, 4 hun og 8/12 6 han, 2 hun. Af de kønsbestemte fugle fås følgende fordeling: 46 han og 39 hun.

Grenå Havn: 18/1 1 han, 2 hun (CO), 20/1 1 han, 2 hun (JNK), 22/1 3 han, 2 hun (JNK), 3/2 1 hun (JNK) og op til 6 i februar, de sidste 28/2 (GF).

Studstrup: 19/1 5 hun, 3 han (AJ), 20/1 4 hun, 3 han (AJ), 30/1 2 hun (HLL) og 9/3 1 han, 2 hun (AJ).

Brabrand Sø: 30/1 1 han, 3/2 1 par, 19/2 1 han, 3/3 2 hun, 6/3 2 hun, 13/3 1 hun, 15/3 2 hun, 16-17/3 1 hun, 25-26/3 3 hun, 29/3 3 hun, 3/4 1 hun, 7/4 1 hun, 11/4 1 hun (LB, KeH, AJ, HLL, PNN, HP) samt 15/11 1 hun (John Loft).

Øvrige: 6/1 1 hun Århus Østhavn (OGJ), 18/1 1 hun Assens v/Mariager (LB), 25/1 1 hun Egås udløb (FF), 27/1 + 12/2 3 han, 2 hun Kysing Næs (LPJ, HLL), 18/2 Gudenå v/Lindholm (TB), 19/2 1 han Eskelund (KeH), 3/3 1 han, 3 hun (TB, ET), 6/3 1 han Silkeborg Langsø (JSP), 9/3 1 han Ø Gjerrild Nordstrand (GF), 9/3 1 han Studstrup - Egå (AJ), 11/3 1 han Egå Marina (PNN) og 17/3 1 Grund Fjord (FFa).



LILLE SKALLESLUGER · ■ KYSING FJORD
□ HELE AMTET (INCL. KF)


Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Fåtalig ynglefugl. Resten af året fåtalig - ret almindelig.

Ynglefund: Horsker 1 par (LPJ), Hov Røn 6 par (JG), Kysing Fjord 3 par (LB, H+JE, SFP, ET) og Hjelm 2 par (PHH). Der må være mange flere.

Indlandsobs: 25/1 2 (FK), 3/2 5 (FK) og 17/3 3 (Vagn Jakobsen) alle Brabrand Sø.

Store forekomster (over 50): 9/3 - 11/5 1053 trk, max 20/3 151 Ø og 22/3 105 Ø Gjerrild Nordstrand (GF), 7/4 51 (PL) + 29/9 171 (HP) + 30/9 71 (LPJ) Kysing Fjord, 9/11 min 60 + 10/11 min 100 Hesselholm (SD) og 1/12 ca 150 Lilleøre (SD).




Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Ret almindelig træk- og vintergæst (nov - pr maj) og meget sjælden sommergæst.

Sommerfund: 5/7 2 N Fornæs Fyr (RD).

Træk: Gjerrild Nordstrand: 9/3 - 9/5 119 trk (GF) og Moesgård: ialt 49 trk + 44 rst (Moes).



Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Formentlig fåtallig yngletrækfugl. Ret almindelig forårstrækgæst (maj - jun) og fåtallig efterårstrækgæst (aug - sep).

I alt 850 iagttagelser er unormalt mange. I lighed med 1984 sås et svagt træk i juli. Kendskabet til ynglestatus er begrænset, men søges for tiden belyst af Jørgen Terp Laursen.

Yngel: 7/7 og 10/8 1 par Støvring Skov (JP), 16/8 1 par Skivholme Skov (KeH), desuden 1 par Fjeld Skov, Skaføgård samt Mols Bjerger (JTL).

Forår: 802 iagttagelser med mulighed for gengangere. Normal kulmination med maj - ult maj. Første obs: 2/5 1 Skovby (JTL), 6/5 1 N Anholt (HE), se i øvrigt under trækstederne.

4 største dage (Kr. Himmelfart og Pinseferie): 16/5 61 N + 1 S Risskov (HLL), 17/5 11 trk Hesselholm (LeB) + 45 N Risskov (HLL) + 57 N Moesgård (Moes, max-dag), 26/5 31 Anholt (OGJ) + 63 Helgenæs (JTL) + 4 N Salten Langsø (LB), 27/5 32 N Helgenæs (JTL) + 44 Ø Gjerrild (TB, ET).

Trækstederne - en summering: Gjerrild Fuglestation: 5/5 - 11/6 322 trk, melder ingen koncentration af betydning (GF). Moesgård 10/5 - 6/6 147 trk (Moes), Risskov 16/5 - 8/7 112 trk (HLL), Samsø 17/5 - 27/7 25 trk (LeB, SD), Helgenæs 24/5 - 27/5 101 trk (JTL), Anholt 6/5 og 24/5 - 26/5 49 trk (HE, OGJ).

Juli-trækket (alle obs): 2/7 1 trk + 8/7 1 trk Risskov (HLL), 20/7 2 + 21/7 1 Hesselholm, Samsø (LeB), 27/7 3 ad N Brøndkær, Samsø (LeB, SD) og 27/7 2 ad N Langdalen, Samsø (LeB).

Efterår: 31 iagttagelser. Sidste: 16/9 1 + 18/9 2 Kysing Fjord (HLL), 17/9 1 Risskov (HLL). Desuden en sen 20/10 1 Brabrand Sø (FK).

Sort Glente (Milvus migrans)

Sjælden forårstrækgæst (ult apr - med jun) og meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst og sommergæst.

I alt 13 obs, som, skønt der måske er enkelte gengangere, gør 1985 til et enestående år.

For første gang sommergæst: 2/7 1 juv SØ Damsbro Mose (SMJ) og 16/7 1 kreds Rønde (RD).

Forår: 6/5 1 NØ Gjerrild (GF), 11/5 1 ad rst, Kysing Fjord (LLH), 17/5 1 N Moesgård (Moes, HP), 18/5 2 tf Gjerrild (GF), 19/5 1 rst - SV Moesgård (Moes, PH), 26/5 1 rst Salten Langsø (LB), 29/5 1 rst Horslev Krat (TB), 2/6 1 N Moesgård (Moes) og 5/6 1 Åbyhøj (HE).

Efterår: 12/10 1 Trekanten, Samsø (LeB). Første efterårsobs siden 18/8 1977.

år	77	78	79	80	81	82	83	84	85
ex	3	0	1	2	1-2	0	3	2	13

Rød Glente (Milvus milvus)

Meget sjælden yngltrækfugl, måske meget sjælden/sjælden sommergæst (jun - med aug), fåtallig forårstrækgæst (med mar - maj) og sjælden efterårstrækgæst (ult aug - pr nov).

55 iagttagelser foruden 1 vellykket yngleforsøg er den imponerende sum af årets Røde Glenter. Århus-området og Gjerrild tegner sig for broderparten af forårsiagttagelserne.

Rød Glente er under indvandring som ynglefugl i vort amt, og ved et evt. fund af ynglepar, bør man kontakte Rovfuglegruppen. Derfor nævnes ingen lokaliteter fra sommeren. Alle obs nævnes.

Sommer: 1 sikkert ynglepar - 1 unge (JTL, SMJ) og 7/7 1 muligt ynglepar på anden lokalitet (PNN) samt enkeltfund: 2/6 1 (OGJ), 13/6 1 (AJ), 28/7 1 (TB), 4/8 1 (KB) og 12/8 1 (AJ).

Forår: Gjerrild: i alt trak 24, fordelt på 17/3 1, 19/3 1, 2/4 2, 4/4 2, 14/4 3, 16/4 3, 17/4 1, 18/4 3, 19/4 1, 20/4 2, 21/4 1, 14/5 1, 18/5 1 og 3/6 1 (alle GF), desuden 11/5 1 tf (HP).

Moesgård: i alt trak 8 ex fordelt på 25/3, 1/4, 13/4, 16/4, 22/4, 25/4, 4/5 og 2/6, tilsammen rekord for stedet (Moes, oma).

Århus-området: 2/4 1 N Skanseparken (NÅ), 4/4 1 N Brabrand Sø (BHJ), 8/4 1 N Brabrand Sø (Keh), 18/4 2 Trige (LTP) og 13/5 1 Århus Forbrænding Nord (AJ).

Øvrige: 18/3 1 Næsby (CO), 2/4 1 NV f/Gjerrild (CO), 14/4 1 Langemark, Samsø (medd JB), 21/5 1 N Randers (KNM) og 23/5 1 SV Sabro (TB).

Efterår: 17/8 1 Alrø (JVS), 24/8 1 juv Alrø (OGJ), 25/8 1 juv Kysing Fjord (OGJ) og 3/11 1 Østerhede, Samsø (LeB).

Havørn (*Haliaeetus albicilla*)

Sjælden trækfugt (med mar - maj). Meget sjælden vinterfugt.

10 iagttagelser fra foråret, ingen fra efteråret samt 1 fra vinteren gør 1985 til alle tiders rekordår. I alt 11 iagttagelser er ligeså mange som i de foregående 8 år tilsammen. Der ser ud til at være nogle gengangere, men det selv. Årsagen til det store er bl.a. den strenge vinter, der tvang mange ørne ud på et længere vintertræk end normalt. Det er heldigt, at der netop i foråret 1985 var en forøget observationsaktivitet ved såvel Moesgård som Gjerrild, så vi kunne registrere Havørnetrækket. Alle obs bringes - bemærk de/den adulte Havørne.

Gjerrild: 3/3 1 3K NØ, 9/3 1 imm R, 16/3 1 ad NØ, 16/4 1 3K NØ, 18/4 1 3-4K N og 19/4 1 ca 3K NØ (GF).

Moesgård: 16/3 1 ad V kl. 12.45 (OGJ), 27/3 1 sub-ad kl. 11.53 (HLL) og 15/4 1 ad NØ kl. 14.55 - 15.09 (JTL).

Øvrige: 26/5 1 ad N Hesselholm, Samsø kl. 11.50 (LeB).

Eneste vinterobs: 21/2 1 four. Grenå Havn (GF).

år	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
vinter-forår	1	1				2	1			11
efterår-vinter			1		1-2	2				
sommer									1	
heraf adulte			1							4

Gåsegrib (*Gyps fulvus*)

Meget sjælden og uregelmæssig fugt.

Sidst set i amtet i foråret 1858!

22-23/5 1 imm Gjerrild (GF) - er godkendt af SU. Fuglen sås senere i Nordjylland og på Langeland.

Blå Kørhøg (*Circus cyaneus*)

Ret almindelig forårstrækfugt (ult mar - med maj), fåtallig efterårstrækfugt (ult sep - nov/dec) og sjælden vinterfugt.

Total antal iagttagelser: 155-159. Et tal, der er 2-3 gange over det normale, og som fremkommer ved det store træk fra Gjerrild. Udelader man Gjerrild, er der iagttaget 50-54 fugle, hvilket ligger inden for den normale ramme.


Forår (128-130 ex): Gjerrild: 4/4 - 31/5 105 trk, max 6/5 31 Ø og 7/5 12 Ø (GF). Moesgård: 8/4 - 8/5 9 trk (deraf 4 hanner), max 8/4 2 N (Moes). Et stort år ved Moesgård, hvor et højt aktivitetsniveau resulterede i et stort antal iagttagelser ligesom i 1972.

Alle øvrige: 15/3 1 brun Brabrand Sø (AJ), 20/3 1 hun N Skanseparken, Århus (NÅ), 28/3 og 29/3 1 hun Brabrand Sø (JTL, KeH), 8/4 1 brun N Brabrand Sø (KeH), 8/4 1 hun Issehoved (AJ, PH), 14/4 1 brun Veggørslev (PN), 30/4 1 hun Moselund (JCN), 1/5 og 3/5 1 hun Anholt (HE), 6/5 1 hun/juv N Brabrand Sø (PNN), 11/5 1 hun/juv NØ Gjerrild (HP), 17/5 1 hun Fløjstrup (JDJ), 17/5 1 brun N Brabrand Sø (KeH), 19/5 1 hun Moselund (JCN) og 26/5 1 hun Anholt (OGJ).

Sommer: 1 meget usædvanligt fund 15/7 2 hanner S for Kolby, Samsø (GW) er nok første sommerfund fra Århus Amt.

Efterår (17-18 ex): 22/9 1 hun Lerdrup Vig (HFj), 28/9 1 han Haarvadbro, Lilleå (SMJ), 12/10 4 brune forbitrækkende/indtrækkende (kl. 9.29 - 10.25) Kysing Næs (HP, BHJ, LPJ), 12/10 2 brune S + 17/10 1 brun S + 18/10 1 brun S Sletterhage (JTL), 17/10 1 hun/juv Sødringør (LTP), 19/10 1 hun/juv SV Kysing Fjord (HP), 19/10 1-2 Salten Langsø (TV), 20/10 1 rst Højlund Skov (TV), 27/10 1 hun/juv S Kysing Fjord (OGJ, JVS), 3/11 1 hun/juv S Malling (OGJ) og 17/11 1 han Råby Odde (JP).

Vinter (8-9 ex): 2/1 1 hun/juv Kristrup Enge (LTP), 4/1 1 four Højlund Skov (TV), 21/1 og 22/1 1 rst Mossø-vest (TV), 19/2 1 brun Lyngby (JTL) samt 1/12 1 Kalsemade (SH), 29/12 1 hun Alrø Poller (HFj), 30/12 1 four Salten Bro (TV) og 31/12 1 han Sellingbæk, Lilleå (SMJ).



Rørhøg (Circus aeroginosus)

Måske fåtallig yngletrækfugl (apr - sep), fåtallig forårstrækgæst (apr - maj) og måske sjælden efterårstrækgæst (aug - sep).

I alt 264 iagttagelser, heraf alene 125 fra Brabrand Sø. Især det sidste tal indeholder dog utvivlsomt mange gengangere.

Yngel: Brabrand Sø: 1 par, 23/7 og 24/7 er der set transport af bytte (TB og BHJ), 4/8 1 hun + 2 juv (TB).

Samsø: Kragemosen - 1 par, 27/7 1 juv (LeB). - Tranemosen, Væsborg og Brattingsborg rummede hver 0-1 par.

Fra de øvrige potentielle yngelokaliteter er der i alt 20 iagttagelser at fordele på såvel sommer- som trækperiode. Dette er ikke tilstrækkeligt til at give et tilnærmelsesvist dækkende billede af Rørhøgens yngleforhold i amtet. Vi bringer de 20 iagttagelser:

Randers-egnen: 6/4 1 hun Vasen (KNM), 2/5 1 2K han Vasen (AJ), 18/5 1 hun Kongslund (JP), 10/8 1 Kongslund (JP) og 22/8 1 hun Dronningborg Bredning (LTP).

Grund Fjord: 27/7 1, 25/8 2, 28/8 1, 31/8 1 (alle FFa).

Dystrup-Ramten Sø: 21/4 1 han (HP) og 27/5 1 han four (TB, ET).

Anholt: 3/5 1 ad hun Flakket (HE), 25/5 1 hun (OGJ) og 26/5 1 han og 7 hunner (OGJ).

Stubbe Sø: 14/4 1 (PN).


Øer: 4/5 1 han rst (KH).

Tunø: 15/6 1 (BHJ).

Lerdrup Vig: 5/6 1 hun (KB), 28/7 1 hun S Horskær (LPJ) og 3/8 1 han og 1 hun Alrø (OGJ).

Mossø: 1/6 1 hun Emborg Odde (SH, BHJ) og 1/6 1 hun Rye Bro (SH).

Øvrige: 7/4 1 ad hun Malling Møse (OGJ), 9/5 1 hun Malling Møse (OGJ), 17/5 1 han Engesvang (JCN) og 20/5 1 Kasted Møse (SH).



Forårstræk: Første obs 31/3 1 han Brabrand Sø (LPJ, SH) og 1/4 1 han + 1 3K han Brabrand Sø (LB), hvorefter man dagligt kunne se flere Rørhøge her.

Brabrand Sø max: 7/4 2 han + 2 hun (HLL, PNN, LLH), 14/4 1 ad han + 1 2K han + 2 ad hun + 1 2K hun (AJ, LLH, JWJ, PNN), 19/4 1 han + 2-3 hun (MCR), 5/5 1 han + 2 hun (KH), 6/5 1 ad han + 1 sub ad han + 1 juv (TB, JTL, KH) og 18/5 2 ad han + 1 2K han + 1 ad hun + 2 juv (JTL).

Gjerrild: 7/4 - 4/6 48 trk, max 17/5 13 Ø (GF) og supplerende 1/4 1 han N (LPJ) og 11/5 1 hun NØ (HP). I alt 50 ex.

Moesgård: 1/4 - 25/5 16 trk, max 17/5 3 hun/juv og 18/5 4 juv N (Moes) - rekord-år.

Øvrige: 18/5 3 N Grenå Enge (JNK) og 27/5 2 N Helgenæs (JTL).

Efterårets største og 3 sidste obs: 25/8 3 hun Kysing Fjord (OGJ), 31/8 1 juv Kragemoen (LeB), 31/8 1 Grund Fjord (FFa) og 25/9 1 Brabrand Sø (JTL).

Forårstrækket viste tal, der var 5-10 gange større end de foregående års. Måske er 1985 året for det største, registrerede forårstræk af Rørhøge i amtet nogensinde. Den store dag på Anholt ligger umiddelbart efter sidste obs på ovennævnte træksteder. De mange forskellige observationer fra Brabrand Sø afspejler formentlig også årets store træk over amtet. Rørhøg indberettes sjældent fra det midtjyske område, hverken i træk- eller yngletid.

Steppehøg (Circus macrourus)

Se appendix I

Hedehøg (Circus pygargus)

Sjælden forårstrækgæst (maj). Meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst pr - med aug).

8 iagttagelser fra foråret og 1 fra efteråret er det største, registrerede antal på et enkelt år. Vi bringer alle obs.

Forår: 3/5 1 imm han Ø Gjerrild (GF), 6/5 2 brune Ø Gjerrild (GF), 11/5 1 2K han N Moesgård (Moes, JTL), 15/5 1 ad hun Ø Gjerrild Nordstrand (RD), 17/5 1 hun/juv N Risskov (HLL), 26/5 1 han Anholt (OGJ) og 3/6 1 brun Ø Gjerrild (GF).

Efterår: 7/8 1 ad hun Kragemoen, Samsø (LeB) er ikke den mindst interessante. Det er 4. efterårsobs i 16 år. Efterårsiagttagelserne tegner efterhånden et mønster: 5/8 - 7/8 - 12/8 - 18/8. Aldersfordeling: 1 brun (fundet død) ubestemt alder, 1 ad

hun og 2 ad han. Dvs fortrinsvis adulte fugle i en ret snæver 14-dages periode i august

År	80	81	82	83	84	85
Antal	3-4	0	3	3	2	9

Hede-/Steppehøg (Circus pygargus/macrourus)

30/5 1 brun Ø Gjerrild (GF).


Duehøg (Accipiter gentilis)

Sjalden (fåtallig) ynglestandfugl. Fåtallig trækfugl (ult feb - med maj).

69 iagttagelser foruden 6 indberettede ynglepar. Fordelingen i amtet af observationerne er som i fjor, men med tilføjelse af enkelte fra Djursland. Vi henviser til prikkortet fra i fjor. Jørgen Terp Laursen forsøger for tiden at udrede Duehøgens ynglestatus i amtet og modtager meget gerne oplysninger.

Yngel (antal par): Silkeborg Vesterskov 1 (SFP, ERS), Linå Vesterskov 1, Ry Sønder-
skov 1, Velling Skov 1, Addithus Skov 1 alle (BRS), Fløjstrup Skov 0-1 (Moes).

Forår: (summering fra trækstederne): Gjerrild 16 trk, max 5/4 4 NØ (GF), Moesgård
7 trk, max 15/4 2 N (Moes).



Spurvehøg (Accipiter nisus)

Formentlig ret almindelig yngletrækfugl eller standfugl. Almindelig forårstrækfugl (ult mar - med maj) og fåtallig efterårstrækfugl. Vintergæst.

Forårstrækket i uddrag: Gjerrild: 14/3 - 4/6 2107 trk, 8 dage over 100, max 7/5 140 Ø, 13/5 162 Ø (GF).

Moesgård: 14/3 - 3/6 396 trk - rekordår - de 9 største dage var 4/4 37, 8/4 53, 13/4 18, 14/4 19, 15/4 14, 16/4 29, 18/4 34, 22/4 19 og 17/5 25 (Moes).

En tilfældigt opstået kædeobs: 8/4 gav 17 Kysing Fjord (OGJ), 11 N-NV Hesselholm, Samsø (SD, LeB), 53 trk Moesgård (Moes), 7 N Udsigten, Brabrand (Vagn Jakobsen) og 15 N Risskov (HLL).

Efterårstrækket i uddrag: Helgenæs: 12/10 - 20/10 34 trk, max 19/10 13 (JTL).

Øvrige trækobs: 1/9 2 S Salten Langsø (LPJ), 13/9 1 S Vejro, Kalundborgfærgen (PL), 30/9 1 S Kysing Næs (LPJ), 6/10 1 V Alrø Poller (HFj), 17/10 1 S Horsker (MCR), 20/10 2 Kysing Næs (OGJ).

Vor viden om Spurvehøgens efterårstræk i amtet lader stadig en del tilbage at ønske, men det ser efterhånden ud til, at trækket ligger fra pr sep - ult okt. Antallet af iagttagelser topper i efterårsferien som sædvanligt.

Musvåge (Buteo buteo)

To racer ses i amtet.

Almindelig Musvåge (B. b. buteo)

Alle uspecificerede henvises til denne race.

Fåtalig ynglestandfugl, almindelig forårstrækgæst (mar - maj) og ret almindelig efterårstrækgæst (med sep - pr nov). Vintergæst.

Yngel (antal par): 2 Silkeborg Vesterskov (JFT), 1 Ildal skov (JCN), "få" Fussing Skov (PER), 3 Pind's Mølleedal (ET) og 2 Anse Enge (JCN).

Forårstrækket var meget stort: Gjerrild: 4890 trk, 10 dage over 200, max 22/4 404 og 18/5 695 (GF) - 18/5 336 S-SV (Våge sp) Grenå kl. 12.00 - 14.30 (JNK) kunne tyde på et vist returtræk fra Gjerrild - desuden 11/5 410 N-Ø Gjerrild (HP).

Moesgård: 2348 trk - en rekordtangering - 7 dage over 100, max 4/4 207, 8/4 207 og 17/5 314 (Moes).

Der er desuden observeret træk af over 10 ex på Anholt, Nordsamsø, Kysing Fjord, Risskov og Brabrand Sø. Ved et tilfælde er der opstået en kædeobservation den 8/4: 59 N Kysing Fjord (OGJ), 157 NV Hesselholm, Samsø (SD, LeB) + 45 NV (Våge sp) (SD), 207 trk Moesgård, 8 N Brabrand Sø, Tårnet (PL), 52 N Udsigten, Brabrand (Vagn Jakobsen) og 81 N Risskov (HLL).

Efterårstrækket - et udpluk: Kysing Fjord: 29/9 20 (HP), 5/10 25 S (OGJ, TB), 19/10 14 (HP) + 10 V Malling (OGJ),
 Helgenæs og Sletterhage: 12/10 - 20/10 268 trk, deraf 219 N, max 19/10 141 N (JTL).
 Trækket ligner det, der fandt sted i 1984 mht antal og retning. Endnu en tilfældigt opstået kædeobs den 15/10: 16 Mårup Skov (medd PL), min 24 indtrk fra Samsø til Hov Fergehavn (PL), 5 NV Tunø (BHJ), 12 trk Brabrand Sø (MCR), 14 N Sletterhage (JTL) og 29 N Stødov, Helgenæs (JTL). Observationerne 15/10 understøtter sidste års ide om et nordgående træk fra Samsø over Helgenæs samt træk ved Brabrand Sø. Men dette år viser desuden, at der kan foregå et vestligt træk fra Samsø mod Hov samt over Tunø. Hvis vi ser ovennævnte obs 19/10 fra Helgenæs, Kysing og Malling med "Samsø-trækket" for øje, kan vi måske se resultatet af et indtræk nær Kysing fra Samsø samtidig med indtrækket på Helgenæs. Hvor kommer Musvågerne fra? Et muligt svar: 13/10 8 indtrk. fra SØ Lushage, Samsø (LeB).

Østlig Musvåge (B. b. intermedius)

Ret almindelig, men givetvis overset forårstrækgæst (med apr - maj).

Alle obs: 21/4 1 V Brabrand Sø (LB), 17/5 min 100 N Moesgård (Moes), 2/6 9 N Moesgård (Moes). Ingen racebestemte fra Gjerrild fuglestation.

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Ret almindelig forårstrækgæst (med mar - pr maj) og fåtallig efterårstrækgæst (ult sep - med nov) og vintergæst.

360 iagttagelser - det største antal nogensinde. I 1980'erne er antallet af iagttagelser vokset år for år. Som tidligere år er efterårstrækkets ophør sat til 1. november, men der savnes faktisk en dokumentation herfor. Trækket i 1985 kulminerede med oktober, som det plejer, og det er forresten i efterårsferien.

Forår (i alt 231 iagttagelser): Trækstederne: Gjerrild: 140 trk, max 5/4 14 og 18/4 14 (GF).

Moesgård: 16 trk, max 8/4 4, 22/4 3 og 17/5 3 (Moes (rekordår)).

Hesselholm, Samsø: 29 trk, max 7/4 5 og 8/4 19 (SD, LeB), store tal trods uregelmæssige observationer.

Desuden en stor obs 18/5 10 trk Grenå (JNK), der også er forårets sidste.

Efterår (74 iagttagelser): Første obs: 29/9 3 S - R + 30/9 3 Kysing Fjord (OGJ, LPJ),

Træk: 12/10 - 19/10 43 trk, max 12/10 27 Sletterhage (JTL), desuden bl.a. 12/10 7 S og 18/10 3 S Midt-Helgenæs (JTL).

Obs over 1 ex: 12/10 2 S Mårup (LeB), 13/10 2 Dystrup-Ramten (JSP), 15/10 1 + 2 trk Brabrand Sø (MCR), 15/10 min 3 indtrk Hov Fægehavn (PL), 19/10 1 indtrk Kysing Næs + 1 SV Kysing Fjord (HP), 24/10 2 SV Dronningborg Bredning (LTP), 29/10 2 S Kysing Næs (OGJ) og 11/11 2 Grund Fjord (KNM).

Vinter (jan - mar, 33 iagttagelser) (nov - dec, 22 iagttagelser), alle obs over 1 ex: 25/1 2 rst Ørby (SD), 10/2 2 Gudenå nær Langå (JP) samt 1/12 2 Horskær (HFj) og 8/12 2 Årslev (JTL). Fjeldvågen er i vintermånederne udpræget truffet i de store ådale samt på strandengslokaliteter.

Ubestemt Ørn (Aquila/Haliaeetus)

22/5 1 tf (måske Lille Skrigeørn) Gjerrild (GF). 14/11 1 VSV Fussing Sø kl. 14.30 (PER). (Se også Kongeørn).

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

Sidst set i amtet i 1921. Se desuden appendix I.

17/5 1 imm N Moesgård (HP) er godkendt af SU.

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Meget sjælden træk- og vintergæst.

20/4 1 imm tf, senere SV Gjerrild (GF). 29/11 1 juv R Gudenå S for Langå (HC). (Se også Ubestemt Ørn).

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Meget sjælden yngletrækfugl og sommergæst. Ret almindelig forårstrækgæst (apr - maj) og fåtallig efterårstrækgæst (aug - med sep).

I alt 200 iagttagelser er uden fortilfælde. Foråret var kolossalt med 171, mens sommerens 1 og efterårets 28 ligger inden for normalen. Den geografiske fordeling af iagttagelserne ligner foregående års.

Sommer: 1-2 ynglepar (JTL). Desuden 3/7 1 four - trk V Flakket, Anholt (Per-Henrik Nielsen).

Forår: Første: 31/3 1 N Moesgård (Moes, PH), 3/4 1 Gjerrild (GF), 4/4 1 NV Moesgård (MCR, Moes) og 4/4 1 Salten Langsø (JSP).

Sidste: 26/5 1 N Moesgård (Moes), 26/5 2 S Anholt (OGJ) og 30/5 1 Århus C (OGJ).

Træksteder: Gjerrild: 3/4 - 23/5 101 trk, max 5/4 13, 8/4 6, 12/4 6, 13/4 16, 14/4 11 og 17/5 6 (GF).

Moesgård: 31/3 - 26/5 23 trk - rekordår - max 13/4 3, 16/4 3 og 17/5 4 (Moes).


Århus-området: 14 fugle, heraf 11 fra Brabrand Sø.

Spredt aktivitet gav i alt 7 fugle på Anholt, 6 på Nord-Samsø og 5 i Randers-området.

Efterår: Første: 26/7 1 N Brabrand Sø (LB), ult jul "set" Grund Fjord (FFa), 9/8 2 ad Solbjerg Sø (BHJ, FL) og 9/8 1 Salten Langsø (JB).

Sidste: 13/9 1 Solbjerg Sø (HE), 18/9 1 juv four Dørup Mølle (ET) og 21/9 1 Salten Langsø (MB).

Alle obs over 1 ex: 9/8 - 11/8 2 Solbjerg Sø (FL, BHJ), 25/8 4 Grund Fjord (FFa), 29/8 2 Salten Langsø (ET) og 1/9 2 Salten Langsø (LPJ).



Tårnfalk (*Falco tinnunculus*)

Formentlig fåtallig - ret almindelig yngletrækfugl/ynglestandfugl, ret almindelig forårstrækgæst (mar - maj) og fåtallig efterårstrækgæst (sep - okt/nov).


394 iagttagelser fra 29 bidragsydere. Utvivlsomt har de øvrige undladt at indsende fund af Tårnfalken. Der må være flere sommerobs end prikkortet viser.

Vi nævner summeringer fra forårstrækstederne samt største obs forår, efterår og vinter.

Gjerrild Fuglestation: 11/3 - 30/5 116 trk, max 12/4 11 Ø og 6/5 15 Ø (GF).

Moesgård: 9/3 - 6/6 31 trk, max 22/4 3 N og 7/5 3 N (Moes).

Største obs: 7/4 4 Kysing Fjord (HLL), 25/11 3 Padderup Mose (LTP) og 5/1 3 Brabrand Sø (AJ).



Aftenfalk (Falco Vespertinus)

Fåtalig forårstrækgæst (maj).

I alt 17 iagttagelser, der må være rekord. Normalt meget sjælden/sjælden trækgæst.

Alle obs nævnes: Gjerrild: 1/5 2, 7/5 2, 8/5 1, 9/5 1, 14/5 1, 15/5 1, 16/5 1, 17/5 1, 22/5 1, 28/5 1, 4/6 1 - i alt 13, der alle trak (GF).

Moesgård: 24/5 1 hun ad N (Moes, Lars Hansen).

Anholt: 25/5 1 hun N og 26/5 2 hun N (OGJ).

Dværgfalk (Falco columbarius)

Fåttallig trækfugl (ult mar - med maj og med sep - nov). Meget sjælden vintergæst.

Et uovertruffet antal på 109 iagttagelser fremkommer fra et formidabelt forår med 92 iagttagelser, et pænt efterår med 15 og en normal vinter med 2 iagttagelser. Alle obs bringes excl Moesgård og Gjerrild, der gives i uddrag.

Forår: Gjerrild: i alt 60 trk fordelt som følger: 12/3 - 18/5 57 (GF) suppleret med 27/4 1 N (AJ) og 11/5 2 N (HP). Max-dage 5/4 10, 24/4 7 og 6/5 9. Øvrige dage trak 1-3 ex.

Moesgård: 3/4 - 17/5 16 trk - rekordår - 13/4 2, 21/4 2 og 17/5 3.

Århus-området: 7/4 1 N Brabrand (Vagn Jakobsen), 19/4 1 N Århus Universitet (BHJ), 23/4 1 N Brabrand (Vagn Jakobsen), 4/5 1 ad hun N Universitetsparken + 1 N Århus Havn (LLH) og 16/5 1 N Risskov (HLL).

Samsø: 4/4 1 N Klitgården Camping (AJ, PH), 5/4 1 indtrk + 7/5 1 N Issehoved (AJ, PH) og 16/5 1 Hesselholm (LeB).

Anholt: 1/5 1 Flakket og 4/5 1 + 2 Engen (HE).


Øvrige: 9/4 1 rst Horskær (BHJ), 20/4 1 Bjerregrav Mose (JP), 7/5 1 hun rst Kysing Fjord (OGJ) og 11/5 1 hun N Skørring (TB).

Efterår: Sletterhage: 13/10 1 SV (JTL, LPJ), 16/10 2 trk, 18/10 2 trk og 19/10 1 trk (alle JTL).

Øvrige: 15/9 2 juv Mossø (HP), 18/9 1 trk Kysing Næs + 3 trk Kysing Fjord (HLL), 8/10 1 hun S Ormslev (LB), 11/10 1 SV Brabrand Sø (JTL) og 10/11 1 Rønde (JP).

Vinter: 13/2 1 hun/juv Gudenå v/Randers (LTP) og 22/12 1 hun rst Kysing Fjord (OGJ).

I 1985 er den overvejende del af Dværgfalkene set på trækstederne, hvilket efterhånden må siges at være den normale fordeling, dog kan Dværgfalken være noget overset på andre lokaliteter.



Lærkefalk (Falco subbuteo)

Fåttallig forårstrækgæst (ult apr - pr jun) og meget sjælden efterårstrækgæst (sep).

76 iagttagelser er flere gange mere end man normalt har observeret her i amtet.. Alene fra Gjerrild Fuglestation stammer dog 59 iagttagelser, men 17 iagttagelser fra de øvrige bidragsydere er stadig blandt de største antal, vi har set. Foråret dominerer. Der er ingen sommerobs. Blot 2 efterårsobs er normalt, den ene er småsen.


Forår: Gjerrild: 1/5 - 5/6 62 trk. Deraf 59 trk (GF) med max 8/5 6, 22/5 10 og 28/5 5 (GF). Desuden 11/5 1 N + 1 NØ (HP) og 27/5 1 rst (TB, ET).

Moesgård: 7/5 - 8/6 7 trk - rekordår - (Moes), max 7/5 2.

Anholt: 8/5 1 og 9/5 1 (HE).

Øvrige: 27/4 1 Hesselholm, Samse (LeB), 17/5 1 N Risskov (HLL) og 19/5 1 NV Brabrand Sø (Kef).

Efterår: 17/9 1 Kysing Fjord (OGJ) og 6/10 1 Malling Mose (OGJ).

Lærke-/Aftenfalk (Falco subbuteo/vespertinus)

8/5 1 N Moesgård (Moes).

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Sjælden forårstrækgæst (ult mar - pr maj), meget sjælden efterårstrækgæst (okt - nov) og meget sjælden vintergæst.

13 iagttagelser - antallet vokser år for år, og det er efterhånden normalt, at der ses Vandrefalk hen i maj. Alle obs navnes.

Forår: Gjerrild: 25/3 1, 29/3 1, 5/4 1, 26/4 1 og 6/5 1 (GF).

Moesgård: 16/3 1 v (OGJ, MCR), 3/4 1 N kl. 10.22 (JTL, LW), 18/4 1 ad N (HC, HLL, PL, ET) og 17/5 1 imm N (Moes).

Øvrige: 3/4 1 rst kl. 8.40 Plantagen, Samsø (LeB).

Efterår: 27/10 1 hun Kysing Fjord (OGJ, JVS).

Vinter: 28/12 2 v/Mariager (Inge B. Gudiutz), første vinterobs siden 1982.

Vagtel (Coturnix coturnix)

Meget sjælden og uregelmæssig forårgæst (maj - jun).

Alle obs: 13/5 1 Gjerrild Nordstrand (GF). Dette er kun 7. obs i de sidste 10 år.

Vandrikse (Rallus aquaticus)

Sjælden/fåtalig yngletrækgæst og trækgæst (apr - maj og aug - sep). Meget sjælden/sjælden vintergæst eller standfugl.

Fund fra yngleperioden: 31/3 - 6/6 1-2 ex jævligt Brabrand Sø (HE, LB, KeH, SH, AJ, FK, HLL, LW), 18/5 2 + 26/5 1 + 5/6 1 Bjerregrav Mose (KNM, LTP, SH, ØBF), 19/5 1 + 19/6 1 Astrup Mose (BHJ, FL), 16/5 + 25/5 2 Kragemosen (LeB), 1/4 1 Skaføgård Skovsø (SH), 1/4 1 Smørnosen (SH), 6/4 Uldrup (SH), 1/5 2 Engen, Anholt (HE), 3/5 1 Flakket, Anholt (HE), 3/5 1 Kasted Mose (SH) og 4/5 1 Vasen, Randers (KNM).

Eneste efterårsobs, der er ret sen: 22/10 1 Vasen, Randers (KNM).

Eneste vinterobs: 17/1 2 Brabrand Sø (KeH).

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana)

Sjælden forårstrækgæst (maj - jul).

6 obs fra 5 lokaliteter er virkelig godt.

Alle obs: 29/4 1 set + 1/5 1 Ramten-Dystrup Sø (CO, GF), 18/5 1h Brabrand (JTL), 2/6 1h Borum Mose (JTL), 24/6 1h Kysing Fjord (OGJ) og ult jun - ult jul 1h i mose på Mols Hoved (JTL).

Engsnarre (Crex crex)

Meget sjælden forsommergæst.

Iagttaget årligt i amtet siden 1981.

Alle obs: Medio maj 1h Sangstrup (GF), 1/6 - 6/6 1h Kasted Mose (PH, SH, JDJ, BHJ, FL, JTL, HP).

Blishøne (Fulica atra)

Yngletrækfugl og ynglestandfugl. Almindelig - meget almindelig træk- og vintergæst (med aug - med apr).

Kysing Fjord er efterårets hovedlokalitet med over 1000 fra ult juli. Derefter jævnt stigende med kulmination 19/10 4400 (HP). Derefter hurtigt faldende til 10/11 1000 (H+JE) og 30/11 500 (ET).

Mariager Fjord er vinterens og forårets hovedlokalitet: 16/1 3500 Assens (LB), 27/1 ca 2000 Dania (JP) og 9/4 5000 (SH).

Indlandsobs (største tal): 29/3 447 Brabrand Sø (AJ), 1/4 112 Ramten-Dystrup Søerne (LPJ), 14/7 450 Dystrup Sø (JTL), 29/12 100 Ravn Sø (ET) og hele efteråret ofte mere end 100 ved Fussing Sø (PER).

Trane (Grus grus)

Fåtallig forårstrækgæst (ult mar - ult maj) og meget sjælden, uregelmæssig efterårstrækgæst (ult aug - pr okt).

Alle obs: 27/3 2 + 6/4 2 Gjerrild (GF), 8/4 3 N Hesselholm på Samsø (LeB, SD), 13/4 1 + 14/4 1 Gjerrild (GF, LTP), 17/5 3 Ø Åbyhøj (HE) samt 6/10 2 Ø Åbyhøj (HE).

Der har nu været okt/nov-Traner i 4 af de seneste 5 år.

Strandskade (Haematopus ostralegus)

Ret almindelig yngletrækfugl, ret almindelig trækgæst (ult feb - maj og jul - sep) og fåtallig vintergæst.

Vi nævner ynglefund, vinterobs, indlandsobs, første og sidste træk-gæster samt maximumstal fra lokaliteter med flokke på mindst 20 ex, dog alle obs af over 49 ex.

Antal sikre og sandsynlige ynglepar: Alrø Poller og Alhale 13 (KB, JG, LJP), Svanegrund 7 (JG), Søby Rev 23 (KB, JG, LPJ), Hov Røn 12 (JG), Kysing Fjord og -Næs 1-2 (H+JE, LPJ), Århus Havn 2 (NÅ, JP), Kalø Ruin 4 (JT), Råby Odde 1-2 (JP), Grund Fjord 0-1 (FFa), Pletten, Mariager Fjord 2-3 (PHH), Hesselholm 7-10 (LeB, SD), Kyholm 4 (PHH), Vejro 14 (PHH) og Hjelm 14 (PHH). I alt 104-111 par. Men der mangler tal fra bl.a. resten af Alrø, hele Mols, Anholt og mundingerne af Randers og Mariager Fjord.

Træk: de allerførste er måske nævnt under vintergæster. Ellers ankomst 2/3 1 Kysing Fjord (OGJ) og 5/3 set Gjerrild (GF).

Alrø: 6/4 150 (max-tal, OGJ), 6/4 75 (SH), 5/5 114 (SH), 30/5 55 (LPJ), 20/7 75 (HFj), 26/7 70 (TB, ET), 28/7 70 (LPJ) og 11/8 76 (HFj).

Øvrige: 16/3 30 Horskar (SH), 27/3 35 Sødring (JP), 31/3 130 Gjerrild. Nordstrand (GF), 7/4 20 Kysing Fjord (PL), 7/4 20 Langør (AJ), 7/4 30 Gammelholm, Samsø (AJ), 23/6 52 Hesselholm (LeB), 4/8 100 Overgård (JP) og 24/11 25 mellem Fjellerup og Bønnerup Strand (JP). Udover denne store sidsteobs er arten kun set følgende gange efter 1. okt: 12/10 2 S Kysing næs (HP) og 17/10 1 (LTP) + 17/11 3 (JP) Sødringholm.

Indlandsobs: 24/3 1 Ørnso (JCN, SFP), 6/4 1 Brassø (GW), 7/4 4 Brabrand Sø (LB, LLH, HLL, JTL), 16/4 et par Lading Sø (TB), 20/4 1 Bjerregrav Mose (JP), 19/5 6 V Klostermølle (TV), 21/5 2 Brabrand Sø (HE) samt 8/7 1 Geding Sø (HE) og 9/7 10 trk Klostermølle (TV).

Vinterobs (dec - feb): 16/1 5 + 23/2 7 Hassensør (LPJ, DOF), 17/1 4 Kysing Næs (JFT), 20/1 19 + 3/2 10 Grenå Strand (JNK), 6/2 3 Åkrogen, Risskov (FF) og 20/2 2 Egå Marina (HLL).

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Fåtalig yngletrækfugl og fåtalig træk-gæst (ult mar - ult aug).

Alle obs uden for ynglepladserne nævnes.

Yngel: Alrø 16/3 - 25/8 20 par på pollerne og 12-13 par på Alhalen,

max 26/4 26 og 5/5 40 (KB, LP, TB, HALE, ØRE, VEJ, JG, SH, PHL, LPI)

OGJ, HP, SFP, ET). Lerdrup Vig 1 par (KB). Søby Rev 22-24 par (KB, JG). Ebeltoft Skudehavn 0-1 par, 7/6 1 (FF). Råby Odde 0-2 par, 17/5 16 + 16/6 4 (JP). Pletten, Mariager Fjord 1-2 par (PHH). Havnø Holme 6-7 par (PHH). Hesselholm, Samsø (30/3 - 18/7) 3-4 par, max 4/4 35 (LeB, SD). Summa summarum 65-74 par - er næppe langt fra amtets totale antal. Et gæt? Hvad med 90 par?

Forår: første 16/3 5 Alrø (SH, ØBF) - er tidlig, men rekorden er 12/3 fra 1980 og 1983. Kysing Fjord: 31/3 + 3/4 + 4/4 + 1/5 2 (H+JE, SH, OGJ, LPJ). Horskær/Kalsemade: 31/3 + 5/4 + 9/4 + 17/5 2 (BHJ, JDJ). Øvrige: 23/3 1 N Fornæs (ØBF, PH), 25/3 2 SØ Moesgård (Moes), 26/3 1 rst + 3/4 1 Ø Gjerrild Nordstrand (GF), 7/4 4 Langør + 1 Stavns (PH, AJ, ØBF), 27/4 2 Brabrand Sø (KeH) og 18/5 1 S Grenå Strand (JNK).

Efterår: 14/7 + 28/7 2 og 2/9 + 14/9 + 16/9 1 alle Kysing Fjord (H+JE, PH, OGJ, HLL, HP, ET) samt 4/8 10 Overgård (JP). Den sidste 16/9 1 Kysing Fjord (HLL) er rekord - den gamle var 12/9 1981.

Lille Præstekrave (Charadrius dubius)

Sjælden yngletrækfugl og sjælden trækgæst (med apr - maj og jul - med aug).

Yngel: Ved Brabrand Sø (1-3 par) er "småpræster" set i flere perioder, 23-27/4 (2 Dødeå), 3-7/5 (Vestenden og Dødeå) og 18/5 - 27/6 (især Eskelund/Åby Eng), herefter 4/7 4 (HLL) og 18/7 1 (LB). Formentlig har der kun været et ynglepar - som måske har undersøgt spisekortene rundt langs søen, før det slog sig ned på Åby Eng. I foråret var der dog flere fugle impliceret, således 3/5 3 ex (AJ) og 6/5 sås 2 ex både i Vestenden og ved Dødeå. I øvrigt er arten i yngletiden (maj - jun) set parvis ved Ring Sø (JTL), Ramten-Dystrup Sø (GF, HP) og 21/5 2 på fin ynglebiotop i en næringsfattig mose i Løvenholm Skov (NÅ).

Træk: Ankomst 13/4 1 NØ Moesgård - 1. gang her - (Søren Skrifer via Moes), derefter 14/4 - 6/6 i alt 4 trk Gjerrild (GF), 18/4 2 + 20/4 1 + 11-12/5 1 Østerby Mose (BHJ, OGJ, Sør) og 1/6 1 + 8/6 1 Kysing Fjord (OGJ) - disse sidste to lokaliteter kunne også sagtens producere ynglepar.

Eneste efterårsfugl blev 9/8 1 Kysing Fjord (LB).

Fuglen 13/4 tangerer den bestående førstedata-rekord fra 1974 og 1982.

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula)

Fåtalig - ret almindelig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst (pr mar - maj og aug - sep/okt).

Sikre og sandsynlige ynglepar: Alrø Poller 3 (KB), Svanegrunden 1 (JG), Søby Rev 3-6 (KB, JG), Hov Røn 3 (JG), Kysing Fjord 1 (H+JE, LPJ), Århus Havn 6-8 (NÅ), Kalø Ruin 2 (JT), Østre Hedekrog 1 (LeB, SD), Hesselholm 1 (LeB), Kyholm 1 (PHH), Vejro 1 (PHH) og Hjelm 1 (PHH).

Forår: Ankomst 3/3 set Gjerrild (GF), 7/3 1 Studstrup (HLL) og 8/3 hørt Alrø (NH). Største antal 3/4 15 Hesselholm (LeB, SD) og 14/4 20 Fjellerup/Bønnerup Strand (JP). 3/3 - 11/4 148 trk, max 25/3 45 Ø Gjerrild Nordstrand (GF).

Efterår: Antal over 20 var 15/7 22 Kysing Fjord (OGJ), 8/8 22 Besser Rev (KB) og 13/9 35 Kysing Fjord (TB). De sidste - til normal tid - blev 29/9 1 Hesselholm (LeB), 29/9 - 5/10 1 Kysing Fjord (LPJ, OGJ, HP) og måske samme 19/10 1 Kysing Næs (OGJ).

Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Meget sjælden og uregelmæssig trækgæst.

27/7 1 Kysing Fjord (OGJ).

Siden 1970 set 5 gange i amtet - 1972-73 (2 fund) og 1979-81 (3 fund) i hver af månederne april-juli og september.

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Almindelig forårstrækgæst (pr apr - med maj), sjælden og uregelmæssig sommergæst og meget almindelig efterårstrækgæst (ult jul - nov).

Virkelig mange, både forår og efterår.

Forår: Ankomst 25/3 1 N + 1/4 11 NØ Moesgård (Moes) og 26/3 sås de første ved Gjerrild (GF).

Større antal (over 100 ex): 6/4 12-1400 + 1/5 600 + 4/5 670 Alrø (OGJ, SH, NH), 14/4 150 S Kysing Fjord (ET) og 26/3 - 10/5 161 trk, max

Sidste var 10/5 set Gjerrild (GF) og 24-26/5 2 Hesselholm (LeB).

Sommer: 24/6 4 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår: De første var 18/7 1 Hesselholm (LeB) og 20/7 35 Alrø (OGJ).
Større tal (over 500 ex): Alrø: 15/8 1500 (SFP), 19/9 3000 (SFP), 22/9 900 (HP), 6/10 2-3000 (OGJ), 15/10 9800 (næsten max, JG, Thorkild Brandt), 29/10 10.000 (max NH) og 14/11 1000 (NH).

Totaloptællinger i "Ramsar-13" (Horskær/Lerdrup/Alrø): 22/9 3885, 6/10 2895 og 20/10 3230 (HFJ).

Kysing Fjord: 12/9 574 (LPJ), 14/9 1000 (OGJ, ET), 19/10 2000 (HP), 20/10 1000 (OGJ), 26/10 6-700 (OGJ) og 2/11 500 (OGJ).

Øvrige: 10/10 500 Foldby (PN), 26/10 1450-1500 Gjerrild (TB, JTL), 27/10 2000 Horskær (LB) og 27/10 2150 Mariager Fjord (KNM). Årets sidste blev 17/11 2 Kysing Fjord (SH) og 24/11 250 (OGJ) + 26/11 92 Alrø (LPJ).

Strandhøjle (Pluvialis squatarola)

Fåttallig forårstrækgæst (ult apr - ult maj), ret almindelig efterårs-trækgæst (ult jul - pr nov) og meget sjælden og uregelmæssig sommer-gæst.

Forår (alle obs nævnes): 5/5 10 Alrø (SH), 6/5 2 Kysing Fjord (HLL), 16/5 1 + 25/5 1 Hesselholm (LeB), 17/5 1 Norsminde (JDJ), 17/5 5 (LPJ) + 25/5 16 (SH) Horskær og 30/5 1 Alrø (LPJ).

Sommer: 15/6 1 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår: første 15/7 1 S + 20/7 1 S Hesselholm (LeB) og 20/7 2 Alrø (OGJ).

Største antal (alle over 25 ex nævnes): Kysing Fjord: 29/9 35, 30/9 35 1/10 30, 13/10 300 (max-tal MCR), 19/10 27, 25/10 30, 26/10 28 og 27/10 48 (LB, TB, SH, BHJ, LPJ, OGJ, FL, HP, JVS).

Øvrige: 18/8 40 (DOF) + 17/10 115 (LTP) Sødring, 29/9 29 Begtrup Vig (DOF), 6/10 40 Alrø (OGJ), 12/10 55 Kysing Næs (BHJ, HP), 17/10 175 (MCR) + 27/10 75 (LB) Horskær, 20/10 i alt 62 Horskær/Alrø/Lerdrup (HFJ), 26/10 30 Gjerrild Nordstrand (TB) og 10/11 52 S Østre Hedekrog (SD). Årets sidste blev 11/11 27 Hevring Strand (KNM) og 17/11 1 Kysing Fjord (SH).

Vibe (*Vanellus vanellus*)

Yngletrækfugl og almindelig/meget almindelig trækfugl (pr mar - apr og jul - nov).

Forår: Ankomst overalt 3/3: Brabrand Sø (LB, AJ, PNN), Mossø (TB), Kysing Fjord (OGJ), Kalundborg-færgen (JDJ), Hattemager Mose (SMJ), Moesgård (Moes) og Kongslund (JP). Dette viser, om ikke andet, at vores observatøret er ved at være ganske tætmasket. 3/3 - 6/6 424 trk Moesgård (Moes) og 7/3 - 9/5 2123 trk, max 23/3 214 og 27/3 675 Gjerrild (GF).

Efterår: De store flokke (mindst 500) er især fra Kysing Fjord: 28-29/7 500, 29/8 500, 14/9 1000, 17/9 800-1000, 29-30/9 2690, 10/10 500, 19/10 1300 og 27/10 600 (LB, H+JE, SH, LPJ, OGJ, FL, HP, SFP, ET). Desuden 20/7 820 Mørke Kær (JTL) og 6/10 taltes 2941 ved en totaloptælling i Ramsar-område 13 (Horskær/Lerdrup/Alrø) (HFj). Sidste fugle var i anden halvdel af nov: 23/11 2 Kysing Fjord (ET), 24/11 4 Alrø (OGJ) og 30/11 13 Søften (SMJ).

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*)

Meget sjælden og uregelmæssig som forårstrækfugl (apr - maj) og sommergæst samt ret almindelig efterårstrækfugl (med jul- ult okt, enkelte senere).

De første forårsfugle siden 1981 og det bedste efterår siden gigantåret 1978 gør sammen med et af de sjældne islandske sommerfund 1985 til et kanonryleår! Alle obs nævnes.

Forår: 16/3 + 23/3 1 vinterdragt Fornæs (RD).

Sommer: 2/6 2 Kysing Fjord (H+JE, OGJ).

Efterår: Kysing Fjord: 18/7 29 (ad-max, SFP), 22/7 15, 23/7 1, 29/7 2, 7/8 2, 16/8 7, 18/8 2, 20/8 1, 31/8 5, 2/9 12, 9/9 9, 11/9 8, 12/9 6, 14/9 10, 15/9 17, 16/9 22 (juv-max, HLL), 17/9 8, 18/9 12, 19/9 10, 21/9 9, 22/9 8, 29/9 1 og 1/10 6 (NÅ, LB, TB, OGJ, SH, LPJ, HLL, HP, SFP, JVS, ET).

Kysing Næs: 7/9 3, 8/9 2, 9/9 5, 10/9 2 og 18/9 4 trk (NÅ, LB, H+JE,

Alre: 20/7 28, 26/7 12, 3/8 4, 8/8 3, 11/8 2, 14/8 8, 21/8 11, 24/8 16, 25/8 1, 31/8 74 (max, OGJ), 22/9 3 og 6/10 6 (LB, TB, H+JE, OGJ, HP, ET).

Øvrige: 21/7 5 + 8/9 3 + 11/9 1 Århus Havn (NÅ, MB), 22/7 1 + 3/8 1 + 10/11 1 Hesselholm (LeB, SD), 8/8 8 Besser Rev (KB), 17/8 2 + 20/8 4 Grenå Strand (JNK), 18/8 12 + 17/11 1 Sødringholm (DOF, JP), 29/8 2 Begtrup Vig (BHJ), 31/8 2 Issehoved (LeB), 2/9 10 Gjerrild Nordstrand (JP), 8/9 8 + 4 S Horskær (HFj), 24/11 7 Bønnerup Strand (JP) og de sidste 25/11 6 Kalø Ruin (JSP).

Marts-fuglen(e) er amtets første i den måned. Men den skal vel snarere kaldes vintergæst (sådanne havde vi også i 1978 og -79) så ankomstrekorden er nok stadig 4/4 1981. Sommerobsen modsvarer tilsvarende i 1976 (14/6 3 Kysing) og 1980 (22/6 1 Mariager).

Sandleber (Calidris alba)

Fåtalig efterårstrækgæst (ult jul - okt) og meget sjælden, uregelmæssig vintergæst.

Den øgede feltaktivitet ved Kysing Næs og på Samsø har nok "skylden" for de mange obs. Århus Havn er "yt". Funderne 4/8 - 10/8 er af voksne fugle, og dem fra 31/8 - 28/9 er af ungfugle. Alle obs nævnes:

Vinter: 19/1 1 dødfundet Grenå Havn (JNK).

Efterår: Kysing Næs: 10/8 1 ad (OGJ), 6/9 4 (JVS), 7/9 5 (JVS) og 8/9 3 (LB, H+JE, OGJ).

Issehoved: 4/8 5 ad (KB, JG), 31/8 3 (LeB) og 28/9 1 (SD).

Øvrige: 8/8 6 ad Besser Rev (KB) og 28/9 1 Vestre Hedekrog, Samsø (SD).

Dværgryle (Calidris minuta)

Fåtalig - ret almindelig efterårstrækgæst (med jul - pr okt).

Som så ofte før ingen forårsfund. I efteråret kun få voksne fugle (20/7 - 15/8), men mange ungfugle (25/8 - okt). Alle nævnes.

Kysing Fjord: 31/8 1, 9/9 12, 10/9 6, 11/9 27, 12/9 10, 13/9 26, 14/9 42 (max, HP), 15/9 41, 16/9 38, 17/9 20, 18/9 2, 19/9 13, 21/9 15, 22/9 1, 24/9 4 og 1/10 3 (NÅ, TB, H+JE, OGJ, LPJ, HLL, HP, JVS, ET).

Alrø: 3/8 3, 8/8 2, 24/8 5, 31/8 1 og 22/9 3 (H+JE, OGJ, HP).

Grenå Enge: 25/8 4, 26/8 2 og 27/8 1 (JNK, CO).

Øvrige: 8/9 2 Århus Havn (NÅ), 10/9 7 + 18/9 5 Kysing Næs (NÅ, HLL), 14/9 7 V Brabrand Sø (TB) - indlandsobs er usædvanligt - 28/9 1 Vestre Hedekrog (SD) samt 17/10 12 Horskær (MCR) - mange så sent!

Endvidere en obs af Dværg-/Temmincksryle: 15/8 5 Alrø (SFP) - tid og sted tyder på Dværgryle.

Temmincksryle (Calidris temminckii)

Sjælden efterårstrækgæst (med jul - ult aug).

Som i 1984 ingen forårsfund. 5-6 efterårsfugle er normalt. 1980 (17 ex) og 1981 (28 ex) var store Temmincksår.

De gamle: 25/7 1 Brabrand Sø (BHJ), 4/8 1 Kysing Næs (OGJ), 7/8 1 Kysing Fjord (OGJ), 8/8 1 Besser Rev (KB) - og de unge: 26-27/8 2 + 29/8 1 Grenå Enge (JNK, CO).

Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea)

Fåtalig efterårstrækgæst (ult jul - ult sep).

Ingen forårsfund, men mange fra efteråret, især mange ungfugle (ult aug - ult sep). Alle obs nævnes.

Kysing Fjord: 13/7 1, 15/7 3, 22/7 1, 28/7 1 (de gamle), 9/9 16, 11/9 16, 12/9 4, 14/9 9, 15/9 11, 16/9 16, 17/9 2, 19/9 2, 21/9 8, 24/9 1 og 29/9 - 1/10 1 (TB, LPJ, OGJ, HLL, HP, ET).

Alrø: 8/8, 14/8, 15/8, 31/8, 22/9 1 pr dag (H+JE, OGJ, HP, SFP) og årets sidste 6/10 3 (OGJ).

Grenå Enge: 25/8 5, 26/8 8, 27/8 15, 28/8 12 og 29/8 21 (JNK, CO).

Hesselholm: 15/7 2 og 3/8 2 (LeB, SD).

Sortgrå Ryle (Calidris maritima)

Fåttallig træk- og vintergæst (okt - apr).

Fantastisk år for "de rullende sten" : 5 fund er klar rekord i amtet. Blandt disse var to vinterfund - det 4. og 5. i nyere tid - samt de to største flokke (som dog måske var gengangere?). Alle obs nævnes (så opnåede også denne art dette udtryk).

13/3 1 rst Kysing Næs (DOF, OGJ, JVS). 20/1 2 Åkrogen, Risskov (LB).
11/3 18 Ø + 16/3 13 Ø Gjerrild Nordstrand (GF) og 26/10 1 rst Kysing Næs (OGJ).

Det er også bemærkelsesværdigt, at 3 af 5 iagttagelser er fra "den indre kyst". Modsat var 10 af 11 fund i 1972-84 fra Djurslands kyst. Oktoberfuglen fra Kysing Næs er således vores første træk-gæst uden for Djursland!

Sortgrå Ryle i Århus amt 1972-85. 16 fund af 62 individer:

<u>Periode</u>	<u>11/3-16/4(11/5)</u>	<u>(3/9)10/10-17/11</u>	<u>24/12-20/1</u>
Fund	5	6	5
Individer	48	8	6

Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Meget sjælden yngletrækfugl, almindelig træk-gæst (med mar - ult maj og pr jul - ult nov) og sjælden vintergæst.

Også mange "gemen-ryler" i år. Her nævnes yngre- og vinterfund, første og sidste forår og efterår samt max-tal fra lokaliteter, der kan fremvise tal over 50, dog alle antal over 500.

Yngel: Som så tit kun meldt fra Alrø, hvor et par fik 3 pulli (KB, JG, LFJ).

Forår: Første 9/3 1 Studstrupværket + 1 Egå Marina (AJ) og 9/3 1 Kysing Fjord (LFJ). Flest 22/3 - 20/5 101 trk Gjerrild Nordstrand (GF), 27/3 50 Sødring (JP), 4/5 1000 Alrø (NH) og 17/5 200 Seby Rev (KB, JG).
Sidste 24/5 10 Kysing Fjord (FF) og 25/5 35 Kalsemåde (SH).

Efterår: Første 6/7 25 Alrø (LPJ), 8/7 7 Kysing Fjord (OGJ) og 12/7 6 Anholt (JB). Flest 19/9 500 (SFP) + 6/10 600 (OGJ) + 20/10 591 (HFj) alle Alrø, 29/9 195 Begtrup Vig (DOF), 1/10 708 Kysing Fjord (OGJ, JVS), 12/10 250 Kysing Næs (BHJ, HP), 17/10 1100 (max) Sødring Kær (LTP), 20/10 700 Lerdrup Vig (HFj) - totaltællingen i "Ramsar-13" gav 1300 ex den dag (HFj) - og 27/10 150 Kalsemade (LB). Årets sidste var 30/11 1 rst + 1/12 2 NV Kysing Næs (OGJ), 1/12 5 Kalsemade (SH, HFj) og ikke mindst 1/12 48 Langør (SD).

Vinter: 5/1 6 Kysing Fjord (OGJ), 8/1 1 Kysing Strand + 2-3 Kysing Næs (ET) samt 6/1 2 + 6-13/1 1 Århus Havn (OGJ, Gejrf, PH, JFT).

Kærløber (*Limicola facinellus*)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst (ult jul - med sep).

To iagttagelser fra samme sæson er helt ekstraordinært. Men der var mange Kærløbere i landet i 1985.

25/7 1 N Fornæs (RD) og 28/7 1 Kysing Fjord (H+JE, OGJ, PH, BHJ, FL, ET) - begge var voksne fugle i sommerdragt.

I lokalrapportens tidsalder er der kun 5 tidligere fund: sep 70, sep 73, aug 76, jul 79 og sep 80 - de tre førstnævnte var også i Kysing Fjord.

Brushane (*Philomachos pugnax*)

Fåtalig forårstrækgæst (ult apr - ult maj) og ret almindelig efterårstrækgæst (ult jul - pr okt). Sjælden, uregelmæssig sommer- og vintergæst.

Normale trækperioder. Et par vinterobs er usædvanligt, men der er vist en tendens til flere overvintringer her i Nordeuropa. Juni-obs forekommer næsten årligt. Vi nævner de første og sidste forår og efterår, alle sommer- og vinterobs samt alle obs af mindst 5 fugle.

Forår: 6/4 7 Alrø (SH, OGJ), 23/4 2 han Brabrand Sø (KeH, HLL), 1/5 9 Kysing Fjord (LPJ), 5/5 5 Brabrand Sø (KeH), 22/5 1 Brabrand Sø (TB) og 24/5 2 Anholt (OGJ).

Sommer: 19/6 1 Bjerregrav Mose (HP) og 1/7 1 han True (LB).

Efterår: 20/7 1 Kysing Fjord + 6 Alrø (OGJ), 22/7 3 Hesselholm (LeB) samt fra Kysing Fjord: 15/8 5, 20/8 6, 11/9 8, 15/9 9 og 19/9 10 (OGJ). Grenå Enge: 25/8 15, 26-27/8 39 og 28/8 34 (JNK, CO). Øvrige: 18/8 9 Sødringholm (DOF), 24/8 25 V Birksø, Ry (JT), 27/8 5 V Brabrand Sø (TB) og sidst 1/10 1 + 6/10 1 Alrø (OGJ) og 6/10 2 Lerdrup Vig + 21 Alrø Poller (HFj).

Vinter: 1/12 5 + 15/12 6 + 29/12 2 Horskær (HFj).

Udviklingen i sidste-obs-datoer for Brushane i Århus Amt:

1973 ...	1979	1980	1981	1982 ...	1985
16/10	20/10	2/11	5/12	28/12	29/12

Enkeltbekkasin (*Limnocryptes minimus*)

Meget sjælden og uregelmæssig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst (ult sep - nov) og meget sjælden og uregelmæssig vintergæst.

Alt i alt en mager sæson. Og der har endda været meget ornitolog-aktivitet mellem star og græs i år.

Forår: 3/5 1 Gudenå Bredningen, Randers (KNM).

Efterår: 12/10 1 Århus Havn (KeH), 14/10 1 (SH) + 27/10 2 Kysing Fjord (BHJ, FL) og 19/10 2 + 23/11 2 Malling Mose (OGJ).

Vinter: Årets eneste var et par "eftersiddere" fra sidste år. 1/1 2 Malling Mose (OGJ).

Dobbeltbekkasin (*Galinago galinago*)

Fåtalig yngletrækfugl, ret almindelig trækgæst (med mar - ult maj og med jul - nov).

Sikre og sandsynlige ynglepar: Brabrand Sø 1-2 (NÅ, LB, AJ, LPJ, FK), Bjerregrav Mose 1 (JP), Kasted Mose 2 (JWJ), Damsbro Mose 2 (SMJ), Funderholme 1-2 (JCN) og Bølling Sø 0-1 (JCN). Den art må da være kolossalt overset på ynglepladserne!

Forår: Ankomst 7/3 1 Studstrupværket (HLL), 9/3 2 Velle Mose v/Gudenåen (ØBF), 15/3 1 Brabrand Sø (AJ) og fra 16/3 mange steder.

Større antal: 7/4 11 rst + 25 Ø Hesselholm (SD), 7/4 29 Tåstrup Sø (SH), 14/4 50 Brabrand Sø (LB) og 14/4 35 Assedrup Enge (ET). Flere siger, at arten forekom meget fåtalligt både forår og efterår.

Efterår: Større antal: 29-30/9 24 Kysing Fjord (HP, LPJ) og 27/10 72 Kysing Fjord (FL). Årets sidste trækfugle blev 23/11 6 Krstrup Enge (LTP) og 23/11 1 + 30/11 1 Kysing Fjord (ET, LPJ).

Vinter: 1/1 1 Malling Mose (OGJ), 2/1 3 Borum Møllebæk (TB), 2/1 2 Lyngbygård Å (TB), 2/1 6 + 4/1 1 Krstrup Enge (LTP), 4/1 2 trk Ris-skov (HLL), 5/1 1 Vilhelmsborg (FL), 20/1 3 Haarvadbro (SMJ) og 20/1 11 Studstrupværket (AJ) samt 31/12 1 Klosterkær (TV).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*)

Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig trækfugl (ult mar - apr og okt - nov) og sjælden, uregelmæssig vintergast.

Mange iagttagelser i år, især fra foråret. Dog givetvis stadig en meget overset art. Der er f.eks. næppe under 100 ungepar i amtet!

Ynglefund (med maj - jul/aug): 16/5 - 30/6 ca 5 par Mårup Plantage (LeB, SD), 4/6 1 Klapskov (SMJ), 5/6 en rede Norringure (SMJ) og 18/6 1-2 Lading Sø (TB). Desuden mindst 5 par på Anholt (HE) og 1 par i Emmedsbo Plantage (GF).

Forår: Første 12/3 1 Gjerrild (GF) og 18/3 1 Moesgård (Moes), derefter 25/3 - 14/4 17 obs af 19 fugle overalt i amtet. Fra Gjerrild meldes dertil om i alt 40-50 obs i løbet af foråret (GF).

Efterår: 23/10 1 lavt over Viby Torv (PN), 27/10 1 Mariager Fjord (KNM), 31/10 2 + 8/11 2 Fussing Skov (PER), 10/11 1 Femmøller Skov (JP), 16/11 1 Ajstrup (NÅ) og 30/11 1 Malling (MCR).

Vinter: 7/1 1 Ryesgade, Århus C (OGJ), 20/1 1 Stautrup (JDJ), 17/2 1 død ved østenden af Brabrand Sø (PNN) samt med dec 1 skudt Bodil Mølle (med ET).

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)

Sjælden trækgæst (med apr - med maj og med jul - pr sep) og meget sjælden, uregelmæssig sommergæst.

Forår: 17/5 1 Råby Odde (JP) og 19/5 2 Alrø Poldkrog (KB, JG).

Sommer: 29/6 1 Alrø Poldkrog (HP).

Efterår: 3/8 1 rst Hesselholm Made (LeB), 4/8 1 Kysing Fjord (LPJ), 11/8 2 V-rst Alrø Poller (HFj), 31/8 1 Hesselholm (SD) og 2/9 3 rst Gjerrild Nordstrand (JP).

Iagttagelsen af de to på Alrø 19/5 var en tangering af hidtil seneste forårsdato (1976 1 Alrø). Måske blev en af disse ved Alrø sommeren over. Det er første juni-fund i amtet i nyere tid (tidligste efterårs-fugl er 9/7 1978 Kysing).

Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica)

Almindelig forårstrækgæst (ult mar - ult maj) og fåtallig efterårs-trækgæst (jul - okt).

Ret normal forekomst. Forårsmaximum er større end i mange år, men der er stadig langt til 60'ernes flokke på 3000 fugle.

Forår: De første var 16/3 100 Alrø (ØBF) - tidligt - og 25/3 1 Ø Moesgård (Moes). Største antal på lokaliteterne var 8/4 1440 + 4/5 mindst 1000 Alrø (NH), 8/4 92 Ydersteholm, Samsø (SD), 16/5 77 Hesselholm (LeB) og 25/5 270 Kalsemade (SH). Uden for Horsens Fjord-området og Stavnsfjord er kun set 2 fugle: marts-iagttagelsen fra Moesgård og 17/5 1 Kysing Fjord (JDJ). Forårets sidste blev 27/5 23 Hesselholm (LeB) og 30/5 27 + 4/6 20 Alrø (LPJ).

Efterår: De første var 29/6 3 Alrø (HP), 20/7 30 Alrø (OGJ) og 23/7 1 Kysing Fjord (ET). Derefter ved Alrø 26/7 45, 3/8 8, 8/8 12, 11/8 15, 14/8 1, 15/8 5, 24/8 3, 25/8 1, 31/8 5, 8/9 1, 19/9 10-12, 22/9 3, 6/10 1 (TB, H+JE, HFj, OGJ, HP, SFP, ET), og ved Kysing Fjord: 23/7 1, 28/7 1, 10/8 1, 17/8 4, 20/8 1, 24/8 1, 25/8 1, 28/8 2, 8/9 1 og 13/9 3 (TB, H+JE, BHJ, OGJ, FL, ET). Hesselholm: 24/7 - 8/8 næsten dagligt 1-2 ex, derefter 9/8 3 og 30/8 2 (LeB, SD). Øvrige: 4/8 2 Overgård (JP), 4/8 1 + 13/10 1 V Kysing Næs (OGJ, HP), 11/8 1 Splidholm + 2

Horskær (HFj), 18/8 set Sødringholm (DOF) og 29/8 2 Begtrup Vig (BHJ).
Årets sidste blev 17/10 5 Sødringholm (LTP) og 20/10 2 + 3/11 3 Alrø
poller (HFj, OGJ).

Lille Regnspove (Numenius phaeopus)

Fåtalig forårstrækgæst (ult apr - med maj) og almindelig efterårs-
trækgæst (ult jun - ult aug).

Normalt forår og som i 1982, et "kæmpe-efterår" med over 1000 små-
spover på Samsø. Alle obs uden for Hesselholm nævnes.

Forår: 7/4 - tidligt - 9 rst Kysing Fjord (PL), 18/4 1 hørt Moesgård
(Moes) og 5/5 34 Anholt Vesterstrand (HE).

Efterår: Første 22/6 9 Hesselholm (SD).

Hesselholm: 22/6 - 11/8 i alt ca 1139 ex set næsten dagligt i flokke
på op til 60, dog 20/7 64 + 80 og 24/7 96. Største dagstotaler 20/7
156, 24/7 147 og 27/7 102 (LeB, SD).

Øvrige: 15/7 15 rst Øer (JTL), 20/7 40 Østerhede, Samsø (LeB), 26/7 1
Horskær (TB, ET), 28/7 59 Østre Hedekrog (SD), 3/8 1 S Hjortshøj (LB),
4/8 2 S Kysing Næs (OGJ), 6/8 2 (OGJ) + 9/8 1 (LB) Kysing Fjord, 10/8
24 S Fornæs (RD), 17/8 13 Fejrups Mose, Helgenæs (JTL), 18/8 1 Sødring-
holm (DOF) og årets sidste 31/8 1 V Kragemosen (LeB).

Stor Regnspove (Numenius arquata)

Ret almindelig trækgæst (med mar - pr maj og ult jun - ult okt) og
meget sjælden, uregelmæssig sommer- og vintergæst.

De 2 første og 2 sidste forår og efterår samt større antal nævnes.

Forår: 16/3 50 Alrø (ØBF) - mange så tidligt - 23/3 1 S Fornæs (ØBF),
9/4 25 Alrø (BHJ), 15/4 14 Ø Brabrand Sø (HLL), 6/5 1 Kysing Fjord
(HLL) og 9/5 1 Ø Anholt (HE).

Sommer: 19/5 3 + 2/6 5 Ulkær Mose (JCN).

Efterår: 14/6 1 Hinnerup (BHJ), 16/6 1 hørt Fjeldskov (LPJ), 20/7
25 Alrø (OGJ), 18/8 55 Sødringholm (DOF), 22/9 2 Alrø (OGJ, HFj),

22/9 1 Brabrand Sø (MCR) og 17/10 2 Sødring Kær (LTP).

Vinter: 14/12 1 NØ Dronningborg Bredning (JP).

Sortklire (*Tringa erythropus*)

Sjalden forårstrækgæst (ult apr - med maj) og fåtallig efterårstrækgæst (pr jun - ult sep, enkelte senere).

Forår: Brabrand Sø: 28/4 2, 5/5 3, 6-7/5 1 og 9-10/5 1 (KeH, LLH, AJ, FK, HLL, LW). Øvrige: 5/5 1 N Moesgård (Moes) og 7/5 2 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår: Kysing Fjord: 28/7 1, 3/8 1, 4/8 3, 7/8 6 + 2 V, 16/8 3, 18/8 3, 20/8 1, 25/8 2, 28/8 1, 9/9 2, 11/9 1, 14/9 1, 17-18/9 2 og 21/9 1 (SH).

Grenå Enge: 11/8 4, 25/8 1, 26-27/8 2, 28/8 4 (JNK, CO).

Øvrige: 14/7 2 Ring Sø (JTL), 17/7 3 + 5/8 1 Hesselholm (LeB), 3/8 1 + 15/8 3 + 8/9 1 Alrø Poller (OGJ, SFP, HFj), 8/8 1 Besser Rev (KB), 9/8 3 Grund Fjord (LTP), 11/8 1 Åkjær (HE), 11/8 2 + 8/9 1 Horskær (HFj), 18/8 1 Sletterhage Fyr (JTL), 18/8 1 Sedringholm (DOF) samt sidst og ultrasent 3/11 1 Alrø Poller (HFj).

Vi kender kun yderligere et fund fra november, nemlig 6/11 1976 3 Kalø Vig. Jeg tror, fund fra nov - mar burde forelægges DOF's Sjaldenhedsudvalg.

Rødben (*Tringa totanus*)

To racer i Århus amt.

Almindelig Rødben (T. t. totanus)

Fåtalig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst (ult mar - ult maj og med jul - ult sep, enkelte senere).

Yngel: Mit gæt fra 84-rapporten på mindst 50 ynglepar i amtet viser sig at holde stik (ikke uheldigt!). Mange har sendt ind i år, og mon ikke 75 ynglepar i Århus Amt er et realistisk bud på "befolkningstallet" for Rødben? På følgende lokaliteter er arten truffet i yngle-

perioden (20/5 - 30/6) - sikre/formodet antal par nævnt efter lokalitet: Alrø med poller 20 (KB, JG, LPJ, HP), Lerdrup Vig 1 (KB), Horskær Kalsemade 3 (KB, JG, SH), Splidholm 1 (KB), Søby Rev 1 (KB, JG), Kysing Fjord 3-4 (H+JE, LPJ, OGJ), Århus Østhavn 1 (NA, KH, PH), - 1. gang her -, Brabrand Sø 1 (LB, FK) - her var 20 ynglepar først i 60'erne -, Kasted Mose 1 (SH, FK), Kalø Ruin 3-4 (JT), Dronningborg Bredning 1-2 (LTP), Bjerregrav Mose 0-1 (LYP), Grund Fjord 0-1 (FFa), Råby Odde ca. 5 (JP), Pletten, Mariager Fjord 6-10 (PHH), Hesselholm 5-6 (LeB, SD) og Kyholm ca 3 (PHH). I alt optalt 55-65 par.

Forår: Første 23/3 2 Moesgård Strand (FK) og 25/3 1 Kasted Mose (HE). Største antal (over 25) var 3/4 30 + 7/4 38 Hesselholm (LeB, SD), 6/4 100 Alrø (OGJ) og 15/4 35 Assedrup Enge (OGJ).

Efterår: Største antal (over 25) var 20/7 30 + 4/9 100 Alrø (OGJ, NH) og 16/9 35 Kysing Fjord (HLL). Årets sidste blev 17/10 2 Sødring (LTP) og 20/10 2 (HFj) + 28/11 1 hørt (LB) Alrø.

Islandsk Rødben (T. t. robusta)

Fåtalig vintergæst (dec - feb).

Indtil videre betragtes alle vinterfund af Rødben som værende af islandsk race, men adskillelsen fra Almindelig Rødben i vinterdragt volder besvær. Alle obs nævnes - ingen fra dec i år.

6/1 1 + 8/1 2 + 9/1 1 Århus Havn/Tangkrogen (Gejrf, PH, HLL, JFT), 16/1 3 Hassensør (LPJ), 18/1 4 Polderev, Grenå (CO), 20/1 1 Kysing Næs (H+JE, OGJ), 6/2 1 Åkrogen, Risskov (FF) og 10/3 4 S Moesgård (Moes)

Hvidklire (Tringa nebularia)

Ret almindelig trækgæst (med apr - ult maj og pr jul - pr okt).

Normal forekomst. Der nævnes de første og sidste obs fra forår og efterår samt alle obs af mindst 5 fugle.

Forår: Første 7/4 1 (JVS) + 14/4 1 (DOF) Kysing Fjord og 18/4 1 Brabrand Sø (KeH). Kysing Fjord: 1/5 11, 6/5 65 (max, HLL) og 11/5 19

(OGJ, LLH, HLL, H+JE, ET, DOF, LPJ, JVS). Øvrige: 1/5 5 N Moesgård (Moes), 5/5 5 Brabrand Sø (KeH) og 5/5 8 Hesselholm (LeB). Sidste 30/5 4 Alrø (LPJ), 4/6 1 hørt Brabrand Sø (ET) og 5/6 1 + 8/6 2 Kysing Fjord (OGJ).

Efterår: Første 23/6 5 + 30/6 1 Hesselholm (SD, LeB) og 8/7 9 Kysing Fjord (OGJ). Hesselholm (23/6 - 13/10): 15/7 5, 18/5 5, 20/5 5, 27/7 - 4/8 5, 6/8 6, 11/8 11, 15/9 5 og 29/9 5 (LeB, SD). Kysing Fjord (8/7 - 14/10): 28/7 10, 31/7 6, 1/8 11, 6/8 8, 7/8 21 (max, HLL), 9/8 5, 15/8 5, 16/8 20, 18/8 8, 20/8 9, 24/8 6, 28/8 18, 31/8 5, 9/9 9, 11/9 6, 13/9 12, 14/9 11, 15/9 21 (osse max, JVS), 16/9 5, 21/9 7, 25/9 15 og 29/9 6 (OGJ, NÅ, LB, TB, SH, HLL, HP, H+JE, ET, LPJ, JVS). Alrø (28/7 - 6/10): 28/7 18, 3/8 12 og 8/8 12 (OGJ, LB, H+JE, LPJ).

Totaloptællinger i "Ramsar-13" (Horskær/Lerdrup/Alrø/Sondrup Strand): 25/8 14, 8/9 11 og 6/10 29, heraf 15 ved Alrø-Egehoved (HFj). Øvrige: 26/7 9 Horskær (TB, ET), 3/8 5 Højslet, Randers (JP), 4/8 35 (max) Overgård (JP), 11/8 5-6 Splidholm (HFj), 25-27/8 5 Grenå Enge (CO) og 14/9 10 S + 3 h Kysing Næs (HP).

Stor Gulbenet Klire (*Tringa melanoleuca*)

Se appendix I.

Svaleklire (*Tringa ochropus*)

Fåtalig trækgæst (ult mar - med maj og ult jun - pr sep) og meget sjælden vintergæst.

Forår: Ankomst 26/3 1 Langå (KNM) og 1/4 set Gjerrild (GF). Største antal 4/5 7 Brabrand Sø (AJ) og 6/5 7 Mariendal (JVS), 1/4 - 10/5 35 trk, max 1/5 5 Ø Gjerrild (GF). Sidste 12/5 1 Kasted Mose (SH), 14/5 set Brabrand Sø (JWJ) og allersidst og sent 1/6 1 Kul sø (ØBF).

Efterår: Første var 19/6 1 Bjerregrav Mose (HP) og 22/6 1 h Mørke Kær (PH). Største antal 7/8 7 Næsby (CO). Sidste trækkere 27/8 1 Grenå (CO) og 27/8 1 S Molslaboratoriet (BHJ).

Vinter: 8/12 1 Kysing Fjord (OGJ, JVS).

Tinksmed (*Tringa glareola*)

Fåttailig trækfugt (pr mar - med maj og med jul - ult aug).

Igen normale trækperioder 6-21/5 og 9/7 - 27/8. Alle obs nævnes.

Brabrand Sø: 6-12/5 1 a 2 fugle, dog 11/5 4 + 2 N (AJ) + 21/5 1 (TB, KeH, AJ, BHJ, HLL, JTL) samt 23/7 2 + 25/7 1 + 9/8 1 V (TB, BHJ, KeH).

Kysing Fjord: 6/5 1 (HLL) samt 9/7 1 + 22/7 1 + 28/7 2 + 1/8 3 + 16/8 (H+JE, OGJ, HLL, ET).

Grenå Enge: 4/8 2 + 8/8 16 + 10/8 12 + 11/8 21 + 12/8 19 + 25/8 7 + 26/8 8 + 27/8 10 (JNK, CO).

Øvrige: 8/5 2 Århus Østhavn (HeC), 11/5 1 Østerby Mose (OGJ), 11/5 5 Ramten-Dystrup (HP) samt 20/7 1 Alrø (OGJ), 22/7 3 Hesselholm (LeE), 8/8 3 Alrø (H+JE, OGJ), 13/8 1 Kristrup Enge (LTP) og 18/8 1 viadukten i Tranbjerg (BHJ)

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*)

Måske sjælden, uregelmæssig yngletrækfugl. Ret almindelig trækfugt (ult apr - ult maj og pr jul - med sep).

Mange "vippeklirer" i år, og et marts-fund og en oversomring. Her nævnes de 3 første, de 3 sidste og alle juni-obs samt alle obs af mindst 5 fugle.

Yngel: muligt ynglefund ved Fussing Sø (PER).

Forår: 16/3 2 Horsker/Kalsemade (ØBF) - er ekstremt tidligt! Derefter 22/4 1 Dødeå, Brabrand Sø (FF), 25/4 1 Brabrand Sø (KeH) samt 1/6 2 + 2/6 1 Kysing Fjord (OGJ, H+JE) og 3/6 1 + 6/6 2 Brabrand Sø (KeH, FK). Brabrand Sø: 28/4 5, 8/5 7, 9/5 6, 11/5 35 (forårsmax, AJ), 14/5 5 og 16/5 13 (KeH, LLH, SH, AJ, JWJ, FK, HP).

Øvrige: 6/5 16 + 10/5 10 Gudena-Bredningen, Randers (KNM), 9/5 8 Engen, Anholt (HE), 11/5 26 Ramten-Dystrup (HP), 17/5 6 Ajstrup Bugt (JP), 17/5 7 Råby Odde (JP) og 21/5 5 Ørnse (SFP).

Efterår: 23/6 1 Hesselholm (SD), 27/6 4 Brabrand Sø (KeH) samt 22/9 1 Horsker (HFj), 28/9 3 Vestre Hedekrog (SD) og 22/9 1 + 5/10 1 Kysing Fjord (OGJ).

Kysing Fjord: 8/7 10, 28/7 10, 29/7 25, 6/8 13, 7/8 20, 8/8 15, 9/8 30 (max, LB), 10/8 19, 15/8 10, 16/8 10, 24/8 12, 28/8 5, 2/9 11 og 14/9 12 (NÅ, LB, H+JE, LPJ, OGJ, HLL, HP, SFP, JVS, ET).

Øvrige: 14/7 14 (FFa) + 9/8 10 (LTP) Grund Fjord, 15/7 9 V Øer (JTL), 21/7 7 + 16/8 14 + 23/8 6 + 8/9 5 Århus Havn (NÅ), 25/7 6 + 31/7 12 Hesselholm (LeE, SD), 27/7 13 Vandstedet/Brøndkær, Samsø (LeE, SD), 4/8 40 (efterårsmax) Overgård (JP), 8/8 22 Besser Rev (KB), 8/8 12 S + 10/8 19 S (RD) + 2/9 6 rst (JP) Fornæs, 16/8 5 Brabrand Se (HE) og 2/9 13 rst Gjerrild Nordstrand (JP).

Stenvender (*Arenaria interpres*)

Meget sjælden, men næsten regelmæssig forårstrækgæst (med apr - med maj), meget sjælden og uregelmæssig sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst (ult jul - pr sep).

Forår: kun 19/5 1 rst Århus Havn (NÅ).

Sommer: 5/6 3 Søby Rev (KB). Dette er blot det 3. sommerfund i amtet (efter juni 1975 2 ved Grenå og juni 1977 3 på Samsø).

Efterår: Kysing Fjord: 23/7 1 + 14/9 1 + 15/9 2 (OGJ, ET, JVS).

Kysing Næs: 4/8 1 (OGJ) og 6-8/9 2 (LB, H+JE, JVS).

Øvrige: 8/8 1 Besser Rev (KB), 12/8 1 S Grenå Strand (JNK), 18/8 1 S Fornæs (JNK), 18/8 2 Sødringholm (DOP) og 2/9 1 rst Gjerrild Nordstrand (JP).

Odinshane (*Phalaropus lobatus*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækgæst.

8/8 1 Kysing Fjord (SFP).

I lokalrapportens tid ellers kun truffet 6 gange i to år: 1975 (2 ex aug) og 1980 (jun, 3 x aug og sep).

Mellemkjove (Stercorarius pomarinus)

Sjælden efterårstrækgæst.

4 iagttagelser af 9 individer.

8/9 4 N Fornæs (RD), 9/11 1 mørk fase + 1 1K Gjerrild Nordstrand (JSP, KNM), 16/11 1 Fornæs (HP), 23/11 2 1K v/Vejrø (H+JE).

Ubestemt Kjove (Stercorarius sp)

12/10 1 Almindelig/Lille Kjove (parasiticus/Longicaudus) Kysing Næs (HP), 9/11 1 S Fornæs (JSP), 12/11 1 1K Almindelig/Mellemkjove (parasiticus/pomarinus) Kysing Næs (LB).

Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus)

Fåtalig trækgæst (aug - nov).

8 iagttagelser af 20 individer.

6/8 1 Skanseparken (Seren Brink), 24/8 1 mørk fase Alrø (OGJ), 8/9 5 Kysing Næs (H+JE, TB, DOF, LB), 8/9 7 Fornæs (RD), 6/10 1 mørk fase Kysing Næs (OGJ), 12/10 3 Kysing Næs (LB, HP, BHJ) og 13/10 1 Sletterhage Fyr (JTL).

Indlandsiagttagelse: 10/11 1 1K Stubbe Sø (JP).

Storkjove (Stercorarius skua)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst.

8/9 1 Fornæs (RD), 13/9 1 v/Vejrø (PL).

Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus)

Se appendix I

Dværgmåge (Larus minutus)

Sjælden trækgæst (maj og aug - okt).

5 iagttagelser af 11 individer.

19/5 1 1K Alrø Poller (KB), 17/7 1 S Sletterhage Fyr (JTL), 18/8 6 Randers Fjord (DOF), 25/8 1 1K + 1 2K Kysing Næs (OGJ) og 13/10 1 1K Kysing Næs (HP, ET).

Hættemåge (Larus ridibundus)

Formentlig almindelig ynglefugl og meget almindelig gæst.

Ynglefund: Søby Rev 59 par, Alrø Poller 16 par (JG), Kalø Ruin "lille koloni" (JT), Hjelm 31 par (PHH), Lyse Mose 100 par (SFP), Frederiksdals Hede 200-300 par (SFP), Brude Sø 5-10 par (TV), Rye Bro 8-10 par (BHJ), Nørre Mose 200 par (SFP).

Større iagttagelser (over 10000): 15/4 11000 Grenå - Gjerrild (GF), 20/4 10000 Gjerrild (GF).

Stormmåge (Larus canus)

Ret almindelig ynglefugl.

Ynglefund: Hov Røn 14 par (JG), Søby Rev 142 par (JG), Alrø Poller 26 par (JG), Hesselholm 6-8 par (LeB), Hjelm 150 par (PHH), Vejre 2-3 par (PHH) og Tunø 15-25 par (BHJ).

Sildemåge (Larus fuscus)

Ret almindelig yngletrækfugl og trækgæst (mar - sep, enkelte senere).

Ynglefund: Hov Røn 43 par (JG), Søby Rev 3 par (JG), Svanegrund 10 par (JG), Anholt (Ørkenen) 70 par (PHH) og Hjelm 30 par (PHH).

Indlandsiagttagelser: Brabrand Sø: 7/4 1 (PNN), 10/4 2 (PNN), 16/4 2 (PNN), 13/4 2 ad (PL). Solbjerg Sø: 9/8 1 (BHJ).

Første og sidste iagttagelser: 24/3 Århus Havn (JT), 3/11 16 Gjerrild Nordstrand (JT).

Sølvmåge (*Larus argentatus*)

Der er truffet to racer i amtet i år.

Almindelig Sølvmåge (*L. a. argentatus*).

Almindelig ynglefugl.

Ynglefund: Mossø 8 par (JCN), Søby Rev 138 par (KB), Hjelm 600 par (PHH), Kyholm 15 par (PHH), Vejre 75 par (PHH), Stavns Fjord (Hundsholm) 2-3 par (SD), Hov Røn 667 par (JG).

En iagttagelse af et leucistisk individ 19/4 1 1-2K Århus Havn.

Gulbenet Sølvmåge (*L. a. omisus*)

(Nomenklatur: Dybbro, Oversigt over Danmarks Fugle 1978).

12/4 1 ad Kalundborgfærgen (LW).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*)

Meget sjælden gæst. Regelmæssig (1-5) om foråret (feb - maj) og uregelmæssig (0-1) om efteråret (sep - dec).

21/2 1 ad Grenå Havn (GF), 20/3 1 2K Bennerup Havn (GF) og 29/9 1 ad Århus Havn (NÅ).

Sølvmåge x Gråmåge (*Larus argentatus x hyperboreus*)

3/2 1 ad Århus Havn (LW). Ifølge observatøren er det mest sandsynligt, at der var tale om en hybrid af denne type, som er relativt almindeligt forekommende som "ynglefugl" på Island. For nærmere beskrivelse af disse hybrider se Ingolfsson 1970, Ibis: 112. 340-362.

Svartbag (*Larus marinus*)

Ret almindelig ynglefugl.

Ynglefund: Anholt (Ørkenen) 3 par (PHH), Hjelm 12-15 par (PHH), Alrø Poller 2 par

(JG), Søby Rev 1 par (KB), Kyholm 2 par (PHH), Hov Røn 106 par (JG), Svanegrund 15 par (JG), Vejro 2-3 par (PHH).

Større iagttagelser (over 100): 29/3 195 trk Gjerrild Nordstrand (GF), 7/4 180 Hesselholm (SD), 10/10 100 Kysing Fjord (JFP), 26/10 230 rst Gjerrild Nordstrand (JTL).

Ride (*Rissa tridactyla*)

Sjælden forårstrækgæst (med mar - ult apr), fåtallig efterårstrækgæst (med okt - ult nov) og sjælden vintergæst (ult dec - pr feb).

De to septemberfund er usædvanlige. 16 iagttagelser af 85-93 individer. Alle obs nævnes.

Forår: 5/4 1 N Fornæs (GF) og 25/4 1 N Gjerrild (GF).

Efterår: 7/9 2 Moesgård (HP) og 8/9 4 Kysing Næs (LB) er en slags sommerobs. 12/10 25-30 + 12/11 2 + 1/12 1 Kysing Næs (LE, BHJ, LPJ, OGJ, HP), 3/11 16 + 9/11 4 Ø Gjerrild (JT, JSP), 7/11 2 Moesgård (HP) og 10/11 3-4 + 16/11 6 + 7/11 13 N + 2 S Fornæs (HC, OGJ, HP, NÅ)

Vinter: 17/1 1 Kysing Næs (LB), 15/2 2 Hov - Sælvig (PL) og 15/2 2 2K Århus - Kalundborgfærgen (JB).

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*)

Meget sjælden og uregelmæssig efterårstrækgæst (aug - sep).

8/9 1 1K Kysing Næs (OGJ, TB, LB) og 14/9 1 Kysing Fjord (HP).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*)

Fåtallig (?) yngletrækfugl og fåtallig trækfugl (ult mar - med okt).

Ynglefund: Søby Rev 12 par (KB).

Indlandsiagttagelser: 18/10 1 Mossø (TV).

Træk: 1/4 - 8/5 321 trk Gjerrild Nordstrand (GF) samt 41 iagttagelser af 55 individer på kystlokaliteter i øvrigt.

Første og sidste obs (uden for Gjerrild) var 3/4 4 Fornæs (HLL) og 7/11 1 Moesgård (HP) - det første novemberfund i Århus amt.

Fjordterne (*Sterna hirundo*)

Sjælden (?) yngletrækfugl og ret almindelig trækgest (pr maj - ult sep).

Ynglefund: Hjelm 6 par (PHH) og Bjerregrav Mose 1 par (JTL).

Øvrige: 41 iagttagelser af 220 individer.

Større iagttagelser (over 10): 28/7 11 Grund Fjord, 9/8 20 Grund Fjord (LTP), 11/8 16 Ørnse (SFP), 21/8 17 Alrø Poller (LB), 1/9 34 Salten Langse (LPJ), 8/9 20 Kysing Fjord (H+JE, LB), 10/9 1 ad + 10 1K Kysing Fjord (NÅ).

Første og sidste: 29/4 1 Kysing Fjord (H+JE) og 19/10 2 Fussing Sø (JP).

Havterne (*Sterna paradisaea*)

Ret almindelig ynglefugl, fåtallig trækgest (apr - okt).

Ynglefund: Kyholm 8-10 par (PHH), Alrø Poller 128 par (KB), Søby Rev 114 par (KB), Kysing Fjord 1 par (BHJ).

Indlandsiagttagelser: 3/4 1 (K&H), 30/4 4 (PNN), 26/4 2 (HCL) og 27/4 4 (PNN), alle Brabrand Sø.

Kystlokaliteter: I alt 27 iagttagelser af 73 individer.

Første og sidste: 14/4 8 Kysing Fjord (DOF), 15/10 2 1K Hov - Tunø (BHJ).

Dværgterne (*Sterna albifrons*)

Fåtallig ynglefugl og trækgest (maj - aug).

Ynglefund: Anholt 20-25 par (OGJ, JB, PHH), Kyholm 2-3 par (PHH) og Kalø Ruin 0-1 par (JT).

Øvrige: 9 iagttagelser af 20 individer.

8/5 4 ad Århus Havn (HeC), 10/5 2 Århus Havn (MCR), 12/5 3 Århus Havn (NÅ), 14/5 2 Ø Gjerrild Nordstrand (GF), 1/6 1 Kysing Fjord (OGJ), 10/6 4 Mørke Kær (FK), 12/7 1 Kysing Næs (OGJ), 23/7 2 Kysing Fjord (OGJ) og 11/8 1 Kysing Fjord (OGJ).

Sortterne (*Chlidonias niger*)

Meget sjælden gæst (maj - aug/sep).

16/5 1 Brabrand Sø (JDJ), 27/7 1 Mossø (H+JE).

Alkefugle (Alcidae)

Som gruppe fåtallig vinter og forår (dec - apr), sjælden sommer (jun - jul) og meget almindelig efterårsgæst (okt - nov).

Fubrikken dækker Alk/Lomvie, hvor intet andet er angivet. Forekommer meget lokalt, idet 98,6% af fuglene er set ved Fornæs, uden hensyn til gengangere. Alle disse nævnes.

Kysing Næs (69 ex): 12/10 6, 12/11 29, 14/11 8, 16/11 7 S, 17/11 17, 8/12 1 rst samt 12/11 1 N (Søkonge/Lunde) (LB, HLL, HP, NÅ).

Århus - Kalundborg (17 ex): 2/1 1, 16/2 8, 11/3 1, 16/6 2, 23/11 5 (LB, BT, NÅ).

Sletterhage (40 ex): 12/10 1, 14/10 13 N + 10 S, 15/10 4 N, 16/10 5 N, 18/10 1 S, 19/10 5 S + 1 N (JTL).

Fornæs (15313 ex): 26/10 36 N + 75 Ø + 37 S, 2/11 3000 trk, 8/11 3000 N, 9/11 4150 Ø + 75 V + 40 rst, 10/11 500 trk, 16/11 374 N + 1051 S + 1 rst, 17/11 1460 N + 1424 S (TB, HC, RD, KNM, HP, JP, JSP, NÅ).

Øvrige (91 ex): 12/2 1 Studstrup (KeH), 10-15/3 11 trk Gjerrild Nordstrand (GF), 25/7 1 S Ballehage, Århus (NÅ), 15/10 1 Hov - Tunø (BHJ), 9/11 1 Ø + 3 rst, Østre Hedekrog, Samsø (SD), 11/11 16 Ø + 17 V Hevring-Mølle Strand (KNM) og 25/12 1 S Fløjstrup Strand (BHJ).

Lomvie (*Uria aalge*)

Status vanskelig (se "Alkefugle"), men de 23 iagttagelser af i alt 237 individer er ikke langt fra de 13 iagttagelser af 286 individer hos Alk, så de har nok atter været lige talrige.

Alle obs nævnes: Kysing Næs: 12/10 2 S, 12/11 3 rst, 14/11 3 S + 1 rst, 17/11 4 S (HLL og især LB).

Århus - Kalundborg: 2/1 1, 16/2 4, 16/3 3, 17/3 1 (NÅ, LB).

Sletterhage Fyr: 14/10 1, 17/10 1 (JTL).

Fornæs: 27/10 1 rst, 9/11 7 S, 10/11 1 rst, 16/11 1 N + 9 S + 1 rst, 17/11 25 N + 80 S (HC, JNK, KNM, HP, JSP, NÅ).

Øvrige: 9/3 1 Studstrup (AJ), 7/4 1 Svanegrunden (KH), 14/4 10 S + 18/4 4 SØ Moesgård (LPJ, HeC), 15/10 min 14 Hov - Samsø (PL), 9/11 1 rst Østre Hedekrog, Samsø (SD), 9/11 35 Ø + 15 V Gjerrild (KNM, JSP) og 16/11 1 rst Århus Lystbådehavn (MCR).

Alk (Alca torda)

Se under Lomvie.

Alle obs nævnes: Fornæs: 9/11 1 S, 10/11 11 N, 16/11 8 S (KNM, HP, JSP, NÅ).

Øvrige: 27/1 1 N Ø for Samsø (SD), 16/2 1 Århus - Kalundborg (NÅ), 15/10 1 Hov - Tunø (BHJ, HeC), 9/11 5 Ø + 29 V + 6 rst Gjerrild (KNM, JSP), 16/11 1 S - rst Kysing Næs (NÅ), 17/11 1 rst Tangkrogen (MCR) og 30/11 min 10 - 1/12 100 nær Anholt (NH).

Tejst (Cepphus grylle)

Fåtalig ynglefugl (55-85 par) og fåtalig træk- og strejfgæst.

En iagttagelse 16/2 af 3 i sommerdragt tyder på den ynglende race: "Nordsø-tejst" (C. g. atlantis).

Ynglefund: Tunø (14 par): 15/6 28 (BHJ). Kyholm (1-3 par): 23/6 6 Kyholm (PHH).

Vejrø (40-65 par): 23/6 80 + 65 redehuller (PHH). Hjelm (1 par): 21/6 2 (PHH).

Skødshoved (0-1 par): hele sommeren 2 (JTL). Anholt (0-1 par): 2/5 3 + 3/5 2 ved havnen (HE).

Ikke ynglende: Fornæs: 5/7 2 N + 6 S (RD), 26/10 1 N (TB), 27/10 2 S (KNK), 10/11 2 N (TB, NÅ, OGJ) og 16/11 1 S (HP).

Øvrige: 2/1 2 Vejrø (LB) 16/2 3 Århus - Kalundborg (NÅ), 19/3 - 30/5 21 trk Gjerrild Nordstrand (GF), 9/4 2 rst Moesgård (HeC), 1/5 1 Sangstrup Klint (LLH), 10/6 2 Hassensør (FF), 7/7 1 Ruggård Strand (PNN), 15/7 1 Hassensør (JTL), 20+21/8 1 Grenå Strand (JNK), 31/8 1 Issehoved (LeB), 5/10 1 juv Kysing Næs (OGJ), 14/10 1 N Sletterhage (JTL), 15/10 3 Hov - Tunø + 4 Tunø + 1 v/Hov Havn (BHJ), 9/11 6 V Gjerrild Nordstrand (KNM), 9/11 2 ad + 1 juv Østre Hedekrog, Samsø (SD), 12/11 1 Kysing Næs (LB) og 29/12 2 Vesborg Fyr (LeB).

Søkonge (Alle alle)

Fåtalig gæst forår (mar - apr) og efterår (okt - dec).

Atter et år med mange iagttagelser. Vi kan vist glæde os over, at denne lille fætter har skiftet overvintringsområde fra Skagerak til Kattegat. Se desuden FUGLE 1-86.

Forår: 9/3 1 Grenå Havn, 11-26/3 20 Ø, max 19/3 4 Ø Gjerrild Nordstrand, 16/3 4 rst Gjerrild Klint, 1/4 1 S + 6/4 1 S Fornæs (alle GF). Desuden et kampeantal 7/3 23-24 NØ-Djursland (Keld Scotwin). Forekomsten er godkendt af DOF's Sjældenhedsudvalg.

Efterår: Kysing Næs: 9/11 4, 12/11 1, 14/11 2 rst + 1 S, 16/11 3, 17/11 1 rst + 3 trk, 23/11 4, 24/11 1, 28/11 3, 8/12 2-3, 22/12 1, 25/12 2, 29/12 1 og 31/12 2 (LB, OGJ, HLL, ET, NÅ).

Risskov (badeanstalten): 10/11 1 ad, 12/11 1, 13/11 2-3, 14/11 2 og 16/11 1 (BHJ, HLL, JTL, LW, HP).

Fornæs: 20/10 3 N, 8/11 1 N + 1 S (RD) og 17/11 2 N + 5 S (HC).

Tunø Nordklint: 15/10 1 four (BHJ, HeC).



SØKONGE

Lunde (Fratercula arctica)

Sjælden efterårsgæst (nov).

Hele 8 individer - kan måske være fulgt med Søkongerne ind (?).

Fornæs: 26/10 1 N (JTL), 8/11 1 N (RD), 10/11 1 S (RD, OGJ, NÅ), 16/11 1 ad S kl. 7.41 (HP) og 17/11 1 N + 1 N - rst + 2 S (HC).

Huldue (*Columba oenas*)

Fåtalig yngletrækfugl (mar - aug), ret almindelig forårsgæst (mar - apr) og fåtalig efterårsgæst (aug - okt).

Første og sidste: 3/3 2 Brabrand Sø (LB) og 5/3 2 Silkeborg Vesterskov (BRS). 15/10 2 Sletterhage Fyr (JTL) + 2 Brabrand Sø (MCR).

Ynglefund (antal par): Moesgård skovene 5 (Moes, LB, H+JE, SH, PH, JTL, MCR, ET, JT) Rye Nørreskov 2-3, Rye Sønderskov 0-1, Østrestenhule 1, Silkeborg Nordskov 3-4, Silkeborg Sønderskov 2-4, Silkeborg Østerskov 1-2 (BRS, GW) og Silkeborg Vesterskov 2-4 (BRS, GW, JCN, SFP).

Fund i yngleperioden: Brabrand Sø: 3/3 2, 6/3 2, 9/3 9, 27/3 2, 29/3 2 og 15/6 2 (LB, AJ), Gylling Næs: 8/8 2 (H+JE), Hesselholm, Samsø: 5/5 1 (LeB), Lysbro Skov: 24/6 1 (SFP), Risskov: 21/6 2 kurr (JT), Ruggård Sønderskov: 7/7 1 (PNN), Karlby: 23/3 1 (PH), Tølløkke Skov: 28/4 1 sy og 7/6 2 hanner (PH, H+JE), Vaserne, Randers: 18/4 2, 14/5 1 og 16/5 1 (KNM).

Forår: Moesgård: 9/3 - 11/5 173 trk (Moes, LPJ, FK, MCR, PH, AJ).

Øvrige: 23/3 12 Gjerrild Nordstrand (PH), 28/3 1 N Skanseparken, Århus (NÅ), 29/3 11 N Risskov (HLL), 3/4 22 trk Fornæs (HLL) og 4/4 2 N Issehoved (PH, AJ).

Efterår: Sletterhage Fyr: 12/10 1 SV + 2 tf, 13/10 1 tf, 15/10 2 (JTL).

Øvrige: 7/8 + 18/9 1 Kysing Fjord (HLL), 14/9 2 Lykkensdalvej, Brabrand (LB), 12/10 1 S Skanseparken, Århus (NÅ), 12/10 1 V Kysing Næs (HP) og 15/10 2 Brabrand Sø (MCR).

Ringdue (*Columba palumbus*)

Meget almindelig trækfugl (mar - apr og okt - nov), desuden talrig ynglefugl og vintergæst.

I alt 102 iagttagelser af 1-7027 fugle, heraf de fleste ved Gjerrild. Derudover slet ikke så talrig som sidste år, måske pga et dårligt olden-år.

Moesgård: 3/3 - 23/5 i alt 11.118 trk. Største dage var 22/3 595, 25/3 611, 27/3 542, 28/3 1252, 29/3 1527 og 3/4 2030 (Moes).

Gjerrild: 4/3 - 3/6 i alt 51.008 trk. Største dage var 3/4 7027 0 og 4/4 6978 0 - i alt 12 dage over 1000 (GF).

Sletterhage: 12/10 2755, 13/10 299 og 19/10 662 (JTL).

Øvrige (over 250): 25/3 300 Nørreris Skov (SMJ), 31/3 4000 rst Homå (GF), 1/4 3400

rst Fornæs (GF), 7/4 1000 Vinderslevholm (JCN), 30/4 250 rst Fornæs (JNK) samt 15/11 600 Brabrand Sø (JTL), 17/11 500-1000 Storskoven, Brabrand Sø (AJ), 23/11 300 Kysing Fjord (ET), 16/12 450 Havskær (LPJ) og 30/12 250 Nørreris Skov (SMJ).

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*)

Status ukendt.

Af i alt 286 indrapporterede individer nævnes kun flokke over 25.

13/1 30 Mindeparken (AJ), pr nov 150 Randers Havn (JB) og 25/11 60-65 Århus Havn (JTL).

Skoggerdue (*Streptopelia risoria*)

Se appendix II.

Turteldue (*Streptopelia turtur*)

Fåtalig forårstrækgæst (maj - jun) og sjælden sommergæst (jul).

Forår: 22/5 - 3/6 i alt 7 Gjerrild (GF), 26/5 1 rst - N Sletterhage Fyr (JTL) og 2 rst Anholt (OGJ).

Sommer: 1/7 1 Kolby, Samsø kl. 15.10 (LeB), 18/7 1h Ørnsø (SFP) og 20/7 1 V Søholm, Brabrand Sø kl. 19.30 (BHJ).

Gøg (*Cuculus canorus*)

Ankom lidt senere end vanligt pga det forsinkede forår.

De første: 7/5 2 Grenå Hede (JNK), 8/5 1 Lillering (JSP) + 1 Hinnerup (PN) + 1 Kongslund (LTP) og 9/5 1 Mårslet (BHJ) + 1 Hinnerup (SMJ) + hørt Lystrup Ådal (JCN) + Fussing Skov (PER).

De sidste: 2/8 1 juv Hesselholm (SD), 8/8 1 Alrø (OGJ) og 15/8 1 Sejshede (PB).

Kirkeugle (*Athene noctua*)

Meget sjælden - sjælden ynglestand- og -strejffugl.

Arten klarer sig stadig ikke for godt.

Ynglefund: Lyngby 1 par (LB, H+JE, OGJ, JFT, JTL), Borum 1 par (JTL).

Øvrige: jan - mar 1 (GF) + 1/4 1 (RD) Thorsø, med apr 1h Gjerrild (GF), 2/5 1 Søsterhøj, Moesgård (JTL) og 23+28+29/6 1 + juli 0 Vejlagelager (JP).

Natugle (*Strix aluco*)

Fåtalig ynglestand- og -strejffugl.

Ca. 30 par indsendt, men der mangler fra bl.a. Odder - Skanderborg, Syddjurs og nord for Randers.

Sikre og sandsynlige ynglepar: Ry Nørreskov 2, Addithus Skov 1, Hemstok Skov 1, Silkeborg Nordskov 2 (BRS), Silkeborg Vesterskov 2 (BRS, SH), Højlund Skov 0-1 (TV), Mårslet 0-1 (BHJ, FL), Moesgård Museum 1 (LB, H+JE, PH, BHJ, AJ, JTL, KNM, JFT), Kragelund, Højbjerg 1 (BHJ), Brabrand Sø: Søsken 1 og Storsken 1 (LB, AJ, JTL), Villa Hans Broge, Brabrand 1 (LB), Risskov 2 (NÅ, JDJ, LPJ, JTL). Ebeltoft 1 (JSP), Gjerrild Skovene 7-9 (GF), Randers 1 (KNM) og Fussing Skov "flere" (PER).

Øvrige: 12/1 1h Femmøller (JSP), 14/1 1 Carl Nielsensvej, Århus (AJ), 6/5 1 Lille-ring (JSP), 16/5 1 Forsthaven, Århus (HP), 1/6 1 Salten Langsø vest, 13/6 1 v/Ørn-sø, 27/7 1 v/Almind Sø (JCN), aug - sep 1 Botanisk Have (JDJ), 28/9 1 Pindsmølle (ET), 1/10 1h Thorsager (JSP), 17/10 1 Pindsmølle (KNM) og 29/10 1 Dørup (ET).

Skovhornugle (*Asio otus*)

Meget sjælden - sjælden ynglefugl og fåtalig træk- og vintergæst (aug - apr).

Iagttagelser af trækkende Skovhornugler er uhyre sjældent. To ynglefund fra Randers-kanten.

Sikre ynglefund: Vaserne: 1 ad m 3 unger (KNM), Kongslund: 1 par m 3-5 unger (JP).

Trækiagttagelser: 15/3 - 21/4 18 set på udtræk i skumringen (GF).

Øvrige: 4/3 1 + 1 død Langedalen, Brabrand (LB), 7/3 4 Ystadgade, Århus (OGJ), 25/3 1 Brabrand Sø (AJ), 29/3 1 + 14/4 2 Tved Øhoved (JSP), 17/4 1 Brabrand Sø (HE), 10/5 1h Ringelmose Skov (JSP), 18/5 1 four Mårup Plantage kl. 21.37 (LeB), 8/8 1 død Mariendal, S for Moesgård (HE) og 3/12 2 Langedalen, Brabrand (LB).

Mosehornugle (*Asio flammeus*)

Fåtalig forårstrækgæst (mar - maj) og sjælden vintergæst (dec - feb).

Et lidt tyndt år, bl.a. ingen efterårsagttagelser.

Gjerrild Nordstrand: 6/3 - 9/5 27 (heraf 20 Ø), max 4 3/4 og 14/4. (GF, LTP).

Øvrige: 26/1 1 S Møgelmosen, Samsø (SD), 16-18/2 5 i flok Lyngby (JTL), 7/4 1 Brabrand Sø (HLL) og 11/5 1 Grenå Hede (JNK). Gylp af *Asio* sp i åbent terræn 21/10 på Frederiksdal Hede (SFP), kan være fra Mosehornugle.

Natravn (*Caprimulgus europaeus*)

Sjælden yngretrækfugl (jun - jul), sjælden, uregelmæssig forårstrækgæst (ult maj - pr jun) og meget sjælden, uregelmæssig efterårsgæst (aug/sep).

Et rekordår med hele 10 iagttagelser mod de sædvanlige 0-3, nok især resultat af den øgede aktivitet ved Gjerrild. Obs af trækkende Natravne er usædvanligt. Iagttagelserne er foretaget i skumringen.

Mulige yngreiagttagelser: med jun 1h Emmedsbo Plantage og 3h Grenå/Annebjerg Plantager (GF), 27/7 1h Femmøller (RD).

Trækiagttagelser: Gjerrild Nordstrand: 17/5 1, 28/5 1, 6/6 1 alle NØ (GF).

Øvrige: Gjerrild Nordstrand: 17/5 1 rst, 23/5 1 rst (GF), Mårup Skov, Samsø: 18/5 1 kl. 21.15 (LeB) og efterårets eneste 21/9 1 Sletterhage (RD).

Mursejler (*Apus apus*)

Status ukendt. Første, sidste og en håndfuld obs af over 100 ex nævnes.

Første: 5/5 4 Brabrand Sø (KeH), 6/5 1 Brabrand Sø (TB) + 2 Randers (JP) og 7/5 14 Brabrand Sø (HLL) + 1 Dørup (ET).

Store tal: 15/9 90-100 Gudenå Bredningen, Randers (KNM), 21/5 150 N + 2/6 545 N Moesgård (Moes), 21/7 min 200 Brabrand Sø (BHJ), 4/11 100 Vorup, Randers (LTP) og 10/8 100 S Hesselholm (LeB).

Sidste: 16/9 1 Skanseparken, Århus (NÅ), 17/9 1 Brabrand Sø (KeH), 18/9 1 Kristrup, Randers (LTP) og 22/9 1 Brabrand Sø (BHJ).

Isfugl (Alcedo atthis)

Sjælden (fåtalig ?) ynglestandfugl, samt fåtalig gæst året rundt.

Ynglefund: Klosterkanalen, Emborg 1 (TV), Silkeborg Østerskov 1 (GW), Pinds Mølle-dal 1 (ET) og Fussing Vandmølle 0-1 (PER).

Øvrige: 3/2 1 Lysbro Skov (rensningsanlæg) (SFP), meste af feb 1 Fannerup (GF), 14/4 1 Bjerregrav Mose (JP), 14/4 1 Julse (JCN), 25/5 1 Salten Langsø (SFP), 2/6 1 Fussing Sø (JP), 11/6 1 Sejssnævringen + 1 Brassø (JCN), 24/7 1 Brabrand Sø (John Loft), 25/7 + 10/8 1 Pøt Sø (SFP), pr okt 1 Århus Østhavn (Torben Sørensen), okt 1 Brabrand Sø (John Loft), 12/10 1 Brassø (JCN), 18/10 1 Dødeåen (TV), 19/10 1 Salten Langsø (TV), 20/10 1 Grund Fjord (FFa), 17/11 1 rnk 4 km fra Ørum, Djurs (JNK) og 29/12 1 Salten Å (JB).

Vendehals (Jynx torquilla)

Meget sjælden (sjælden ?) yngletrækfugl, fåtalig forårstrækgæst (ult apr - ult maj) og meget sjælden efterårsgæst (med aug - pr sep).

Kulminationen: Forårstrækket faldt den 11/5 med halvdelen af alle fuglene! Rekord-forår.

Ynglefund: 1 par med min 5 pulli Thorsager (JTL).

Forår: Gjerrild: 6/5 - 2/6 23, max 11/5 8 rst (GF, RD).

Moesgård: 4/5 1, 7/5 1, 8/5 1, 11/5 4, 16/5 4 og 17/5 1 (Moes, OGJ).

Øvrige: 4/5 1 Brabrand Sø (AJ), 11/5 1 sy Omæstrup v/Mørke (LPJ) + 3-4 Tre Broer, Brabrand Stien (PNN) + 2h An sø Enge (JCN).

Efterår: 27/8 1 Brabrand Sø (KeH).

Grønspætte (Picus viridis)


Fåtalig - ret almindelig (?) ynglestand- og - strejffugl.

Over 100 iagttagelser, største koncentrationer i Silkeborg Skovene. Gjerrild og Molsbjergerne med 10/dag hele sommeren.

Ynglefund (antal par): Silkeborg Nordskov: 10-12 (SFP, BRS), Silkeborg Sønderskov: 5-10 (BRS). Silkeborg Østerskov: 8-12 (BRS). Silkeborg Vesterskov: 6-10 (H+JE), SH, JCN, SFP, BRS). Moesgård: 1 (OGJ, TB, FF, SH, BHJ, LPJ, HP, Moes, MCR, PH), 5/7 1 ad m 3 juv (JFL). Fussing Skov: "flere" (PER). Gjerrild-området: min 10 (JP, GF).

Mulige ynglelokaliteter: Midtjylland: Højlund Skov + Pindal Mose (TV), Salten Langsø (OGJ, H+JE, JSD), Velling Skov (SH), Emborg Odde/Mossø (SH, FL), Sejs (PB) og Funder Skov + Lysbro Skov (SFP).

Djursland: Helgenæs (JTL), Torup Mark v/Degtrup Vig (HE), Agri/Molsbjergerne + Lange-sø + Ringelmose (JSD), Tolløkke Skov (TB, BHJ, PH), Stubbe Sø/Skarsø Plantage (OGJ, TB, FF, NÅ, PN, JTL), Skaføgård Skov + Smørmosen/Ringsø (SH, JTL), Auning Skov (JTL) og Fjeld Skov + Løvenholm Skov (LPJ).



Nordlige amt: Vorup v/Randers + Floes Skov + Østrup Skov + Assentoft Skov (LTP), Sødringholm + Hungstrup Skov + Houlbjerg Skov + Ajstrup Skov + Langå Skov + Clausholm Slotspark (JP).

Øvrige: Uldrup Bakker (SH), Blommehaven/Marselisborg Skov (BHJ, H+JE)

Strejfugle: 10/4 1 Langedalen, Brabrand (LB), 16/4 1 Erabrand Sø (LW), 12/5 1 Storskoven, Brabrand Sø, 5/10 1 Kysing Fjord (OGJ), 13/10 1 Vejlbo Mose (JCN) og 24/11 Nørreådal (via JP).

Sortspætte (*Dryocopus martius*)

Fåtalig ynglestandfugl, muligvis sjælden forårstrækgæst.

Ynglefund (antal par): Silkeborg Vesterskov 2, Silkeborg Sønderskov 1, Silkeborg Nordskov 1, Rye Sønderskov 2, Rye Nørreskov 1, Linå Vesterskov 1, Nygårde Skov 1, Løndal Skov 1, Addithus Skov 1, Fussingø Skov 1, Bidstrup Skov 1, Hemstok Skov 0-1 og Højkol Skov 0-1 (alle GW + BRS).

Alle enkeltobs nævnes: Silkeborg Vesterskov: 24/3 2, 5/4 2, 7/4 1 hun, 8/5 h, 10/5 h 16/5 1 han, 3/6 1 hun, 10/6 1, 16/6 rede tom og 28/6 h (OGJ, H+JE, SH, JCN).

Velling Skov: 28/1 + 15/2 1 han overnattede (BRS), 2/2 1 Lystrup Å (JCN), 17+24/3 h ved Hundso (JB) og 1/6 3 (ØBF).

Øvrige: 9/1 1h Skærbæk Plantage (BRS), 6/2 1 han Nygårde Skov (BRS), 12/2 1 han, 1 hun Rye Sønderskov (BRS), 7/3 1 Emmedsbo Plantage (GF), 24/3 1 han, 1 hun Linå Vesterskov (BRS), 26/3 1 sy + trom Gjerrild Nordstrand (RD), 9/4 1 hun, 1 han Løndal Skov (BRS), 14/4 1 han Slåensø (JCN), 20/4 1 Gjessø Skov (BRS), 1/5 1h Gjerrild Nordstrand (GF), 8/5 1 Fussing Skov (PER) og 23/5 1 Fussingø (LTP).

Lille Flagspætte (*Dendrocopus minor*)

Meget sjælden og uregelmæssig vintergæst.

30/12 1 Skalbjerget ved Giberå (mellem Fulden og Vilhelmsborg (MCR)). Siden 1972 set tre gange i amtet. 7/2 1978, 13/1 1982 og 16/2 1983.

Korttået Lærke (*Calandrella cinerea*)

Se appendix I

Toplærke (*Galerida cristata*)

Fåtalig ynglestandfugl samt meget sjælden trækfugl.

Lidt flere indberetninger end i 1984.

Formodede ynglepar i Århus-området: 1 Århus Havn (NÅ), 1 Tranbjerg-centret (OGJ, H+JE, BHJ), 1 Edwin Rahrsvej/Åby Ringvej (JP), 1 Digterparken (KeH), 1 Bispehaven (KeH), 1 Trillegården (KeH), 1 Slet (BHJ), 1 Bilka (SH) og 1 Veri-centret (PNN).

Formodede ynglepar i Randers-området: 1 Randers gl. losseplads (LTP), 1 Grenåvej (JP) og 1 Randersbro (JP).

Formodede ynglepar i øvrigt: 1 Grenå (GF) og 1 Hinnerup (PN).

En enkelt obs fra et træksted: 31/3 2 rst Gjerrild Nordstrand (GF).

Der må være flere ynglepar. Se godt efter ved butikcentre, industri kvarterer, oplagspladser og lignende steder.

Hedelærke (*Lullula arborea*)

Sjælden yngletrækfugl (mar - okt), fåtalig forårstrækfugl (med mar - apr) og sjælden efterårstrækfugl (okt).

Yngel: 31/3 2 par sy Salten Langsø syd (KH), 5/4 2 Salten Langsø (OGJ, H+JE) og 11/5 1 sy Anso Enge (JCN).

Træk: 5/3 - 19/4 i alt 69 trk, max 1/4 18 Ø Gjerrild (GF), 14/3 2 Roved (KNM), 16/3 1 N, 31/3 1 S, 17/4 1 rst (Moes) og 18/4 1 sy N (LPJ) alle Moesgård, samt 12/10 1 trk og 13/10 1 trk Sletterhage Fyr (JTL).

Er givetvis overset på ynglepladsen og måske på efterårstrækket.

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*)

Fåtalig forårstrækfugl (mar - apr).

I 1985 udelukkende forårsiagttagelser, deriblandt en antalsmæssig så usædvanlig obs som:

24/3 20 rst Moesgård (Moes), endvidere 29/3 1 rst Tangkrogen (Moes) og 10/4 1 NV Gjerrild (GF).

Digesvale (*Riparia riparia*)

Ret almindelig yngletrækfugl og ret almindelig trækgæst (ult apr - maj og aug - pr sep).

Optalte kolonier: 80 huller Ahl Hage (FF), 20 huller Hassensør (FF), 23/6 50 par Vejro, Kattegat (PHH) og 20/6 100 par Pilbrodalen (FL).

Træk: Første: 19/4 1 Gjerrild (GF), 23/4 3-4 Bidstrup Skov (PN), 6/5 2 Moesgård (AJ) og 6/5 2 Brabrand Sø (JTL).

Forårstræktal: 19/4 - 28/5 115 trk Gjerrild (GF) og 7/5 - 5/6 55 trk Moesgård, max 17/5 15 N (Moes).

Sidste indrapporterede: 31/8 1 Samsø (LeB).

Landsvale (*Hirundo rustica*)

Yngletrækfugl og meget almindelig trækgæst (med apr - pr jun og aug - med okt).

Tre tidlige obs: 7/4 1 Eskelund (KeH, PNN), 8/4 1 Århus Å v/Tre Broer (PL), og 8/4 1 N Moesgård (Moes). De næste sås efter en uge med meget koldt vejr 14/4 1 Kysing Fjord (OGJ), 14/4 2 Fussing Sø (JP), 15/4 3 Silkeborg (PB), 16/4 1 Grund Fjord (FFa) og 17/4 1 Brabrand (LB).

Forårstrækket: 8/4 - 8/6 i alt 1966 trk Moesgård, hvilket er hidtil højeste totaltal fra denne lokalitet, max 17/5 625 N (Moes) og 19/4 - 3/6 i alt 8727 trk Gjerrild max 7/5 1205 trk (GF).

Efterårstrækket mere diffust, dog samledes 12/9 2000 ved Brabrand Sø (LW) og 20/9 træk 220 forbi Assentoft (LTP).

De allersidste: 19/10 15 trk Salten Langsø (TV), 20/10 1 Nørreådal (JP), 21/10 1 Kysing Fjord (OGJ) og 27/10 1 Kysing Fjord (OGJ).

Bysvale (*Delichon urbica*)

Yngletrækfugl og meget almindelig trækgæst (ult apr - pr jun og aug - med sep).

Eneste obs i april var 23/4 1 Bidstrup Skov (PN). 3/5 starter trækket i Gjerrild, hvor der indtil 4/6 trækker i alt 13.968. Maximumdage 7/5 7060 Ø og 8/5 2500 Ø (GF). Ved Moesgård ses i perioden 6/5 - 8/6 i alt 504 trk (Moes).

Efterårets sidste: 14/9 1 Mårup, Samsø (LeB), 20/9 1 Assentoft (LTP), 21/9 5 Gl. Åby (KeH) og 29/9 2 Sletterhage (DOF).

Storpiber (*Anthus novaeseelandiae*)

Se appendix I.

Markpiber (*Anthus campestris*)

Meget sjælden - sjælden yngletrækfugl (pr maj - aug) og fåtallig forårstrækgæst (pr maj - pr jun).

Fra Anholt foreligger 2 sikre ynglefund: 11/7 1 par med kuld ved Fyret øst (JB) og 12/7 1 par med kuld vestlige del af ørkenstien (JB). Endvidere er set 3/6 4 Ørkenen, Anholt (PHH).

Oprettelsen af Gjerrild Fuglestation har bl.a. givet til resultat: 4/5 - 1/6 24 trk Gjerrild, max 13/5 7 Ø (GF).

Skovpiber (*Anthus trivialis*)

Yngletrækfugl og meget almindelig trækgæst (med apr - maj og ult aug - sep).

På forårssiagttagelser, hvor Moesgård og Gjerrild dominerer billedet: Moesgård: 17/4 - 26/5 i alt 784 trk, heraf 17/4 2 N, 9/5 319 N. April i alt 14, maj i alt 770 (Moes). Gjerrild: 8/4 - 31/5 i alt 10.357 trk, heraf 7/5 2550 Ø og 8/5 3027 Ø (GF).

Blot 2 efterårssiagttagelser: 22/9 100 Moesgård (H+JE) og 27/9 2 Assentoft (LTP).

Engpiber (*Anthus pratensis*)

Yngletrækfugl og almindelig trækgæst (pr mar - ult maj og sep - nov). Fåtalig vintergæst.

Forårstræktal, største tal (over 100): 10/3 - 18/5 i alt 888 trk Moesgård, max 1/5 274 (Moes), 14/3 - 23/5 i alt 3917 trk Gjerrild, max 8/5 550 Ø (GF), 7/4 217 NØ Issehoved (AJ), 14/4 100 Tved Øhoved (JSP), 14/4 200 trk Gjerrild Nordstrand (LTP), 16/4 250 Dronningborg Bredning (LTP) og 21/4 min 100 Grund Fjord (FFa).

Største efterårstræktal: 22/9 20 Moesgård (H+JE), 22/9 60 trk + 10 rst Krstrup Enge (LTP), 22/9 30 trk Vorup (LTP), 28/9 84 SV Hesselholm (SD) og 12/10 - 20/10 i alt 204 trk Sletterhage Fyr, max 13/10 63 trk (JTL).

vinteriagttagelser: 2/1 5 + 4/1 3 + 8/1 1 Krstrup Enge (LTP), 8/1 1 Kysing Næs (ET), 25/1 9 Sydøst-Samsø (SD), 30/12 1 Brudese + 3 Kragse (TV) og 31/12 1 Klosterkær (TV).

Rødstrubet Piber (*Anthus cervinus*)

Sjælden trækgæst (maj - pr jun og sep).

Første forekomster i amtet siden 12/5 - 1975. Til overflod både forårs- og efterårs-iagttagelser:

Forår: 3/5 1 Ø, 11/5 1 Ø og 3/6 1 Ø alle Gjerrild (GF).

Efterår: 5/9 1 hørt Fornæs (RD) og 18/9 1 rst Kysing Fjord (HLL).

Skærpiber (*anthus spinoletta littoralis*)

Sjælden yngletrækfugl og fåtallig trækgæst (mar - apr og sep - nov), fåtallig vinter-gæst.

Sandsynlige ynglefund: 23/6 1 sy Langør, Samsø (SD), 2 par Hov Røn (JG) og 8/8 2 ad Besser Rev (KB).

Forår: 9/3 - 17/4 i alt 46 trk Gjerrild, max 14/3 8 Ø (GF) samt 17/3 1 Fornæs (JP) og 3/4 1 N Moesgård (Moes).

Efterår: af 23 obs nævnes alle af over 2 individer og de tre første: 8/9 2 Fornæs (RD), 29/9 2 Århus Havn (NÅ), 29/9 2 Kysing Næs (LB), 27/10 6 S Fornæs (JNK), 2/11 25 rst + 13 trk Fornæs (RD), 3/11 6 Grenå Mole (JSP), 3/11 31 Fornæs (JSP), 8/11 3 Århus Østhavn (LW), 10/11 4 Grenå Havn (JP), 24/11 5 Fjellerup/Bønnerup Strand (JP), 25/11 4 Kalø Slotsruin (JSP), 30/11 3-4 rst Langøre, Samsø (SD).

Vinter: af 12 obs nævnes alle af over 1 individ: 14/1 + 19/1 9 rst Grenå Havn (JNK), 20/1 + 3/2 2 rst Grenå Strand (JNK) og 17/2 2 Århus Østhavn (JP).

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*)

1985 bød på 3 racer i Århus amt.

Almindelig Gul Vipstjert (M. f. flava)

Fermodentlig ret almindelig yngletrækfugl (med apr - sep) og ret almindelig træk-

gæst (med apr - maj og aug - sep).

Kun få ynglefund: 4-11 par Århus Havn (NÅ, KeH), 5-6 par Dronningborg Bredning (LTP) og 1 par Ølst bakker (LTP).

Forår: de første: 1/4 1 Øster Hedekrog, Samse (SD, LeB), 5/4 2 Hesselholm (SD) tidlige! 21/4 1 og 24/4 1 Vasen, Randers (KNM) og 28/4 1 Brabrand Sø (BHJ).

Øvrige: 1/5 - 6/6 i alt 157 trk Moesgård, max 17/5 66 N og 18/5 48 N (Moes), 3/5 9 Brabrand Sø (AJ), 11/5 21 rst Fornæs (JNK), 18/5 30-40 Brabrand Sø (MCR), 19/5 40 NØ Hesselholm (LeB) og 20/5 20 Kasted Mose (SH).

Små traktal fra efteråret, de største nævnes: 23/8 5 rst Dørup (ET), 29/8 11 Begtrup Vig (BHJ), 1/9 5 rst Dørup (ET), 10/9 4-5 rst Dørup (ET), 29/9 5 Begtrup Vig (DOF).

Nordlig Gul Vipstjert (M. f. thunbergi)

Almindelig træk-gæst i maj - pr juni. Efterårsstatus ukendt.

Alle obs nævnes: 2/5 - 3/6 i alt 2503 trk Gjerrild, max 17/5 1065 Ø, disse fugle var primært thunbergi-racen (GF), 4/5 1 han Brabrand Sø (AJ), 5/5 1 Brabrand Sø (LW), 6/5 2 Århus Østhavn (LW), 9/5 60 Dronningborg Bredning (LTP), 11/5 2 N + 14/5 21 rst + 18/5 5 N Moesgård (Moes, ET), 14/5 5 Brabrand Sø (LW), 14/5 1 Dødeå (PNN), 17/5 10 Dalbynder (JP), 25/5 3 rst Hesselholm (LeB).

Gulhovedet Vipstjert (M. f. flavissima)

Meget sjælden og uregelmæssig gæst.

En af årets overraskelser. Dette er det første fund af denne race i lokalrapportens historie (siden 1972):

6/5 1 rst Gjerrild Nordstrand (GF).

Et lille hjertesuk: Det ville være ønskeligt, om alle indsendere bestræbte sig på så vidt muligt at racebestemme de Gule Vipstjerter. Blandt de her i rapporten nævnte Almindelig Gule Vipstjerter forekommer efter al sandsynlighed en del individer af den nordlige race, som således unddrages registrering og samtidig fortegner billedet af racefordelingen.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl (mar - nov), fåtallig trækfugl (mar - pr maj og sep - nov) og meget sjælden vintergæst.

Tilsyneladende tilbagegang som ynglefugl og vintergæst, mens trækket er stabilt.

Ynglefund: 28/6 1 ad + 1-2 juv Kollen Mølle (ET), 26/7 1 hun + 2 juv Grundfør Mølle (SMJ), 1 par Klostermølle (TV) og 1-2 par Fussing Vandmølle (PER).

Forårstræk: 25/3 - 13/4 i alt 23 trk Gjerrild, max 1/4 5 og 6/4 5 (GF), 29/3 - 11/5 i alt 6 N Moesgård (Moes), 3/4 1 trk Fornæs (HLL) og 10/5 1 trk Norringure (SMJ).

Efterårstræk: 14/9 1 hørt Sletterhage (RD), 2/10 1 N Lykkendalsvej, Brabrand (LB), 13/10 1 S Sletterhage (LPJ, JTL) og 15/10 2 trk Sletterhage (JTL).

Vinter: Kun et enkelt fund: 2/1 1 Krstrup Enge (LTP).

Hvid Vipstjert (Motacilla alba)

Yngletrækfugl og almindelig trækfugl (med mar - maj og sep - okt).

Første: 13/3 1 Hinnerup (PN), 13/3 1 Malling Mose (OGJ) og 16/3 1 Røved (KNM).

Forårstræk (største tal): 16/3 - 20/5 i alt 1354 trk Gjerrild, max 15/4 208 og 23/4 355 (GF), 15/3 - 5/6 i alt 514 trk Moesgård, max 4/4 125 og 7/4 59 (Moes m.fl) og 11/4 25-30 rst Dødeå (ET).

Efterårstræk (største tal): 5/9 53 trk Fornæs (RD), 16/9 25 rst Dørup (ET), 29/9 67 trk Sletterhage (DOF) og 12/10 - 19/10 41 trk Sletterhage (JTL). Årets sidste 3/11 1 Grenå Strand (JSP) var sen.

Silkehale (Bombus garrulus)

Ret almindelig træk- og vintergæst, der optræder invasionsagtigt (med okt - pr maj).

Til trods for, at 1984 sluttede med ca 2000 iagttagne Silkehaler i amtet, sås efter årsskiftet - sandsynligvis på grund at samtidigt indtrådt kraftigt vintervejr - kun få og små flokke på op til 19 fugle i januar. Undtagelsen var en flok på flere end 500 i Gjellerup den 9/1 (HE).

Februar gav 2/2 30 Møllevangs Alle (JDJ), 5/2 25 Frydenlundskolen (SH) og 13/2 22 Nordlandsvej, Risskov (PNN). Marts: 6/3 12 Ydunsvej, Åbyhøj (PNN) og 19/3 30 Nordlandsvej, Risskov (PNN). Uden for Århus-området sås kun få fugle, nævnes skal 19/3 - 4/4 9-15 Vorup, Randers (LTP), samt observeret forårstræk 19/3 - 9/5 18 trk Gjerrild (GF).

I efteråret starter en mindre invasion, hvor enkelte forløbere ses 20/10 1 Universitetsparken (KNM) og 30/10 1 Strandvejen, Århus (OGJ). Første flokke ses 15/11 12 Brabrand Sø (JTL), 16/11 80 rst Grenå Havn (HC) og 17/11 12 rst - SV Hesselholm, Samsø (LeB). 23/11 observeres flere flokke i Århus med op til 75 Universitetet (LLH, OGJ), og året ud meldes om mindre flokke. Alle over 30 nævnes: 3/12 min 100 Søndervangen, Viby (PH), 8/12 ca 50 Søndervangen (LB) og 22/12 35 Mølleparken (ET). Eneste december-obs uden for Århus-området: 29/12 13 rst Ry Station (TV).

Vandstar (Cinclus cinclus)

Fåtalig træk- og vintergæst (med okt - med apr).

Tilsyneladende fremgang, idet ca 60 fugle er set jævnt fordelt over hele antet.

Forårets sidste: 8/4 1 Norring Vesterskov (SMJ), 11/4 + 13/4 1 Giber Å (Moes), 13/4 1 Jeksen Bæk (ET), 14/4 1 Pinds Mølle (ET). En meget sen: 11/5 1 Gudenå v/Silkeborg Papirfabrik (GW).

Efterårets første: 17/10 2 Pinds Mølle (KNM), 18/10 + 20/10 1 Klostermølle (TV), 27/10 1 Pinds Mølle (DOF).

Største antal var 23/1 5-6 Pinds Mølle (ET) og 29/12 Lystrup - Salten Å (JB).

Nattergal (Luscinia luscinia)

Ret almindelig yngletrækfugl (pr maj - ult jun/aug).

Registreres stort set udelukkende som syngende i maj og juni. Ingen indberetninger senere end 26/6.

Første: 9/5 1 sy Moesgård (Moes), 10/5 1 sy Ringelmosen (JSP), 10/5 4 sy Vasen, Randers (KNM), 10/5 1 sy Brabrand Sø (BHJ), 10/5 2 Kongslund (JP).

Største antal: 25/5 73 (!) sy Mørke Kær (JSP), 26/5 min 30 sy Bjerregrav Mose (LTP), 30/5 10 sy Vasen, Randers (KNM) og 2/6 10 Kongslund (JP).

Peking Robin (*Leiothrix lutea*)

Se appendix II

Blåhals (*Luscinia svecica*)

I 1985 forekom 2 racer i Århus amt.

Nordlig Blåhals (L. s. *svecica*)

Sjælden forårstrækgæst (ult apr - pr jun)

I år udelukkende forårsobs af 7 fugle, alle fra den østlige del af amtet: 8/5 1 hun ringmærket Anholt (HE), 18/5 1 han Sletterhage Fyr (HE), 11/5 - 4/6 i alt 5 Gjerrild, heraf 1 ringmærket (GF).

Sydlig Blåhals (L. s. *cyaneola*)

Meget sjælden. Tilfældig trækgæst.

Denne i Danmark meget sjældne race optræder her for første gang i lokalrapporten: 14/4 1 ad han ringmærket Gjerrild (GF).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*)

Fåtalig yngletrækfugl (pr apr - okt) og sjælden trækgæst (apr og okt). Meget sjælden (tilfældig) vintergæst.

Bedømt ud fra 79 indberetninger skønnes ynglebestanden i Århus incl. havnen og forstæderne at ligge på 20-22 par, hvoraf sikre ynglepar er: 1 Mejlgade (LPJ), 21/7 4 juv Århus Østhavn (NÅ) og 3/8 1 par + 4 juv JME, Eskelund (KeH). I Grenå er der 2-3 ynglepar (GF) og i Randers 2-3 par (JP).

Forårstræk: 3/4 1 hun rst Fornæs (HLL), 3/4 - 24/4 4 Gjerrild Nordstrand (GF), 5/4 1 rst Klitgård - Issehoved (AJ) og 5/4 - 8/4 1 hun rst Hesselholm (SD).

Efterårets sidste: 8/10 1 sy Mejlgade, Århus (LPJ), 13/10 2 Kulhavnen, Århus (KeH) og 26/10 1 rst Fornæs (TB, JTL).

En helt usædvanlig vinterforekomst: 31/12 1 han rst i sneen på Kysing Næs (LB).



Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)

Formentlig ret almindelig yngletrækfugl (ult apr - ult aug/sep) og trækgæst (ult apr - maj og ult aug - sep).

Sikre ynglepar: 2736 1 han + 1 juv Silkeborg (JCN), 29/6 1 hun + unger Thorsager (ET), 3/7 1 juv Klostermølle (TV), 5/7 1 par Åbyhøj (KeH), 1/8 1 par + 3 juv Eskelund (KeH), 2 par Hinnerup (PN).

Første: 14/4 1 han ringmærket Grenå (CO), 16/4 1 hun Moesgård (Moes), 21/4 1 Vasen, Randers (KNM), 22/4 1 sy Monradsvej, Viby (FF) og 22/4 1 Hinnerup (PN). Forårstræk: 10/5 35 trk Gjerrild (GF).

Eneste september-obs: 22/9 1 Moesgård (H+JE).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*)

Fåtalig yngletrækfugl (pr maj - sep) og formentlig almindelig trækgæst (pr maj - pr jun og aug - ult sep).

Sikre ynglepar: 1 Grund Fjord (FFa), 3/7 - 10/7 1 par + 3 juv Klosterkær (TV), 11/7 1 Bølling Sø (SFP). Yderligere er 22 par set på tidspunkter og lokaliteter, der kunne tyde på ynglen (JP, LTP, SMJ, JCN).

Forår: de første fugle ses 2/5 1 Gjerrild (SGF), 4/5 1 Hesselholm (LeB) og 7/5 2 haner Dørup (ET).

Træk: 10/5 - 26/5 i alt 11 rst Moesgård (Moes), største trækdag i Gjerrild 11/5 med 55 trk (GF).

Fra efteråret foreligger to usædvanligt høje rasttal af blandede flokke af Bynkefugl og Stenpikker (se også denne): 9/9 800-1000 Alrø (JVS) og 15/9 400-500 Kysing Fjord (JVS).

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*)

Sjælden (fåtalig?) yngletrækfugl (apr - sep) og formodentlig almindelig trækgæst (med apr - med maj og sep - pr okt).

Kun 2 sikre ynglepar: 1 Århus Havn (NÅ, KeH) og 10/6 1 par + pulli Ebeltoft Færgeshavn (FF).

Forårstrækkets første fugle sås: 4/4 1 Gjerrild (GF), 4/4 4 Issehoved (PH, AJ) og 7/4 9 Nord-Samsø (PH, AJ). Ved Gjerrild kulminerede trækket 14/5 med 30 rst (GF).

Største efterårstræktal: 2/9 mere end 50 Kysing Fjord (OGJ). To usædvanligt store tal for blandede flokke af Stenpikker og Bynkefugl (se også denne): 9/9 800-1000 rst Alrø (JVS) og 15/9 400-500 Kysing Fjord (JVS). Ved Kysing Fjord sås i dagene omkring: 14/9 10 (HP) og 16/9 14 (HLL).

Efterårets sidste: 18/9 1 Dollerupvej, Århus (KeH), 18/9 1 han Lybro (JCN), 22/9 3 Eskelund (KeH) og 22/9 2 Alrø (LPJ).

Ringdrossel (Turdus torquatus)

Ret almindelig forårstrækgæst (pr apr - ult maj).

Ca. 170 fugle er set, alle fra foråret. Efterårstrækket går tilsyneladende stort set uden for Århus Amt.

Forårstrækket indledes i Gjerrild 1/4, hvor der frem til 2/6 ses i alt 88 rst, max 3/5 13 og 4/5 27 (GF).

Største tal i øvrigt: 26/4 5-6 Kolindsund (medd AJ), 1/5 35 Engen, Anholt (HE), 3/5 4-5 Salten (JCN), 4/5 5 Malling Mose (JVS) og 4/5 6 Anholt (HE).

Sjagger (Turdus pilaris)

Formodentlig meget sjælden ynglefugl. Meget almindelig træk- og vintergæst (med okt - pr maj).

Der foreligger et muligt ynglefund, idet en fugl er set med føde i næbbet i sommerperioden Næsby, Djursland (CO). Ingen andre sommeriagttagelser er indsendt.

Træk- og vinterforekomster, flokke på mindst 300 nævnes: 22/3 400 rst Dørup (ET), 21/4 700 Dystrup-Ramten (HP), 2/5 "flere tusinde" Samsø (LeB), 4/5 800 Skjoldelev Bakker (TB), 1/3 - 18/5 i alt 7479 trk Gjerrild, max 5/5 4375 trk (GF), 27/10 300 rst Gylling Næs (LB) og 30/11 400 Vestervang, Århus (H+JE).

Sangdrossel (Turdus philomelos)

Yngletrækfugl og trækgæst (med mar - maj og sep - okt). Meget sjælden vintergæst.

Første: 7/3 1 sy Brabrand (LB), 10/3 1 Gjerrild (GF) og 16/3 1 Moesgård (Moes).
 Træktal: 4/4 21 N Moesgård (Moes), 17/4 225 rst og 4/5 155 rst Gjerrild (GF).
 Sidste: 20/10 10 trk Klostermølle (TV) og 22/10 1 Vasen, Randers (KNM).

Vinterforekomster: 16/1 1 Eskelund (KeH) og 27/1 1 Brabrand Sø (AJ). Samme fugl?

Vindrossel (*Turdus iliacus*)

Almindelig træk- og vintergæst (pr okt - ult apr).

92 indberetninger, antal over 100 nævnes: 18/3 - 11/5 trak 372 ved Gjerrild, ingen flokkkoncentrationer (GF), 19/4 - 21/4 100-150 Grund Fjord (FFa), 11/10 foregår øjensynlig et større dagtræk, idet der denne dag ses 150 Assentoft (LTP), 200 Søften Dal (SMJ) og 460 S + 175 S gennem Mejlgade, Århus (LPJ), 12/10 153 trk Sletterhage Fyr (JTL).

Misteldrossel (*Turdus vicivorus*)

Formodentlig ret almindelig yngletrækfugl (feb - nov) og almindelig trækgæst (ult feb - pr maj og okt - ult nov). Sjælden vintergæst.

103 observationer melder om mange par eller syngende fugle fra hele amtet, dog mest koncentreret i Midtjylland og på Djursland.

Forår: ankomst 23/2 1 Molslaboratoriet (PNN), derefter største antal: 3/3 - 9/5 i alt 1122 trk Gjerrild, max 1/4 355 Ø (GF), 11/3 - 1/5 i alt 179 trk Moesgård, max 4/4 86 trk (Moes), 23/3 58 Ø Gjerrild Nordstrand (PH) og 5/4 56 trk Issehoved (PH, AJ).

Efterår: største antal: 12/10 19 trk og 18/10 18 trk Sletterhage (JTL).

Vinterforekomster: 12/1 1 Salten Langsø (SH), 28/1 - 10/2 1 Dørup (ET) samt 8/12 1 rst Kysing Fjord (LB), 26/12 2 rst Kysing Fjord (OGJ) og 30/12 2 rst Kragssø (TV).

Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Stadig ingen sikre ynglefund.

Normal ankomst: 4/5 1 Vasen, Randers (KNM) og sidste 28/7 1 Eskelund (KeH). Er set eller hørt på flg. lokaliteter med max-antal i (): Eskelund (Brabrand Sø) (2), Kysing Fjord (1), Kongslund (1), Bjerregrav Mose (4), Damsbro Mose (2), Vasen, Randers (1), Ugelbølle Hoved (1), (OGJ, KeH, SH, BHJ, FK, JNK, PL, FL, HP, SMJ, KNM, JP, ØBF, MB, LTP, PH, PNM, ET, AJ, JTL, JVS). Fra Gjerrild 5 ex i perioden 11/5 - 28/5 (GF).

Flodsanger (*Locustella fluviatilis*)

Se appendix I

Savisanger (*Locustella luscinioides*)

Meget sjælden og uregelmæssig trækfugl.

1 observation: 19/6 1 set + hørt Kasted Mose (FL).



Sivsanger (*Acrocephalus schoeobaenus*)

Yngletrækfugl og trækfugl.

Ynglefund: Kongslund 1 par (JP) samt Bjerregrav Mose 3 par (JP).

Sen ankomst: 10/5 1 sy Vasen, Randers (KNM) og 11/5 1 Brabrand Sø (AJ). Max 15/5 4 sy Vasen, Randers (KNM). Gjerrild Fuglestation fik mærket 3 (GF). Sidste: 14/7 1 sy Mørke Kær (LPJ).

Kørsanger (*Acrocephalus palustris*)

Yngletrækfugl og trækfugl.

Ynglefund: 4-6 par Kongslund (JP) samt "flere par" Grund Fjord (FFa) er alt.

Første: 16/5 3 Eskelund, Brabrand Sø (KeH), derefter 18/5 1 sy Bjerregrav Mose (KNM) og 1 sy Moesgård (Moes). Max 30/5 12 sy Vasen, Randers (KNM). 9 ex blev ringmærket Gjerrild (GF). Sidste: 10/8 3 Solbjerg Sø (FL).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ynglefund: Kongslund 10-15 par (JP) samt "talrig" Grund Fjord (FFa).

Sen ankomst: 10/5 3 sy Vasen, Randers (KNM) samt 1 Gjerrild (GF), derefter 3 første-fund 11/5 (JP, PNN, SFP). Største forekomst: 15/6 16 Kongslund (JP). Sidste fra efteråret: 22/9 1 sy Vasen, Randers (KNM).

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Meget sjælden yngletrækfugl eller forårstrækgæst.

Hele 3 fund: 14/5 1 sy + 30/5 1 sy Ramten-Dystrup Søerne (GF) samt 8/6 1 sy + set Bjerregrav Mose (GW).

Gulbug (*Hippolais icterina*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ankomst: 11/5 1 Eskelund, Brabrand Sø (KeH) + 1 Gjerrild (GF) samt 1 "pilekrattet", Brabrand Sø (PNN). Max: sølle 3 sy Kysing Fjord 9/6 (LPJ) er alt. Sidste sene er 13/10 1 Lushage, Samsø (LeB) og mere normalt 16/9 1 Søften (SMJ).

Gårdesanger (*Sylvia curruca*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Tidlig ankomst: 23/4 1 Mårslet (BHJ), derefter 4/5 1 Vorup, Randers (LTP) og 4/5 1 Hesselholm (LeB). Max blev: 18/5 6 sy Bjerregrav Mose (KNM). Gjerrild fik ringmærket 51 ex (GF). Sidste: 14/9 1 Hesselholm (LeB) og 20/9 1 Assentoft (LTP).

Tornsanger (*Sylvia communis*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ankomst: 6/5 1 hun (!) Brabrand Sø (BHJ). Derefter 10/5 1 Noringure (PN)
Sidste: 15/9 1 Søften (SMJ) samt 19/9 1 Eskelund (KeH).

Havesanger (*Sylvia borin*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ankomst: 11/5 1 Grund Fjord (FFa). Max: 2/6 9 Kongslund (JP). Afgang: 30/8 1 Essenbæk Mose (LTP).

Munk (*Sylvia atricapilla*)

Yngletrækfugl og trækgæst samt meget sjælden vintergæst.

Ankomst: 16/4 1 han Giber Å (Moes), dernæst 20/4 1 "Tre Broer", Brabrand Sø (PNN) og 21/4 1 Østrup Skov (LTP) samt 1 Reventlowsvej, Viby (FF). Max: 1835 10 sy Bjerregrav Mose (KNM). Der blev ringmærket 62 ex i Gjerrild (GF). Ingen efterårsobs. For sløvt!

Et vinterfund: 12/1 1 han Grenå (JNK).

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Sandsynlig yngel: Silkeborg Vesterskov 6 terr (SFP), Norring Vesterskov (SMJ), samt Nørreris (SMJ). De må da yngle andre steder?

Ankomst: 4/5 1 Gjerrild (GF). Max: 19/5 25 rst Gjerrild (GF). Ingen efterårsobs!

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Ankomst: 28/1 1 Houbjerg Skov (JP), derefter 1/4 1 Gjerrild (GF) + 1 Moesgård Strand (Moes). Max: 16/4 28 sy Brabrand Sø (LW) og 6/4 + 20/4 20 sy Vasen, Randers (KNM). Gjerrild fik ringmærket 116 ex (GF). Sidste: 19/10 1 Vorup, Randers (LTP) + 1 Moesgård (H+JE).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Normal ankomst: 18/4 2 sy Brabrand Sø (KH), derefter 8 førsteobs 19/4 - 22/4. Max: Sidste, sene er: 15/9 1 sy Hesselholm (LeB) og 20/9 3 Assentoft (LTP).

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus)

Sjælden trækgæst.

Hele 5 fund er mange: 4/4 1 Gjerrild Overskov (GF), 16/4 1 han Giber Å (Moes), 4/5 1 Gjerrild Nordstrand (GF), 31/5 1 Gjerrild Overskov (GF) og 20/7 1 sy Femmøller (RD).

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

Yngletrækfugl og trækgæst.


Ynglefund: Stautrup 2 par (ET, KeH), Odinsgade, Århus (FF), Gjellerup egekrat (KeH), Søholm, Brabrand Sø (KeH) og Randers (JP).

Ankomst: 8/5 1 Pinds Mølle (ET). Afgang: 13/9 1 Brabrand (LB) og 18/9 2 Silkeborg (JCN).

Lille Fluesnapper (Muscicapa parva)

Sjælden trækgæst.

10/5 - 31/5 i alt 4 ex Gjerrild (GF) er pant.

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Yngletrækfugl og trækgæst.

Sen ankomst: 4/5 1 Brabrand Sø (AJ) + 1 Hesselholm (LeB) + 1 Moesgård (Moes). Store tal fra Gjerrild med max 10/5 450 rst og 60 ex ringmærket i foråret (GF). Fra efteråret kun 28/8 1 Ormslev Stationsby (KeH) og sidste 30-31/8 "set" Molslaboratoriet (BHJ).

Musvit (Parus major)

Ynglestandfugl (og trækgæst?)

Interessante tal fra trækstederne: f.eks. 10/3 - 9/4 103 trk Gjerrild (GF), 16/3 40 rst Moesgård Strandpark (Moes) og 19/10 480 trk sletterhage Fyr (JTL). Største derudover blev: 23/9 50 Brabrand Sø (JWJ).

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Sjælden - fåtallig yngletrækfugl og meget sjælden trækgæst.

Ekspløsiv fremgang! Arten er nu fundet ynglende i alle de velbesøgte moser o.lign., men er givetvis overset en række andre steder.

Ynglefund: Brabrand Sø (3-5 par): 14/4 - 18/9 3 reder m par og 2 reder, der kan være "han-reder" eller stamme fra omlæggere (LB, TB, Gejrf, KH, KeH, BHJ, HP, LW). Kasted Mose (1 par): par ved rede (Gejrf, PH, BHJ). Mørke Kær (1-2 par): par ved rede + tom rede (Gejrf, PH). Moser ved Ringsø (0-2 par): 2 par, ingen redefund (Gejrf). Bjerregrav Mose (1-2 par): par ved rede + par (Gejrf, KNM, HP, JP). Total 6-12 par. Hvad mon næste år bringer?

Træk: En ekstrem tidlig fugl 5/3 1 han rst Gjerrild (GF).

Pirol (Oriolus oriolus)

Sjælden yngletrækfugl og sjælden til fåtallig trækgæst (2. uge af maj - med jun).

Ynglefund: der er ingen oplysninger fra et par af de senere års konstante ynglepladser. Juni 1 ynglefund, Fladbro Camping (medd HE).

Øvrige er fra trækstederne: 17/5 1 (HP), 2/6 1, 3/6 1 (Moes) og 1 sy hele juni (FK) Moesgård, 9/5 - 5/6 5 trk Gjerrild (GF) og 11/5 1 hørt + 15/5 2 Ø Gjerrild Nordstrand (RD).

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)

Fåtallig yngletrækfugl og fåtallig - ret almindelig trækgæst (pr maj - pr jun og aug - med sep).

Ynglefund (12-13) par: 10/7 1 par m juv Møgelskår/Samsø + 1 ynglepar Ansø Enge + 1 ynglepar Skærbæk Plantage (GW), 6/7 1 par Kolsø (JCN), 1/6 1 han m redemateriale Brude Sø (BHJ, SH), 16/8 1 par m 1 juv Lading Sø (KeH), 28/7 1 par + 4 juv Norring Vesterskov + 1 par m 4 juv Klapskov + 26/7 1 han m 3 juv Haarvadbro (SMJ), 21/7 1 par m 1 juv og 1 hun m 1 juv Fjeld Skov (LPJ) og 19/7 2 par m pull Sletterhage Fyr (JTL).

Arten ankom tidligere end vanligt for det sidste par år. Første: 9/5 1 han Moesgård (Moes) + 1 Gjerrild (GF), derefter 10-11/5 2 hanner rst (Moes), 11/5 1 han Stenvad

Hede (HP) + 1 han Kolsø + 2 han Anso Enge (JCN). Ved Gjerrild Fuglestation er største rst-tal 20/5 20 (GF).

Alle obs fra aug - sep: 4/8 1 Malling Mose (OGJ), 11/8 1 han Kolsø Plantage (JCN), 31/8 1 juv Hesselholm (LeB) og 4/9 1 Brabrand Sø (KeH).

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*)

Fåtalig træk- og vintergæst (pr okt - ult apr). Meget sjælden og uregelmæssig sommergæst.

Fraregnet Gjerrild Fuglestations tal er der 24 obs med 19-20 fugle.

Et par obs ud over det sædvanlige: 9/3 2 m parringsadfærd Skærbæk Plantage (JB) og et sommerfund 2/6 1 Ulkar Mose (JCN).

Forår: Sidste 13/4 1 Gjerrild Skov (JNK) og 15/4 1 Funderholme (JCN). Fra Gjerrild følgende træktalet: 1/3 - 13/4 38 trk, heraf 15 på direkte Ø-træk. Max tal 6/4 8 og 7/4 11 (GF).

Efterår: Første 18/10 1 trækforsøg Sletterhage (JTL) og 19/10 1 Fussing Skov (JP).

Skovskade (*Garrulus glandarius*)


Ynglestandfugl og uregelmæssig invasionsgæst.

Efterårets invasion afspejles ikke nævneværdigt i observationerne, idet 2/3 er fra foråret, men til gengæld er de største enkeltobs fra efteråret. Største: 13/10 15 tf Sletterhage (JTL) og 19/10 15 Moesgård (H+JE).

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*).

Muligvis sjælden ynglestrejffugl. Ret almindelig, men uregelmæssig invasionsgæst.

Årets markante invasion her i Århus Amt medført 55 obs af i alt 105-125 fugle og sandsynligvis omfattet både Tyndnæbbet Nøddekrige og Tyknæbbet Nøddekrige. Invasionen starter pr sep på Sjælland, og ult sep træffes den ret talrigt og spredt over hele Samsø, hvorefter en bestand markerer sig i Grenå fra ult okt - ult nov. I den øvrige del af amtet er fundene meget små og spredte indtil 18/11, hvor langt den



NØDDEKRIGE

største flok indfinder sig på Jævnøgnsvej/Århus N. Derefter er arten næsten væk resten af året.

Løsrevet fra invasionen har vi igen i år de næsten konstant årlige obs fra Silkeborg-området, der tyder på en lille, lokal ynglebestand: 12/8 4, 14/8 1 og 9/9 2 Sejs (PB).

Samsø: 28/9 første efterårsobs 3 Mårup (SD), 29/9 2 Hesselholm + 3 N Trekanten (SD), ult sep og frem flok 10-12 Mårup Skov og flok 10-12 Brattingborg Skov + 1/10 6-7 Koldby Kås + 4/11 1-2 Tranebjerg (medd Kristian Lamberg), 1/10 - 31/12 konstant op til 5 Nordby (PL) og 13/10 1 Lushage (LeB).

Grenå: Første obs 17/10 2-3 (JNK, CO) og sidste 28/12 1 (CO). Anslået bestand i Grenå centrum ult okt - ult nov 5-10 (JNK), dog 17/10 - 24/10 10-15 (CO).

Fra øvrige amt: 3 tidlige fugle, hvoraf Silkeborgfuglen kan være lokal: 28/9 1 Silkeborg (JCN), 29/9 1 Malling (OGJ) og 2/10 1 Århus Universitetspark (KNM). Derefter 5/10 1 Bryrup (Chr. Lange), 6/10 3 S Dørup (medd ET), 10/10 1 + 7/11 1 Hinnerup (PN), med okt 4-5 Pinds Mølle (medd ET), 15/10 1 + 19/10 1-2 Tunø (NH), 15/10 1 + 21/10 1 + 29/10 1 + 7/12 1 Silkeborg (JCN), 16/10 1 Moesgård (MCR), 17/10 1 Jeksen (KNM), 19/10 2 tf Sletterhage (JTL), 19/10 2 + 27/10 1 Kysing Næs (OGJ), 20/10 1 + 8/11 1 Risskov (HLL), 21/10 2 Mariendal (JVS), 24/10 1 Katrinebjergvej, Århus N (NÅ), 27/10 1 Malling Mose (JVS), 11/11 1 Hørslev Mose (JTL), 14/11 1 Forsthaven, Århus (MCR), 15/11 1 + 18/11 1 Eskelund (KeH) og absolut største flok 18/11 ca 30 Jævnøgnsvej, Århus N (Ketty Lundbøl medd til AJ), 22/11 1 Viby (MCR) og 27/11 1 Gudenåbredningen, Randers (KNM).

Allike (Corvus monedula)

Ynglestandfugl og meget almindelig træk- og vintergæst.

Der nævnes træktaf og største flokke: 3/3 - 3/6 10.108 Gjerrild, max 28/3 2050 (GF), 3/3 - 2/6 3535 Moesgård, max 25/3 704 (Moes), 10/3 500 Sødringholm (JP), 17/4 - 15/5 500/dag Vasen/Randers (KNM) samt 1/10 ca 2000 Hald Sø (TV), 15/12 500 Haarvadbro (SMJ) og 26/12 800 Funderholme (JCN).

Desuden er der rapporteret et fund af racen Halsbåndsallike (C. m. soemmerringii).
Se appendix I.

Råge (Corvus frugilegus)

Nok almindelig ynglestandfugl samt trækfugl.

Der er kommet "nye" ynglekolonier til, men de "gamle" mangler. 4 kolonier med i alt 400 par Kejstrupvej/Ndr. Højmarksvej Silkeborg + 12 par Slotsholmen/Silkeborg (SFP), 75-100 par Skjoldhøjkollegiet/Århus og 250 par Hadsundvej/Randers (JP).

Sortkrage (Corvus corone corone)

Meget sjælden yngletrækfugl, fåtallig forårstrækfugl (med mar - ult maj) og sjælden efterårstrækfugl (sep - nov). Sommer- og vintergæst.

I alt 46 individer, langt de fleste (38) fra foråret.

Yngel: der er ikke fundet rene ynglepar, det nærmeste er et par mellem en Sortkrage og en Grå/Sortkrage-hybrid på Hesselholm her er Sortkrage derfor set jævnligt fra 28/4 - 28/10 (LeB, SD). Desuden to blandingspar Grå-xSortkrage: 14/4 1 bl.par Assendrup (ET) og 1 bl.par med 3 unger (hybrider) Gjerrild Nordstrand (GF).

Vinter: 10/2 1 Brabrand Sø (AJ).

Forår: 12/3 - 9/5 10 trk Gjerrild (GF), 24/3 - 14/5 min 26, max 28/4 6 N og 9/5 4 N + 2 S Moesgård (Moes, PH, LPJ, ET), 16/3 1 N Brabrand Sø (AJ) og 3/4 1 Kysing Næs (LPJ).

Sommer: 21/7 1 rst Skanseparken (NA).

Efterår: 13/10 2 NV Sletterhage (LPJ) og 13/10 2 NV Sletterhage (LPJ) og 13/10 1 Kysing Fjord (ET).

Ravn (Corvus corax)

Fåtallig ynglestandfugl. Ungfuglene strejfer en del omkring.

Obs-mængden er steget til 89 obs og sammen med et større antal ynglefund afspejler dette udmærket Ravnens fortsatte fremgang i amtet.

Formodede og sikre ynglepar: 1 par Yding Skov (JTL), 17/6 1 par + 2 juv Harlev (JTL), 30/5 1 ad + 1 juv Ravnholt/Tiset (ET), 1 par + juv Kollskov (ET), 1 par Velling Skov (BRS), 1 par Rye Sønderskov (BRS), 1 par Silkeborg Sønderskov (BRS), 1 par Silkeborg Nordskov (BRS), 17/5 1 par + 2 juv Fløjstrup (Moes, JDJ), 3/2 1 par m rede Grusbjerg Skov (TB), 1 par + 4 juv Klapskov (SMJ), 1 par + 4 juv Haraldslund (SMJ), 10/5 1 par v rede Hestehaven/Rønde (JSP, LLH), 21/4 1 par Rahr Skov (JP) og året rundt 1-2 par Fussing Skov (PER).

Største sammenrend er 24/3 4 Emborg (SH) og 15/7 4-5 Lisbjerg Forbrænding (AJ).

Træk: 18/3 - 17/5 12 trk Gjerrild (GF).

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

Almindelig træk- og vintergæst (sep - apr), der kan optræde invasionsagtigt.

Efter invasionen i 83/84 igen mere "normale" tilstande med i alt 2540 fugle, fordelt med ca lige mange forår og efterår.

Forår: 29/3 - 17/5 768 trk Moesgård, max 4/5 603 (Moes) og de største tal 3/4 200 Mygind Skov (LTP) og 6/4 250 Gudenå (LTP). Sidste-dagen ved Moesgård (17/5) blev også amtets sidste.

Efterår: første 20/9 3 Drastrup (LTP) og 22/9 ca 200 Sepstrup (JCN) og de største tal i øvrigt: 20/11 200 Konstantinsborg (ET) og 1/12 300 Højslet/Randers (JP).

Gulirisk (Serinus serinus)

Meget sjælden trækgæst - især fra foråret.

17/4 1 NØ Gjerrild N-Str (GF), 5/6 1 sy Grenå (GF) og 14/9 1 SV Sletterhage (RD) - er vist nok amtets første obs fra efteråret.

Stillits (*Carduelis carduelis*)

Ret almindelig ynglestrejff- og yngletrækfugl (mar - apr og aug - okt) samt regelmæssig vintergæst.

137 obs (pænt) med i alt 787 fugle. Stillits træffes gerne i helt små forsamlinger - således udgør obs med 1-2 fugle ca 53% af det totale antal obs. Der er ingen sikre ynglefund, så dem hører vi gerne om.

Træk: 4/4 - 17/5 25 Moesgård, max 17/5 6 N (Moes), 16/3 - 30/3 36 Gjerrild (GF) og 13/10 - 20/10 47 Sletterhage (JTL).


Største flokke: 3/2 32 Brabrand Sø, 5/3 24 Maden/Lyngbygård Å (TB), 21/8 59 Morsholt Hage (LB), 22/9 30 Kristrup Enge (LTP), 10/11 30 Stubbe Sø og 21/12 22 Kongslund (JP).

Grønsisken (*Carduelis spinus*)

Sjalden ynglestrejffugl og meget almindelig træk- og vintergæst (med sep - apr).

Grønsisken invaderede både forår og efterår, og der sås 10.660 fugle (tal fra (GF) og (Moes) er ikke medtaget).

Ynglefund og sommerfund: 4/5 flere par sy + parringsadværd Skærbæk Plt. 1/6 1 par sy Blid Sø (JTL), 5/6 1 Norringure (SMJ), 22/6 2, 23/6 1 Hesselholm (SD), 28/6 1 Pinds Mølle (ET), 8/7 1 Klostermøllen (TV) og 11-12/7 ret almindelig i plantagen, Anholt (JB).



Træktal: 10/3 - 19/5 1277 (hidtil højeste årstotal) Moesgård, 7/5 107 N er max (Moes), 5/3 - 23/5 19.416 Gjerrild, max 5/4 5196 + 5 dage med over 1000 trk (GF).

Større flokke med min 200 nævnes: 23/1 200 Pinds Mølle (ET), 3/3 205 Brabrand Sø (SJ, PNN), 17/3 ca 1000 Vasen/Randers (JSP), 15/10 500 Silkeborg Vesterskov + 17/10 400 Vejlsø + 18/10 300 Ørnso + 21/10 1000 Frederiksdal Hede (SFP) og 24/12 250 Kollen Mølle (ET).

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*)


Almindelig træk- og vintergæst (ult sep - med apr).

Sidste i foråret 4/5 15 N Moesgård (Moes) er sent, mens første i efteråret 13/10 16 S + 13 rst Sletterhage (LPJ, JTL) er normalt.

Indlandsobs: 2/1 50 Århus Å/Årslev + 20 Lyngbygård Å (TB), 2/1 10 Kristrup Enge (LTP), 6/1 60 Randers Gl. Losseplads (LTP), 12/1 1 Mårslet (BHJ), 27/1 24 trk Brabrand Sø (AJ), 25/3 4 Brabrand Sø (HLL) samt 10/11 20 Stubbe Sø (NÅ) og nov 6 Mårslet (BHJ).

Træk: 15/3 - 21/4 76 Gjerrild (GF), 25/3 - 4/5 61 Moesgård (Moes) og 13/10 - 20/10 163 Sletterhage (JTL).

Største flokke (min 100): 12/1 394 Katholm Skov (LPJ) - må være rekord for amtet, 15/2 160 Århus Øst-havn (HLL, HP, PNN) samt 15/12 130 Århus Øst-havn (LW) og 28/12 155 Århus Kulterminal (JDJ).



Gråsiskan (*Carduelis flammea*)

Fåtalig yngletrækfugl (C. f. cabaret) og almindelig træk- og vintergæst (C. f. flammea) (sep/okt - apr).

Gråsiskan følger forløbet i Grønsiskan-invasjonen, men i efteråret har Gråsiskan kun en mindre invasion. I alt 163 obs med 4971 fugle (efterår 1380 fugle). I disse tal er ikke medregnet træktal fra (GF) og (Moes)

Ynglefund: 2 par Sletterhage Fyr, 1 par Stubbe Sø, min 10 par Øer og et muligt par Ring Sø (alle JTL) og sommerobs: 1/6 1-2 sy Blid Sø (ØBF), 1/6 1 Overse (SH), 1/6 fl sy Rye Bro (BHJ), 3/6 1 sy Brabrand Sø (JDJ), 10/7 1 sy Klosterkær (TV), 11-12/7 hørt Anholt (JB), 27/7 1 Brabrand (LB) og 27/7 1 Mossø (H+JE).

Træktal: 5/3 - 26/5 7063, max 30/3 3320 Gjerrild (GF), 3/3 - 9/5 107, max 7/4 87 N Moesgård (Moes). I foråret ingen klar sidste dato, men i efteråret er de første 22/9 1 Moesgård (H+JE) og 12/10 12 Sletterhage (JTL).

Største flokke: 19/1 170 Gudena (LTP), 23/2 200 Salten Å (SFP), 3/3 500 Mossø (TE, ET), 4/4 200 Blid Sø (LB), 8/4 200-300 Igelse (JCN) samt 15/12 200 Mørke Kær (SH) og hele dec 100-200 Lisbjerg Forbrænding (AJ).

Hvidsiskan (*Carduelis hornemanni*)

Sjælden, uregelmæssig træk- og vintergæst.

Som følge af den ret kraftige Gråsiskan-invasion i foråret, er der i år observeret hele 7 fugle af arten.

19/1 2 Malling Mose (OGJ, H+JE), 16/3 1 Brabrand Stien (LW), 11/4 1 Bryrup (JB), 21/4 1 Gjerrild Nordstrand (RD), foråret 1 ringmærket, Gjerrild (GF) og 17/10 1 ringmærket, Grenå Hede (CO, JNK).

Hvidvinget Korsnæb (*Loxia leucoptera*)

Arten skulle have invaderet landet i efteråret, men disse for amtet sjældne obs er fra foråret (!).

9/3 flok hørt, 23/3 1 Ø og 8/5 1 Ø Gjerrild Nordstrand (RD).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*)

Formentlig sjælden ynglestrejffugl og ret almindelig invasionsfugl, der træffes året rundt.

Fraregnet et ret stort træktaf fra (GF) giver 66 obs et antal på 652 fugle - med de fleste fugle fra med okt.

Ynglefund: ingen!

Træk: træktafene er overraskende høje i forhold til ovennævnte total. 5/3 - 4/6 1397, max 3/3 360 Gjerrild (GF) og 12/10 - 20/10 136, max 19/10 91 Sletterhage (JTL).

Største flokke (min 20): 26/5 21 Helgenæs (JTL), 1/7 30 Nørreris Skov (SMJ), 19/10 ca 30 Blid Sø (TV), 20/10 20 Klostermølle (TV), 27/10 26 + 11/11 33 Moesgård (FK) og 12/11 21 Thorsager (JSP).

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*)

Fåtallig træk- og invasionsfugl, der i år har vist sig i meget beskedent tal.

8/4 1 trk Gjerrild (GF) samt 19/10 10 Blid Sø (TV) og 12/11 1 hun i flok af Lille Korsnæb, Thorsager (JSP).

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*)

Sjælden - fåtallig trækgæst (ult maj - pr jun).

Der er set 14-16 fugle, hvilket er mere end "normalt". Iagttagelserne er som vanligt fra de østlige egne.

24/5 1, 25/5 2 alle trk S Anholt (OGJ), 22/5 - 10/6 7 Gjerrild (GF), 22/5 1 sy og 27/5 1 sy Gjerrild Nordstrand (RD). Desuden et par sene fugle: 28/6 1 sy og 2/7 1 sy Fornæs Fyr (RD).

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fåtallig til ret almindelig ynglefugl og ret almindelig træk- og

vintergæst.

112 obs med 264 fugle (GF) ikke medregnet.

Ynglefund: 20/6 1 m føde i næbbet Årslev Skov + 13/7 1 par m 3 juv Thorsager (JTL) og af mulige ynglepar: 8/5 1 par Dørup Mølle (ET), 10/5 1 par Hinnerup Skov, 2 par Norringure, 12/5 1 par Nørreris Skov (SMJ), 11/5 1 par Nørreskov/Hinnerup (PN), 11/5 1 par Ørnereden (Moes), 16/5 1 par Tranevig (JCN) og 22/6 1 par Klosterkær (TV).

Træk: 8/4 - 18/5 ca 24 Moesgård (Moes) og 9/3 - 29/5 103, max 11/5 15 og 12/5 17 Gjerrild (GF).

Største flokke (min 5): 13/1 5+4 Mindeparken (AJ), 20/1 - 24/1 5 Silkeborg (SFP), 31/3 8 Silkeborg (JCN), 7/4 5 Silkeborg (JCN), 8/4 5 Søften (SMJ), 14/4 20 Grenå (CO), 14/7 12 incl juv Fussingø (KNM), 13/10 15-20 Lysbro Skov (SFP) og 27/11 5 Risskov (HLL).

Laplandsværling (*Calcarius lapponicus*)

Fåtalig træk-gæst (apr - maj og okt - nov) og meget sjælden vintergæst.

1985 blev året med mange Laplandsværlinger i Danmark - og her i amtet blev der obset et rekordantal på 60 fugle.

Vinterfund: 25/1 1 Brabrand Sø (FK) og 30/1 1-2 Alrø (OGJ).

Forår: 5/4 8 Kulhavnen/Århus (MB) - er ikke daglig kost - 7/4 - 14/5 23, max 4/5 5 og 9/5 5 Gjerrild (GF) og 5/5 1 N Moesgård (Moes).

Efterår: 28/9 1 Århus Havn Ø (Nis Rattenborg), 29/9 1 ad hun Århus Havn Ø (NÅ), 10/11 1 Øster Hedekrog, Samsø (SD), 24/11 19 rst Alrø (OGJ) - er bare utrolig mange - 28/11 1 han og 2 hunner Alrø (LB) og 28/11 1 juv Kysing Næs (LB).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*)

Almindelig træk- og vintergæst (okt/nov - mar/apr).

Fraregnet (GF) er der registreret 1194 fugle, hvilket er noget mindre end sidste år. Tilsyneladende har de fleste Snespurve i år opgivet Århus Havn som opholdssted.

Sidste i foråret: 6/4 2 Alrø (SH) og 29/4 1 hun Kysing Fjord (OGJ, H+JE) er ekstremt sent.

Første i efteråret var 3 obs 26/10 2 Gjerrild Nordstrand (TB), 3 Kysing Næs (OGJ) og 2 Gjerrild Stenværk (JTL).

Største flokke (min 50): 24/1 ca 50 Studstrup (PH), 7/3 - 8/3 75-80 Studstrup Havn (HLL, LB) samt 28/11 200 Alrø (LB), 30/11 50-60 Alrø (OGJ) og 1/12 200 Kalsemade (SH). Eneste indlandsobs: 1/12 1 Vorup, Randers (KNM).

Træk ved Gjerrild: 1/3 - 27/3 243, max 15/3 107 trk Ø (GF).

Hortulan (Emberiza hortulana)

Fåtallig forårstrækgæst (maj).

6/5 1 og 7/5 3 Engen/Anholt (HE), 25/5 1 Anholt (OGJ), 4/5 1 h, 8/5 2 Ø + 1 h og 15/5 1 Ø Gjerrild Nordstrand (RD) og 6/5 - 15/5 24, max 9/5 10 Gjerrild (GF).

Dværgværling (Emberiza pusilla)

Se appendix I



APPENDIX I

Fund, der skal godkendes af DOF's Sjældenhedsudvalg (SU).

Islom (*Gavia immer*)

Et fund 2/1 1 øst for Samsø (LB) er indsendt til SU, men ikke færdigbehandlet. Desuden 2 ex fra Gjerrild og 2 fra Anholt - alle udokumenteret.

Ubekendt Albatros (*Diomedea/Phoebetria* sp)

Et udokumenteret fund, måske af Gulnæbbet A (*D. chlororhynchos*).

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*)

3 udokumenterede fund af 4 fugle.

Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*)

Et udokumenteret fund

Lille Skrigeørn (*Aquila pomarina*)

Foruden det godkendte fund er et udokumenteret fund rapporteret.

Steppehøg (*Circus macrourus*)

Et fund 17/8 1 han N Kysing Fjord (OGJ). Beskrivelsen er forkastet af SU.

Stor Gulbenet Klire (*Tringa melanoleuca*)

Et udokumenteret fund

Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus*)

4 udokumenterede fund - få dem da beskrevet !

Korttået Lærke (*Calandrella cinerea*)

Et udokumenteret fund

Storpiber (*Anthus novaeseelandiae*)

Et fund 11/5 1 rast Malling Mose (OGJ). Beskrivelsen er forkastet af SU. Desuden et udokumenteret fund.

Flodsanger (*Locustella fluviatilis*)

Et udokumenteret fund. Et desværre typisk tilfælde: en fugl er set/hørt af et hav af folk i 8 dage, men ingen beskrivelse !

Kortttået Træløber (*Certhia brachydactyla*)

4 udokumenterede fund, især fra Moesgård, hvor der vistnok er en lille bestand. Men bemærk venligst, at fund uden for Fyns, Vejle og Sønderjyllands amter skal beskrives til SU.

Halsbåndsallike (*Corvus monedula soemmerringii*)

Et fund 6/3 1 rast Brabrand Sø (LB) er endnu ikke færdigbehandlet af SU. Kig efter racen. Den er måske noget overset !

Dværgværling (*Emberiza pusilla*)

Et udokumenteret fund

APPENDIX II

Fund af fugle, der uden tvivl er undsluppet fangenskab - typisk arter med hjemstavn i fjerne lande (mere præcist: uden for holarktiske regioner og oceanerne).

Mandarinand (*Aix galericulata*)


1/1 1 hun Beder Gadekær (OGJ), 6/1 1 han Århus Østhavn (OGJ) og 12/1 - 10/3 samt 13-29/10 1 han Thorsmøllesøen i Århus Dyrehave (HJ, FK, JFT).

Skoggerdue (*Streptopelia risoria*)

10/4 + 16/4 1 Skanseparken, Århus (NÅ).

Peking Robin (*Leiothrix lutea*)

23-26/10 1 set og hørt Botanisk Have, Århus (H+JE).



APPENDIX III

Rettelser og tilføjelser til "Lokalrapporten 1984, DOF Århus Amt."
Initialerne JK står for Jens Kirkeby, Ry.

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

19/4 26 Birk sø, 19/4 198 Jul sø, østlige del og 2/12 103 Salten Lang sø
(JK).

Pibesvane (Cygnus bewickii)

29/3 11 Hjortsholm, Stavnsfjord (LeB) og 25/11 3 Hesselholm Made (SD).

Sangsvane (Cygnus cygnus)

5/3 13 Klosterkær, 19/2 75 Emborg Odde, Mossø og 29/3 20 Vessø (JK)
samt 12/2 26 rast Stavnsfjord og 24-29/3 99 trk + 1/12 10 trk Hessel-
holm (LeB).

Grågås (Anser anser)

5/2 2 Klosterkær og 1/4 15-20 Emborg Odde (JK).

Rettelse: "10/10 7 trk Fornæs (ØBF)" skal være "11/11 7 Stubbe Sø (ØBF)"

Knortegås (Branta bernicla)

26/3 ca 30 + 18/4-23/4 i alt ca. 400 Stavnsfjord og 18/5-8/6 i alt
6-8000 trk Ø, max 1/6 3100-3700 Ø Hesselholm (LeB) - faldt sammen med
10.000'talligt træk over landet i månedsskiftet maj/juni.

Pibeand/Gråand/Spidsand (Anas penelope + platyrhynchos + acuta)

15/3 410 Pibeand + 635 Gråand + 2 Spidsand Kysing Fjord (KNM).

Lille Skallesluger (Mergus albellus)

19/2 1 han, 2 hun Gudensø (JK) og 15/3 14 Kysing Fjord (KNM).

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

8/1 250 Gudensø (JK).

Rød Glente (Milvus milvus)

29/3 1 Gl. Rye (Jørgen Keis) og 13/4 1 N Grønnegade, Århus (MB)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Desværre er behandlingen af efterårstrækket faldet ud. Vi nævner alle
obs fra sep/okt.

1/9 1 hun/juv Emborg Odde (JK), 2/9 1 han Emborg Odde (BHJ), 9/9 1 brun
Kysing Fjord (TB), 23/9 1 juv Brabrand Sø (JTL), 29/9 1 juv Emborg Odde
(JTL) og 7/10 1 Kysing Fjord (BHJ, FL).

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*)
24/4 1 N Moesgård Museum (JK)

Strandskade (*Haematopus ostralegus*)
Alligevel en ægte vinterobs: 3/1 1 Sangstrup Klint (JK).

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*)
15/3 16 Kysing Fjord (KNM).

Strandhjejle/Hjejle (*Pluvialis squatarola/apricaria*)
Rettelse: "Strandhjejle 26/8 350 Kysing Fjord (SH)" skal være "Hjejle ..."

Almindelig Ryle (*Calidris alpina*)
Ny førsteobs: 15/3 2 Kysing Fjord (KNM).

Fjordterne (*Sterna hirundo*)
1/9 14 V Salten Langsø (JK)

Ringdue (*Columba palumbus*)
1/2 500 Moesgård Skov (JK)

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*)
12/11 200 Århus Havn Gejrf)

Isfugl (*Alcedo atthis*)
2/4 1 Moesgård Park (JK)

Sanglærke (*Alauda arvensis*)
5/2 30 N Emborg (JK)

Skærpiber (*Anthus spinoletta littoralis*)
Fra 20/10 konstant 1-2 Århus Havn (Gejrf)

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*)
Alligevel en obs fra januar. 18/1 1 han Moesgård Skovmølle (JK)

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*)
29/3 ankom yngleparret ved Moesgård Museum (JK)

Silkehale (*Bombycilla garrulus*)
6/2 8 Kysing Fjord (KNM). Stor nov-flok 10-15/11 30 Skåde Bakker (JK)

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*)

ifølge MB i Gejrf var der i 1984 29-32 ynglepar i Århus-området. Samme kilde har ny førsteobs 31/3 1 han Anholt + 31/3 1 sy Østergade, Århus samt en efterårsobs 7/10 1 sy Risskov

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

11/11 1 Stubbe Sø (ØBF)

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*)

8/1 1 Klosterkær, 1/4 1 Gl. Rye samt 2/12 1 + 29/12 1 Klosterkær (alle JK).

Ravn (*Corvus corax*)

Formentlig ynglepar ved Vestbirk (JK)

Kvækerfinke (*Fringila montifringila*)

En pæn obs, der fordobler årets totaltal. 1/2 250.000 Moesgård Skov (JK)

Græsiskan (*Calidris flammea*)

20/11 200 Moesgård Museum (JK)

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*)

En efterårsobs kom oveni de 6 forårsobs. 27/10 1 han, 3 hun Holtum Å ved Smedebæk (MB).



Uffe Jørgensen
vinteren '86

BIDRAGSYDERE

Følgende initialer/forkortelser er benyttet i rapporten.

JB	Jørgen Ballegård, Bryrup	JNK	Jesper Nelby-Kristiansen, Grenå
KB	Kim Billedgaard, Horsens	FL	Flemming Lundberg, Mårslet
LB	Lars Borup	HLL	Henning Lykke Larsen
LeB	Leif Brauer, Skodsborg	JTL	Jørgen Terp Laursen
MB	Mogens Bang	PL	Peter Lange
PB	Preben Bach, Silkeborg	KNM	Kim Nørgaard Mouritsen, Randers
TB	Torben Bøgeskov	Moes	Rapport over fugletræk ved Moesgård
HC	Hans Christophersen, Ålborg	JCN	Jalmer Clod Nielsen, Silkeborg
HeC	Henning Christiansen	PN	Peter Nielsen, Hinnerup
RD	Rolf Danielsen	PNN	Peder Nygaard Nielsen, Aars
SD	Svend Dybkjær, Hellerup	CO	Carsten Olsen, Grenå
HE	Henning Ettrup	HP	Hans Pinstrup, Horsens
H+JE	Hanne og Jens Eriksen	JP	Jørgen Pagter, Randers
DOF	Dansk Ornitologisk Forenings turreferater	JSP	Jens S. Pedersen, Randers
FF	Finn Frandsen	LTP	Lars Tom-Petersen, Randers
GF	Gjerrild Fuglestation	SFP	Stig Frøjk Pedersen, Silkeborg
ØBF	Østjysk Biologisk Forenings turreferater	MCR	Marcel C. Rahner
FFa	Flemming Falk, Randers	PER	Per Egge Rasmussen, Randers
HFj	Horsens Fjord-gruppen	BRS	Bo Ryge Sørensen, Silkeborg
JG	Jens Gregersen, Vorse	JVS	Johannes Veldt Sørensen, Malling
Gejrf	Gejrfuglen v/ØBF	Sør	Søravnen, v/DOF
KH	Kjeld Hansen	ET	Eigil Thomasen, Dørup
KeH	Keld Henriksen	JT	Jesper Tofft
LLH	Lars Lund Hansen	JFT	Jens Fromsejer Thomsen, Roskilde
NH	Niels Hannow, Flemming	GW	Gunnar Wahlgreen, Silkeborg
PH	Per Henriksen	LW	Lars Witting
PHH	Poul Henrik Harritz	TV	Thomas Vikstrøm, Birkerød
SH	Søren Højager, Mundelstrup	NA	Niels Aagaard
AJ	Allan Jannicke		
BHJ	Bjarke Huus Jensen, Mårslet		
HJ	Hans Jeppesen		
JDJ	Jens Dejgård Jensen		
JWJ	Jens Wolf Jespersen		
LPJ	Lars P. Johansson		
OGJ	Ole Gylling-Jørgensen, Malling		
SMJ	Svend Møller Jensen, Hinnerup		
FK	Flemming Kofoed		

INDSAMLINGSARTER

Af følgende arter ønsker vi alle iagttagelser fra Århus amt
indsendt til Rapportgruppen:

alle lommer	Sortklire
Sorthalset Lappedykker	alle ryler
Sangsvane	Brushane
alle gæs	Dværgterne
Atlingand	alle alkefugle
Spidsand	alle ugler
Skeand	Grønspatte
Bjergand	Vendehals
Lille Skallesluger	Toplærke
Fjeldvåge	Hedelærke
Hvepsevåge	Ravn
Rørhøg	Sortkrage
Blå Kørhøg	Vandstar
Duehøg	Misteldrossel
Tårnfalk	Husrødstjert
Vandrikse	Skovsanger
Agerhøne	Skarpiber
Lille Præstekrave	Bjergvipstjert
Strandhjejle	Silkehale
Enkeltbekkasin	Stor Tornskade
Skovsneppe	Kærnebider
Stor Regnspeve	Bjergirisk
Lille Regnspeve	Gråsisken
Lille Kobbersnepe	Lille Korsnab
Svaleklire	Snespurv