

Lokalrapporten

1986



DOF - ÅRHUS AMT

Lokalrapporten 1986, DOF - Århus Amt.

Redaktion (ansv.): Eigil Thomasen
 Renskrivning: Lars P. Johansson
 Tegninger: Mads Ejrnæs, Erik Hørning, Christian Lange,
 Marcel C. Rahner, Annelise Skov
 Forside- og bagsidetegning: Christian Lange
 Figurer: Henning Eттrup
 Layout: Peter Lange, Eigil Thomasen

Oplag: 150 eksemplarer
 Pris (incl. Porto): 50,00 kr (for bidragydere 40,00 kr)

Indhold:

Indledning (Eigil Thomasen).....	3
Artsbehandling (Thomas Kjær Christensen)	5
Sjældne fugle (- " -)	5
Retningslinjer for indsendelse (- " -)	5
Det indkomne materiale (- " -)	6
Anvendte forkortelser (Lars Borup)	6
Lommer - Gæs (Peter Lange, Flemming Lundberg)	7
Svømmeænder (Eigil Thomasen)	15
Dykænder (Thomas Kjær Christensen)	18
Rovfugle (Eigil Thomasen)	23
Hønsfugle (Peter Lange)	31
Strandskade - Stor Regnspeve (Jacob Salvig)	33
Sortklire - Thorshane (Lars Gabrielsen)	38
Kjover - Terner (Lars Lund Hansen)	40
Alkefugle (Peter Lange)	42
Duer - Spætter (Jens Christensen)	43
Lærker - Drosler (Lars Borup)	48
Sangere - Mejser (Peter Lange)	58
Pirol - Bomlærke (Peter Lange, Niels Aagaard)	65
Appendix I (SU-arter) (Niels Aagaard)	73
Appendix II (Undslupne fangenskabsfugle) (- " -)	74
Appendix III (Rettelser og tilføjelser) (Peter Lange).....	75
Artsindex (Peter Lange)	80
Bidragydere	83

Lokalrapporten kan bestilles hos Dansk Ornitologisk forening i Århus Amt, giro 551 09 61, DOF, Gjellerupvej 111, Sølyst, 8220 Brabrand. Henvendelse til lokalrapportgruppen bedes foretaget til lokalafdelingens adresse eller på tlf.: 06 92 37 73 (Eigil Thomasen).

ISSN nr. 0902-0489
 Tryk: DS Tryk, Fredericia.

3 Dansk Ornithologisk Forening Lokalafdelingen i Århus amt Naturformidlingscenter

Indledning

December 1987

»Sølyst«
Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Den er et resultat af en gruppes flittige bearbejdelse af de feltornitologiske data, det er lykkedes at fremskaffe inden vor frist udløb ved udgangen af januar 1987.

Der har været stor aktivitet i 1986, alene 80 bidragydere er det største antal nogensinde. Deres fordeling i amtet fremgår af omstående figur, og man vil forstå, hvorfor amtet har sine feltornitologiske tyngdepunkter ved Moesgård, Brabrand Sø, Kysing Fjord og -næs, mens det Midtjyske, Djursland og den nordlige del af amtet, er mere forsømt.

Forskellige arbejdsgrupper har bidraget til lokalrapporten: Horsens Fjord-gruppen har regelmæssigt ca. hver anden uge optalt i Ramsarområdet 13 med fine resultater, der er suppleret med tal fra Vorsø. Lokalitetsregistret har tilført store ynglefugletal, som vi refererer så godt vi formår; hvis man er interesseret i detaljer herom, henvises til selve registret. Rovfuglegruppen udvider i disse år sine aktiviteter i amtet, hvilket denne rapport har glæde af. På Samsø fortsatte Leif Brauer sin ornitologiske virksomhed, der igen i 1986 resulterede i en selvstændig rapport, hvis færdiggørelse, vi desværre ikke kunne afvente, hvorfor arterne fra og med vadefuglene kun summarisk er medtaget.

Trækstoderne har derimod ikke bidraget så omfattende som 1985. For Moesgård faldt aktiviteten til et mere normalt niveau efter de foregående rekordår. Hans Pinstrup udlånte velvilligt materialet og modtager gerne, som koordinator, alle obs herfra. Gjerrild Fuglestation har ikke bidraget af nævneværdig grad. De sparsomme og meget generelle indberetninger herfra har på det nærmeste ikke kunnet indarbejdes i en amtslig kontekst.

En voksende forståelse for tidligere udgivers svagheder i arternes statusangivelser og en til tider for kedelig og opremsende gennemgang, der i sidste ende blev for pladskrævende, nødvendiggjorde en redaktionel ændring af fremstillingsformen, hvilket gennemgås i de efterfølgende afsnit. Den nye behandling af arterne har endnu ikke fundet sit endelige leje. Der er f.eks. ikke lavet beregninger af alle arternes månedsforekomst, mens andre foretagne beregninger måske burde være udeladt.


Rapporten beskriver mere generelt, hvad der er set i årets løb. Man kan derfor indvende at mange mindre obs er forsvundet fra rapporten, selv om de ikke har mindre værdi end de store obs. Vi vil forsøge at kompensere for dette ved at anvende den opnåede merplads i rapporten til at råde bod herpå. Der er f.eks. tanker om at behandle arterne med en detaljeret omtale, f.eks. en 5- eller 10-årsoversigt, efter en turnusordning. Samtlige indberettede arter er blevet behandlet i denne rapport - et princip vi regner med at fortsætte. Det medfører at listen over i-arter (indsamlingsarter) udgår, idet vi betragter alle arter som ligeværdige. Bidragyderne må selv sætte skellet, hvornår deres obs er interessante for vort arkiv og for lokalrapporten.

I rapportens sidste del findes et Appendix III over bl.a. for sent indkomne obs, der ikke har kunnet offentliggøres tidligere p.g.a. pladsmangel. Vi regner ikke med at vi i fremtiden vil udsende tilføjelser af denne art, men blot lade disse bidrag indgå i arkivet.

Alle involverede i lokalrapportarbejdet skal have en varm tak, også bidragyderne der har givet nøjters arbejde. Efter mange sæsoner trak Svend Møller Jensen, Bjarke Huus Jensen og Per Henriksen sig tilbage og Lars Juhler sluttede efter en sæson. Gruppen suppleredes med Jens Christensen, Thomas Kjær Christensen, Lars Gabrielsen og Jacob Salvig. Inden rapporten blev færdiggjort har Lars Borup, Flemming Lundberg og Niels Aagaard meddelt at de forlader gruppen. En særlig indsats er gjort af Lars P. Johansson, der har renskrevet rapporten. Henning Ettrup udfærdigede figurer og diagrammer. Alle takkes for arbejdsindsatsen. Også en stor tak til de tålmodige illustratører, hvis arbejder smykker denne udgivelse.

BOPÆL for RAPPORTØRER

n=58 (hertil 16 udenfor amtet)



Figuren viser bidragydernes bopæl i amtet. Foruden bidragydere, der indberetter personligt, anvendes materiale fra forskellige grupper. Man ser årsagen til, at det er lokaliteterne nær Aarhus, der er mest frekventeret af feltornitologerne.

ARTSBEHANDLING

De enkelte arter er søgt behandlet efter følgende punkter:

- 1) Generelle kommentarer (f.eks. afvigelser fra foregående år)
- 2) Yngleforekomst
- 3) Trækforekomst
- 4) Vinterforekomst
- 5) Summering: Total-tal, månedsfordeling, indsendere/obs

Under pkt. 1) er der, modsat tidligere år, udeladt arternes status i amtet. Mens der som noget nyt under pkt. 2) er tilstræbt en mere konsekvent gennemførelse af de enkelte arters månedsfordeling. Dette skulle give et billede af den enkelte arts reelle talmæssige forekomst i amtet. - Totaltallet skulle angive artens reelle forekomst på årsbasis, bl.a. medtaget observationer uden tydelig månedsangivelse.

Derudover er medtaget brøken/forholdet: antal indsendere/observationer, hvilket giver et billede af folks aktivitet og af artens obs-"tilgængelighed".

Ved behandling af ynglefugle anvendes antallet i par, og hvor søjlediagrammer er anvendt, er disse opdelt i 7-dages perioder startende fra 1/1.

Desværre er det ikke muligt at udgive alle enkeltobservationer i selve rapporten. Men det betyder ikke, at materialet ikke er brugt i udarbejdelsen af de aktuelle afsnit. Alt indkommet materiale er anvendt. Artsbehandlingen er foretaget af den enkelte skribent og dennes prioritering bestemmer udvælgelsen. Derfor er det vigtigt at indsende til lokalrapporten, selv om det ikke kommer på tryk.

Se i øvrigt "Det indkomne materiale".

SJÆLDNE FUGLE

Observationer af sjældne fugle skal normalt godkendes fra SU, DOF's sjældenhedsudvalgs side, før egentlig offentliggørelse finder sted. Dette er foreningens officielle holdning, og har som alle ved, både gode og dårlige sider.

Men da udokumenteret "hot stuff" heller ikke skulle forsvinde i redaktørens kakkelovn, er det besluttet, at arter på SU-listen, nye danmarkskarter og meget specielle fund, som ikke er beskrevet til SU, bringes i rapportens appendix I som udokumenterede observationer. Af oplysninger bringes så kun fuglens navn, obs-måned og observatør.

Ellers er behandlingsproceduren den, at alle arter nævnes i artsgennemgangen. Og godkendte SU-arter bringes på normal vis under denne.

I appendix I findes udokumenterede fund og beskrevne, men ikke færdigbehandlede SU-arter. Appendix II angiver de fund, der med sikkerhed kan siges, at være undslupne fangenskabsfugle, så som Flamingo og Undulat.

Det springende punkt er altså, om obs'en er beskrevet og indsendt til SU !!

RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE:

Alle iagttagelser vil med glæde blive modtaget. - Men hvis dette er et uoverkommeligt arbejde, er vi især interesseret i f.eks. yngleobs, første- og sidstegangsobs af trækfugle, rast- og træktaal af ande-/vadefugle, invasionsforekomster, flokiagttagelser og alt, hvad der er lidt ud over det normale.

Et indberetningsskema er blevet udformet og trykt i Sørvæn nr. 4/86. Indberetning af obs på disse, vil ikke bare hjælpe vore skribenter, men også give medlemmerne et ensartet og overskueligt kartotek. - Fordelene er altså store ved brug af disse skemaer

Skemaerne kan fotokopieres direkte fra Sørvæn eller afhentes gratis på Sølyst i det omfang der er behov.

Bidrag til lokalrapporten 1987 sendes senest 20. januar 1988 til Lokalrapportgruppen, DOF, Sølyst, Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

DET INDKOMNE MATERIALE

Det indkomne materiale opbevares af lokalrapportgruppen, hvor det akkumuleres år for år. Herved fremstår et unikt avifaunistisk kildemateriale fra Århus amt, som foreningens medlemmer vil kunne anvende ved at rette henvendelse til lokalrapportgruppen. For enkelte sårbare arters vedkommende må man dog påregne en form for clausulering af materialet.

Forkortelser anvendt i rapporten:

pull = pullus, dvs. fra klækning til opnåelse af flyveevne.

juv = juvenil, dvs. fra første rigtige fjerdragt til gennem kropsfjærfældning opnået første vinterdragt.

imm = immature, dvs. ikke-ynglende fugl fra første vinterdragt til kønsmodenhed.

subad = subadult, dvs. en ynglende fugl, der endnu ikke har opnået fuldt udfarvet voksendragt. De store måger f.eks. kan yngle med brune fjer i dragten.

ad = adult, dvs. kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt.

1K, 2K osv. = alder i kalenderår. En fugl er i sit 1. kalenderår fra klækningen til førstkomne nytår, derefter i 2. kalenderår hele næste år osv.

Om aldersangivelser i DOF's publikationer se endvidere DOFT 74. årg. 1980/3-4 side 89.

vdr = vinterdragt

h = hørt

ret = returtræk

sdr = sommerdragt

trk = trækkende

rst = rastende

odr = overgangsdragt

trkf = trækforsøg

fou = fouragerende

sy = syngende

indtrk = indtrækkende


ex = eksemplarer

N, Ø, S, V, SV, NNØ osv. = trækretningen mod det pågældende verdenshjørne.

pr = primo, dvs. dagene fra d. 1. - d. 10. i måneden.

med = medio, dvs. dagene fra d. 11. - d. 20. i måneden.

ult = ultimo, dvs. dagene fra d. 21. - d. 31. i måneden.



LOMMERLom sp. (Gavia stellata/arctica)

I perioden 6/3-10/6 trak 315 ved Gjerrild (GF).

Forår, alle nævnes: 4/2 1 rst Gjerrild (JSP), 9/2 1 rst Fornæs (JSP), 26/3 1 Ø Gjerrild (JSP), 27/3 2 N Fornæs (AJ, HLL).

Efterår, største månedstal nævnes: 6/9 5 Issehoved (SD), 5/10 12 Kysing Næs (LB, EI), 26/10 10 S Kysing Næs (LPJ), 1/11 11 N + 7 S, 16/11 26 S + 6 N, 29/11 9 S + 2 N, alle Fornæs (HP, JSP, EI, PL), 6/12 18 + 14/12 16 S Kysing Næs (PL, JC, LB), 30/12 8 Århus-Kalundborg (JFT).

Samlet total i 1986 for smålommer var på 558 individer, hvor kun ca 7% blev artsbestemt. Dette skyldtes det store sp. antal fra Gjerrild i foråret. Men alt i alt en meget flot total.

Total: 520.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	2	3	0	0	0	0	0	6	40	98	56

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Alle nævnes:

Forår: 4/1 1 N + 26/1 1 N + 1 S Kysing Næs (LB), 7/2 2 syd for Vejrnø (LB), 24/2 1 død Vesterløkke/Koldby Kås (SD), 27/3 1 rst Fornæs (HLL, AJ), 30/3 1 Århus Østhavn (NR), 5/4 1 død Randers Fjords Udløb (JRR), 13/4 1 rst Kysing Næs (NÅ), 27/4 1 død Århus Østhavn (NÅ).

Efterår: 16/11 2 trk Fornæs (FH), 22/11 2 S Kysing Næs (LB), 6/12 1 rst Kysing Næs (LB), 15/12 1 Kysing Næs (CEM), 29/12 2 Århus-Kalundborg (LB).

Indlandsiagttagelse: 8/11 1 Dagstrup Mose (JSP).

Total: 20 ex.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	5	4

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

I alt 18 ex, alle nævnes:

Forår: 12/1 1 rst Kysing Havn/Næs (BHI, HC, CEM), 26/1 1 N Grenå Havn (JNK), 13/4 1 rst Kysing Næs (NÅ), 20/5 1 Flakket, Anholt (JS, HE), 24/5 1 Sønderstrand, Anholt (JS, HL).

Efterår: 6/9 1 Issehoved, Samsø (SD), 7/10 1 N + 18/10 1 Ø Kysing Næs (PB, NÅ, BHI), 2/11 1 S + 16/11 4 + 30/11 2 S + 1 N Fornæs (EH, JSP), 29/12 2 Århus-Kalundborg (LB).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	0	0	1	2	0	0	0	1	2	8	2

Storlom sp. (Gavia immer/adamsii)

I alt 9 ex, alle nævnes:

Forår: 4/2 1 S Fornæs (JSP), 25/3 1 trk Gjerrild (GF).

Efterår: Fornæs: 16/11 1 N (EH, PL), 16/11 1 S (JSP), 30/11 1 N + 1 S (PL, JOS, JSP), 14/12 1 S (JSP). Vejrnø: 6/12 1 (LLH).

Islom (Gavia immer)

Se appendix 1.

Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii)

Se appendix 1.

LAPPEDYKKERELille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Mange ynglepar indsendt i år, i alt 73-80 par på 23 lokaliteter samt en del indrapporteringer fra lokaliteter, som ikke kan genfindes på et almindeligt kort og som derfor ikke nævnes her.

Langt de fleste y-par er fra Søhøjlandet og området vest for Århus. Der er meget få meldinger fra f. eks. Djursland og den sydlige ende af amtet.

Øvrige: Overvinterende flokke ses i isvintre hvor der er åbent vand. Sikre lokaliteter er bla. Norsminde Havn og sluserne i Silkeborg. Største tal herfra samt øvrige flokke nævnes:

Vedr. Norsminde Fjord/Havn månedsmax, se nedenfor (1).

Silkeborg Papirfabrik/Silkeborg Langsø, største tal herfra: 18/1 13, 26/2 14, 12/3 9 og ult dec 35 (JCN, PMc, PB).

Studstrupværkets kølevandsrende: Set her i perioden 31/1-22/3 med max antal 20/2 16 (LW), 28/2 17 (HLL) samt 9/3 15 (AJ).

Øvrige over 10: "vinter" 25-30 Gudenåen ml. Svstrup-Silkeborg (PMc), "vinter" 7-11 Sminge Sø (PMc), 9/1 10 + 14/2 12 Kristrup Enge (LIP), samt jan-mar max 15 Remstrup Å (GG).

Total: 594 ex (uden hensyntagen til gengangere). Antal obs: 170. Indsendere: 34.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	163	239	63	21	12	16	4	60	60	137	7	45
(1)	14	28	3	0	0	0	0	15	30	30	2	1

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

I alt min 214 par indrapporteret, men der mangler tal fra mange søer i Søhøjlandet.

Ynglepar (antal par), alle nævnes: 16 Silkeborg Langsø, 16 Ørnsø/Pøtsø, 1 Lyse-mose, 5-6 Udbyover Sø, 6 Fussing Sø, 7 Ramten-Dystrup Sø, 0-1 Ulstrup Mose, 1 Smørmose, 5 Dagstrup Mose, 16-20 Mørke Kær, 87 Brabrand Sø, 2 Tåstrup Mose, 6-7 Sminge Sø, 6-7 Gudenåen/Svstrup-Silkeborg, alle (Lok), 2 Borum Stormose (KH), 15 Solbjerg Sø (HE), 10 Mossø (AM), 4-8 Dronningborg Bredning (LIP), 4 Vejlsø (SFP), 2-3 Goding Sø (EBJ), 1 Kysing Fjord (HLL), 2 Langsø (JT) og Stubbe Sø ?.

Større tal: 25/3 50 + 15/12 50 Ørnsø (JCN), 13/4 30 Mørke Kær (SH), 17/4 20 Emborg Odde (EI), 2/5 32 + 11/8 40 m. 7 pull. Grund Fjord (LIP), 15/5 52 Solbjerg Sø v. Vitved Bæk (HE), 25/5 15-20 Mørke Kær (JWJ), 9/8 150 incl. unger Stubbe Sø (JI), 18/8 40 Fussing Sø (JP), 27/9 110 Brabrand Sø (AJ), 11/10 20 Hampen Sø (NA), 2/12 550 Silkeborg Langsø (PMc), 7/12 24 Alrø (HP), 20/12 25 Knudsø (JK), 23/12 35 Glenstrup Sø (PL).

Total: 2681. Antal indsendere: 31. Antal obs: 75. Antal ynglepar: 214 - 2.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11	21	222	299	421	37	37	588	126	95	91	733

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena)

Yngel: I alt 28-40 par indrapp. Alle nævnes:

1-2 Gudenåen/Silkeborg, 0-1 Silkeborg Langsø, 1 Gammelmose, 1 Borum Mose, 1-2 Udbyover Sø, 1-2 Ramten/Dystrup Sø, 2-3 Ulstrup Mose, 2-4 Smørmosen, 3 Skaføgård Sø, 1-2 Mørke Kær, 1 Rønbæksøen, 2-3 Galten Gammelmose + Sømose, 1-2 Sminge Sø, alle (Lok), 1 Vandhul v/Tranbjerg (JWJ), 2 Irønemosen (LeB), 1 Kragemosen 1 Fuglsø (SFL), 1 Højslet v/Randers (JP), 1-2 Langå Sø (JP), 1 Vilstrup Sø (JP), 1 Kysmose (JTL), 1 Borum Mose (JTL), 0-1 Mose v. Gunnerup (LIP), 1 Mose v. Vilstrup (LIP).

Iræk: Enkelte eksemplarer er set trækkende/rastende ved Kysing Næs, Samsø og Fornæs i sept/okt. Der er blevet registreret store tal i foråret omkring Samsø: 26/3 30 Øster Hedekrog (LeB), 5/4 14 + 6/4 31 Vester Hedekrog (SD).

Vinter: 28/1 1 Gudenåen v/Gødvad Bakke (PL), 30/11 1 Fornæs (JSP), 3/12 1 Risskov (BHJ), 17/12 2 rst + 24/12 1 rst Kysing Næs (LB).

Total: 256. Antal indsendere: 28. Antal obs: 106. Antal ynglepar: 28 - 40.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	39	89	38	41	11	4	13	13	3	4

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Yngel: I alt 23-31 par, alle nævnes:

0-1 Udbyover Sø, 2-4 Ramten-Dystrup Søer, 1-2 Mørke Kær, 3-4 Urabrands Sø, 2-3 Grauballe Mose, 0-1 N. f. Grauballe Mose, 2-3 Gammelose, 3 Nørre Mose, alle (Lok), 10 Emborg Odde, Mossø (AM). Ingen totalopgørelse for Mossø.

Ud over ynglelokaliteterne er arten truffet på følgende lokaliteter:

29/4-3/5 2 Østerby Mose (BHJ, OGJ), 14/7 1 Julsø (BRS), 14/7-17/7 2 Frederiksdal Hede (PMc), 30/8 15 Kysing Fjord (LB), 27/9 2 Klostermølle (NR) og 28/9 2 Kysing Næs (OGJ).

Total: 107. Antal indsendere: 27. Antal obs: 92.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	26	62	37	19	21	6	1	0	0

Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus)

Alle obs nævnes:

24/2 1 død Kolby Kås (SD), 12/3 1 trk + 10/4 1 trk Gjerrild (GF), 11-19/10 1 rst Hesselholm, Samsø (SD, LeB), 14/12 1 rst + 17/12 1 rst-S Kysing Næs (UGJ, LB).

SULER

Sule (Sula bassana)

Arten var i 86 noget "spøjs" fordelt, med hele 42 eks på een trækdag ved Kysing Næs, og med 2 vinteriagttagelser, som generelt er sjældne, og specielt i indre farvande.

Alle obs nævnes: 8/2 1 ad på vandet Moesgård (via JTI), 4/10 1 ad + 1 juv Hjelm-Nordsamsø (IV), 5/10 min 42 S Kysing Næs (OGJ, LB, ET), 6/10 1 3K Anholt (EH), 1/11 1 3K N Fornæs (HP), 7/12 1 Kysing Næs (OGJ, CEM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	1	0	0	0	0	0	0	0	45	1	1

Total: 48.

EGENTLIGE STORMFUGLE

Mallebuk (Fulmarus glacialis)

6/9 1 V Issehoved, Samsø (SD).

Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus)

20/9 1 S Kattegat SØ for Grenå (HP).



SKARVERSkarv (*Phalacrocorax carbo*)

Mange indrapporteringer fra både kyst og indland. De fleste af fuglene er vel ynglefugle på fourageringstræk fra kolonien på Vorskø, som voksede til 2900 par i 1986.

Yngel: 4 par gjorde yngleforsøg på Svanegrund (Jens Gregersen).

Største flokke fra henholdsvis saltvand og ferskvand nævnes:

Saltvand, alle over 200 nævnes: 7/2 400 Vejrhø (LB), 7/2 200 Bøsserne (LB), 22/2 1000 Dyrby Strand (BHJ), 22/2 200 Sælvig Havn (SD), 24/2 200 syd f. Samsø (SD), 4/5 200 Alrø (JWJ), 26/7 246 Kolderne, Stavns Fjord (LeB), 30/7 300 Alrø (PMc), 7/9 306 Issehoved, Samsø (LeB), 3/10 500-700 Vejrhø (NH), 21/10 300 N Sletterhage (JTL), 6/12 1000 Vejrhø (LLH), 26/12 400 Århus-Kalundborg (JFT).

Kysing Fjord: Skarver ses i fjorden i perioden 2/3-18/10, flest 9/5 213 (HLL), og 24/5 190 (MCR).

Ferskvand: Fusing Sø, skarver set i perioden 27/3-12/10 max 18/8 1200 (JP, LIP).

Brabrand Sø: set 31/3-20/8, flest 13/7 12 ex (AJ).

Stubbe Sø: set 24/8-7/12 med max 31/8 10 R (AM).

Solbjerg-Stilling Sø: flest set 15/5 20 R + 7 Ø (HF).

Mossø: set 17/4-9/10, max 24/5 + 24/7 20 (ET, BRS).

Ørsø: max 30/7 13-15 (PMc).

Total: 12724. Antal indsendere: 45. Antal obs: 255.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
314	1403	161	367	1823	52	1466	2875	484	1639	105	1457

Iopskarv (*Phalacrocorax aristotelis*)

7-17/12 1 Fløjstrup/Moesgård Strand (LB, PBu, OGJ, JTI). Obsen er godkendt.

HEJRERRørdrum (*Botaurus stellaris*)

Fr igen i år registreret på de 2 hovedlokaliteter i amtet: Brabrand Sø: 13-14/3 1 set fiske fra våge i vestenden (JTL), 14-20/4 1 hørt (Svend Erik Jensen via AJ), 25/6 1 hørt (Svend Erik Jensen via AJ).

Bjerregrav Mose: 20/4 1 (JP), 21/5 1 hørt (LTP), 25/5 1 (JP).

Endvidere er der 2 noget usædvanlige obs: 26/6 2 N kl. 23.00 Ajstrup Strand (JFT) og 12/9 2 Sminge Sø (PMc).

Total: 6.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	1	2	1	3	0	0	2	0	0	0

Fiskehejre (*Ardea cinerea*)


Antal ynglepar: min 38 - fordelt således: 6 Assingehoved (PMc), 7 Horskær (ET), 3 Pinds Mølleådal (ET), 3 Moesgård (SH), 1 Storskoven, Brabrand Sø (Lok), 17-20 Dejret Øhoved (Lok), 1 nær Bryrup (JB).

Der er indkommet et stort materiale om denne art, med iagttagelser fordelt over hele amtet og på alle tider af året. For periode max ved Kysing Fjord og Brabrand Sø, se figur.

Øvrige større tal nævnes: 1/1 60 Ørnø (JCN), 25/4 36 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (AJ), 15/6 18 Horskær (IPJ), 28/7 14 Fussingø (PER), 24/8 21 Ulstrup Mose (AJ), 31/8 30 Sødringholm (BHJ), 8/10 26 Salten Langsø Vest (BRS), 21/12 15 Mørke Kær (SH), 29/12 48 Ørnø (SFP).

Total: 2093. Antal indsendere: 30. Antal obs: 278.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
482	44	143	176	122	129	293	243	44	121	71	225



STORKE

Sort Stork (Ciconia nigra)

3 iagttagelser, alle fra maj: 7/5-11/5 1 ad Velling Skov (JB, SH), 9/5 1 Stødv, Helgenæs, blev dagen efter set ved Ålsrode (JTI), og det kunne måske være samme fugl der et par dage efter dukkede op ved Gjerrild: 13/5 1 F-SV (GF).

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

I alt 9 ex, samt 1 y-par: Ynglepar, Randers: Den ene fugl har som tidligere år opholdt sig i området hele året. Den er indrapporteret først 11/1 Tebbestrup Enge (JP) og sidst 12/11 Randers (JRR). Allerede 17/3 er den set på reden (JP), mens det først var 23/4 2 ex blev set ved Kongslund/Vasen (JP).

Øvrige: 27/4 1 Brabrand Sø (AJ), 1/5 1 NV Tulstrup, Ry (JK), 22/5 2 rst Allingå nær Auning (JRR), 13/6 1 N-S Nordby, Samsø (ChL), 1/7 1 rst-NØ Lading Sø (JTI) og 1/8 1 N Ødum (HC).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	1	3	5	3	2	2	0	0	1	0

ANDEFUGLEKnopsvane (Cygnus olor)

Mange ynglefugle og store tal fra Mariager Fjord, men forbausende små tal fra Kysing Fjord.

Yngel: 151-153 par fra 45 lokaliteter, der fordeler sig over hele amtet.

3 kolonier: Hou Røn 11 par, Søby Rev 38 par, Alrø Poller 25 par.

Uden for yngletiden ses store flokke i fjorde og bugter, her nævnes kun obs over 150 ex:

1 halvår: 26/1 275 Lerdrup Vig (HFj), 27/1 500 Alrø (SFP), 29/1 i alt 1709 Mariager Fjord strækn. Saltværket-Hadsund (PL), 9/2 750 Dania (AJ), 22/2 1080 Assens, Mariager Fjord (SH), 9/2 150 Alrø poller (HFj), 1/3 3000 ad + 100 imm Mariager Fjord v. Saltværket (HeP), 1/3 175 Alrø (HP), 2/3 1500 Dania, Mariager Fjord (JP), 9/3 223 Alrø Poller (HFj), 15/3 150 Råby Odde (JP), 6/4 300 Sondrup Strand (ET). Vedr. Kysing Fjord, se nedenfor.

2 halvår: 6/9 338 ad + 8 juv Hesselholm, Samsø (SD), 13/9 306 Stavns Fjord (LeB), 19/10 + 2/11 1000 Mariager Fjord/Ajstrup Bugt (JP).

Total: 19734. Antal indsendere: 34. Antal obs: 266.

Månedsfordeling (1) samt Kysing Fjord månedsmax (2):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1.	3681	2506	5578	1082	758	46	75	77	791	2215	1404	672
2.	60	38	35	150	126	2	17	43	52	116	126	75

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Alle nævnes: Forår: 19/2 7 Additsøerne (PMc), 15/3 1 Sødringholm (JP), 5/4 5 + 20/4 1 Kolindsund, Kærby (AJ).

Efterår: 5/10 4 Kysing Fjord (CEM), 11/10 2 rst Hammershøj Teglværk (HP), 11/10 2 V Fussing Udskov (JR), 18/10 54 V kl. 10.25 Moesgård (LB), 26/10 7 Kysing Fjord (IKC, ET) og 2/11 1 Stubbe Sø (JNK).

Total: 84. Antal indsendere: 8. Antal obs: 10.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	7	1	6	0	0	0	0	0	69	1	0

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Største flokke i langt de største koncentrationer er set og optalt ved Randers og Mariager Fjorde i foråret: 26/1 377 Mariager Fjord (FH), 8/2 1076 Mariager Fjord (JRR), 9/2 569 Saltværket, Mariager Fjord (HLL, AJ), 22/2 590 Assens, Mariager Fjord (SH), 1/3 1500 ad + 800 juv Saltværket, Mariager Fjord (HeP), 1/3 500 Råby Enge (JP), 2/3 766 Mariager Inderfjord (JRR), 2/3 742 v/Demstrup Gd. (JRR), 15/3 300 Sødringholm (JP), 22/3 350 Vestrup Enge, Randers Fjord (JP), 27/3 176 v/Overgård (PL), 29/3 185 N. f. Hadsund (HE).

Øvrige: 17/1 103 Resenbro-Svostrup (BRS), 26/1 131 Resenbro-Sminge Sø (BRS), 29/1 76 Mossø Vest (ET), 27/2 121 Åkrogen + Studstrupværket (LB), 4/4 55 Ø Ris-skov (HLL), 21/12 62 Salten Langsø (GG), 27/12 84 Studstrup (TKC, JSP).

Forårets sidste: 2/5 2 ad + 3 juv Brabrand Sø (PB).

Sommer: 27/7 1 + 12/8 1 Sminge Sø (PMc).

Efterårets første: 9/10 2 Flakket, Anholt (EH), 19/10 3 V Salten Å v/Velling Skov (JB), 26/10 2 Kysing Fjord (IKC, ET).

Total: 6584 ex (uden hensyntagen til gengangere). Indsendere: 42. Obs: 188.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1053	1363	3717	167	5	0	1	1	0	9	30	405

Gås sp. (Anser sp.)

Alle obs nævnes: 17/3 2 N Universitetet, Århus (TKC) og 20/12 32 set ved Fløjstrup Strand og Mariendal Strand (TKC, JC).

Sædgås (Anser fabalis fabalis)

Alle nævnes: Forår: 15/3 2 NV Kysing Næs (OGJ), 26/3 1 N Møesgård Strand (LW, HP), 27/3 3 N + 1 S Fornæs (HLL, AJ), 27/3 1 F Gjerrild (HLL, AJ), 12/4 1 N Møesgård (OGJ).

Efterår: 18/10 56 Helgenæs (JTL), 2/11 1 trk Salten Langsø (GG, HP), 28/12 10 Kysing Fjord (LPJ).

Total: 76.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	8	1	0	0	0	0	0	56	1	10

Kortnæbbet Gås (Anser fabalis brachyrhynchus)

En stor obs hæver totalen op på i alt 51 ex.

Alle obs nævnes: 13/9 1 + 24/9 2 N-V + 26/10 1 S-V Kysing Fjord (BHJ, HC, ET) og 18/10 47 S Ebeltoft (HC).

Blisgås (Anser albifrons)

Alle nævnes: Forår: 19/3 1 ad Kysing Fjord (KH).

Efterår: 13/10 2 ad rst Alrø Egehoved (Thorkil Brandt), 9/12 11 rst Mølleskov Eng (JTL) og 11/12 4 ad + 7 juv Kysing Fjord (NR). Sidstnævnte flokke må formodes at være de samme fugle, da arten er meget uregelmæssig i antallet og yderst sjælden i så store flokke.

Grågås (Anser anser)

Mange iagttagelser, bla. med mange vinterfund hvilket er usædvanligt for amtet.

Yngel: Kun sikkert y-fund fra Bjerregrav Mose: 21/5 1 par m. 2 pull og 25/5 1 par med 6 pull (LIP, JP).

Desuden er Grågæs set i y-tiden på 10 mulige y-lokaliteter, men altså ingen sikre (Lok, ET, PMc, JRR, SMJ, LeB, SD).

Forår: Ankommer 1/3 1 Alrø (HP) og 6/3 4 Kysing Fjord (HLL), herefter mange obs frem til med maj, størst blev Mossø med 20 ex 19/3 (ET) og 30 Emborg 11/5 (SH), samt 18/5 30 Alrø Poller (HFj). Efter maj meget få obs indtil ult juli, hvor efterårstrækket starter.

Efterår: 18/7 11 S Gudenåmuseet, Salten (BRS), 20/7 59 Alrø (NH) og 23/7 23 SSØ Ijerrild (LPJ) indleder efterårstrækket der kulminerer omkring månedsskiftet med store tal fra Stavns Fjord: 30+31/7 58-60 ex (SD).

Efterårets sidste ses 28/9 23 S Kysing Næs (LPJ), 8/10 2 Salten Langsø (BRS) og 7/11 1 V Vorup, Randers (LIP).

Vinter: 20/12 1 Grund Fjord (FFa), 20/12 9 Salten Langsø (PMc), 27/12 9 S Ommestrup (LPJ) samt en voldsom melding fra Sminge Sø: "vinter" (?) 20-25 ex (PMc).

Total: 1326 ex frasorteret de værste gengangere. Antal obs: 199. Indsendere: 40.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
23	23	187	338	265	3	373	111	64	2	1	19

Kanadagås (Branta canadensis)

Alle nævnes, der er sandsynligvis en del gengangere i materialet:

1 halvår: 1/1 22 NV Mårslet (BHJ), 25/1-9/3 16-22 Kysing Fjord, max 2/3 22 (ET), 4/2 18 R Ebeltoft Vig (JSP), 14/2 31 Ebeltoft Færgehavn (SKH), 1/3 11 R + 19/3 11 R på isen v. Moesgård Strand (JTL, MCR, HeC, OGJ), 1/3 6 Alrø (HIP), 2/3 12 R Demstrup Gd. (JRR), 8/3 11 fourag. Hørret Enge (BHJ), 24/3 3 Ahl Hage (SEL), 24/3 2 SV Moesgård (JTL), 26/3 12 R Fejrups Mose, Helgenæs (JTL).

2 halvår: 16/11 3 R Besser Rev (SD), 28/12 12 V Brabrand Sø (TB), 29/12 14 Ahl Hage (SLL), 30/12 27 Ebeltoft Vig (JSP).

Total: 247 ex, frasorteret gengangere. Antal obs: 34. Antal indsendere: 21.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
43	70	78	0	0	0	0	0	0	0	3	53

Bramgås (Branta leucopsis)

Alle obs nævnes: 4/2 22 Ø Gjerrild Klint (JSP), 18/10 3 V + 19/10 1 S + 70 SV Hesselholm, Samsø (SD) og 2/11 4 V Risskov (HLL).

Total: 100 ex.

Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota)

Et rekordår, men mon ikke det skyldes bedre indrapportering. Sommerfund er usædvanlige.

Sommer: 10/6 1 R Hevring Bugt (JRR).

Efterår: Første ses 27/9 522 Ajstrup Bugt (JRR) og største ses her 25/10 1669 (JRR) samt 22/11 2214 Mariager "yder"-Fjord (JRR).

Store vintertal: 26/1 750 Mariager Fjord (EH), 26/1 200 Randers Fjord (EH) og 8/2 920 Mariager Fjords Udløb (JRR). Sidste ses her 19/4 (JSP).

Total: 8484. Antal indsendere: 5. Antal obs: 15.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
952	920	77	27	0	1	0	0	522	1811	2664	1510

Mørkbuget Knortegås (Branta bernicla bernicla)

Mange obs af få fugle, bemærk også her et sommerfund.

Førår: Første 22/3 10 Sælvig (LeB). Max 23/3 58 R Grønhoved Strand (LeB) og 5/4 53 Hesselholm (LeB). Sidste ses sent, 18/5 6 R Hesselholm (LeB).

Sommer: 10/6 1 R Hevring Bugt (sammen med 1 lysbuget) (JRR).

Efterår: Første ses tidligt, 13/9 21 V + 7 R Hesselholm (LeB), største blev 2/11 50 Mariager Fjord (JP). Arten ses i amtet indtil årsskiftet.

Vinter: Kun 18/1 4 Dejret Øhoved (JSP). Det er vel isvinteren der gør sig gældende.

Total: 275. Antal indsendere: 8. Antal obs: 19.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	0	63	88	6	1	0	0	34	13	54	12

Knortegås sp. (B.b. bernicla/B.b. hrota)

Kun første, største og sidste samt et sommerfund nævnes:

1. halvår: Flest ses 9/2 200 Mariager Fjords Udløb + 500 Sødringholm (AJ, HLL) og 30/3 130 Randers Fjords Udløb (JRR). Sidste ses 27/4 11 Hjortholm, Stavns Fjord (SD) og 18/5 2 Yderste Holm, Stavns Fjord (SD).

2. halvår: Sommer: 5/7 1 ad Ø Hegedal Strand, N. Djursland (LB).
Efterårets første blev 12/9 ca 10 VSV Silkeborg (SFP) og største flok 18/10 10 V-R Kysing Næs (LB).

Total: 1338. Antal indsendere: 10. Antal obs: 23.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	717	130	468	2	0	1	0	10	11	0	1

Gravand (Tadorna tadorna)

Yngel: Indberettet 18 par fra 8 lok.

Træk: Vidt udbredt i foråret. I det sene efterår dannes en koncentration ved Mariager Fjord.

21/10 400 Sødringholm (JP), 2/11 2000 Mariager Fjord/Ajstrup Bugt (JP), ult nov 1000 Mariager Fjord (JRR).

Vinter, (Jan + Dec) alle obs:

4/1 10 Alrø (NH), 22/1 9 Alrø (NH), 26/1 1 Århus Havn (LPJ), 1/12 3 Alrø (NH), 6/12 1 N Fornæs (LPJ), 21/12 250 Sødringholm (JP), 30/12 1 rst Bråbrand Sø (JTL).

Indsendere: 29. Lokalteter: 73.

Månedsfordeling (incl. alle gengangere) + månedens største obs:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
20	71	575	930	573	79	19	34	4	792	4240	261
10	35	74	100	140	22	10	25	2	400	2000	250

Pibeand (Anas penelope)

Sommerfund: 30/6 2 hanner overflyvende v/Salten Langsø (JCN).

De sidste forårsobs: 4/5 20 Kysing Fjord (NA), 8/5 17 Mørke Kær (SH, LPJ), 8/5 8 Dystrup-Rantø Sø (JPJ), 8/5 5 Hollandsbjerg + 1 Kare Holme (LTP), 11/5 1 par Bråbrand Sø (AJ).

Forårsobs over 100 ex: 24/3 120 Alrø poller (NH), 3/4 150 Grund Fjord (FFa), 30/3 500 + 18/4 400 Råby Odde (JP, ML).

Efterårets første: 22/8 2 Alrø poller (AJ), 24/8 2 Randers Fjord (JP) + 13 Kysing Fjord (SH, TR).

Efterårets største tal domineres af Kysing Fjord, max 10/10 1600 (LB), se månedsfordelingen.

Vinter: 7/12 3 Odden-Ebeltoft overfarten (HC), ellers blot Kysing Fjord med max 28/12 192 (JF 1), se månedsfordelingen.

Indsendere: 27. Lokalteter: 25.

Månedsfordeling, totalt og månedsmax for Kysing Fjord (1):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	50	150	1055	723	105	2	0	140	567	1664	313	192
(1)	50	150	200	15	70	0	0	120	500	1600	300	192



Knarand (Anas strepera)

Ikke mange fund af Knarand, der ellers siges at være en art i fremgang. Alle obs:

Forår: 6/4 1 par Horskær (ET), 27/4 1 par Møgelmosen, Samsø (LeB, SD), 1/5 1 hun Brabrand Sø (AJ).

Efterår: 20/9 3 Kysing Fjord (CEM).

Forekomst gennem 10 år:

X	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Sommer	-	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Forår	3	0	2	2	6	5	6	9	1	5
Efterår	-	0	0	4	2	1	3	0	1	3

Krikand (Anas crecca)

Findes om foråret på en række lokaliteter, men er i efteråret hovedsageligt set i det jagtfri reservat, Kysing Fjord.

Yngel: 26/7 1 par + 8 pulli Stavns Fjord (ChL), 26/6 1 hun m. pulli Frederiksdal Hede (SFP), 19/4 1 par i yngel Dystrup-Ramten Sø (JSP).

Forår, over 100: 30/3 200 Råby Odde (JP), 4/4 110 Grund Fjord (FGa), 4/4 120 Kysing Fjord (PBU), 20/4 130 Kolindsund (AJ), 25/4 109 Sødringholm (AJ).

Efterår over 100, excl Kysing Fjord: 27/8 160 Sødring Kær (LTP).

Indsendere: 28. Lokaliteter: 44.

Månedsfordeling og månedsmax for Kysing Fjord (1) og Brabrand Sø (2):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	93	28	550	996	39	18	22	467	318	505	57	76
(1)	65	25	50	120	6	0	0	68	270	450	55	25
(2)	10	0	35	41	9	0	0	40	1	0	0	1

Gråand (Anas platyrhynchos)

Yngel 27 kuld/ynglepar fra 6 lokaliteter, heraf Fussing Sø 22 par (PER).

Træk: 4 store rastepåseer skiller sig ud med betragtelige max-obs i løbet af året, Fussing Sø, Kysing Fjord, Mariager Fjord og Stubbe Sø.

Indsendere: 26. Lokaliteter: 51.

Månedsmax for de 4 fremhævede lokaliteter, hvis oplysninger haves + Månedsforekomst i amtet totalt (revideret for de største gengangere incl. de ad ynglefugle). Fussing Sø (1), Kysing Fjord (2), Mariager Fjord (3), Stubbe Sø (4).

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	9118	7313	12376	1422	398	99	203	2801	717	880	700	2600
(1)	3000		1000						200			
(2)	2000	3200	1100					1500	500	880	480	800
(3)		200	4000									
(4)								300				1000

Spidsand (Anas acuta)

Største obs udenfor Kysing Fjord 23/3 6 Horskær (HFj), 27/8 15 Sødring Kær (LTP), 5/10 7 Kysing Næs (FT).

Indsendere: 23. Lokaliteter: 12, deraf forår: 8, Efterår: 3, Vinter 3.

Spidsand fortsat

Månedsfordeling for amtet samt månedsmax for Kysing Fjord (1):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	5	3	15	6	5	0	0	15	3	23	10	30
(1)	4	2	4	4	0	0	0	7	3	14	10	30

Atlingand (Anas querquedula)

Atter et år med få obs. Arten er set sjældnere i den senere år. Måske er den ramt at tørken i vinterområdet i Sahel, Nordafrika. Alle obs nævnes:

Yngel: 1 par Sminge Sø + 1 0-1 par Gudenåen s. f. Svostrup (Lok).

Forår: Brabrand Sø: 9/5 2 han + 1 hun (TB, LB), 14/5 og 17/5 1 han (KH, CEM).

Kysing Fjord: 3/5 og 4/5 1 par (SH, MCR). Desuden 1/5 1 han Kalsemade (SH).

Efterårets eneste: 20/8 1 Kysing Fjord (HLL).

Forekomst over 10 år:

	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Yngel	-	-	-	-	3	1-8	2	0	0	1-2
Sommer	0	0	0	3	0	0	9	5	0	0
Forår	5	5	3	13	7	21	20	7	3	6
Efterår	2	3	0	1	4	4	2	7	1	1

Skeand (Anas clypeata)

Yngel: Brabrand Sø 0-1 par + Skaføgård Sø 0-1 par (Lok), Mørke Kær 3 par (Lok, SH). Desuden en del obs, der tyder på yngel.

Forårets første: 22/3 1 par Gudenå-bredningen (JP), 25/3 1 han Gudenåbredningen (LTP), 25/3 1 han Hesselholm (LeB), 26/3 1 han Brabrand Sø (LB, KH).

Efterårets/vinterens sidste: 14/12 1 + 15/12 1 Kysing Næs (OGJ, CEM).

Månedsfordeling i amtet totalt, og for Brabrand Sø (1) og Kysing Fjord (2), som er de to største lokaliteter for arten:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	0	0	6	35	25	8	1	42	26	70	30	2
(1)	0	0	3	13	4	1	0	0	0	0	0	0
(2)	0	0	0	2	5	4	0	29	25	70	30	0

Forårs-max for Brabrand Sø over 10 år:

77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
-	2/5	16-19/4	17/4	9-10/4	24/4	20/4	17/4	?	16/4
	14	17	8	5	8	17	11		13

Efterårsmax for Kysing Fjord over 10 år. Bemærk datoerne:

77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
-	15/10	28/10	25/10	18- 22/10	18/10	18/10	15- 21/10	27/10	21/10
-	36	51	77	73	200	68	31	102	70


Taffeland (Aythya ferina)

En rimelig spredt dækning i amtet, se figur.

Indrapporterede ynglefund, antal par: 0-1 Udbyover Sø, 3-6 Ramten-Dystrup Søer, 2 Smørmose, 0-2 Skaføgård Sø, 10-12 Mørke Kær, 1-2 Bråbrand Sø, 0-2 Sminge Sø, Gudenå ml. Svstrup og Silkeborg 1-2 og Grauballe Mose og Gammelmose begge 0-2 (Lok).

Årets største forekomster: 3/4 75-100 Grund Fjord (FFa), 7/10 120 (NA) og 26/10 200 (E1), begge Kysing Fjord.

Antal indsendere: 23. Antal obs: 152.

TAFFELANDTroldand (Aythya fuligula)


1986 har, i forhold til sidste år, givet meget pæne tal. Se selv figuren.

Ynglefund, antal par: 2-4 Ramten-Dystrup Søer, 2-3 Smørmose, 0-1 Skaføgård Sø, 1 Dagstrup Mose, 1-2 Bråbrand Sø, 10-15 Mørke Kær, 1 Kvoltrup Mose, 0-1 Galten Søomose og Gammelmose, 2 Sminge Sø, 4-7 i Gudenåen ml. Svstrup og Silkeborg, 0-2 Silkeborg Langsø, 0-2 Grauballe Mose, 0-1 Gammelmose, 1 Frederiksdal Hede og 0-1 Dejret Øhoved - alle (Lok).

Desuden sås 27/6 1 hun m. 7 pulli Halle Sø (JCN), 6/7 1 hun m. 6 pulli ved Varna (CEM), 12/7 1 hun m. 7 pulli ved Eskelund (Kell), 18/7 1 hun m. 8 pulli Ristrup Mose (SMJ).

Største vinterforekomster: 25/1 2000 Fussing Sø (JP), og fra 2. halvår 14/12 900 Stubbe Sø (JSP) og 23/12 1400 Glenstrup Sø (PL).

Antal indsendere: 29. Antal obs: 245.



Bjergand (Aythya marila)

Der er en generel, antalsmæssig tilbagegang i forhold til 1985. Kun den kolde marts måned viste gode tal. Der findes sikkert gengangere, da næsten alle tal er fra Århus Bugt.

Indlandsobs: Kun to tilfælde er indrapporterede, nemlig 1 hun 15/3 i Gudenåen ml. Silkeborg og Resenbro (SFP) og 15/7 rastede 1 han i Brørand Sø (KCH).

Fra forårstrækket meldes fra Gjerrild i perioden 9/3-23/4 om 906 trækkende fugle (GF).

Årets største flokke er naturligt nok fra marts: 1/3 270 Studstrupvæket (AJ), 8/3 140 Østhavnen, Århus (NR) og 29/3 200 Ived Øhoved (SEL).

Antal indsendere: 25. Antal obs: 54.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
97	214	522	2	5	0	1	0	1	33	25	0



Ederfugl (Somateria mollissima)

Ynglefund: Stavns Fjord ca 2000 par (LeB). Lokalitetsregistreringen (Lok) har noteret: 1171 par Hou Røn, 486 par Søby Rev, 279 Alrø Poller og 309 Svanegrund. Horsens Fjord-gruppen (HFj): 18/5 87 pull. Horskær, 15/6 57 pull. Sondrup Strand.

Trækket ved Gjerrild gav i perioden 6/3-25/5 i alt 56368 ex. Mens de største vinterforekomster er fra Samsø-området: Kysten v. SV-Samsø min 10000 22/2 og samme dag min 15000 Issehoved (SD), 24/2 15-20000 Kolby Kås-Brattingsborg (fra færgen) (SD/LeB).

Fra andre lokaliteter skal nævnes: 8/3 685 rst Moesgård Strand (LW), 31/3 1000 rst Kysing Strand (ET), 20/10 1246 ex trk N Sletterhage, Helgenæs (JTL) og fra Fornæs meldes 2/11 om 9500 (JNK). Desuden sås 15-16-17 og 26/3 1 ad han Brabrand Sø (LB).

Antal indsendere: 21. Antal obs: 73. Månedfordeling, se næste side

Stellersand (Polysticta stelleri)

Se appendix 1.

Havlit (Clangula hyemalis)

Alle obs nævnes:

1. halvår: 8/2 + 9/2 1 hun m. olie Norsminde Havn hhv. (OGJ) og (PNN). 14/2 5 Ebeltoft Havn (SKH), 16/2 1 hun Alrø (HP), 22/2 1 Studstrup (SH), 24/2 32 syd f. Samsø (SD + LeB). 2/3 3 Fornæs (SKH), 26/3 7 han Ø. Hedekrog, Samsø (SD, LeB), 27/3 2 trk S ved Fornæs (AJ + HLL), 5/4 1 Vester Hedekrog, Samsø + 5 døde ex, hvoraf tre med olie i fjere (SD), 6/4 2 rst Helgenæs (JTL).

2. halvår: 2/11 6 han + 2 hun trk N Fornæs (JNK, JSP), 22/11 3 han trk S Kysing Næs (LB + OGJ), 30/11 trk 3 N og 2 S ved Fornæs (JSP). 14/12 var en aktiv dag med 3 trk S Kysing Næs (JC, OGJ, PL) samt 2 N og 1 S ved Fornæs (JSP).

Gjerrild melder sig med 83 trækkende ex i perioden 9/3-15/4 (GF).

Antal indsendere: 16. Antal obs: 18. Månedfordeling, se næste side

Sortand (Melanitta nigra)

En enkelt at de 16 indsendere så 19/6 3 han + 1 hun i Juul Sø (JB)!!

Det kan vel kaldes en værdig opfølger af sidste års mange indlandsobs. Desuden sås 15/3 1 han i Gudenåen ml. Silkeborg og Resenbro (SFP).

Fra de resterende 35 obs skal kun følgende nævnes: Perioden 6/3-21/5 gav 3923 trk ex ved Gjerrild (GF). Mens der allerede 9/2 rastede ca 4200 ved Gjerrild Nordstrand og Gjerrild Klint (JSP). 29/11 3-4000 trk N ved Fornæs (JOS) og 30/11 sås samme sted 4600 trk S + 1200 trk N (PL). Der er sikkert mulighed for overlap. Månedfordeling se næste side

Fløjlsand (Melanitta fusca)

1986 gav ingen sommerfund blandt de 31 obs.

Store forekomster (over 100): 14/2 400 Ebeltoft Færgenhavn (SKH), 22/2 ca 1500 rst Issehoved og samme dag ca 150 rst ud for kysten ved Mårup Bakker, også Samsø (begge obs (SD), 24/2 1500 rst syd for Samsø (SD), 6/3 220 trk Kysing Næs (HLL) og 8/3 110 i Østhavnen, Århus (NR).

Fra 7/3-28/5 568 trk ved Gjerrild (GF).

Månedfordeling, se næste side Antal indsendere: 15.

Hvinand (Bucephala clangula)

Sommerfund: 1/6 1 hun Ringsø og 1 han i et lille hul ml. Ramten og Dystrup (SH), 7/6 1 han + 2 hun Grund Fjord (Fla), 29/6 2 hun Kysing Fjord (LPJ), 7/7 2 han Lille sø v/ Vindskov (FF), 11/7 3 hun Brabrand Sø (AJ), 14/7 og 17/7 4 ex Frederiksdal Hede (SFP) og endelig 28/7 og 29/7 hhv 3 og 1 dronningborg Brodning (LTP). Det er vist en rekord med så mange sommerfund. I hvert tilfælde siden '83!

De største vinterforekomster (over 250): 9/2 446 Horskær (LPJ), 1/3 ca 2000 Ma-

riager Fjord ved Saltværket (HeP), 9/3 750 Råby Odde (JP), 16/3 3-400 ved Alrø (SH) og 2. halvårs eneste større obs 7/12 615 også ved Alrø (HP).

Antal indsendere: 24. Antal obs: 194.

Samlet månedsfordeling excl GF og total incl GF.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ederfugl :	20	25000	6050	8500	276	3206	130	40	0	1000	14650	5115
Havtil :	0	40	12	3	0	0	0	0	0	0	16	19
Sortand :	0	4330	226	150	0	4	0	0	76	31	5800	36
Fløjsand:	0	1782	373	20	0	0	0	0	12	2	2	7
Hvinand :	582	732	3574	410	28	7	12	5	14	60	298	895

Lille Skallesluger (Merqus albellus)

Utroligt mange har indsendt observationer for 86. Igen er det 1. halvår, der vægter mest.

Kysing Fjord: (se figur) Max 5/1 10 ex (7 hun, 3 han) (PL-AJ, OGJ, HLL), 9/2 slår alle rekorder med 21 ex i isvåge (NR)! 6/3 4 han og 3 hun (HLL), 31/3 7 han, 3 hun (JC).

Brabrand Sø: 17/3, 18/3 og 19/3 1 ad han (hhv. LB, LLH og TB), 21/12 3 hun (TB).


Stodstrupværket: 23/2 2 han (JOS), 2/3 3 han, 1 hun (PL).

Alle øvrige: 1/3 3 han ved Alrø (HP), 3/3 1 hun trk S Grenå Havn (JNK), 16/3 1 par Fjellerup/Bønnerup Strand (JP), 28/3 1 han trk N ved Moesgård Strand (HLL, HP), 6/4 2 han ved Helgenæs (første obs fra dette område) (JTL).

Et meget usædvanligt obs fant sted, da (JRR) d. 14/6 så 1 ad han i Mørke Kær!!

Bemærkelsesværdig parallel iagttagelse til 18/6-1981 1 han Bjerregrav Mose (ØBF). 30/12 1 hun i Gudenåen v/Randers (LTP).

Antal indsendere: 52. Antal obs: 29.




Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*)

Ynglefund: Hov Røn 1 par (Lok), 5-8 par Stavns Fjord (LøB), 15/7 flere hunner m. pulli Kysing Fjord (SFP) og 27/7 2 hun m. 14 pull Kysing Fjord (LPJ), 10/8 1 hun m. 1 pull Alrø Egehoved (LPJ) og 22/8 1 hun m. 7 pull Alrø poller (AJ).

Årets største forekomster (over 50): 22/2 min 300 Issehoved og 24/2 min 1500 ex syd for Samsø (begge obs SD), er meget store, 8/3 90 ex Århus Østhavn (NR), 31/3 50 rst Kysing Strand (E1), 26/10 200 ex ved Fjellerup/Bønnerup Strand (JP).
Fra forårstrækket ved Gjerrild sås mellem 6/3-21/5 1128 ex (GF).

Antal indsendere: 20. Antal obs: 87.

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*)


Ingen indsendte sommerfund for 1986. Men mange obs.


Største samlinger (over 200): 4/1 260 Kalsemade (SH), 26/1 290 Horskær (HFj), 1/3 200 Alrø (HP), 300 rst Kysing Næs (LB) og 225 Mariager Fjord ved Saltværket (HcP), 9/3 250 Råby Odde (JP) og årets max 610 ex Kysing Fjord (NR), 21/3 200 Grund Fjord (FFa), 23/12 250 Ørnsø (SFP). (se figur).

Antal indsendere: 29. Antal obs: 349.

Hvidkindet Skarveand (*Oxyura jamaicensis*)

Se appendix I.





ROVFUGLE

For 1986 er der mange fine yngleoptyællinger fra (Lok) og der er udgivet artikler om Duehøg og Hvepsevåge i Århus amt i ØBF's blad Gejrfuglen 1987 nr. 1 og 2 af (JTI.). Samme forfatter har udgivet en rapport om den ynglende rovfuglebestand i et område vest for Århus og på Helgenæs, samt endnu en rapport om vinterens rovfuglebestand i området. Yngleoptyællingerne fortsættes i 1987 og 1988. Rovfuglegruppens blad, Accipiter, er tilgængeligt på Sølyst og på Århus Kommunebibliotek. Fra træktiden imponerer det stigende antal Vandrefalke. Igen i år sås et nordgående rovfugletræk på Samsø i efteråret - denne gang af Hvepsevåger.

Indrapporteringen fra Gjerrild Fuglestation var desværre mangelfuld. For de fleste rovfugle modtog vi kun årets totalsum og trækkets første og sidste dage uden angivelse af max-dage. Der er intet oplyst om Hvepsevåge, Hedehøg, Lærkefalk og Tårnfalk. Oplysningerne fra (GF) har derfor ikke kunnet indarbejdes i hverken uge- eller månedsfordelinger og har ikke bidraget til vor fænologiske indsigt i rovfuglenes forekomst i amtet. For at lappe lidt på denne tilstand er årstotalen fra (GF) sammenlignet med middeltallet fra Skagen 1973-1982 (Fugle i Skagen '83). Det er forhåbentlig interessant, men læseren bør selv overveje tallenes sammenlignelighed.

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

En god yngleregistrering, men i øvrigt en indberetning på 187 ex. Der er nærmest ingen forårstræktagtelser nogetsteds, og fra (GF) er der intet materiale. (Vedr. ynglefuglene er obsforholdene formentlig som nævnt under Duehøg). Et enestående efterårstræk kunne ses på Samsø.

Indsendere: 27. Lokalteter: 50, heraf 22 ynglelokaliteter.

God dækning i Århus- og Midtjyske område, ellers ringe og meget ringe dækning.

Yngel: Fussingskovene 1, Nørre- og Ulstrup Skov 1, Lillering Skov 1, Granslev Å-

dal 0-1, Tovstrup Østerskov 0-1, Mølleskov 0-1, Skivholme Skov 2, Baskær Skov 1, Lyngbygd. Ådal 0-1, Vesterskov 1, Kokær 0-1 (Lok), Moesgård Skov 0-1 (LB), Gjærn Bakker 1, Thorsø Bakker 1, Silkeborg Sønderoskov 3, Silkeborg Østerskov 1, Silkeborg Nordoskov 1 (PMc), Velling Skov 1 (JTL), Ansø Enge 1 (BRS, JTL), Bryrup 0-1 (JB), Skov ved Gjesing 1 (NH), Pøtsø 0-1 (JCN).

Træk: Første 3/5 1 N Stødov, Helgenæs (JTL), 9/5 1 V Viby Ringvej, Århus (LB) og 1 S Malling (MCR). Sidste 31/8 1 S Norsminde Fjord (LB) og 1 SV Vorup (LIP), 9/9 1 Funderholme (LCN), 13/9 1 Tirstrup Lufthavn (JCN). Se desuden nedenfor.

Forårets træksteder, alle obs: Gjerrild: 14/5 3 N (HC). Moesgård: 17/5 5 (BHJ), 20/5 1 (NR), 22/5 12 N (OGJ). Hesselholm: 18/5 1 S (SD), 19/5 3 N (LeB). Helgenæs: 3/5 1 N, 17/5 2 N (JTL), 22/5 1 (AJ). Risskov: 17/5 1 N, 22/5 2 N, 28/5 2 V, 22/6 1 N + 5 V (HLL). Anholt: 19/5 1, 20/5 2 (HE, JS).

Efterårets træk på Samsø: 12/9 58 NV Hesselholm, 2 NV Mårup Skov og 13/9 2 NV Hesselholm (SD). Trækretningen og de enestående høje tal er i høj grad bemærkelsesværdige. Rapportens trofaste læsere vil dog nikke genkendende til mønstret med et nordgående efterårstræk for især Musvåge, der af og til kan ses på Nordsamsø og Helgenæs. På landsplan er tallene selvfølgelig små, men de er opsigtsvækkende i vort amt. Tilsyneladende har de jyske/århusianske ornitologer ikke bemærket noget træk fredag d. 12/9, ærgerligt, ikke sandt?

Sort Glente (Milvus migrans)

4 ex indberettet og alle fra foråret. Et normalt antal i 1980'erne.

11/5 1 trk f.-SV Gjerrild (GF, TB), 17/5 1 ad N Brabrand (LB), 22/5 1 Birkelyng, Ry (via ET), 26/5 1 trk f.-SØ Gjerrild (GF).

Rød Glente (Milvus milvus)

54 ex er, foruden ynglefundene, jagttaget. 27 lokaliteter.

Der er tale om det største antal obs nogensinde gældende for alle årstiderne med undtagelse af vinteren. 4-6 par hævdede territorium, 1 par gennemgik ynglecyklus. Et andet par blev som bekendt udsat for en blødderforgiftning (Århus Stiftstidende i april md), så hunnen og 3 flyvefærdige unger døde. I oktober blev det meddelt at en Rød Glente var skudt ned nær Falling (LPJ). Således blev 1986 det lykkeligste og samtidigt det mest tragiske år for amtets genindvandrede Røde Glenter. Ynglefund bør meldes til Rovfuglegruppen.

Af hensyn til artens sikkerhed bringes kun et udpluk af obs:

Forår: Første obs: 16/2 ynglepar på sidste års redested (Sonja Kornerup i FUGLE). Træk: Gjerrild 17/3-22/5 15-17 trk (GF). Århus området: 24/3 1 NNV Moesgård (JTL, BHJ), 28/3 1 S Århus Havn (AM), 28/3 1 S Moesgård (HP, HLL), 30/3 1 S - ret Moesgård (OGJ), 6/4 1 Brabrand (via JTL), 11/4 1 N Moesgård (HeC, TKC, LW).

Efterår, alle obs: 28/9 1 indtrk Kysing Næs (OGJ, LB), 1/10 1 S Grenå (Peter Kanne), 17/10 1 Brabrand (via JTL), 29/10 1 Fulden (NR).

Månedsfordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	2	7	9	15	1	3	0	1	4	0	0

Havørn (Haliaeetus albicilla)


3 obs, heraf 1 ad ex. Jagttagelserne er gjort i det sene forår og i sensommeren, hvilket for alles vedkommende er lidt udenfor det normale.

Med maj 1 ad Odder (via Erik Borg), 26/7 1 2-3K Stubbe Sø (HC), 24/8 1 imm/2K Ulstrup mose (AJ).

Rørhøg (*Circus aeruginosus*)

Usædvanligt mange iagttagelser - 306. I 1986 er Rørhøg set på en række lokaliteter inde i landet.

Yngel: Dystrup-Ramten Søer 0-1, Brabrand Sø 1, Sminge Sø 0-1, Tingvad Kær 1, Hinge Sø 1 (lok). Desuden Tranemosen 1, Krøgemosen 1-3 (ChL, LeB).



Forårstræk: Første 30/3 1 hun Brabrand Sø (BHJ), 31/3 1 han Brabrand Sø (SH, AJ) og 1 brun (TB). Gjerrild: 10/4-6/6 104 trk (GF), dette tal uddybes af et par store obs 19/4 2 han+2 hun (JSP), 9/5 6 Ø (HC). Moesgård: 20/4 1 hun (LW), 26/4 1 han+1 hun N (HP, JTL, BH), 1/5 1 han (LW, HLL, MCR), 14/5 1 brun N (HLL). Risskov: 20/4 2 trk, 27/4 1 NØ, 24/5 1 brun trk (HLL). Helgenæs: 9/5 3 V+1 SV, 11/5 1 N, 18/5 1 brun rst, 19/5 2 S-SV (JTL). Nordsamsø: 19/4 1 trkf (ChL).

Efterårstræk: Sidste 9/9 1 hun Brabrand Sø (JM), 13/9 1 hun Hesselholm (SD), 17/9 1 Spørring (LTP) samt en efternøler 12/10 1 ad han Sødringkær (JRR, AJ).

Prikkortet viser forekomsten i maj, juni, juli måned samt ynglefund. Der er indskudt april-obs, såfremt der var obs af Rørhøg i maj, juni eller juli - øvrige april-obs er udeladt.

Indsendere: 45. Lokaliteter: 50. Obssteder: Vådområder med rørskov, fouragering over kornmarker og træksteder.

Månedsfordeling excl (GF): (1) = total Brabrand Sø.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	0	0	3	61	79	9	18	40	5	1	0	0
(1)	0	0	3	25	17	1	1	2	1	0	0	0

Blå Kørhøg (Circus cyaneus)

205 iagttagelser, sædvanlig dækning. I det midtjyske er der kun 1 obs V f. Gudenaen. Udbredelse som Fjeldvåge, i kystnære områder, i de østjyske tunneldalssystemer og moseområder. I et østjysk underøsgelsesområde viste det sig at Blå Kørhøg ikke var en årlig vintergæst. Der var præference for eng, rørskov samt en stor stubmark (JTL).

Forårstræk: Gjerrild: 19/3-26/5 125 trk. Middeltallet for Skagen 1973-82 er 196 trk. Moesgård: 20/4 1 ad hun, 25/4 1 brun (LW). Risskov: 14/4 1 brun N, 20/4 1 brun N (HLL). Nordsamsø: 4/4 1 brun indtrk ØSØ Ballebjerg (SD), 19/4 1 brun Issehoved, 25/4 1 brun Issehoved (CHL). Helgenæs: 3/5 1 hun, 1 han N, 4/5 1 brun N, 9/5 1 brun (JTL). Anholt: 19/5 1 brun, 20/5 1 han, 21/5 1 imm han, 22/5 1 han+1 hun, 28/5 1 subad han (JS, HE).

Efterårstræk: Første: 13/9 1 ad hun Sødringholm (HP), 17/9 1 brun Kolindsund (Birgitte Poulsen via IB) og sidste obs 5/10 2 indtrk Bønnerup Strand (GG).

Indsendere: 34. Lokalteter: 30. Obssteder: Se ovenfor. Md.fordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	7	3	25	19	0	0	0	2	19	2	6

Hedeheg (Circus pygargus)

Et normalt år med 3 iagttagelser fra foråret. Ingen fra Gjerrild (GF) er måske uventet, men i år kan det jo skyldes manglende indrapportering.

9/5 1 hun rst v/Framlev Korsvej (TB), 18/5 1 2K Salten Langsø, vestenden (LB), 20/5 1 2K SØ Ilørret Enge (BHJ).

Duehøg (Accipiter gentilis)

59 iagttagelser er lidt mindre end tidligere år, men der er indkommet meddelelser om en række ynglefund, 12-17 par i alt, så mængden af oplysninger om Duehøg er stigende. Det er forbavsende så lidt arten ses i betragtning af dens udbredelse. I amtets vestlige del, i de store skovområder, er der kendskab til 11-13 reder. Alligevel ses kun få omkringflyvende Duehøge i dette område. En generel slutning må være, at Duehøg nok er noget overset i amtet. Bemærk antallet af obs-lokaliteter i forhold til antallet af ynglelokaliteter/territorier.

Yngel: Se ovenfor.

Træk, alle obs: Gjerrild: 18/3-7/5 8 trk (GF). Moesgård: 6/3 1 N (LW), 18/3 1 N (JTL), 24/3 1 ad hun N (BHJ, JTL), 28/3 1 ad hun NV (HP, HLL), 9/5 1 hun indtrk NV (HP).

Indsendere: 30. Lokalteter: 38, heraf 17 ynglelokaliteter. Md.fordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1	10	9	7	2	0	3	3	5	6	1

Spurvehøg (Accipiter nisus)

1088 iagttagelser. Fortrinsvis træk- og ynglefund. Ringe dækning.

Yngel: 44-55 par på 44 lokaliteter (Lok).

Forårstræk: Gjerrild: 19/3-27/5 809 trk (GF), et par store dage belyser dette: 13/4 15 trkf, 10 rst (TB), 3/5 23 Ø-NØ (HP, GG). Middeltallet for Skagen 1973-82 er 2375. Moesgård: 18/3-1/5 79 trk. Marts: 20, apr: 47, maj: 12. Dage over 10: 12/4 17 N (LW, MCR, JTL), 20/4 16 N (LW, JOS), 1/5 12 N (LW, MCR). Risskov, 2 obs-dage: 5/4 6 trk, 20/4 32 trk (HLL). Issehoved, 2 obs-dage: 18/4 8 NV, 19/4 54 NV (CHL).

Efterårstræk, alle obs: Sletterhage: 6/10 1 trk + 1 trk (LPJ), 23/10 6 S + 24/10 8 S (JTL). Kysing Næs: 5/10 2 indtrk (EF), 26/10 1 indtrk (TKC, ET), 9/11 1 ind-

trk (TKC, ET).

Indsendere: 26. Lokaliteter: 86. Månedsfordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	3	29	195	47	0	2	2	0	26	8	9

Musvåge (*Buteo buteo buteo*)

Yngel: 71-78 par på 58 lokaliteter (Lok, BHJ, JCN, CT).

Forår: Gjerrild: 17/3-1/6 2.054 trk (GF), et udpluk fra andres store dage: 27/3 121 trkf (AJ, HLL), 3/5 70 SØ trkf (HP), 11/5 75 trkf (IB). Moesgård, 21 obsdage: 15/3-17/5 840 trk. Marts: 450, april: 332, maj: 58; dage over 50: 18/3 20 N+30 S (LW), 21/3 221 N (MCR, LW), 26/3 55N(HP, HeC), 1/4 75 N (TKC, HeC, LW), 5/4 50 N (JOS, LW), 12/4 60 N (MCR, JTL, TKC, HeC, LW, OGJ, IB), 20/4 75 N (LW, JOS), 1/5 54 N (MCR, LW). Risskov, 4 obs-dage: 18/3-20/4 156 trk, størst 20/4 121 trk (HLL). Nordsamsø, 8 obs-dage: 24/3-25/5 54 trk NV-N-NØ, størst 19/4 23 NV (ChL). Helgenæs, 2 obs-dage: 9/5 101 SV, 17/5 89 V (JTL). Anholt, 6 obs-dage: 18/5-27/5 13 trk (HE, JS).

Efterår: Samsø: 13/9 2 NV (SD), 11/10 83 N, 12/10 7 N, 13/10 6 NV, 17/10 12 NV og 4 trk (LeB), 15/10 9-10 indtrk Lushage (LeB). I øvrigt 26/9 5 SV Kysing Fjord (PL), 5/10 10 indtrk N f. Kysing Næs (ET). Store obs: 25/9 13 rst/trk NNV Pinds Mølleådal (ET), 8/10 10 Kysing Fjord (PBU), 11/10 13 Linå Enge (PMc).

Vinter, store obs: 25/1 7 Tinning Skov (AJ), 2/2 8 Funderholme (PMc), 22/2-24/2 min 22 på hele Samsø (SD).

Indsendere: 33. Lokaliteter: "ses overalt". Totalsum: 4.127. Md.fordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
64	62	695	682	544	17	8	18	38	194	41	24

Østlig Musvåge (*B. b. intermedius*)

(nomenklatur: Dybbro, oversigt over Danmarks Fugle 1978).

Kun 3 jagttagelser. Man kunne passende bemærke at Musvåge både kan race- og aldersbestemmes.

24/4 1 N Skanseparken, Århus (NÅ), 26/4 1 Moesgård (JTL), 1 Fillemandsbjerget, Helgenæs (JTL).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*)

416 jagttagelser - tallet er øget år for år. Fjeldvåge ses, som ventet, oftest i kystegne og i de østjyske tunneldalssystemer. I det Midtjyske er der kun en obs vest for Gudenådalene. God dækning.

Forårstræk: Gjerrild: 18/3-27/5 237 trk (GF). Moesgård: 8/3-1/5 10 ex trk/rst. max 30/4 2 (FF, LB, MCR, BHJ, JTL, OGJ, TKC, LW, HeC, HP, HLL). Risskov: 18/3-20/4 3 trk (HLL). Nordsamsø (Isschoved, Kragemosen, Hesselholm): 26/3-25/5 16 trk (ChL, SD, LeB) max-dage 26/3 3, 28/3 2, 19/4 4, 25/5 3. Forårets sidste: 25/5 3 Kragemosen, Samsø (ChL), 27/5 ? (GF).

Efterårets første: 31/8 1 Stubbe Sø (AM), 13/9 1 Sødringholm Enge (HeP), 24/9 1 Fløjstrup (HLL), 28/9 1 Norsminde Fjord (OGJ, LB).

Indsendere: 38. Lokaliteter: 67. Obssteder: Se ovenfor. Månedsfordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
12	11	32	28	21	0	0	1	3	30	16	14

Stor Skrigørn (*Aquila clanga*)

25/8 1 Hesselholm Møde, Samsø (LeB). Godkendt af SU.

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*)

2 ex er indrapporteret, heraf blev den ene set et par dage i foråret, mens den anden blev fundet ilanddrevet ved Ballen, Samsø (Lars Therkelsen) i efteråret.

12/4 + 13/4 + 1 2-3K Ø Gjerrild (GF, LB, TB, CEM). (Se også Ubest. Ørn). 26/10 i 1-2K død Ballen Strand (Lars Therkelsen).

Ubestemt Ørn (*Aquila chrysaetos* ?)

14/4 i Gjerrild (JSP) antageligt en ung Kongeørn, set dagene forud.

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*)

I alt 213 iagttagelser foruden et muligt ynglepar. Det største antal nogensinde, også mhl sommerobs. Rimelig god dækning af amtet undtagen de nordligste dele ved Randers- og Mariager Fjorde.

Forårstræk: Første: 5/4 set ved Gjerrild (GF) + 1 N Malling (OGJ).

Gjerrild: 5/4-6/6 120 trk (GF). Andre bidragydere uddyber dette tal med nogle store dage: 16/4 9 (LPJ), 19/4 9 (JSP). Middeltallet for trækket ved Skagen er 190 for perioden 1973-82.

Århus området, alle obs (Moesgård, Risskov, Brabrand Sø): 20/4-27/4: 5-7 trk (LW, BHJ, JTL, HLL, Vagn Jacobsen via AJ). 14/5 i Brabrand Sø (KeH).

Nordsamsø: 19/4 1 + 25/4 1 (ChL). Helgenæs: 2/5 1, 4/5 1, 9/5 2 (JTL).

Efterårstræk: Sidste: 13/9 i Brabrand Sø (Per Loft via AJ), med sept i Grund Fjord (FFa), 16/9 og 26/9 i Silkeborg Vesterskov (JCN). Alle obs over 1 ex: 22/8 2 Ørnsø (SFP), 31/8 3 S Kysing Næs (OGJ, LB).

Indsendere: 32. Lokalteter 36. Obs-steder: Sø- og fjordlokaliteter samt træksteder.

Månedsfordeling (excl GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	45	14	5	6	16	7	0	0	0

Falk sp. (*Falco sp.*)

26/3 i N Hadsten st. (HeP), sikkert en Vandrefalk.

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*)

Bestanden af Tårnfalk er vigende i disse år. Indrapporteringerne er vigtige til belysning af denne situation. 337 iagttagelser, foruden 25-30 ynglefund. Ynglefund er vanskelige at dokumentere, hvorfor vi er meget glade for alle sommerobs.

Yngel: Der er dokumentation for at der i Århus amt er en tæt bestand i nogle områder f.eks. Helgenæs, mens der i andre områder kan være meget langt mellem parrene f.eks. i område NV og V for Århus (JTL).

Træk: Moesgård: 4/4 i N (LW), 12/4 2 N (MCR, LW), 20/4 2 rst (LW), 1/5 i N (LW), 17/5 i N (BHJ).

Indsendere: 44. Lokalteter: 111 + 25-30 ynglelokaliteter.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
26	17	24	46	30	19	26	20	22	31	39	37

Aftenfalk (*Falco vespertinus*)

Forår: 12/5 i ad han fou Dalbyover (HC).

Efterår: 30/7 i ad han Alrø (SFP, PMc), 10/8 i hun/imm V fander-Mårslet (BHJ).

Dværgfalk (*Falco columbarius*)

Et meget stort år med 130 ex. Ved Gjerrild trak totalt 85 mod 60 i 1985. Til sammenligning er årsgennemsnittet fra Skagen 1973-1982 393.

22 indsendere fra en række forskellige lokaliteter i modsætning til tidligere år,

hvor trækstederne nærmest havde monopol.

Trækstederne: Forår: Gjerrild: 11/4-26/5 85 trk (GF), med forårets sidste obs. Moesgård: 30/3-1/5 5 trk. Risskov: 25/4-4/5 5 trk (HLL).

Efterår: Sletterhage 22/10-25/10 4 trk (JTL). Første 12/9 1 S Kanehave, Samsø (SD), 18/9 1 rst Adslev (ET).

Månedsfordeling (excl GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	2	2	18	12	0	0	0	4	7	1	1


DVÆRGFALK

Forår ●1, ●3, ●5

Efterår ○1, ○4

Vinter x1

n=127



Lærkefalk (*Falco subbuteo*)

19 ex fordelt på 14 fra foråret og 5 fra efteråret. Ingen tal fra GF. Flere efterårsobs end normalt og igen 1 obs fra pr okt. Alle nævnes.

Forår: 4/5 1 N Stødov, Helgenæs (JTL) + 1 rst Savmølle Skov (AJ) + 1 Vadestødet, Salten Langsø (JK), 7/5 1 trk Risskov (HLL), 9/5 2 N Stødov (JTL) + 1 rst-N Constantinsborg (TB), 11/5 1 rst Hestehaveskoven, Kalø (JIL), 12/5 2 fou Gjerrild (HC), 14/5 1 N Moesgård (HLL), 17/5 1 VSV Issehoved (SD, LeB), 3/6 1 Gjerrild Nordstrand (KeH), 12/6 1 Malling Mose (MCR).

Efterår: 30/8 1 Hesselholm (LeB) og 1 imm fou Skanseparken, Århus (NÅ), 6/9 1 fou Sletterhage (JTL), 7/9 1 Salten Langsø (GG), 5/10 1 Norsminde (CFM). Den sidste er sen.

Lærke-/Aftenfalk (*Falco subbuteo/vespertinus*)
4/5 i Ellemandsbjerget, Helgenæs (JIL).

Slagfalk (*Falco cherrug*)
Se appendix I.

Jaglfalk (*Falco rusticolus*)
Se appendix I.


Vandrefalk (*Falco peregrinus*)

8-9 jagttagelser med klar overvægt fra foråret. Alle obs nævnes.

Forårstræk: Gjerrild: 26/4-3/5 3-4 trk (GF).

Øvrige: 23/3 i SV Katholm Skov (ØBF), 3/5 i ad Gjerrild (CEM), 9/5 i ad Brabrand Sø (LB).

Efterår: 15/9 i ad hun med læderstropper rst Sødringholm Enge - trk senere ned i Randers Fjord (HeP), 16/11 i ad han rst Besser Rev (SD).



FASANFUGLEAgerhøne (*Perdix perdix*)

Fundene fordeler sig over hele året, dog flest fra vinterhalvåret.

Stort set ingen sikre ynglefund, så en bestandsopgørelse er umulig. Der udsættes sandsynligvis en del i amtet, men hvor og hvor mange vides ikke. Kender nogen blandt læserne til oplysninger om dette, hører vi meget gerne derom (antal, tid og sted).

Største flokke blev: 11/1 24 Constantinsborg Enge (LB), samt 20/2 23 Studstrup (LW).

Total: 633 ex. Antal indsendere: 30.

Månedsfordeling (1) samt den gns. flokstørrelse (2) pr. måned:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	56	61	42	48	71	8	13	42	59	47	49	137
2	9,3	12,2	2,6	2,5	2,4	1,6	2,2	14,0	11,8	9,4	12,3	9,8

Gns. flokstørrelse for året 1986: 7,5.

Vagtel (*Coturnix coturnix*)

Er nu for 3. år i træk set i amtet.

Hele 2 ex: 31/5-1/6 1 sy Hyllested Mose (SKH), 2/6 1 Åbo (medd. af Ole Richter via ET).

Fasan (*Phasianus colchicus*)

Kun ganske få indrapporteringer af det tamme kræ.

Vi henviser til jagtstatistikkerne.

VANDHØNSVandrikse (*Rallus aquaticus*)

Artens ynglestatus er vanskelig, da der kun er få sikre y-fund men mange obs på egnede steder i træktiden.

Er set eller hørt i perioden ult april-juli flg. steder:

Brabrand Sø (max 3 h), Bjerregrav Mose (max 2 h), Tunø (1 ex), Engetved Sø (1 ex), Kvindsø, Bryrup (1 ex), Kragemosen, Samsø (1 ex), Sminge Sø, Silkeborg Langsø, Gudeåen ml. Svostrup og Silkeborg, Norsminde Fjord (max 3 juv + 1 ad), Kæret, Anholt (max 2), Ring Søerne (1 ex), Dystrup Sø (1 ex), Mørke Kær (1 ex), Astrup Mose (1 ex) (Lok, BHJ, JSP, SH, JS + HE, JTL, CEM, AJ, LB, BeH, ET, HLL, MCR, NH, JRR, LTP, PMc, JP, SD, JB).

Træk: De 3 første obs: 26/3 1 h Brabrand Sø (LB), 29/3 3 Skaføgård (JTL) samt 4/4 1 Helgenæs (JTL).

En del efterårsfugle. Alle nævnes: 23/8 1 Kasted Mose (SH) + 3 juv Brabrand Sø (CEM) + 1 Romalt Enge (JP), 24/8-15/10 1-4 ex Norsminde Fjord (max 10/9 1 ad + 3 juv) (LB, HeC, BHJ) samt 27/9 1 Klostermølle (NR) er vel i Vejle amt. Mange af disse kan også være lokale ynglefugle . . . !?

Eneste vinterfund er: 4/2 1 Brabrand Sø (LLH).

Total: min 35, frasorteret de værste gengangere. Antal indsendere: 23.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	1	6	22	39	3	0	11	8	2	0	0

Pløttet Rørvagtøl (Porzana porzana)

En art med store variationer i forekomsten fra år til år. Er de sidste 10 år set med 0-11 ex pr. år.

Årets 2-3 ex er: 1/5 1 h Gonge, Brabrand Sø (TB), 6/5-7/5 1 h Brabrand Sø, vestenden (JTL, OGJ, TB), 28/6 1 h Helgenæs (JTL).

Engsnarre (Crex crex)

Er forekommet i amtet de sidste 6 år i træk.

Alle nævnes: 25/5 1 Kongsø Plantage (TB), 26/5-28/5 1 h Harlev/Framlev (JTL, OGJ, TB, CCM), 20/6-15/7 1 han Skovsrod v. Tulstrup (JK), -/86 1 par Sminge Sø (PMc), samt sidste 24/10 1 Sminge Sø (PMc).

Iagttagelserne fra Tulstrup og Sminge kunne tyde på yngel.

Dens foretrukne opholdssted - dyrkede områder - gør, at den nok er noget overset. Hør/se godt efter derude.

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)

Stadig få indrapporteringer af denne oversete art. Dog har vi i år fået et stort antal y-par fra (Lok):

Yngel: 1 alt 91-105 par fra 22 lokaliteter (Lok, PMc, JP, PER).

Største antal fra: Brabrand Sø (40 par), Kasted-Geding Mose (8-10), Gudenåen ml. Svostrup og Silkeborg (6-10 par), samt Mørke Kær (5 par). Alle (Lok). Resten af lokaliteterne med under 5 par. Der mangler dog ynglefund fra de nordlige og sydlige dele af amtet, der er således ingen y-fund nord for Randers og syd for Århus.

Det "løse" giver min 114 ex fra 8 indsendere, alle fra vinter og forår. Ingen sommerfund!

Alle vinterfund (dec-feb) nævnes: Jan-pr marts 10-25 ex Silkeborg Langsø (SFP, PMc), 16/1 3 Botanisk Have, Århus (NA), 1/2 12 og 16/2 8 Vasen/Kongslund (JP), 26/2 "set" Brabrand Sø (AM), samt endelig ca 20/12 20 Universitetsparken (NA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
13	31	29	14	4	0	0	0	0	0	2	20

Blishøne (Fulica atra)

Mange indrapporteringer i år og også mange ynglepar, dog hovedsageligt takket være (Lok).

Yngel: ca 225 y-par fra 25 lokaliteter (Lok, PER, AJ, SH).

Alle lok med over 10 par nævnes: Brabrand Sø (50-55), Gudenåen ml. Svostrup og Silkeborg (21), Mørke Kær (18-23), Sminge Sø (13-19), Fussing Sø (15), Silkeborg Langsø (15), Kvottrup Mose (10-12) og Ramten-Dystrup Sø (10) (Lok, PER, AJ, SH).

Fra vinteren og foråret store tal fra Mariager Fjord ved Dania og Assens samt vågerne ved Saltværket: 1/1 2500 (JP), 22/2 1300 (SH), 1/3 ca 6000 (HeP), 2/3 5000 (JP) er også sidste melding herfra.

Fra Norsminde Fjord: 4/1 1000 (SH), 11/1 500 (SH), 9/2 min 1000 (NH) samt sidste forårstal herfra 3/5 120 (SH).

Kun sommertal fra ynglepladserne.

Efteråret gav store tal fra Norsminde Fjord: 24/8 2000 (TB), 26/9 1900 (PL), 8/10 2500 (PBu), 26/10 2130 (I.P.J), 26/11 2035 (PL), 2/12 ca 800 (AM) samt 25/12 300 (SH).

Derover et kolloidsomt tal fra Mariager Fjord: 19/10 10.000 Mariager Fjord/Ajstrup Bugt (JP).

Ferskvand, alle lok med over 100 nævnes: Jan-mar 100 Silkeborg Langsø (SFP), jan-mar 100-300 Brabrand Sø (max 300 22/3 + 31/3) (SH, AJ, TB m.fl), 24/8 228 Dystrup

Sø (AJ), 24/10 450 Dråby Sø (PL) samt 26/12 200 Gudenå/Randers (JP).

Total: 41179, fraregnet de mest iøjnefaldende gengangere. Antal indsendere: 25.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6126	3255	7461	807	414	162	175	3172	3477	11220	3151	1759

TRANER

Trane (Grus grus)

Alle nævnes: 27/3-5/4 1 2K Kolindsund vest for Kolind (AJ), 6/4 1 Gjerrild Nordstrand (JP, JSP), 26/4-ca 10/5 1 par Gylling Næs (medd. af E. Morville via JK), 3/5 4 markerne ved Gylling Næs (E. Morville via JK), 6/5 1 trk Malling kl. 15.51 (MCR), 7/6 1 Frederikshøj, Ajstrup Strand (NR), samt endelig et sommerfund: 27/6 3 Søholm, Kolindsund (medd. af Birgitte Poulsen via TB). Sommerfund er meget usædvanlige.

Total: 10-13. Antal indsendere: 7. Antal obs: 8.

VADEFUGLE

De fleste vadefuglearters forskellige fjerdragter og komplicerede fældningsforløb gør dem vanskelige at arts-, alders- og kønsbestemme. Med det vil være spændende med flere oplysninger om alder og køn, f.eks. kan oplysning om alder give et bedre billede af mange arters opsplittede træk i adult- og juvenilt træk. Og da stadig flere felthåndbøger ser dagens lys (sidst Shorebirds af P. Hayman et al.) vil det givet gøre vadefuglene lettere tilgængelige. Det vil forhåbentlig resultere i endnu flere indsendere og endnu flere oplysninger de kommende år.

Strandskade (Haematopus ostralegus)

Indberetning om 70 ynglepar på 8 lokaliteter.

De første ses 9/2 6 S Fornæs (JSP). Forårstrækket starter pr marts med største 1/5 100 Alrø (SH).

Sydtrækket starter med juli. Største er 30/7 min 100 Alrø (SFP) og 22/8 60 rst Bønnerup Strand (GG).

Vinterforekomster: 9/2 6 S Fornæs (JSP), 16/2 8 Glatved-Dråby (JSP), 27/2 1 rst Åkrogen, Risskov (LB), 23/12 1 Udbyhøj (HC).

Total: 1972. Antal indsendere: 27. Antal obs: 132.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	15	145	739	459	146	288	125	0	41	11	3

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Der er indrapporteret 65 ynglepar fordelt på 5 lokaliteter: Alrø (40 par), Horsker, Søby Rev, Råby Odde og Hesselholm, Samsø (Lok, SD, HFj, ML, LPJ, SFP).

Et normalt år. De første ankom 23/3 5 Alrø (UGJ). Herefter ankom ynglefuglene slag i slag. Største obs 29/6 63 Alrø (ET).

Sidste obs 23/8 2 Kysing Fjord (OGJ).

Total: 275. Antal indsendere: 15. Antal obs: 41.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	28	74	50	67	44	12	0	0	0	0

Lille Præstekrave (Charadrius dubius)

Ynglepar ved Brabrand Sø, i Lilleådalene og måske Grundfør Grusgrav og Nord for Tønderup, Samsø.

Første var 9/4 1 Brabrand Sø (AJ), hvilket gør den til den tidligst registrerede Lille Præstekrave i Århus amt.

Total: 37. Antal indsendere: 16. Antal obs: 51.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	7	5	1	16	8	0	0	0	0

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula)

Der er rapporteret om 32-36 ynglepar.

Forårstrækket starter 8/3 2 rst Kysing Fjord (LB). Største i foråret er 13/4 24 Fjellerup/Bønnerup Strand (JP).

Efterårstrækket kulminerer pr august. Største obs er 3/8 45 Fjellerup/Bønnerup Strand og 9/8 27 rst Kysing Fjord (LB).

Ingen vinterfund.

Total: 395. Antal indsendere: 28. Antal obs: 80.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	65	71	36	14	50	142	13	4	0	0

Hjejle (Pluvialis apricaria)

4-5 lokaliteter fremviser langt de fleste Hjejler: Kysing Fjord, Sødring Kær, Alrø, Kolindsund og Stavns Fjord.

Forår: Første 16/3 1 Alrø (SH), 23/3 40 Alrø og 62 Horskær (HFj m.fl.). Sidste: 28/5 1 Anholt (HE). Største: 11/5 1000 Alrø (SH).

Efterår: Første: 20/7 2 Alrø (HFj). Sidste 21/12 300 Råby Enge (HeP). Største: 12/9 1000 Alrø (HFj), 5/10 600 Frijsenborg (SMJ), 9/10 4000 Alrø (NH), 26/10 min 5000 Sødring (JP), + 3000 Kysing Fjord (OGJ, CEM, m.fl.), 9/11 1900 Kolindsund (LPJ), 16/11 8-10000 Sødring (JP) + 2415 Kolindsund (PL+EH) + 600 Besser Rev, Samsø (SD) + 300 Hesselholm, samsø (SD).

Total: 37995. Antal indsendere: 32.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	1276	1881	2499	0	22	450	2242	13327	15960	338

Strandhjejle (Pluvialis squatarola)

Kun 17 forårsfugle og 503 efterårsfugle, hvilket er en del mindre end i 1985. Fra området ved Sødringholm rapporteres 417 af 520 Strandhjejler.

Forår, alle nævnes: 15/3 1 Kysing Næs (OGJ), 11/5 12 Sødringholm (ML), 19/5 2 Kysing Fjord (LB) og 20/5 2 Kysing Fjord.

Efterår: Første: 26/7 3 Alrø (OGJ). Sidste: 26/10 3 Kysing Fjord (SH) og 25 Fjellerup (JP). Største: 10/8 120 Randers Fjord/Udbyhøj (JRR), 23/8 146 Sødring Kær (JRR), 13/9 250 Sødringholm (HP), 29/9 117 Pletten, Mariager Fjord (JRR).

Total: 520. Antal indsendere: 24. Antal obs: 50.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	1	0	16	0	8	130	257	108	0	0

Vibe (Vanellus vanellus)

Yngleforekomst: Ca 115 par er indrapporteret. Brabrand Sø 52-54 par, Alrø 10 par, Kasted-Geding Mose 7-8 par, Sødringholm 6-7 par, Gudenå ml. Svøstrup og Silkeborg

17 par og Stilling Sø 6-7 par (Lok, AJ, SH, HE m.fl.).

Forår: Første 8/3 1 Dronningborg Bredning (LTP). Største 18/3 88 ØNØ Moesgård (LW+JTL).

Efterår: Største 26/10 1009 Kysing Fjord (LPJ), 9/11 min 1000 Kysing Fjord (JTL+ET)). Fra 24/9-13/11 iagttag (ET) 100-350 på efterårsrasteplass ved Dørup-Hørning.

Total: 18008. Antal indsendere: 34.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	803	828	655	165	470	1767	2791	5552	4230	747

Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Et år med få obs.

Et sommerfund: 7/6 1 Horskær (CEM).

Fra foråret: 11/5 2 han Sødringholm (ML).

Efterår: Flest fugle ult juli/pr aug. Max 30/7 med 11 Kysing Fjord (OGJ) og 30 ved Alrø (SFP).

Et vinterfund: 30/12 2 Dejret Øhoved (JSP).

Total: 118. Antal indsendere: 17. Antal obs: 25.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	2	1	70	41	0	3	0	2

Sandløber (Calidris alba)

Kun 3 fugle har gæstet amtet i 1986: 30/7 1 ad Kysing Fjord (OGJ) og 18/8 2 rst Bønnerup Strand (GG).

Dværgryle (Calidris minuta)

Vanen tro ingen forårsfugle, og kun få fugle i efteråret.

Årets første, største og sidste: 30/7 4 Alrø (SFP), 27/8 5 Sødring Kær (LTP), 12/10 2 Kysing Fjord (OGJ, BHJ).

Total: 32. Antal indsendere: 13. Antal obs: 25.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	0	0	4	17	5	6	0	0

Temminckeryle (Calidris temminckii)

Et magert år med kun 1 fund: 27/8 1 Sødring Kær (LTP).

Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea)

Ingen forårsfund. Første: 23/7 2 ad Kysing Fjord (HLL). Sidste: 4/10 2 rst Kysing Fjord (LB).

Hovedparten af fuglene er set ved Kysing Fjord og Kysing Næs. Kun en enkelt er set udenfor: 27/7 1 Alrø Egehoved (HFJ).

Total: 28. Antal indsendere: 10. Antal obs: 18.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	0	0	3	15	8	2	0	0

Sortgrå Ryle (Calidris maritima)

Det blev ikke en gentagelse af sidste års fantastiske 5. Kun en enkelt fugl fra efteråret er indrapporteret: 14/9 1 Besser Rev, Samsø (SD).

Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Der er kun indrapporteret om 1-2 ynglepar ved Dejret Øhoved (Lok).

Forårstrækket begynder for alvor ult marts og kulminerer april/maj. Forårets max-tal er 2/4 1000 Alrø (NH) og 6/5 1000 Søby Rev (NH).

Efterårstrækket begynder pr juli og ebber ud ult nov. Efterårsmax: 19/10 1500 Sødtringholm (JP).

Mange vinterfugle.

Total: 11478. 1/halvår: 6651. 2/halvår: 4827. Indsendere: 36. Obs: 170.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
82	43	392	2938	3194	2	316	2223	248	1995	28	17

Brushane (Philomachus pugnax)

Forår: Første: 29/4 6-9 Brabrand Sø (LB+AJ). Sidste: 21/5 2 han Brabrand Sø (AJ). Største: 3/5 22 Dystrup-Ramten Sø (HP). Forårstrækket kulminerer primo maj.

Efterår: Første: 27/7 3 Kysing Fjord (LPJ). Sidste: 24/9 1 Kysing Fjord (EI). Største: 16/8 16 Østerby Mose (BHJ). Efterårstrækket kulminerer ult august.

Total: 340. Antal indsendere: 15. Antal obs: 47.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	22	179	3	3	124	9	0	0	0

Enkeltbekkasin (Lymnocyptes minimus)

Som sidste år meget få fugle. Alle nævnes: 4/1 1 Kalsemade (SH), 16/3 1 Kalsemade (SH), 27/4 1 Eskelund (KøH), 10/10 2 Kysing Fjord (LB), 24/10 1 Kysing Fjord (ØGJ) og 2/11 1 Astrup Mose (SH).

Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Der er indrapporteret om 27-36 ynglepar på 12 lokaliteter.

Første tegn på forårstræk er med marts. Største tal i foråret: 6/4 21 Brabrand Sø (AJ).

Efterårstrækket begynder ult juli med største: 14/9 min 50 S Hesselholm, Samsø (SD).

Total: 313. Antal indsendere: 20. Antal obs: 112.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	4	9	69	19	10	4	71	91	42	0	0

Tredækker (Gallinago media)

2 observationer, begge fra efteråret: 22/9 1 Kysing Fjord (IB) og 5/10 1 Kysing Fjord (CFM).

Skovsneppe (Scolopax rusticola)

5-7 ynglepar på 6 lokaliteter. Endvidere er der fra yngletiden registreret yderligere 15 Skovsnepper på 5 lokaliteter.

Første forårsfund: 6/4 1 Mårup Skov (SD).

Første efterårsfund: 31/10 2 Fussing Ø (PLR). Efterårets sidste: 27/11 2 Fussing Ø (PER). Max 18/11 10 (heraf 1 skudt) Fussing Ø (PER).

Ingen vinterfund.

Total: 42. Antal indsendere: 14. Antal obs: 32.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	3	9	8	2	5	0	0	2	13	0

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*)

16 obs af vel 10 fugle, alle nævnes: 20/4 1 Alrø poller (HFj), 26/4 1 rst sommerdragt Hesselholm, Samsø (SD), 10/5 1 Kysing Fjord (CEM), 11/5 1 Kysing Fjord (OGJ), 17/5 1 rst Brabrand Sø (LB, IB), 3/8 5 Fjellerup/Bønnerup Strand (JP), 14/10-26/10 1 Kysing Fjord (OGJ, TB, ET, LB, BHJ, LPJ, FI, SH, CEM). Sidstnævnte er en temmelig sen forekomst.


Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*)

Arten ses på få lokaliteter (Alrø og Stavns Fjord) om foråret, mens den om efteråret er mere spredt og i mindre tal.

Første og største i foråret: 23/3 21 Alrø poller (HFj), 20/4 620 Alrø Egehoved + 110 Alrø poller (HFj).

Efterårets største og sidste: 26/7 80 Alrø (OGJ), 1/10 1 Alrø Egehoved (LPJ).

Indsendere: 17. Antal obs: 68.

Lille Regnspøve (*Numenius phaeopus*)

Forårets 3 obs: 20/4 1 Alrø poller (HFj), 27/4 1 SØ Hesselholm, Samsø (SD), 8/5 23 SSV Sletterhage (JTL).

Fra efteråret meget få obs fra fastlandet: 30/7 1 Alrø (SFP), 30/8 6 Kysing Fjord (CEM), 4/9 6 Grund Fjord samt 10/9-11/9 2 Grund Fjord (FFa).

Fra Samsø (SD): Hesselholm: 26/7 23, 27/7 70 rst, 28/7 9, 29/7 12, 30/7-31/7 14, 1/8 5, 3/8 42. Østerhede: 26/7 69 rst, 27/7 50 rst, 2/8 25.

Stor Regnspøve (*Numenius arquata*)

Sommerobs: 7/6 4 Sødring Kær (JRR, AJ), 17/6 3 Grund Fjord (FFa).

Forårets første og største: 15/3 1 Brabrand Sø (SH), 25/4 167 Sødringholm (AJ).

Efterårstrækket starter ult juni med største 31/8 20 Sødringholm (BHJ).

Enkelt vinterfund: 26/1 1 Randers Fjord (FH), 30/12 11 Dejret Øhoved (JSP).

Total: 385. Antal indsendere: 25. Antal obs: 69.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	15	252	3	11	29	38	2	21	2	11

Sortklire (*Tringa erythropus*)

Forår: Første 20/4 3 Alrø poller (HFj), en uge tidligere end i 1985. Først to uger senere ses de næste, flest 4/5 6 Kysing Fjord (NÅ).

Efterår: 9/6 16 Råby Odde (ML) og 10/6 8 rst Hevring (JRR), eneste juniobs. De næste ses fra 18/7 5 Grund Fjord (FFa). Sidste 1/11 2 Kysing Fjord (OGJ). Største: 27/8 12 Sødring Kær (LTP), 13/9 20 Kysing Fjord (BHJ) og 28/9 11 1K Kysing Fjord (AJ).

Total: 246. Antal indsendere: 26. Antal obs: 60.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	3	18	24	15	91	58	35	2	0

Rødben (*Tringa totanus*)

Yngleforekomst: 24 par er indrapporteret. Flest 24/6 min 10 par Alrø (SFP). Brabrand Sø 3 par (AJ+Lok).

Forår: De første ankom 23/3 1 Amstrup Red (HFj) og 27/3 1 trk 5 Fornæs (AJ). Største 5/4 40 Hesselholm (SD) og 25/4 76 Sødringholm (AJ).

Efterår: Største 7/8 40 Kysing Fjord (PBu), 23/8 151 rst Sødring Kær (JRR), 24/8 65 Overgård (JP) og 31/8 60 Sødringholm (BHJ). Sidste blev set 28/12 1 Kysing Fjord (JFT).

Vinterforekomst: Ingen obs fra jan og feb. Fuglene fra nov og dec er alle set i Kysing Fjord. Ingen af fuglene er racebestemt, se endvidere Islandske Rødben nedenfor.

Total: 1059. Antal Indsendere: 25.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	27	244	169	77	54	385	28	48	12	15

Islandske Rødben (*Tringa totanus robusta*)

Tidligere er vinlerobs henregnet til denne race, det undgås i år.

18/10 18 rst Fornæs (HC). Dette er de eneste som er blevet racebestemt i år. De er medregnet i månedsfordelingen for Rødben. Se ovenfor.

Hvidklire (*Tringa nebularia*)

Forår: Første 20/4 1 Brabrand Sø (AJ) og 23/4 11 Alrø (HFj). Sidste: 26/5 1 Anholt (JS+ML). Største: 11/5 60 Kysing Fjord (OGJ). Forårstrækket kulminerer ult april-med maj. 25/4 19 Sødringholm (AJ) + 18 Kysing Fjord (LB), 26/4 40 Kysing Fjord (MCR) og 3/5 57 Kysing Fjord (SH).

Efterår: Første 30/6 1 Ørnsø (SFP), Sidste 26/10 1 Kysing Fjord (TKC+FT). Største 22/8 47 Alrø poller (AJ).

Total: 839. Antal indsendere: 23. Antal obs: 84.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	91	308	1	91	276	29	43	0	0

Svaloklire (*Tringa ochropus*)

Sommer: 15/6 2 Horskær (HFj).

Forår: Første 12/4 1 Gudenå, Randers (LTP) + 1 Brabrand Sø (SH). Sidste 12/5 1 Kasted Muse (SH).

Efterår: Første 5/7 1 Malling (OGJ). Sidste 1/9 1 Grund Fjord (LTP). Største: 16/7 4 Kysing Fjord (KeH), 30/7 5 Hesselholm, Samsø (SD), 23/8 8 Grund Fjord (FFA).

Vinter: 11/1 1 Kysing Fjord (SH).

Total: 88. Antal indsendere: 21. Antal obs: 46.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	0	19	1	2	25	39	1	0	0	0

Tinksmed (*Tringa glareola*)

Forår: Første 2/5 1 Brabrand Sø (AJ+LB) + 4 Brabrand Sø (BHJ). Sidste: 24/5 1 Kysing Fjord (ET). Største 11/5 53 Brabrand Sø (AJ). Største siden 1971.

Efterår: Første 24/6 2 Brabrand Sø (AJ). Sidste 30/8 1-2 Kysing Fjord (LB+MCR).

Total: 224. Antal indsendere: 14. Antal obs: 33.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	193	3	12	16	0	0	0	0

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*)

Forår: Første 23/4 1 Gudenå, Randers (JP), normal ankomst. Sidst 8/6 7 Geding Sø (FK). Største: 13/5 23 Brabrand Sø (AJ).

Efterår: Første 29/6 1 Alrø poller (ET). Sidste 16/9 1 trk Silkeborg (SFP). Største 7/8 15 Kysing Fjord (PBu).

Vinter: En meget usædvanlig vinterfugl 10/12 1 Moesgård Strand (HeC).

Total: 526. Antal indsendere: 23. Antal obs: 113.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	3	219	9	157	123	14	0	0	1

Stenvender (*Arenaria interpres*)


9 obs af 14 fugle. Alle nævnes: 4/5 1 Alrø (JWJ), 3/6 1 rst Gjerrild Nordstrand (KeH), 6/7 2 Horskær (CEM), 30/7 4 Alrø (SFP), 9/8 1 ad rst Kysing Fjord (LB, CEM), 12/8 2 Skødshoved (SEL), 31/8 2 Sødringholm (BHJ), 6/9 1 Kysing Næs (OGJ).

Odinshane (*Phalaropus lobatus*)

Igen i år et fund: 9/7 1 hun Grenå Enge (JNK). 8. fund i lokalrapportens historie.

Thorshane (*Phalaropus fulicarius*)

Se appendix I.



Indledning til gruppen af Kjøver, Måger og Terner.

For Gruppen af Kjøver, Måger og Terner er der ikke registreret væsentlige ændringer i forhold til 1985. Der er dog gjort flere iagttagelser af Dværgmåge, Gråmåge, Splitterne og Havterne end sædvanligt, mens der til gengæld er færre iagttagelser af Ride og Fjordterne. For de Kjøve-interessererede gøres der her opmærksom på Klaus Malling Olsen's guide til feltbestemmelse af de tre Kjøve-arter: Mellem-Almindelig- og Lille Kjøve. (DOF-salg ca. kr. 70.-).

Mellemkjøve (Stercorarius pomarinus)

To iagttagelser af Mellemkjøve: 18/10 1 juv rst Kysing Næs (LB, OTH) og 6/12 1 juv Kysing Næs (OGJ).

Almindelig Kjøve (Stercorarius parasiticus)

Tre iagttagelser af Almindelig Kjøve: 24/9 2 juv Kysing Næs (HLL), 26/9 1 ad mørk fase Kysing Næs (NA) og 4/10 1 juv Kysing Næs (OGJ).

Storkjøve (Stercorarius skua)

31/8 1 Issehoved, Samsø (LeB).

Dværgmåge (Larus minutus)

Der er i år iagttaget et større antal Dværgmåger end normalt for amtet, omend en iagttagelser på 9 individer 23/10 udgør stigningen. Der er i perioden 1981-1985 gennemsnitligt iagttaget 10 Dværgmåger i Århus amt.

Der er 10 iagttagelser af 22 individer.

3/5 2 Østerby Mose (OGJ), 4/5 1 2K Emborg Odde (NR), 15/8 1 juv Brabrand Sø (KH), 24/9 1K Kysing Næs (FT), 27/9 2 1K Kloster Mølle (NR), 23/10 8 ad+1 juv Kysing Næs (OGJ), 25/10 1 ad N Slettorhage (JTL), 13/12 1 ad Kysing Næs (OGJ), 14/12 3 1K Kysing Næs (OGJ) og 17/12 1 1K Kysing Næs (LB).

Hættemåge (Larus ridibundus)

Ynglefund: 25 par Overgård Plantage (JCN), 50 par v. Kragelund (JCN), 4 par Dagstrup Mose (Lok), 680 par Mørke Kær (SH), 30-35 par Sminge Sø (Lok), 150 par Frederiksdal Hede (SFP), 43 par Søby Rev (Lok), 9 par Alrø Poller (Lok), 4089 par Brabrand Sø (Lok), 25 par Huldre Mose (Lok), 100 par Ramten Dystrup Sø (Lok), 25 par lille hul v. Ramten Dystrup Sø (SH), 14 reder/par ? Lysemose (Lok), 95 par nord for Grauballe Mose (Lok), 100 par Gammel Mose (SFP), 75-100 par Grauballe mose (Lok), 20 par Udbyover Sø (Lok), ca. 5 par Smørmose (Lok), 10-20 par i mose ved Gunnerup (ny koloni) (LTP), 150 par Nørre Mose (Lok).

Stormmåge (Larus canus)

Ynglefund: 30 par Hou Røn (Lok), 170 par Søby Rev (Lok), 35 par Alrø poller (Lok), 2 par Alrø (Lok), 3 par Svanegrund (Lok), 2 par (minimum) Sangstrup Klint (HC).

Sildemåge (Larus fuscus)

Ynglefund: 15 par Hou Røn (Lok), 12 par Søby Rev (Lok), 10 par Svanegrund (Lok).

To meget tidlige iagttagelser er indkommet: 1/3 1 Egå (JT) og 7/3 1 Silkeborg Langsø (PMc).

I perioden 7-20/7 er der iagttaget mellem 10 og 18 Sildemåger ved Brabrand Sø (AJ), alle ad på nær 1-2 imm 7-8/7.

Der ønskes indsendt flere iagttagelser af Sildemåge.

Sølvmåge (Larus argentatus)

Ynglefund: 474 par Hou Røn (Lok), 158 par Søby Rev (Lok), 6 par Alrø Poller (Lok), 115 par Svanegrund (Lok).

Der er en iagttagelse af en leucistisk Sølvmåge 1-2K i Århus Havn 9-10/1 (1W, 1KC)

Hvidvinget Måge (Larus glaucooides)

Se appendix I.

Gråmåge (*Larus hyperboreus*)

En fordobling i antallet af iagttagelser, der i perioden 1981-1985 gennemsnitligt har ligget på 2-3, hvor der i 1986 blev iagttaget 6 Gråmåger.

5/1 1 2K Studstrupværket (LLH, JOS), 19/3 1 3K Irk Gjerrild (GF), 3/5 1 2K Irk Gjerrild (GF), 23/11 1 ad S Fornæs (HC), primo december 1 3K Fornæs (HC), 26/12 1 1K Århus Havn (JTL).

Svartbag (*Larus marinus*)

Ynglefund: 30 par Hou Røn (Lok), 5 par Søby Rev (Lok), 28 par Svanegrund (Lok).

Større iagttagelser (over 100): 24/2 min 100 syd for Samsø (SD), 1-6/4 min 150 Stavns Fjord (SD).

Ride (*Rissa tridactyla*)

Relativt få iagttagelser af Ride, når der ses bort fra 6/12 hvor ca. 200 passerede Kysing Næs i løbet af 1 ½ time.

4/2 1 Gjerrild (JSP), 4/4 1 ad fundet død Nord-Samsø (SD), 4/10 12 Kysing Næs (OGJ), 2/11 2 Fornæs (JNK), 23/11 31 ad S Fornæs (HC), 29/11 3 S + 1 N Fornæs (JJS), 30/11 3 S + 6 rest (PL, JSP), 6/12 ca. 200 N (på 1 ½ time) Kysing Næs (OGJ, LB), 6/12 14 Ebeltoft-Odden (HC), 7/12 14 Odden-Ebeltoft (HC), 20/12 3 Kysing Næs (OGJ), 24/12 2 N Fornæs (HC).

Månedsfordeling: feb okt nov dec
 1 12 46 233

Splitterne (*Sterna sandvicensis*)

Første og sidste: 2/4 2 Øster Hedekrog, Samsø (SD) og 26/9 2 N Kysing Næs (NÅ).

Der er 31 iagttagelser af 239 Splitterner, der er fordelt som følger:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	13	29	0	3	2	57	135	0	0	0

Fjordterne (*Sterna hirundo*)

Første og sidste: 24/4 1 Brøbrænd Sø (NR), 11/10 1 Borre Sø og 1 samme dato Julsø (JCN).

Der er 32 iagttagelser af 101 Fjordterner, der er fordelt som følger:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	1	21	0	14	51	12	2	0	0

Havterne (*Sterna paradisaea*)

Ynglefund: 148 par Søby Rev (Lok), 238 par Alrø Poller (Lok), 5-10 par Svanegrund (Lok).

Første og sidste: 13/4 1 Hou Havn (AM), 14-15/10 1 ad Iunø (NH).

Der er 17 iagttagelser af 407 Havterner, der er fordelt som følger:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	255	99	14	27	8	2	2	0	0

Havterne/Fjordterne (*Sterna paradisaea/hirundo*)

En meget sen iagttagelse: 6/12 1 Kysing Næs (OGJ)

Dværgterne (*Sterna albifrons*)

Ynglefund: 1 par Østhavnen (NR, FF, KH, NÅ), 15-20 par Anholt (JS, HE).

Første og sidste: 5/5 1 Tangkrogen (CLM), 14/8 2 Kysing Fjord (OGJ).

7 iagttagelser af 15 Dværgterner.

Sortterne (*Chlidonias niger*)

To iagttagelser af Sortterne: 11/5 2 Mørke Kær og 24/5 5 Ramten Dystrup Sø (AJ).

ALKEFUGLEAlkefugl sp. (Alcidae sp.)

Rubrikken dækker både Alk/Lomvie og Alkefugl sp. indrapporteringer.

Total: 4676 es. fra 16 indsendere er færre end forrige år. Forskellen skyldes dog nok et lavere aktivitetsniveau ved Fornæs.

Som sædvanlig dominerer Fornæs totalt med over 90% af alle fuglene. De fleste iagttagelser bærer desværre stadig tilfældighedernes præg. En mere systematisk observation ved f.eks. Fornæs og Kysing Næs vil sandsynligvis give gode resultater.

Alle nævnes:

Fornæs (4520 ex): 4/2 4 N + 2 S + 2 R, 1/11 2244 N + 86 S, 2/11 1500 trk, 16/11 33 trk, 21/11 1 N + 1 S, 23/11 49 trk, 30/11 336 N + 163 S, 14/12 9 trk, 24/12 90 trk (JSP, HP + HLL, JNK, JSt + EBO, EH, HC, JOS).

Kysing Næs (37 ex): 18/10 4 S, 26/10 4 S + 4 R, 7/11 4 N, 9/11 5 (rst?), 22/11 3 S + 3 R, 6/12 10 (rst?) (LB, LPJ, ET, TKC).

Øvrige:

11/1 (rst?) Moesgård Strand (BHJ), 19/10 6 S Sletterhage (LPJ), 2/11 30 Ø + 40 V Sangstrup Klint (JSP), 6/12 2 v. Vejro (LLH), 6/12 15 Ebeltoft-Odden (HC), 7/12 14 Odden-Ebeltoft (HC).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	8	0	0	0	0	0	0	0	18	4499	150

Lomvie (Uria aalge)

Ingen større tal. De i alt 23 ex. fra 8 indsendere er katastrofalt få. Skyldes det blot ringe aktivitet ved kysterne eller hvad sker der ??

Alle nævnes:

Kysing Næs: 4/1 1 rst, 18/10 2 S, 22/11 2 S og 6/12 1 rst (OTH, LB, BHJ).

Fornæs: 4/2 2 rst (JSP) er alt !

Øvrige: 22/2 1 Issehoved, Samsø + 1 v. Mårup, Samsø (SD), 24/2 1 syd for Samsø (SD), 2/3 1 rst Studstrupværket, i våge (PL), 6/12 6 Ebeltoft-Odden (HC), 7/12 4 Odden-Ebeltoft (HC).

Herudover et sommerfund: 22/7 1 ad rst syd for Mols (EBU). Sommerfund er usædvanlige.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	5	1	0	0	0	1	0	0	2	2	11

Alk (Alca torda)

I alt 22 ex. fra 7 indsendere er magert.

Alle nævnes:

Fornæs: 4/2 1 rst, 1/11 6 N + 2 S, 30/11 1 S + 2 N (JSP, HP).

Øvrige: 22/2 1 Issehoved, Samsø (SD), 19/10 2 S Sletterhage (LPJ), 6/12 1 rst

Kysing Næs (LB), 6/12 1 Ebeltoft-Odden (HC), 7/12 1 Odden-Ebeltoft (HC), 26/12 1 Kalundborg-Århus (JFI) samt fra de evige jagtmarker: 1-6/4 3 døde NV-kysten af Samsø (SD).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	11	4

fejst (Cepphus grylle)

I alt 33 ex. fra 13 indsendere er meget få, under halvdelen af sidste års total.

Alle nævnes:

Eneste tal fra ynglepladserne er: 14/6 12 Tunø (Beh). Er der ingen der besøger småøerne længere ??

Øvrige: 16/2 1 død Grenå Havn (JNK), 22/2 6 rst Issehoved, Samsø (SD), 1/4 1 rst

Moesgård Strand (HLL), 29/4 1 Moesgård Strand (FK), 22/7 3 ad rst syd for Mols (EBU), 2/8 1 juv Øster Hedekrog, Samsø (SD), 18/8 1 rst Bønnerup Strand (GG), 11/10 1 N Kysing Næs (OGJ), 26/10 1 vdr rst Kysing Næs (TKC, ET), 1/11 1 vdr rst Kysing Næs (OGJ), 30/11 1 S Fornæs (JOS, JSP, PL), 6/12 3 Ebeltoft-Odden (HC).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	7	0	2	0	12	3	2	0	2	2	3

Søkonqe (Alle alle)

Er nu den talrigeste af de artsbestemte alkefugle i amtet.

I alt min 64 ex. fra 12 indsendere er dog færre end 1985's rekordtal (106 ex).

Alle nævnes:

Forår: 19/1 1 rst Kysing Næs (OGJ), 11/2 1 rst Moesgård Strand (JTL), 2/3 1 rst + 1 S Fornæs (JNK, SKH).

Efterår:

Fornæs: 18/10 1 S, 1/11 1 S-rst, 16/11 5 trk, 23/11 1 N, 30/11 3 N + 1 S, 24/12 5 N (EH, JSP, PL, HC, HP + HLL).

Kysing Næs: 7/11 1 rst, 22/11 2 rst-S, 29/11 1 rst, 6/12 2 rst, 7/12 1, 13/12 1 rst, 14/12 3, 15/12 1, 20/12 1 rst (OGJ, AJ, LB, EI, CEM).

Risskov: 2/12 1 fou, 6/12 2 fou, 7/12 1 (HeC).

Moesgård Strand: 10/12 2 (HeC).

Århusbugten: 15/11 min 10 ml. Skødshoved og Molshoved samt 27/12 ca 15 Århusbugten (JTL).

Endelig en indlandsobs: 2/12 1 Vr. Tørslev (medd. af J.C. Schou via JTL).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	25	34

Lunde (*Fratercula arctica*)

I alt 3 ex, alle fra Fornæs: 1/11 1 S (HP + HLL), 16/11 1 S + 1 N (EH, PL).

Søkonqe/Lunde (Alle alle/*Fratercula arctica*)

En observation: 22/11 1 rst-S Kysing Næs (LB).

DUER

Steppehøne (*Syrnhaptes paradoxus*)

Se appendix I.

Huldue (*Columba oenas*)

Mange ynglefund, alle nævnes: Antal par: Risskov 4 (JT), Hørret Skov 1 (BHJ), Moesgård Skov 2 (JT), Fussingø Skov 5-8 (HeP), Silkeborg Vesterskov 2-3 (SFP), Silkeborg Statsskovd. 10-14 (BRS), Rye Nørreskov 1-2 (BRS), Rye Sønderoskov 1-2 (BRS), Linå Vesterskov 2-3 (BRS), Østre Stenhule 1 (BRS), Bidstrup Skovd. 1-2 (BRS), Havskov 1, Årslev Skov 1, Høskov 1 (Lok).

Moesgård havde i perioden 8/3-17/5 71 trk (BHJ, HLL, ET, HeC, TKC, LW), største dag var 19/3 25 trk Moesgård (HLL).

Første er tidlige: 20/2 1 Vester Alle, Århus (LB) og 25/2 1 Søren Frichsvej (LB).

Sidste: 16/8 1 Havreballe Skov, Århus, 11/10 1 Fussingø Skov (HC+HP), 12/10 1 Kysing Fjord (BHJ) og 20/10 1 Lysbro Skov (SFP).

Total: 139. Antal indsendere: 21. Antal obs: 52.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	2	81	40	11	0	1	0	0	3	0	0

Ringdue (*Columba palumbus*)

I alt 72 iagttagelser af 15243 fugle, hvilket er få i forhold til foregående år. Vi savner tal fra trækstederne !!

Ynglefund, alle nævnes. Antal par: Fussingsø 9, Hesselbjerg Skov 7, Mørke Kær 5,

Savmølle Skov 22-24, Kasted-Geding Mose 6-8, Tinning Skov 9, Brabrand Sø 10, Lillering Skov 15-20, Skørring Overskov min. 20, Sminge Sø 3, Gudenåen ml. Svostrup og Silkeborg 12, Silkeborg Langsø 12, Silkeborg Vesterskov 12, Granslev Ådal 20, Dejret Øhoved 4-6 (Lok, EM, JCN).

Fra trækstederne, forår:

Moesgård 6/3 - 1/5 ialt 2979 ex (HeC, TKC, MCR, LW). Største dag her: 12/4 898 trk N-NV (HeC, LW, MCR).

Gjerrild: Ingen tal.

Efterår:

Slotterhage 21-24/10 5362 trk (JTL).

Øvrige: Overnatning (største tal nævnes): 22/3 350 v. Demstrup gd. (JRR), 15/11 1000 Lillerup Ådal (ET), 5/12 1200 Kollens Mølle (ET), 6/12 600 Årslev Skov (JTL), 17/12 400 Adslev (CT).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
206	1	915	2964	82	0	80	8	41	5862	2060	3024

lyrkerdue (*Streptopelia decacotta*)

Af ialt 203 indrapporterede individer nævnes kun flokke over 25:

15/10 50 Århus Havn (NH), 18/10 100 Randers Havn (JP) og 15/11 50 Randers Havn (JP).

Antal indsendere: 4. Antal obs 5!

turteldue (*Streptopelia turtur*)

Kun 3 iagttagelser/eks, alle nævnes:

9/5 1 N Helgenæs (JTL), 24/5 1 Kolindsund v. Kærby (AJ), 30/5 1 Anholt By (HE).

GØGE

Gøg (*Cuculus canorus*)

Yngleføremst, alle par nævnes: Fussing Sø 7, Hesselbjerg Skov 4, Skaføgård Sø 1, Dystrup Mose 3, Mørke Kær 2, Kasted-Geding Mose 3, Damsbro Mose 2-3, Lilleå-dalen 5-8, Kvottrup Mose 2, Brabrand Sø 4, Tåstrup Sø 2, Galten Smørmose 1, Gammel-mose 1, Lillering Skov 2, Skørring Overskov 1, Sminge Sø min. 1, Gudenåen ml. Svostrup og Silkeborg min. 2, Silkeborg Langsø 1-3, Ørn Sø 1, Pøt Sø 1 (Lok, PMc, CLM), Bodil Mølle 1-2 (JC).

Første: 1/5 1 Sminge Sø (PMc) og 4/5 1 Mossø (AM).

Største antal blev 9/5 8 Brabrand Sø og 25/5 6-10 Mørke Kær (JWJ).

Sidste: 18/9 1 Moesgård Slot (PN) og 24/8 1 Kysing Fjord (OGJ).

Total: 63. Antal indsendere: 21. Antal obs: 32.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
0	42	18	0	2	1	0

UGLER

Slørugle *Tyto alba*

1 par i Århus amt (JTL).

Kirkeugle (*Athene noctua*)

Det ser ikke godt ud!

Ynglefund: Floes 1 par (FFa), Borum 1 par (JTL) og Lyngby 1 par (JTL).

Øvrige: 10/6 + 25/6 + 27/7 1 Vejlager (JP) og 13/10 1 Houlbjerg (BD).

Natugle (Strix aluco)

Sikre og sandsynlige ynglepar: Mårslet 1 (BHD), Bodil Mølle 1 (JC), Floes 1 (?), Dystrup-Ramten 1 (JSP), Silkeborg Nordskov 2-3, Silkeborg Vesterskov 2-4, Silkeborg Østerskov 1-3, Silkeborg Sønderkov 1-2, Linå Vesterskov 1-2, Addithus Skov 1-2, Nygårde-Hemstok Skov 1-2, Rye Nørreskov 2, Rye Sønderkov 1-3 (BRS), Ris-skov 1 (HeC), Hinnerup 1 (ChL), Marselisborg Skov 1 (JS), Villa Hans Brøge, Bra-brand 1 (LB), Skovbakken, Randers 1 (JRR), Hørhaven 1 (EBu), Hesselbjerg Skov 3, Savmølle Skov 1, Hår Skov 1, Haraldslund Skov 1, Sønderkov 1, Nørreskov 1, Nor-ringure 1, Norring Vesterskov 1, Nørre-Is-Ulstrup Skov 2, Skjoldlev Bjerge 1, Hattemager-Kvottrup Skov 1, Lillering Skov 1-2, Skørring Øverskov 4, Gedehave 1, Søsken 1, Storskoven 1 (AJ), Fussingø 3 (CEM).

Øvrige (obs. over 1 ex nævnes): 12/4 2 Haraldslund v/Hinnerup (JOS, ChL), 23/5 2 Dystrup-Ramten (JSP), 23/5 4 Hemmed Kær (JSP), 20/6 2 pull Marselisborg Skov (JS), 10/10 2 Rye Sønderkov (HC, BRS).

Total: 147. Antal indsendere: 28. Antal obs: 72.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	5	3	6	19	5	2	1	0	6	1	5

Skovhornugle (Asio otus)

Ynglefund (Antal par): Ansø Enge, Vrads 1 (JB), Kasted-Geding Mose 1 (SH), Bra-brand Sø 1 (AJ), låstrup Mose 1 og Vind Skov 1 (JTL), Lilleådal 1 (Lok), Plan-tage v. Frydensvang 1, Lillering Skov 1, Gudenåen ml. Svøstrup og Silkeborg 1, Silkeborg Langsø 0-1, Dejret Øhoved 1, Storskoven 1, Mose ved Lilleåen 1, Øst for Søholt 1 (Lok), Funder Kro 1 (PMc).

Øvrige: 12/4 1 Lyngbygård Skov (JSP), 21/5 1 Eskelund (KH), 14/7 1 Romalt Enge, Randers (JRR), 26/7 1 Hesselholm, Samsø (SD).

Vinterforekomst: Fælles overvintringsplads for ca. 15 fugle næv Bryrup (JB).

Total: 29 Antal indsendere: 11 Antal obs: 11.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-	15	-	1	6	4	2	-	-	-	1	-

Moschornugle (Asio flammeus)

Alle nævnes:

Forårstræk: Marts 1 Bjerregrav Mose (ML), 31/3 1 Gammel sø (JC), 13/4 1 Gjerrild Nordstrand (TB, LB), 27/4 1 Damsbro Mose (TB), 6/5 1 Råby Odde (ML).

Efterårstræk: 26/9 2 indtrk Kysing Næs (NA), 16/11 1 indtrk Fornæs (JOS, PL, EH).

Vinter: 4/1-12/1 1 Kysing Næs (LB, CEM, OGJ), 9/2 2 Alrø Egehoved (Hfj), 10/2 1 Alrø Egehoved (HP), 19/2 1 Egens, Mols (AJ).

Total: 13 Antal indsendere: 16 Antal obs: 16 (korr. for gengangere).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	4	2	2	1	-	-	-	2	-	1	-

NATRAVNENatravn (Caprimulgus europaeus)

2 ynglefund er all: 21/6 4-6 par Gludslø Plantage (NPB, BD), Smingegård Planta-ge 0-1 par (PMc).

Ingen meldinger fra trækstederne.

SFJLEREMursejler (*Apus apus*)

Status ukendt. Første, sidste og en håndfuld obs over 50 nævnes. Få indsendere.

Første: 4/5 1 Bjerregrav Mose (JRR), 5/5 2 Gudenåen, Randers (LTP).

Store tal: 17/5 102 N Helgenæs (JIL), 23/5 75-150 Gjellerup Center, Århus (JWJ), 14/6 80 Gudenåen, Randers (JP), 6/7 120 Vorup, Randers og 27/8 66 Sødring Kær (LTP).

Sidste: 2/10 1 Ørnsø (JCN), 5/10 2 Silkeborg (GC) og 24/10 1 Vorup, Randers (LTP). Må siges at være meget sene fugle. Sikkert pga. det varme efterår.

Total: 819 Antal indsendere: 19 Antal obs: 42

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-	-	-	0	363	147	140	291	18	4	-	-

Alpesejler (*Apus melba*)

Se appendix I.

SKRIGEFUGLEIsfugl (*Alcedo atthis*)

Ynglefund (antal par): Silkeborg Langsø (Lok), Ørnsø 1, Pøtsø 1 (Lok), Fussing Skovene (Lok), Velling Skov 1 (JB), Jeksen Fredningen 1 (ET).

Alle øvrige: 1/1-31/1 1 Botanisk Have, Århus (CEM, BIJ, TB, SMJ, EH), 8/1 1 Remstrup å (JCN), 13/1 1 Lyngbygård å (AJ), 1/3 1 Kongsvad Mølle (HeP), 17/4 Odder Næs, Gudenå (LF), 31/5 1 Ansø Enge (JTL), 31/8 1 Langesø (NR, AM), 20/10 1 Døde å (HE), 25/10 1 Hinge Sø (JCN), 8/11 1 Kongslund (JP), 13/11 1 Eskelund (KH), 7/12 1 Salten Langsø (AJ), 14/12 1 Funder å (BD), 24/12 1 Dronningborg Bredning (JP).

Total: 87 Antal indsendere: 23 Antal obs: 68.


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
19	2	2	13	5	10	4	3	1	10	7	11

Blæder (*Merops apiaster*)

En iagttagelse:

26/5 1 trk Gjerrild (GF).

Er sidst set i amtet i 1984.



SPÆTTERVendehals (*Jynx torquilla*)

Ynglefund, alle nævnes: 1 muligt fund: 7/6 1 Lyngbygård Skov, "meget aktiv, syngende, viste tegn på yngleuro (JTL). Desuden en fugl set i yngletiden: 14/6 1 Mygind Skov (JRR).

Forårstræk: 1/5 1 Tranevig (PMc), 1/5 1 Brabrand Sø (Per Loft), 4/5 1 Emborg (NR, AM), 7/5 1 Brabrand Sø (KH), 9/5 1 Dragsmur-Holgerenæs og 31/5 1 Ansø Enge (JTL).

Efterår: 1/9 1 fouragerende Sondrup Bakker (LPJ).

Total: 9. Antal indsendere: 9.

Grønspætte (*Picus viridis*)

Indrapporteret fra stort set de samme lokaliteter og i samme antal som i 1985. (Se kort i 85-rapporten). Dog også obs og y-fund fra Frijsenborg skovene i år.

1 alt 48-58 y-par fra 15 lokaliteter, heraf landt de fleste fra skovene omkring Silkeborg.

I øvrigt spredte obs fra det meste af amtet, dog ingen obs syd for en linje Mossø-Moesgård. Mangler øjensynligt også på Samsø?

Total: 131. Antal indsendere: 30. Antal obs: 84.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	2	23	30	21	13	4	6	0	22	4	3

Sortspætte (*Dryocopus martius*)

Ynglefund, antal par: Silkeborg Statsskovdistrikt 4, Rye Nørreskov 2, Rye Sønderkov 1, Nygårde Skov 1, Løndal Skovbrug 1, Palsgård Statsskovd. 2, Bidstrup Statsskovd. 1, St. Hjælland Pl. 1, Fussingø Statsskovd. 3 (BRS, HeP, SFP, ML).

Alle øvrige: 7/3 1 Gjerrild (GF), 12/4 1 hørt Brunskov v. Ålum (ML), 14/4 1 rst Gjerrild (GF), 27/4 1 hørt Salten Langsø (HP), 1/6 2 Nørring Vesterskov (MJ), 3/9 1 hørt Salten Langsø (JTL) og 22/10 1 Skærso Plantage (PI).

Total: 64. Antal indsendere: 21. Antal obs: 52

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	9	4	15	8	4	-	-	2	17	-	1

Stor Flagspætte (*Dendrocopus major*)

Ynglefund, alle nævnes: Hesselbjerg Skov 5, Savmølle Skov 5-9, Lisbjerg Skov 3, Sønderkov 3, Nørreskov 1, Nørringure 3, Klapskov 1, Tinning Skov 1, Skjolddelev Bjerg 1, Orasbjerg Skov 2, Hattemager-Kvottrup Skov 2, Brabrand Sø 2-3, Tåstrup Sø 1, Lillering Skov 3, Skørring Overskov 7, Granslev Ådal 3, Gudenåen ml. Svøstrup og Silkeborg 1, Silkeborg Langsø 7, Dejret Øhoved 1 (Lok), Floes Skov 1-2 (JH), Jeksen Fredningen 2-4 (JC), Fussingø 8 (CtM).

Total: 73. Antal indsendere: 9. Antal obs: 46

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	1	5	25	7	5	1	5	-	-	9	9

Mellemflagspætte (*Dendrocopus medius*)

Se appendix I.

Lille Flagspætte (*Dendrocopus minor*)

Nu for 2. år i træk i amtet.

12/4 1 N Moesgård Strand (OGJ), 20/4 1 N Moesgård Strand (NR).

Siden 1972 set 4 gange i amtet: 7/2 1978, 13/1 1982, 16/2 1983 og 30/12 1985.

SPURVEFUGLEToplærke (Galerida cristata)

Halvering af ynglepar i forhold til 1985.

10 sikre og sandsynlige ynglepar:

Århusområdet: 1 Texaco, Grenåvej (FF), 1 Jernaldervej og 1 Bilka (SH), 1 Århus Østhavn (NÅ), 1 Halmstadgade/Randersvej (PN), 1 Skelagervej (HeC).

Randers: 1 Randers gl. losseplads (LTP), 1 Grenåvej (JP).

Ynglepar i øvrigt: 1 Sminge Sø (Lok, PMc), 1 Silkeborg Banegård (PMc).

Årets øvrige obs: 4/1 4 Tranbjergcentret (OGJ), 23/3 2 Århus Østhavn (NÅ), 5/11 2 Øllegårdvej, Viby (KeH), 2/12 1 Vericentret, Risskov, 4/12 2 Kordegården, Risskov, 14/12 1 Texaco, Grenåvej (JSt + EBO), 26/12 1 Århus Havn (JTL).

Indsendere: 13. Observationer: 19. Sum: 38.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	0	2	0	8	5	6	5	0	1	2	5

Hedelærke (Lullula arborea)

Manglen på traktal fra Gjerrild får forårstrækket i 1986 til at syne af meget lidt. Ynglesituationen ser normal ud - dvs. meget få par. Ingen fugle set i efteråret.

Alle obs nævnes:

Følgende obs må give formodning om ynglen: 4/5 1 Emborg (NR), 24/5 min. 5 Ørkenen, Anholt (HE), 27/6 1 sy Sepstrup Sande kl. 00.30 (OGJ, TB, LB), 6/7 1 sy Grenå Strand (FFa).

Forårstræk: 19/3 4 N Moesgård (HeC, HLL, JTL), 6/4 1 SV Grenå Hede (JNK).

Indsendere: 11. Observationer: 8. Sum: 13.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	4	1	6	1	1	0	0	0	0	0

Sanglærke (Alauda arvensis)

Man er - vel i glæde over forårets komme - flittige til at indsende sine første iagttagelser. Derefter er tallene så lidt repræsentative, at det er håbløst at konkludere noget ud fra dem. De få vinterobs nævnes dog alle.

Der er indberettet 228 ynglepar (Lok, PER, JP).

Forårstrækket indledes med februar og kulminerer i sidste halvdel af marts, Største tal: 15/3 996 N Moesgård Strand (KCR) og 17/3 235 N Universitetet (TKC).

Januar- og decemberobs: 7/1 50 Alrø (NH), 2/12 11 Kysing Fjord (AM), 11/12 4 Kysing Fjord (NR), 15/12 2 Nørsminde (CEM), 27/12 18-24 Århus Østhavn (NR, JFI).

Indsendere: 16. Observationer: 62.

Bjerglærke (Eremophila alpestris)

Så er vi i 1986 atter nede på det mere normale med kun to obs:

16/3 1 Brabrand Sø (LW) og 7/10 2 høn Totten, Anholt (LH).

Digesvåle (Riparia riparia)

Stor fremgang i optællingen (!) af kolonier.

Ca. 550 ynglehuller fordeler sig således: 10/6 30-40 Hassensør og 13/6 ca. 70 Ahl Hage (FF), 27/6 koloni ved Vissinggård (JCN), 12/7 20 par Haldum Grusgrav og 12/7 75 par Grundfør Grusgrav (SMJ), 24/7 43 Yderup Grusgrav (KeH), 27/7 100 par Sangstrup Klint (HC), 100 par Rosendalvej (PMc), 75 par Lilleådal og 12-15

par Brabrand Sø (Lok), ca. 25 Bjerregrav Mose (JP).

Første: 29/4 1 Resenbro (PMc), 1/5 12 Bjerregrav Mose og 3/5 3 Gudenå/Randers (JP), 3/5 2 Vorup, Randers (LTP).

Sidste: 7/9 9 N Issehoved, Samsø (SD), 8/9 3 Essenbæk Mose (LTP), 28/9 10 Stubbe Sø (JP).

Antal indsendere: 14. Antal observationer: 39.

Landsvale (*Hirundo rustica*)

En art, hvor det typisk er første og sidste iagttagelse samt store flokke, der indberettes.

113 ynglepar er indberettet (Lok, PER).

Normal til lidt sen ankomst: 18/4 7 Funder Holme (JCN), 18/4 1 Resenbro (PMc), 26/4 2 Nørreådal (JP), 27/4 1 Spørring (LTP), 27/4 1 Brabrand Sø (AM), 27/4 10 Dystrup-Ramten Sø (LB).

Største træktalet: 15/5 min. 500 Mørke Kær (SH), 3/8 1000 Ørnsø, Silkeborg (JCN), 13/9 ca. 1500 Grund Fjord (JH), 13/9 ca. 1200 Sødringholm Enge (HeP), 25/9 min. 1000 Albæk Enge, Randers Fjord (JP).

Sidste, alle oktoberobs nævnes: 4/10 20 Støvringgård Skov (JP), 4/10 1 Vorup, Randers (LTP), 5/10 20 Emborg og 100 Klostermølle (JK), 7/10 1 Kysing Næs (NÅ), 11/10 2 Kysing Næs (OGJ), 16/10 4 Sminge Sø (PMc).

- og så til det usædvanlige: En rede med store unger 25/10 Råby (FUGLE) må siges at være på det seneste, for slet ikke at tale om 6/12 1 Gravlev (FUGLE), som kan hælde at være landets sidste?

Antal indsendere: 18. Antal obs: 56.

Bysvale (*Delichon urbica*)

Meget lidt materiale indkommet.

Yngel: Der er melding om ialt 100 par (Lok, PER, JP, AM), hvilket slet ikke svarer til virkeligheden.

Første : 21/4 8 Resenbro (PMc) og 29/4 1 Brabrand Sø (HLL).

Sidste: 16/9 2 Vorup, Randers (LTP) og 23/9 130 Fiskergård/Gudenåen (PMc).

Største tal: 10/8 500 Kolby Kås, Samsø (SD), 13/9 500 Grund Fjord (JH).

Antal indsendere: 13. Antal obs: 34.

Storpiber (*Anthus novaeseelandiae*)

Se appendix I.

Markpiber (*Anthus campestris*)

I 1986 foreligger der kun to iagttagelser uden for Anholt, som er den eneste kendte yngleplads inden for amtet.

Anholt: 24/5 2 Fyret (JS + HE), 28/5 1-2 Ørkenen (HE), 21/6 - 26/6 min. 2 par (LII) giver alt sammen formodning om ynglen.

Træk, begge obs fra Djursland: 9/5 1 rst Dragsmur, Helgenæs (JIL), 9/5 2 Ø Gjerrild Nordstrand (HC).

Antal indsendere: 5. Antal obs: 5.

Skovpiber (*Anthus trivialis*)

Da der ikke foreligger 1986-træktalet fra Gjerrild, fremlægges her de sørgeligt små tal fra resten af amtet. Yngleforekomsterne er ikke medregnet i summeringen.

Der er indberettet 35 ynglepar hovedsageligt fra Midtjylland og Djursland (Lok, PER).

Forårstrækkets første: 19/4 1 Stubbe Sø (AJ), 20/4 5 N Moesgård Strand (JOS), 25/4 4 Silkeborg Vesterskov (JCN).

- og største: 1/5 33 N Moesgård (LW), 9/5 46 N Dragsmur, Helgenæs (JTL).

Kun én eneste efterårsobs - det kan da ikke passe !

11/10 "flere" sy Sindbjerg-Stoubjerg Hede, Sejs (NÅ).

Indsendere: 15. Observationer: 30. Sum: 159.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	17	129	11	0	0	0	2	0	0

Engpiber (Anthus pratensis)

Også for denne art føles manglen på træktal fra Gjerrild og Moesgård mærkbart. Vinterforekomsterne ser ud som normalt. I sommeringen er yngleføremster ikke medregnet.

Indberettede ynglepar: 28, hvoraf de 10 er fra Århus Østhavn (Lok, PMc, NÅ, AM).

Forårstrækkets største obs: 18/4 200 Kapelbæk (JWJ), 1/5 350 N Moesgård (LW).

Efterårstrækkets største: 23/9 110 trk Vorup, Randers og 12/10 100 Sødring Kær (LIP), 21/10 - 24/10 ialt 359 trk Sletterhage, Helgenæs, max 22/10 178 trk (JTL).

Vinteragttagelser: 1/1 1 Kristrup Enge (LIP), 7/1 1 Brabrand Sø (LW), 22/2 4 Sælvig Camping, Samsø (SD), 27/12 1 Århus Østhavn (JFT), 27/12 8 Sminge Sø (PMc), 30/12 2 Gudenåen/Randers (LTP).

Indsendere: 17. Observationer 47. Sum: 1540.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	4	33	388	405	0	0	35	175	485	2	11

Rødstrubet Piber (Anthus servinus)

Ingen forårsiagttagelser, men som i 1985 to fra efteråret:

10/9 1 S Kysing Næs (LB), 9/10 1 h nattrk Anholt (EH).

Skærpiber (Anthus spinoletta littoralis)

Som sædvanligt ses der langt flest af denne art under efterårstrækket, især i november. Vinterbestanden viser en pæn fremgang i forhold til 1985.

Eneste indberettede ynglepar: 2 par Hov Røn (Lok).

Største ansamlinger, alle fra efteråret: 18/10 7 rst Fornæs (HC), 2/11 7 Fornæs og 16/11 8 Fornæs (JSP), 16/11 24 rst Besser Rev, Samsø (SD).

Indlandsobs: 9/1 1 Brabrand Sø, ved Rensningsanlæg Øst (Keh).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11	13	3	6	1	4	0	0	6	16	61	4

Indsendere: 22. Observationer: 51. Sum: 125.

Gul Vipstjert (Motacilla flava)

2 racer optræder normalt i Århus Amt:

Almindelig Gul Vipstjert (M. f. flava)

Ynglepar: 3-5 Brabrand Sø (Lok), 1 Sminge Sø (Lok, PMc), 2-4 Dronningborg Bredning (LTP), 1/6 4 Århus Østhavn (NR), 24/6 2 Alrø (SFP), 29/6 1 Lerdrup Vig (ET), 5/7 1 Eskelund (Keh).

Forårstræk, alle aprilobs nævnes: 20/4 2 N Moesgård Strand (JOS, NR), 25/4 + 27/4

I Århus Østhavn (NÅ), 29/4 5 brabrand Sø (LB).

Største tal: 18/5 90 Anholt (HE), 19/5 80 Anholt (JS + HE).

Efterårstræk: som sædvanligt små tal, eneste obs over 3: 24/8 10 5 Dørup (ET).

Indsendere: 21. Observationer: 77. Sum: 507.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	8	402	62	47	25	3	0	0	0

Nordlig Gul Vipstjert (M. f. thunbergi)

Denne race ses/erkendes normalt kun under forårstrækket, i 1986 således kun i maj.

De største flokke: 9/5 38 rst Brabrand Sø (LB), 9/5 39 N Dragsmur, Helgenæs (JTL), 11/5 40 rst Brabrand Sø (LB), 17/5 22 Kragemosen, Samsø (SD), 19/5 20 Anholt (JS + HE).

Indsendere: 8. Observationer: 12. Sum: 201.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)

Stor fremgang i indberetningerne om ynglende fugle, dog ingen fra Djursland. Træktallene små som normalt, når der ses bort fra de manglende tal fra Gjer-rild og Moesgård. I summeringen er der så vidt muligt taget hensyn til gengangere, og yngleparrerne tælles med i maj, juni og juli.

BJERGVIPSTJERT



Der er konstateret 17 ynglepår. Se prikkortet. Det er en stor fremgang fra 5 par i 1985.

Trækforekomster: 27/3 1 S Fornæs (AJ, HLL), 26/4 1 N Moesgård (LW), 10/9 1 Norsminde Fjord (LW), 5/10 1 trk Kysing Fjord (HeC), 8/10 1 S Brabrand Sø (TB), 22/10 1 Sletterhage, Hølgelæs (JTL).

Vinterfund: 4/1 1 Giber å ved Fulden (LB), 7/12 1 Katrinedal Dambrug, Salten å (AJ).

Indsendere: 33. Observationer: 68. Sum: 66.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	7	11	34	37	35	9	4	3	3	1

Hvid Vipstjert (Motacilla alba)

I 1986 forekom 2 racer i Århus amt:

Almindelig Hvid Vipstjert (M. a. alba)

Numinatracen, som fortrinsvis indberettes som første- og sidsteobs.

47 ynglepar er meddelt (Lok, JP, JK).

Forårets første dukkede op en lille uge senere end sidste år: 18/3 4 Kysing Fjord (ET), 19/3 1 N Moesgård (HLL), 20/3 1 han Virklund (JCN), 20/3 1 Moesgård Museum (JK).

Efterårets sidste: 7/10 11 Kysing Næs (NÅ), 8/10 2 Dørup (ET), 10/10 1 Assentoft (LTP) og 10/10 1 Sletterhage (LPJ) var tidligere end normalt.

Antal indsendere: 21. Antal obs: 69.

Sortrygget Hvid Vipstjert (M. a. yearrellii)

Der foreligger to iagttagelser af denne britiske race:

4/4 1 rst østlige side af Issehoved, Samsø (SD) og 29/4 1 Døde å, Brabrand Sø (AJ).

Silkehale (Bombycilla garrulus)

Denne invasionsfugl optrådte mest talrigt i januar. Antallet reduceredes i februar og marts, og de sidste fugle var væk ult marts. I månedstallene er taget rimeligt hensyn til gengangere.

I Århusområdet sås langt de fleste fugle. De største flokke var her: 10/1 55-60 Mindeparken (FF), 10/1 45 Århus Havn (LW), 25/1 50 Botanisk Have (ChL), 26/1 60 Bogtårnet (LW), 13/2 70 Rådhusparken (ChL), 19/2 45 Højbjerg (CEM), 13/3 65 Mørienlund (HLL).

Fra amtet i øvrigt skal nævnes 25/1 17 Vorup, Randers (LTP), 10/3 ca. 75 Hyllested, Djursland (SKH), 16-17/3 22 Tegllevej, Randers (JP).

Efterårets første fugle ses 16-17/10, hvor 8 ex opholder sig i Brabrand (JTL). Derpå varer det helt til 23/12, hvor 4 fugle ses i Udbyhøj (HC). Eneste større flok var 29/12 min. 55 Brammersgade + Skanseparken (JFT).

Antal indsendere: 29. Observationer: 67.

Sum: 1158. 1. halvår: 1080. 2. halvår: 78.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
544	246	290	0	0	0	0	0	0	8	0	70

Vandstær (Cinclus cinclus)

Stor tilbagegang i forhold til 1985. Summen samt halvårstallene hviler på et skøn over det faktiske antal af fugle på de enkelte lokaliteter.

Forårets sidste: 5/4 1 Naturskolen Lystrupsmide, Snabegård Skov (NPB), 16/4 1 Tarskov Mølle (JC).

Efterårets første: 14/10 i Fulden Mølle (JC), 16/10 i Slotsholmen, Silkeborg (SFP).


Eneste obs med over 3 fugle: 16/2 4 Klostermølle (NH).

Antal indsendere: 23. Antal observationer: 57. Antal lokaliteter: 23.

Sum: 35. 1. halvår: 24. 2. halvår: 11.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
16	13	14	2	0	0	0	0	0	2	1	11

VANDSTÆR



Gærdesmutte (*Troglodytes troglodytes*)

Det indkomne materiale må siges at være så lidt repræsentativt, at det er svært at drage konklusioner.

Der er indberettet 78 ynglepar, næsten alle fra Lokalitetsregistret. Største bestande huser Hesselbjerg Skov (Fussingø) med 17-20 par (Lok, PER) og Lillering Skov 7-10 par (Lok).

Gjerrild Fuglestation har ringmærket 12 ex i forårsperioden.

Antal indsendere: 6. Antal observationer: 68.

Jernspurv (*Prunella modularis*)

Også her et meget sparsomt materiale, som næppe siger noget reelt om arten i Århus amt.

45 ynglepar er indberettet (Lok, PER).

Gjerrild: 14 ringmærket (GF) i foråret.

Antal indsendere: 10. Antal observationer: 39.

Rødhals (Erithacus rubecula)

Materialet lige så småt som hos de to foregående arter.

49 ynglepar er meldt, hvoraf 21 holder til omkring Fussingø (Lok, PER).

268 ringmærkede i Gjerrild i løbet af foråret (GF) giver en fornemmelse af, at et træk foregår.

Antal indsendere: 7. Antal observationer: 28.

Nattergal (Luscinia luscinia)

Hos denne art kommer alle indberetninger fra maj og juni. Kun en enkelt sniger sig ind i juli. Den registreres stort set over hele amtet, dog er der en negativ melding fra Grund Fjord.

136 ynglepar er indberettet. De største lokaliteter var 25 par Mørke Kær (Lok, SH), 15-23 par Kasted-Geding Mose (Lok, SH), 17 par Bjerregrav Mose (JP). En nattælling på Djursland gav 93 sy (JSP).

Første fugle: 4/5 3 Ørting Mose (OGJ), 5/5 1 Gudenå/Randers og 1 Bjerregrav Mose (JP).

Antal indsendere: 21. Antal observationer: 69.

Blåhals (Luscinia svecica)

I 1986 kun to iagttagelser af denne skønne fugl. Det er jo ikke meget i forhold til 8 fugle i 1985.

14/5 1 han rst Gjerrild Nordstrand (HC), 27/5 1 han Fornæs (JNK, Carsten Olsen).

Husrødstjert (Phoenicurus ochuros)

Tilsyneladende nedgang i yngle-(ornitolog-?)aktiviteten i Århus. Fremgang i Randers.

Sikre og formodede ynglepar:

Århus, 15 par: 2 Østhavnen (NÅ, FF, NR), 2 Halmstadgade (KB), 1 Læssøesgade Skole (AJ), 1 Viby Ringvej/Brabrandstien, 1 Frichs, 1 Carl Blochsgade, 1 Godsbanen, 1 Postterrænet v. Banegården, 1 Midtkraft (TB), 1 Østhavnen, 1 Hovedbanegården (JT), 1 Eskelund (KeH), 1 Skelagervej (HeC).

Randers, 7 par: 1 Hvidemøllevej, DSB, 1 Strømmen, 2 Ironholmen (JP), 1 Randers Jernstøberi (LTP), 1 Ascan Scandia (ML), 1 Fussing Savværk (LTP).

Silkeborg, 3 par: 1 Silkeborg Langsø (Lok, PMc), 1 Arkadecentret, 1 Vaskehallen Silkeborg Bybusser (PB).

Øvrige mulige ynglepar: 1 Hørning Finérfabrik (ET), 1 Beder (OGJ), 1 Hov (NH), 1 Skolebugten, Samsø (SD).

Forårstræk yderst beskedent, kun fra Samsø: 3/4 1 han Ballen Havn og 5/4 1 han Kolby Kås (SD).

Efterårets obs, alle er fra oktober: 4/10 4 Skelagervej, Århus N (HeC), 7/10 1 han sy Asfaltfabriken, Åbyhøj (Kell), 11/10 1 han sy Vestergrave, Randers (JP), 16/10 3 Århus Østhavn (LB).

Indsendere: 21. Observationer: 74. Sum: 86.

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Fremgang i indberetningerne om ynglefund spredt over hele amtet, dog intet fra Djursland og Samsø. Efterårsobsene udviser en fremgang på 900 %, der skulle nu heller ikke så meget til fra den ene fugl i 1985.

18 sikre ynglepar (Lok, PER, LB, JP, ET). Kan det passe, at der er færre ynglende par end ved Husrødstjert? Send ind!

Normal ankomst 20/4 1 han Bjerregrav Mose (JP), 28/4 1 sy Årslev (TB), 29/4 1 sy Adslev (ET), 29/4 1 Moesgård Strand (FK).

34 gik i ringmærkernes net ved Gjerrild Fuglestation i foråret.

"Ekspllosion" i august/septemberobs, alt nævnes: 22/8 1 Alrø (AJ), 27-29/8 1 hun/ juv rst Brabrand (LB), 8/9 1 han Silkeborg (JCN), 9/9 1 hun/ juv rst Universitetsparken, Århus (NA), 12/9 1 hun/ juv Hesselholm, Samsø, 12/9 1 han + 2 hun/ juv Trekanten, Samsø (SD), 16/9 1 hun/ juv rst Brabrand (LB).

Antal indsendere: 18. Antal observationer: 54. Sum: 111.

Bynkefugl (Saxicola rubetra)

Ynglesituationen ligner det normale. I summeringen er der taget højde for gengangerne, ligesom yngleparrene indgår i tallene for maj, juni og juli.

35 sikre og sandsynlige ynglepar.

Forårstrækket meget spredt, de første sås: 29/4 2 Tunø (NH), 2/5 1 Moesgård (HLL), 2/5 1 han Kysing Fjord (JP).

Kun én obs senere end 1/9: 26/10 1 Kysing Fjord (LPJ) var sent.

indsendere: 22. Antal observationer: 60. Sum: 136.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	2	107	79	71	15	1	1	0	0

Stenpikker (Oenanthe oenanthe)

I summen samt tallene for maj - juli indgår yngleparrene, der er taget hensyn til gengangere.


Sikre og sandsynlige ynglepar: 1-2 Krstrup Enge (JP), 1 Randers Havn (JRR), 1 Brabrand Sø og 1 Frederiksdal Hede (JK).

De første nåede lidt sent frem til amtet, alle aprilobs nævnes: 25/4 1 han rst Hesselholm, Samsø (SD), 28/4 1 Funder Holme (JCN), 29/4 1 Moesgård Strand (FK), 30/4 1 Tunø (NH).

Den sidste og eneste oktoberfugl var 7/10 1 Kysing Fjord (NÅ).

Total: 79 Antal indsendere: 16 Antal obs: 43

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	4	26	20	10	23	5	1	0	0



Ringdrossel (Turdus torquatus)

Kraftig tilbagegang, og det skyldes ikke kun manglende træktil fra Gjerrild Fuglestation. Som sædvanlig kun fugle fra forårstrækket.

Alt nævnes: 18/4 4 Nordby, Samsø (CHL), 25/4 1 rst Hesselholm, Samsø (SD), 2/5 1 han NØ Dejret Klit (SKH), 19/5 1 han Engen, Anholt (JS + HE), 20/5 1 Moesgård Strand (AM) samt 1 ringmærket (GF).

Ved Tulstrup-Laven er arten udeblevet i modsætning til de foregående år (JK).

Total: 9 Antal indsendere: 7 Antal obs: 6

Solsort (Turdus merula)

Kun 3 har besværet sig med at indsende materiale om denne lidet påagtede art.

Største yngleførekømt: 25 par Fusingø (Lok, PER).

Første syngende: 8/3 1 sy Silkeborg (JCN).

Sjagger (Turdus pilaris)

Vinteren 1985/86 bød ikke på så mange fugle som året før, derfor stor nedgang i forårstallene. Efteråret ser mere normalt ud.

Ingen ynglefund i 1986.

Forårstrækket kulminerer i april, største flokke: 6/4 180 rst Oldrup (LB), 19/4 120 øst for Fusing Skov (JP).

Forårets sidste: 3/5 18 Stødov bakker, Helgenæs (JTL), 4/5 1 Øm (AM).

Efterårstrækket starter med 5/10 10 Addithus Skov (BRS), 14/10 2 Adslev (ET), og kulminerer med 23/10 140 SV og 706 SV Sletterhage, Helgenæs (JTL), 26/10 350 trk Sminge Sø (PMc).

Indsendere: 14. Antal observationer: 41.

Sum: 4232. 1 halvår: 694. 2 halvår: 3538.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
118	152	103	302	19	0	0	0	0	2298	701	539

Sangdrossel (Turdus philomelos)

En art, hvor det oftest kun er første- og sidsteiagttagelser, der indberettes. I 1986 ingen vinterforekomst.

Indberettede ynglepar: 63 (Lok, PER, JP).

De første sang 7/3 1 Brabrand for (LB) og for (JP) 17/3 1 Tøjhushaven og 18/3 1 Valløvej, begge Randers.

Der foreligger ingen forårstræktil. Dog er der ringmærket 13 i Gjerrild (GF) i forårsperioden.

Fra efteråret meldes om nattræk 7/10 Ry Sønderkov (HCh), samt blandet Sang/Vindrossel 8-9/10 mere end 1000 nattrk pr. time Anholt (CH). 3/11 lagde Fløjstrup Skov grene til 600 (TKC). Årets sidste: 30/11 1 Langdalen, Brabrand (LB).

Antal indsendere: 13. Observationer: 41.

Vindrossel (Turdus iliacus)

Stor nedgang i observerede fugle i forhold til 1985. Vinteropholdsområdet lå ikke i Århus amt i 1986.

Interessant er det med en augustobs: 23/8 8 Åbyhøj (HE). Er det omstørfende danske ynglefugle eller blot tidlige trækfugle nordfra?

Forårstrækket kulminerer medio april: 13/4 ca. 100 Silkeborg Vesterskov (JCN), 19/4 50 Hallemager Skov (SMJ) og 19/4 45 Brabrand Sø (LB).

Efterårstrækket indledes efter to obs af enlige septemberfugle primo oktober med 8-9/10 mere end 1000 nattrk pr. time, blandet med Sangdrosler, Anholt (EH) (holdt ude fra summeringen). 20/10 - 26/10 100 Adslev (ET). Kulmination pr. nov med 10/11 ca. 300 Astrup Mose (HF).

Antal indsendere: 13. Antal observationer: 51.

Sum: 822. 1. halvår: 287. 2. halvår: 535.

Jan	Feb	Mår	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1	57	284	3	0	0	8	2	212	303	12

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Tilsyneladende et år med nedgang i træktallene, eller er det snarere den ornitologiske aktivitet, der afspejles? Det kan undre, at ingen fugle ses i august og september, skønt ungerne her må være fløjet af reden. Som vanligt enkelte vinterfund.

Ynglesituationen ser normal ud med 22 sikre og sandsynlige ynglefund over hele amtet, dog langt flest fra Midtjylland, hvor den betegnes som karakterfugl i plantagerne.

Forårets første: 16/2 3 Sallen Langsø (TB), 8/3 1 Moesgård Park (LB).

Forårstrækkets største tal: 26/3 15 N Moesgård (HeC, HP, LW), 27/3 10 Fornæs (HLL, AJ), 27/3 14 S Gjerrild Nordstrand (AJ), 16/4 24 rst Gjerrild Nordstrand (LPJ).

Fra efterårstrækket meldes kun om småflokke på 1-5 individer. Eneste undtagelser: 23/10 17 S og 24/10 9 V Sletterhage (JTL).

Vinter, alle nævnes: 2/1 2 Fulden (MCR), 6/12 1 Årslev (JTL), 22/12 2 Sødringholm Hede (JRR), 27/12 1 Bryrup Langsø (JB).

Antal indsendere: 22. Antal observationer: 85. Sum: 262.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	3	105	58	13	12	1	0	0	60	4	4



Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Der er indrapporteret 8-11 y-par, men stadig ingen sikre y-fund. Hanner på forlænget træk optræder hyppigt hos denne art, se godt efter!

Er set/hørt flg. steder i yngletiden med formodet antal par i parentes: Hesselbjerg Skov (1), Dagstrup Mose (2), Mørke Kær (0-2), Ristrup Mose (0-1), Damsbro Mose (2), Kvottrup Mose (1), Brabrand Sø (1-2), Gudenåen Svostrup-Silkeborg (1-2), Fussing Sø (1), Kongslund/Vasen (0-1), Nørreådal (1), Bjerregrav Mose (max 8 sy) (Lok, SH, PER, PMc, JP, Birger Rasmussen, HeP, SMJ).

Trækket: De første ankommer 4/5 i Bjerregrav Mose (JRR), derefter 5/5 i Gudenåen, Randers (LTP) og 6/5 i Brabrand Sø, vestenden (JTL, OGJ).
Sidste er 13/7 2 sy Bjerregrav Mose (JRR).

Antal indsendere: 23. Antal obs: 57.

Materialet indeholder dog sandsynligvis en del gengangere, så det antal individer der "reelt" er observeret er mindre.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
0	35	19	3	0	0	excl ringmærkede fugle fra (GF).

Savisanger (*Locustella luscinioides*)

Før 2. år i træk 1 ex: 18-21/7 1 set + hørt Floes, Grund Fjord (FFa).

Er også den hidtil seneste i amtet.

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Kun 35 ex fra 12 indsendere er få, derudover 16-21 y-par som her skal nævnes: Fussing Sø (3 par), Ramten-Dystrup Sø (1 par), Dagstrup Mose (1 par), Mørke Kær (2 par), Brabrand Sø (3-8 par), Gudenåen Svostrup-Silkeborg (3 par), Ørnso + Pøtsø (2 par), Kongslund/Vasen (1 par) (Lok, SFP, PER, PMc, JP). Der må være flere. Send dem ind!

Første: 5/5 1 Malling Mose (OGJ), næste 7/5 1-2 sy Brabrand Sø, vestenden (IB) og 8/5 1 Grund Fjord (LTP).

Største: 14/5 8 sy Brabrand Sø (KeH).

Sidste og eneste efterårsfugl: 23/8 1 Randers Fjord (JP).

Ult mar-pr juni ringmærkedes 8 ex på Gjerrild Fuglestation (GF).

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
0	27	7	0	1	0

Buskrørsanger (*Acrocephalus dumetorum*)

Se appendix I.

Kørsanger (*Acrocephalus palustris*)

Yngletal: I alt 90-100 par fra 20 lokaliteter er pænt. Største antal er fra Kaststed-Geding Mose (20-23 par), samt Dagstrup Mose (16 par) (Lok).

Første ses 18/5 1 Eskelund, Brabrand Sø (KeH), derefter 19/5 2 Brabrand Sø (JWJ).

Største forsamling blev 7/6 7 Kongslund (JP).

Sidste er tidlig: 8/7 1 Bjerregrav Mose (JP).

Der ringmærkedes 9 ex på (GF).

Antal indsendere: 11. Antal ex: 55.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
0	21	31	3	0	0	Excl Gjerrild Fuglestation

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Ca 400 y-par fra 21 lokaliteter. Det store tal skyldes to voldsomt store tal: Sminge Sø 86-90 par samt Gudenåen Svstrup-Silkeborg 200 par (Lok).

Ankom normalt: 8/5 4 Grund Fjord + 3 Hollandsbjerg Holme, Randers Fjord (LTP). Herefter 10/5 2 Kongslund (JP).

Største: 1/6 20 sy Dystrup Sø (SH).

Der blev ringmærket 494 ex på Gjerrild Fuglestation i perioden ult mar-pr juni.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
0	37	106	19	6	0	Excl Gjerrild Fuglestation

Antal indsendere: 9. Antal ex: 168.

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Er nu set de sidste 2 år på nedennævnte lokalitet:

23/5-8/6 1 sy Ramten-Dystrup Sø (JSP, AJ, PBU, SH, KeH, EH).

Gulbug (*Sylvia icterina*)

I alt 26 ex fra 10 indsendere er få.

Yngletal: 46-50 par fra 14 lokaliteter (Lok, JFT, PER).

Første 9/5 1 Moesgård Strand (FK) er tidlig, den næste mere normal 16/5 1 Vorup, Randers (LTP).

Sidste set 9/9 1 Ørnsøvej, Silkeborg (SFP), er også eneste efterårsfugl.

Der ringmærkedes 6 ex på Gjerrild Fuglestation ult mar-pr juni.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
0	14	10	1	0	1	0	Excl (GF).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*)

Yngel: 35 par på 8 lokaliteter (PER, Lok).

Første 26/4 1 Søften (SMJ) samt 3 obs 27/4.

Ingen større tal.

Sidste 27/6 5 sy Ajstrup Strand (JFT).

Gjerrild ringmærkede 34 ex (GF).

Antal indsendere: 19. Antal obs: 24. Antal ex: 41.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
15	20	6	0	0	0

Tornsanger (*Sylvia communis*)

I alt 117 ex fra 11 indsendere er få.

Yngletal: 181-186 par er bedre og skyldes et stort materiale fra (Lok), - 17 lokaliteter (Lok, SH, PER). Største tal er fra Gudenåen Svstrup-Silkeborg (30 par) og Kasted-Geding Mose (16-26 par) (Lok). Der mangler stadig tal fra f.eks. Bjerregrav Mose, Moesgård-Norsminde området samt Helgenæs-Mols.

Træk: Første: 4/5 1 Østhavnen, Århus (AM) og 6/5 1 Kongslund/Vasen (JP). Største sammenrend er 19/5 20-30 Brabrand Sø (JWJ) og 25/5 19 Bjerregrav Mose (JP).

Sidste er 8/9 2 Essenbæk Mose (LIP) samt 14/9 1 Norsminde Fjord (ET).

Der ringmærkedes 24 ex på Gjerrild Fuglestation ult mar-pr juni.

Se også appendix I for april obs.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
0	75	29	8	2	3	0	Excl (GF).

Havesanger (*Sylvia borin*)

En noget overset art, hvilket afspejler sig i få indrapporteringer.

Yngletal: 48-52 par fra 14 lokaliteter (Lok, PER, JFT, SH).

Flest fra Fussingø (11 par) samt Gudenåen Svostrup-Silkeborg (11 par) (Lok).

Første: 4/5 1 sy Norsminde Fjord (NÅ), derefter et spring til næste 13/5 1 han Forsthaven, Århus (IKC) samt samme dato 1 sy Ørnsø (JCN).

Største: 31/5 12 Fussing Skov (JP).

Sidste: 6/9 1 Vorup, Randers (LTP) og 16/8 1 sy Kongslund/Vasen (JP).

Ringmærkningstal (GF): 79 ex ult mar-pr juni (GF).

Antal ex: 66. Antal indsendere: 10.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
0	29	29	6	1	1	0

Excl (GF).

Munk (*Sylvia atricapilla*)

Kun 75 ex fra 14 indsendere er få. Der må være mange flere?

Yngletal: 105-111 par fra 14 lokaliteter (Lok, PER, SH).

Største antal fra Gudenåen Svostrup-Silkeborg (16 par), Fussingø (15 par) samt Savmølle Skov (12 par) (Lok, PER).

Første Munk ses 21/4 1 Vorup, Randers (LTP), derefter 29/4 1 Moesgård (FK) og 30/4 1 Skovbakkevej, Århus (JWJ). Herefter flere førsteobs 2/5.

Største antal er 13/5 7 Forsthaven, Århus (TKC).

Sidste: 6/10 1 hun rst Slotterhage (LPJ), 7/10 1 han + 1 hun Vorup, Randers (LTP) samt endelig 11/10 1 han Vorup, Randers (LTP). Ingen vinterfund.

På Gjerrild ringmærkedes 86 ex ult mar-pr juni (GF).

Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
0	3	42	22	4	0	0	4	0

excl (GF).

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*)

I alt 206 ex fra 22 indsendere er pænt og skyldes muligvis artens status som I-art.

Af de ca 75 indrapporterede y-par fra 11 lokaliteter er de 51 fra Silkeborg Vesterskov (SFP). Herudover en række observationer fra egnede ynglelokaliteter, der alle nævnes: formodet antal par i (): Hesselbjerg Skov (6), Lisbjerg Skov (2), Norringure (1), Norring Vesterskov (1), Lillering Skov (1-2), Skørring Overskov (+), Silkeborg Langsø (3-6), Lysbro Skov (1?), Ristrup Skov (0-2), Vind Skov (0-1), Ry Sønderskov (2), Velling Skov (1-5), Rugård Sønderskov (0-1), Skørsø Plantage (0-3), Skovbakken, Randers (0-2), Havkær Skov (1?), Sofie Amaliegård Skov (2), Fjeld Skov (1), Fussingø (6), Jeksendalen (1), Moesgård-Marselisborg Skovene (min 2-3) (Lok, SFP, BHJ, ChL), JB, PMc, JTL, SMJ, BD, SH, FF, JRR, LPJ, ET, PER, CEM, PL).

Første: 5/5 1 Skørring Overskov (JIL) + 2 sy Skovbakken, Randers (JRR).

Ingen store tal fra trækstederne, største blev 18/6 42 sy Silkeborg Vesterskov (SFP). Næstsidste + sidste er: 12/7 2 sy Silkeborg Vesterskov (SFP) og 18/8 1 sy Højlund Skov (CFM).

Der ringmærkedes 3 ex på (GF) i perioden ult mar-pr juni.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
0	88	105	12	1	0	0

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Arten er stort set kun indrapporteret fra forår og efterår. der må også være nogle "sommerfugle".

Yngletal: 85-95 y-par fra 13 lokaliteter (Lok, PER).

Største yngletal fra Fussingø 23 par (PER), samt Hesselbjerg Skov 22 par (Lok) og Skørring Øverskov min 15 par (Lok).

Træk: Første ses 3/4 1 Vorup, Randers (LTP) + 1 han Moesgård Park (JK), derefter 4/4 1 es Randers + Moesgård Str. + Marselisborg Skovene (JRR, LW, HeC).

Der ringmærkedes 59 ex på (GF).

Sidste ses 11/10 3 Gudenåen/Vasen (JP) + 1 Randers (JP), samt lidt sent 3/11 1 Fløjstrup Skov (TKC).

Sum: 98 ex. Antal indsendere: 18.

Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
0	59	17	10	0	0	1	10	1

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Ynglepar rapporteret fra 19 lokaliteter af (Lok). Store tal fra Gudenåen Svstrup-Silkeborg (125 par), Kasted-Geding Mose (30-34 par) samt Silkeborg Langsø (30 par) (Lok).

Første er sen: 24/4 1 Vorup, Randers + 3 Gudenåen/Vasen (JP, LTP), herefter 26/4 2 Hesselholm, Samsø (SD) og 8 førsteobs 27-28/4.

Største sammenrend: 4/5 39 sy Bjerregrav Mose (JRR).

Sidste: 21/9 2 Gudenå/Vasen (JP) og 27/9 1 Vorup, Randers (LTP).

Gjerrild fanger 740 ex i perioden ult mar-pr juni (GF).

Sum: 188 ex. Antal indsendere: 16.

Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
0	20	133	30	0	3	3	0	Excl (GF).

Fuglekonge (*Regulus regulus*)

I alt 40 ex fra 4 (fire) indsendere er meget få.

Også få ynglepar indsendt, eneste større tal er 26 par fra skovene omkring Silkeborg Langsø (Lok).

Eneste større tal iøvrigt er: 22/10 min 15 Skærsø Plantage (PL).

På Gjerrild ringmærkedes 48 ex i perioden ult mar-pr juni (GF).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	6	6	1	0	0	1	0	19	0	7

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*)

Ingen !



Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*)

Yngletal: 13-16 y-par fra 13 lokaliteter (Lok, PLR, PMc, SMJ, JP, LB).

De første - lidt tidlige - kommer: 4/5 1 Savmølle Skov (AJ) + 2 sy Pinds Mølle-
dal (FK, ET).

På (GF) ringmærkedes 5 ex i perioden ult mar-pr juni (GF).

Eneste efterårsfugl blev 8/9 1 Vorup, Randers (LTP).

Antal ex: 26. Antal indsendere: 13.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
0	14	5	6	0	1	0	Excl (GF).

Lille Fluesnapper (*Muscicapa parva*)

for 5. år i træk er denne lille fikse ting set i amtet.

Fra trækket: 9/5 1 Sæskoven, Brabrønd Sø (TB, LB), 10/5 1 hun Skanseparken, År-
hus (NR).

Herudover flg. observation: 4/6-23/6 1 imm han Moesgård Park/Skovmøllen (JK, JTL,
OGJ, IB, ET), fuglen hævdede territorium ifølge (JK).

Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*)

Yngletal: 24-25 y-par indrapporteret (Lok, PER, Kell, JFT, JCN).


Træk: Hovedparten ankommer i første halvdel af maj og de første ses: 3/5 1 Fus-
singø (PLR), derefter 4/5 1 han Pinds Mølle-dal (ET, FK) + 2 hun Savmølle Skov (AJ).
Største: 13/5 + 14/5 25 røst Gjerrild Nordstrand (HC).

Her ringmærkedes i alt 51 ex ult mar-pr juni (GF).

Sidste og eneste efterårsfugl: 17-18/9 1 hun Vorup, Randers (LTP).

Total: 94 ex. Antal indsendere: 14.

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
0	83	10	0	0	1	0	excl (GF).

Skægmejse (*Panurus biarmicus*)

Så er denne lækre fugl atter set i amtet! Tilmed i stort antal:

Alle nævnes: 28/7 min 5 Dronningborg Bredning (LTP), 23/8-25/8 12-15 juv Randers
Fjord (JP), 17/10 min 6 Grund Fjord (LTP). Kunne godt tyde på at de har ynglet
deroppe.

Er sidst set i amtet i vinteren 1978-79. Det er også interessant, at arten er i-
agttaget i stort tal v. Randers Fjord, sommeren 1977. Har de mon været der lige
siden, blot overset?

Halemejsse (Aegithalos caudatus)

Få indrapporteringer af de langhalede. Glemmer I dem eller er der ingen?

I alt 231 ex fra 12 indsendere, heraf kun 86 racebestemte. Husk det !

Fordeling på racer	Nordlig	Sydlig	Mellem	Ubestemt
antal	39	47	0 (?)	145


Yngel: Vi har modtaget 21-23 sikre/formodede y-par (Lok, AJ, ET, PFR, TB, SMJ). Flest fra Tinning Skov (3 par) og Skørring Overskov (2-3 par) (Lok).

Øvrige: flokke med 10 eller mere: 8/1 15 uspec Kollens Mølle (JC), 8/1 30 uspec Bodil Mølle (JC), 25/1 12 sydl. Skivholme Skov (AJ), 23/2 10 uspec Kollens Mølle (JC), 9/3 10 uspec Havskov (AJ), 26/10 12 nordl. Fjellerup Nederskov (AJ), 9/11 10 sydl. Grøbrænd Sø (AJ), 12/11 10 uspec Kollens Mølle (JC), 15/11 12 nordl. Vassen/Kongslund (JP) samt 22/11 10 uspec Fløjstrup Skov (JC).

Gjerrild Fuglestation ringmærkede 16 ex i perioden ult mar-pr juni (GF), hvordan er denne race-fordeling?

Månedsfordeling er excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
76	23	29	16	13	7	0	3	0	15	42	7

Sumpmejsse (Parus palustris)

I alt 62 ex samt min 37 y-par fra 12 lokaliteter (Lok, PER, JTL, JP, JH, LPJ, AM).

Største antal: Fussingø 8 par (PCR), Hesselbjerg Skov 6 par (Lok), Skørring Overskov 5 par (Lok) samt Gudenåen Svostrup-Silkeborg 5 par (Lok).

(GF) ringmærkede 5 ex i perioden ult mar-pr juni.

Månedsfordeling er excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
10	4	8	7	7	2	0	2	0	2	5	15

Topmejsse (Parus cristatus)

Yngel: Min 26 par fra 12 lokaliteter (Lok, PER, FF).

Største y-antal: Nørreris-Ulstrup Skov 6 par (Lok) og Gudenåen Svostrup-Silkeborg 5 par (Lok). Er der ingen i de store nåleskove ude vestpå?

3 ex blev ringmærket på (GF).

Total: 41 ex. Antal indsendere: 8.

Månedsfordeling er excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	0	5	1	0	4	2	6	3	3	3	8

Sortmejsse (Parus ater)

Kun sølle 27 Sortmejsjer fra 4 (fire) indsendere. Heldigvis er de 27 ret produktive, da der er indrapporteret 32 y-par fra 10 lokaliteter (Lok, PER).
Største tal fra Tinning Skov 8 par (Lok).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	6	5	2	0	6	0	0	0	2	1	5

Blåmejsse (Parus caeruleus)

Min 67 y-par fra 13 lokaliteter (Lok, PER, JWJ, LPJ, JH, JP).

(GF) ringmærkede 22 ex uit mar-pr juni.

Total: 76 ex. Antal indsendere: 6.

Månedsfordeling er excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	25	12	2	0	0	0	31	0	6

Musvit (Parus major)

En noget forsømt art, kun 5 indsendere med i alt 200 ex.

Min 175 y-par fra 17 lokaliteter (Lok, PER, JCN, JP, JWJ, JC).

Største antal fra Fussingø 49 par, Hesselbjerg Skov 42 par og Silkeborg Langsø 20-31 par (Lok, PER).

Øvrige: 23/2 ca 100 Jeksen-fredningen (JC), 23/3 20 Clausholm Slotspark (JP).
Ingen tal fra trækstederne, udover 10 ex ringmærkede Gjerrild (GF).

Månedsfordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	105	20	13	19	24	2	2	0	17	0	0

Spætmejsse (Sitta europaea)

Meget få indsendere. Notér race på fuglene.

Yngel: Min 43 y-par fra 14 lokaliteter (Lok, PFR, JOS).

Største antal fra Silkeborg Langsø 8 par (Lok) (undervands-Spætmejsse?), Fussingø 6 par (PER), Hesselbjerg Skov 5 par (Lok), Savmølle Skov 5 par (Lok).

Total: 61 ex. Antal indsendere: 7.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	0	21	16	6	0	0	0	0	0	11	1

Iræløber (Certhia familiaris)

Kun 26 ex fra 5 indsendere er sløjt.

Yngel: I alt min 22 par fra 9 lokaliteter (Lok, PER).

Største antal blev 4 par fra: Hesselbjerg Skov, Skørring Overskov og Fussingø (Lok, PER).

Gjerrild Fuglestation ringmærkede 1 ex i foråret (GF).

Månedsfordeling excl (GF)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	12	6	1	1	0	0	0	0	2	3

Kortlået Iræløber (Certhia tridactyla)

Se appendix I.

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Bliver stadig fundet på nye lokaliteter og holder stand på de gamle.

I alt indrapporteret 10-13 ynglepar, hvoraf mindst 5 har fået unger på vingerne. Alle nævnes: Ynglepar: Brabrand Sø: min 1 par med unger + 1-2 reder 4/4-4/8 (Lok, OGJ, KeH, LB, TB, AM, AJ, Per Loft, JTL, ET), Bjerregrav Mose: 3 par m unger + 2 "han"-redcr 17/4-24/7 (HeP, JP, JRR), 2 hemmeligholdte lokaliteter i Søhøjlandet: 2 par (PMc), Mørke Kær: 1 par v. rede (SH, JWJ), Dagstrup Mose: 1-2 par 29/4-5/6 (JSP).

Øvrige: 29/3 1 Skaføgård Sø (JTL), 28/4 1 han Gjerrild (GF) samt forår 86 1 Ri-strup Mose (Gert Rosenlund via (JTL).

Pirol (Oriolus oriolus)

Kun 3 ex er meget få:

Flg. obs: 19/5 1 sy Silkeborg Nordskov (BRS + HCh), 29/5 1 hun Engen, Anholt (HE) samt 31/5 + 7/6 1 sy Søby Fredsskov (OGJ, CEM).

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)

I alt 23-32 y-par er indrapporteret fra 13 lokaliteter, flest Ansø Enge 4-6 par (LB). Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er rapporteret par fra området syd for Århus.

Fra trækket noteres ny ankomstrekord. Hidtil tidligste var 5/5 1981 1 han Århus Ridebane. Alle obs før 15/5 og efter 16/8 nævnes:

4/5 1 par Rye Bro (TB) og 11/5 1 han Sandmark Skov (TB) samt 24/8 1 hun Kysing Fjord (TB, SH) og 3/9 1 juv Silkeborg Vesterskov (JCN).

Total: 67 ex. Indsendere: 21.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	13	32	14	8	1	0	0	0



Illustration af Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) af M.E.

Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Et gennemsnitsår med i alt 21-25 ex. Alle nævnes, der er overalt tale om 1 fugl:

1. halvår (7-9 ex): 3/1 + 9/1 + 16/2 Salten Langsø (SH, JB, TB, OGJ), 11/1 Kat-holm Skov (LPJ), 27-28/3 + 20/4 Bjerregrav Mose (JRR, JP), 29/3 Albæk Enge (JP), 16/4 Gjerrild Nordstrand (LPJ), 18/4 Kongslund (LIP), 19/4 Nørreådal (JP).

2. halvår (14-16 ex): 4/10 Østerlundsvej, Virklund (HCh, BRS), 5/10 Sepstrup Sande (JCN), 9/10 Flakket, Anholt (EH), 11/10 Sindbjerg/Stoubjerg Hede (NÅ), 12/10 + 7/12 Tranevig (JCN), 17/10 Frederiksdal Hede (SFP), 24/10 + 12/11 Sil-keborg Vesterskov (JCN), 9/11 + 6/12 Løvenholm Skov (ML), 22-23/11 Malling Mose (OGJ, MCR), 6/12 Gjerrildvejen (LPJ), 7/12 Kragssø v. Salten (JK), 7/12 Kloster-kær (hov - det er da vist Vejle Amt JK!), 7/12 Kongsø Plantage (JB), 28/12 Vrads Sande (JB).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	2	3	4	0	0	0	0	0	8	4	7

Skovskade (Garrulus glandarius)

I alt indrapporteret 43-47 y-par samt en håndfuld løse obs.

Træk noteres 27/4 5 N Skanseparken (NÅ) og 1/5 16 N Moesgård (LW).

Øvrige over 10: 22/1 10 Mols Bjerge (MSL), 20/4 12-14 Brabrand Sø (AJ) samt 2/11 10 Ajstrup Krat (JP).


Total: 198 ex. Antal indsendere: 9.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
34	0	39	33	40	7	0	4	0	3	16	23

Husskade (Pica pica)

Kun ganske få indrapporteringer.

Ses der ingen flokke ? og hvad med trækstederne ?

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes)

Stadig mange observationer efter invasionen sidste år og som ventet flere obs der tyder på yngel.

Århus/Brabrand (4-6 ex): 6/1 2 Brabrand (JTL, LB), 7/1 2 V Brabrand (TB), 9/1 1 Gjellerup (LW), 18/1 1 Risskov (H. Brandt), febr. 1 Universitetsparken (SFP), ult feb. 1 Åbyhøj (L. Hammer), 2/5 1 Risskov (JTL), 6/5 1 Åbyhøj (KeH), med maj-pr juni 1 par (yngel?) villakvarter i Århus (medd. via JK), 11/12 1 Stautrup (SiSi).

Moesgård/Højbjerg (1-4 ex): 4/1 + 6/2 + 16/3 1 Højbjerg (CEM), 23/1 1 Højbjerg (HP), 10/2 1 Højbjerg (EBu), 14/2 1 Moesgård (JTL), 5/4 1 Moesgård (NR), 19/10 1 v. Skovmøllen (BHJ), 29/10 1 Fulden (NR).


Søhøjlandet (4-5 ex): jan + feb 1 (mange dage) Silkeborg (SFP), 20/1 1 Silkeborg Vesterskov (SFP), 11/1 1 Silkeborg (JCN), 14/8 1 Nordskoven, Silkeborg (PB), efterår 2-3 Sejs (PB), 19/9 + 29/9 + 4/10 1 Silkeborg (JCN), 20/12 2 Lysbro Skov (SFP).

Midt-djurs (2-4 ex): sept 85-22/1 1 Hyllested (SKII), jan 2 Ryomgård (Bent Engbjerg via BHJ), 24/2 1 Rønde (JSP).

Samsø (5-10 ex): 23/1 5 Nordby (ChL), 22/2 2 Dyvelstenen (SD), 28/2 3 Nordby (ChL), 6/3-17/4 1-2 Nordby (ChL), heraf en set med græsstrå (redemat?) i næbbet (ChL), 15/5 enkelte "Samsø" (Nø), 20/5 1 Koldby Kås (Nø), 22/5 1 Tranbjerg (Nø), 10/8 3 + 1 Hesselholm (SD), efterår 1 Koldby (Nø).

Øvrige (20 ex): 1/1 1 Gl. Gjesing (Søren og Marianne H. Møller), 1/1-28/4 1 set 10 gange Vorup, Randers (LTP, PBU), 31/8 1 rst Kysing Næs (OGJ, LB), 20/9 2 Øer (SKII), 2/11 1 Mygind Skov (LTP), 4/11 11 S Norsminde Fjord (OGJ), 6/11 2 Lading Sø (JTL).

Total: 35-49 ex. Antal indsendere: 23. Antal obs: 64.



Allike (Corvus monedula)

Kun ganske få y-par indsendt, alle nævnes:

Hesselbjerg Skov 3 par, Silkeborg Langsø 27 par samt en melding om at den yngler i rågekolonien ved Skjoldhøjkollegiet, Århus (Lok, PER, JWJ).

Der må da være flere ??

Træk: Moesgård i alt 337 trk i perioden 8/3-1/5 fordelt på 9 dage (LW, TKC).

Store tal iøvrigt: 23/2 200-250 røst Besser Rev (SD), 6/11 ca 2000 Gl. Estrup Skov (overnatning) (LTP).

Total: 2675. Antal indsendere: 8. Antal obs: 24.

Råge (Corvus frugilegus)

Mange "nye" kolonier optalt, medfører rekordantal reder/par:

I alt 2545-2645 reder/par fra 27 kolonier, alle nævnes:

3 kolonier v. Brabrand Sø 109 par, Silkeborg Langsø 135 par, Risskov 15 reder, 4 kolonier Silkeborg 256 reder, Sejling 35 reder, Grønløkke alle, Tranbjerg 135 par, Skjoldhøjkollegiet, Århus 255 reder, Tulstrup 92 reder, Hinnerup 114 reder, Tranbjerg 116 reder, Hjortshøj min 40 reder, Kastrup Skov min 100 reder?, Tingskov 148 par, Bolskov-Solbjerg Sø 103 par, Rødkol-Stilling Sø 152 par, ml Bendstrup og Termstrup ca 300-400 reder, Sletten v. Randers 18 reder, Jomfruløkken, Randers 287 + 33 reder, Ølst 18 + 5 reder, Langskov v. Hadbjerg 78 reder (AJ, BHJ, HE, JWJ, JCN, SFP, JI, AM, Lok)

Ræsttal: 16/3 ca 1000 mark nær Vivild (JP), 6/11 ca 1000 Gl. Estrup Skov (LTP).

Total: 2177 ex (excl. y-par). Antal indsendere: 12. Antal obs: 14.

Gråkrage (*Corvus c. cornix*)

I alt 64-74 y-par indsendt (Lok, PFR, JCN).

Træk, alle nævnes: Moesgård Strand: 18/3 min 20 N, 11/4 9 N, 12/4 136 N, 1/5 1 N, alle (LW).

Universitetsparken: 17/3 24 trk, 4/4 37 trk, begge (TKC).

Issehoved, Samsø: 22/2 ca 60 rst (SD). Besser Rev: 23/2 ca 90 rst (SD).

Total: 428 ex. Antal indsendere: 9.

Sortkrage (*Corvus c. corone*)

Ingen y-fund med Sortkrager.

I alt 21 Sortkrager indsendt, alle nævnes: 3/3 1 N-R Universitetet (BHJ), 25/3 2 Tved (SEL), 27/3 1 rst Sletterhage (JTL), 30/3 1 Tved (SFL), 4/4 1 Kysing Fjord (PBU), 8/4 3 N Skanseparken, Århus (NÅ), 14/4 1 N Skanseparken (NÅ), 9/5 2 i flok af Gråkrage v. Vrads (JCN), 20/6 1 Brabrand (LB), 28/7 1 Hesselholm, Samsø (SD), 12/10 2 S Kysing Næs (BHJ), 20/10 2 S Sletterhage (JTL), 23/10 2 S Sletterhage (JTL), 30/11 1 Moesgård Strand (MCR).

Gråkrage/Sortkrage (*Corvus c. cornix X C. C. Corone*)

Flg. blandingskrager set: 1-6/4 + 28/7 1 (lok.y?) Hesselholm, Samsø (SD), 13/12 1 Århus Havn (PNN).

Ravn (*Corvus corax*)

Stadig fremgang for arten i amtet, de i alt 18-19 sikre/formodede y-par er det hidtil højeste antal i rapp. historie. Men der mangler stadig mange par! Ifølge (JTL) yngede der i 1985 op imod 40 par i Århus amt (Gejrfuglen 22.2.1986: Ravn i Århus amt).

Udover y-fund er mange strejffere indsendt, her skal kun de største flokke nævnes, det kan både være familieflokke og træk: 25/2 6 Moesgård Park (JK), 13/4 3-5 Gjerrild Nordstrand (LB), 22/5 5, 9+6 7 Østergård Skov, Malling (MCR), 30/6 4 Ø Adslev (ET), 30/8 6 Emborg Odde (JTL), 7/9 4 Salten Langsø (GG).

Total: 181 ex. Antal indsendere: 39.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	11	16	34	33	19	3	9	11	7	11	13

Stør (*Sturnus vulgaris*)

In del vinterobs, samt den største overnatningsflok i mange år.

Yngel: min 50 par fra 10 lokaliteter (Lok, JCN).

Øvrige, større vinterflokke samt de største overnatningsflokke nævnes:

Vinter: 2/1 30 + 20/1 10 Ørnsøvej, Silkeborg (SFP), 19/1 60 Århus Havn (HP), 24/12 ca 10 Vinding (JB) og 28/12-året ud 35 Ørnsøvej, Silkeborg (SFP).

Øvrige, alle over 2000 nævnes: 9/4 3000 Skaføgård (LW), 19/8 2500 Dronningborg Bredning (JP), 1/10 2000 Højslet, Randers (JP) samt flg. obs: 27/9 ca 90000 Klos-termølle, Mossø (NR). Lokaliteten er godt nok i Vejle amt, men mon ikke nogle af fuglene sad på den rigtige side af åen?

Total: 107392 ex. Antal indsendere: 14. Antal obs: 66.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
104	13	3323	4528	57	2	0	3150	90550	4725	211	732

Gråspurv (*Passer domesticus*)

Kun 3 indsendere har noteret denne art.

I alt 41 y-par samt 45 ex er set (Lok, PER, JWJ).

Skovspurv (Passer montanus)

Som forrige en forsømt art.

Min 25 y-par samt 98 ex er alt (Lok, PER, JH, JWJ).

Bogfinke (Fringilla cuelebs)

Meget få indrapporteringer overhovedet.

Yngel: På 11 lokaliteter fandtes 235-250 par, flest i Hesselbjerg Skov med 69 par (Lok, PER).

Øvrige: Størst fra foråret blev 6/4 1000 Fornæs (JP).

Fra efteråret skal nævnes 21-24/10 4447 trk Sletterhage (JTL). Flest herudover sås 5/10 200 Salten Å v. Gl. Rye (JK).

Total: 6586 ex. Antal Indsendere: 8.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
400	3	99	1089	40	44	0	50	0	4647	100	110

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

Kun få forårsfugle, men fra med nov. stort rykind (pga. oldenår?).

1. halvår: Størst blev 1/1 750 Overgård (JP), heruover spredte obs af op til 200 fugle, sidste ses 3/5 i Ørnsøvej, Silkeborg (SFP) + 1 Vorup, Randers (LTP) samt 4/5 2 Salten Langsø (AM)?

2. halvår: De første ses 16/9 i h Adsløv (EI) og 17/9 5 Hvinningdal, Silkeborg (GG). Store flokke ses fra med november og max nås i december med 24/12 10000 Møesgård Skovene (OGJ). Største udenfor dette område blev 16/11 1000 Fjellerup Nederskov (JP).

Total: 28821 ex. Antal indsendere: 18. Antal obs: 68.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1142	131	471	406	4	0	0	0	37	58	5376	24199

Grønirisk (Carduelis chloris)

I alt 48-51 y-par indsendt (Lok, PER).

Største flokke: 6/4 200 Hørskær (ET), 15/11 100 Randers Havn (JP) 23/11 90 Århus Østhavn (JP), ellers ingen over 60 ex.

Total: 697 ex. (excl. y-par). Antal indsendere: 8. Antal obs: 16.

Stillits (Carduelis carduelis)

Kun 4 y-par og færre fugle indrapporteret, hvad sker der??

Iræk: Møesgård 18/3 2 N + 24/3 1 N + 3/5 1 N (JW, BHJ).

Sletterhage: 19/10 4 S (LPJ) og 23/10 28 S (JTL).

Øvrige, flokke over 25 nævnes: 4/1 25 Kysing Næs (LB), 26/1 52 Ørting (LPJ), 2/2 26 Kongslund (JRR), 23/2 35 Fannerup (SKH), 23/8 40 Kasted Mose (SH), 27/11 28 v. Nymølle (KH), 1/12 26 v. Gråmølle (KH).

Total: 507. Antal indsendere: 25. Antal obs: 72.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
98	132	43	16	8	1	12	45	0	52	51	53

Grønsisken (Carduelis spinus)

1986 blev et år med få Grønsiskener. De 1833 ex er langt fra 1985's invasions-tal. Dog mangler vi også her tal fra trækstederne.

Yngel: Hesselbjerg Skov 1 par, Nørring Vesterskov 1 par.

Sommerfund: 25/6 3 Risskov, 13/7 1 h Sletten, Juulsø, 17/7 1 Vorup, Randers, 24/8 1 h Ulstrup Mose (ET, HLL, AJ, LTP, PER, Lok).

Øvrige, alle over 100 nævnes: 26/1 235 Pinds Mølleedal (ET), 26/2 ca 100 Brabrand Sø (AM), 15/3 200 Nørreris Skov (SMJ), 27/3 100 Storetørv Skov (PL), 19/4 100 Våsen, Kongslund (JP), 27/9 ca 200 Salten Langsø (JCN), 24/10 200 Dråby Sø (PL).

Total: 1833. Antal indsendere: 15. Antal obs: 48.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
301	205	255	207	11	3	2	1	220	230	86	42

Tornirisk (Acanthis cannabina)

En art med få indrapporteringer. De i alt 23-27 y-par fra 10 lokaliteter er ikke dækkende.

Træk: Første ses 19/3 3 N Møesgård (HLL) og 24/3 3 Møesgård (RHJ).

Største fra foråret blev 3/4 120 rst Besser, Samsø (SD), 12/4 30 Hinnerup (JOS) og 25/5 40 Århus Østhavn (NÅ).

Efterårets største blev: 26/9 50-100 Kysing Næs (NÅ), 26/9 ca 500 v. Salten (JCN) og 5/10 ca 200 Anso Enge (JCN).

Sidste blev 26/10 30 indtrk Kysing Næs (ET) og 16/10 5 Århus Østhavn (NÅ).

Ingen vinterfund.

Total: 1127. Antal indsendere: 14. Antal obs: 33.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	13	216	51	0	0	5	580	265	0	0

Bjergirisk (Acanthis flavirostris)

Et år over normalen. Fast tilholdssted er stadig Århus Havn, hvor Bjergirisker ses hele vinteren.

Sidste forår, første efterår samt alle indlandsobs og en håndfuld store flokke nævnes:

Forårets sidste: 16/4 42 Gjerrild Nordstrand (LPJ), 25/4 1 Fjeld Skov (LPJ) og 25/4 11 Isehoved, Samsø (CHL).

Første Efterår: 26/9 15 Kysing Næs (NÅ) og 1/10 23 Ajstrup Bugt (JRR).

Øvrige: Århus Havn ses Bjergirisker i perioderne 9/1-23/4 og 16/10-29/12 med max forår 8/3 300 (LB) og max efterår 23/11 125 (JP). Herudover 22 obs af 8-200 ex herfra (HeC, LW, HP, NR, AM, PNN, IKC, JP, LB, CAM, JTL, JFI, NÅ).

Øvrige over 100: 13/1 190 + 15+1 130 Katrinebjergvej, Århus (NÅ), 12/10 160 Sødring Kær (LTP), 22/10 190 Sletterhage (JTL), 14/12 115 mark v. Fornæs (JSP).

Indland (alle set over 10 km fra kysten) nævnes:

25/1 26 Lading By (JIL), 6/12 21 Fjeld Skov (LPJ), 7/12 6 Hvilsager Skov (LPJ), 26/12 75 Rosenholm Skov (LPJ). Herudover en del fra Århus/Brabrand Sø området.

Total: 3802. Antal indsendere: 24. Antal obs: 70.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1288	345	473	73	0	0	0	0	15	823	332	461

Gråsiskan (Acanthis flammea)

Et normalt forår og et stort efterår bringer årstotalen op over det normale.

Yngel: 12 y-par indrapp. (Lok, JTL, GG) fra 4 lokaliteter. Herudover en del sommerfund, hvoraf nogle også kan være ynglefugle.

Træk, flest ses: 1/11 150 v Kysing Fjord (LB), 16/11 807 SV Fornæs (EH m. flere) og 21/11 70 SV Fornæs (JSt + EBO).

Øvrige, største flokke forår og efterår nævnes: 1/1 210 St. Sjørup Strand (HII),

16/3 140 Sdr. Borup (LB) samt 17/11 ca 500 Fløjstrup Skov (Kell), 19/11 300 Brand Sø (LB) og 20/11 2500-3000 Fuglevad, Helgenæs (T. Michaelsen).

Total: 1. halvår 1044. 2. halvår 6342. Antal indsendere: 35. Antal obs: 108.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
595	55	205	167	9	9	15	2	40	232	5464	640

Hvidsken (*Acanthis f. hornemanni*)

En obs: 16/3 2 i flok m. 140 Gråsken v. Sdr. Borup, Randers (LB).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*)

Få obs af få fugle og ingen y-fund. Dog observationer fra Silkeborg Vesterskov og Helgenæs der tyder på yngel.

Øvrige, store flokke nævnes: 22/1 100 i alt Mols Bjerge (MSL), 4/2 20 Skæring Strand (JT), 13/4 30 røst Gjerrild Nordstrand (TB), 20/10 24 SV Helgenæs (JTL), 9/11 20 Løvenholm Skov (ML), 1/12-ca 1 uge frem ca 30 Bryrup (JB), 7/12 75 Salten Langsø (AJ).

Total: 393. Antal indsendere: 20. Antal obs: 38.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
109	27	38	48	10	0	0	4	0	44	29	174

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*)

Kun 4 obs, som alle nævnes:

22/2 31 Issehoved, Samsø (SD), 2/3 7 Stenvad (SKH), 17/10 1 han Frederiksdal Hejde (SFP) og 1/11 1 Hvinningdal, Silkeborg (GG).

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*)

Er nu set i amtet de sidste 6 år i træk.

Flg. obs: 21-26/6 2 hanner sy Anholt - 1 sy i byen og 1 sy på campingpladsen (EH).

Dompap (*Pyrrhula pyrrhula*)

Et meget tyndt materiale som ikke viser artens status.

Yngel: Min 17 par indsendt (Lok, PER), samt en del obs der tyder på yngel.

Øvrige: Ses uden for y-tiden i mindre flokke, aller over 5 nævnes: 11/1 6 Vorup Enge (JP), 16/2 13 Salten Langsø (TB), 14/12 6 Funder Stationsby (BD) og 26/12 9 Rosenholm (LPJ).

Total: 171. Antal indsendere: 15. Antal obs: 72.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
17	17	22	26	12	9	7	2	0	13	7	37



Kørnebider (*Coccothraustes coccothraustes*)

Et rekordstort antal indrapporteringer, flest fra foråret.

Yngel: I alt 29-34 y-par indsendt, emn der mangler stadig tal fra bla. Moesgård Skovene og Djursland. Desuden 2-3 par fra lokaliteter som ikke kan genfindes på almindelige landkort!

Øvrige: Uden for y-tiden strejfer de om i småflokke.

Forårets største blev 12/1 ca 15 Kysing Næs (BHJ, HeC), 9/2 15-20 Ørnøvej, Silkeborg (SFP) og 22/3 22 Søften (SMJ).

Efterår: Forholdsvis få fugle indsendt, flest ses 16/11 8 Floes Skov (JH), 6/12 6 Søften (SMJ) samt 24/12 8 Uggelhuse (JH).

Total: 437. Antal indsendere: 32. Antal obs: 167.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
72	64	85	59	60	12	11	10	7	17	23	33

Lapländsvärpling (*Calcarius lapponicus*)

De 28 ex er langt fra sidste års rekordantal, og tilmed er det en obs der hæver totalen op fra det rene ingenting.

Alle nævnes, forår: 5/1 20 rst Kysing Fjord (PL, JOS), 15/3 1 N Moesgård Strand (JTL).

Efterår: 28/9 2 rst-S Kysing Fjord (LR, OGJ), 12/10 1 S Sødring Kær (DOF), 22/10 1 SSV Sletterhage (JTL), 15/11 1 rst Kysing Fjord (OGJ), 16/11 1 Besser Rev (SD), 7/12 1 S Kysing Næs (OGJ).

Artens forekomst varierer kraftigt fra år til år:

	1982	1983	1984	1985	1986
1. halvår	2	2	13	34	21
2. halvår	8	1	1	26	7

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*)

De 331 ex er kun en brøkdelt af forrige års antal. Manglen på okloberobs er også usædvanlig.

1. halvår: Største flokke ses v. Studstrupværket 31/1 24 + 20/2 21 + 1/3 30 + 9/3 25 rst her (BHJ, LW, AJ), herudover kun to større flokke: 4/1 ca 50 Alrø (SH) og 8/2 min 20 Kalsemade (SH). Sidste ses 24/3 5 begtrup Vig (SEL) og 27/3 11 Fornæs (HLL, AJ).

Efterår: Første ses 2/11 6 Fornæs (JSP) og 9/11 1 h Brabrand Sø (AJ). Største flokke er fra 16/11 27 rst + 9 S Fornæs (EH, PL, JSP) + 12 Besser Rev, Samsø (SD), 6/12 10 Fornæs (ML), 7/12 12-13 Kysing Næs (OGJ, CEM) samt 26/12 11 Århus Havn (JTL).

Total: 331. Antal indsendere: 17. Antal obs: 31.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
94	48	82	0	0	0	0	0	0	0	58	50

Gulspurv (*Emberiza citrinella*)

En noget tilfældig indrapportering fra få indsendere og 86% af fuglene er fra samme indsender.

Yngel: Fra 17 lokaliteter oplysninger om 236-261 y-par (Lok), flest langs Gudenåen fra Svostrup til Silkeborg med hele 110-115 par.

Øvrige, 3 store flokke nævnes: 1/1 250 v. 25 km stenen på Randers-Hadsund landevejen (JP), 25/10 125 Fjellerup Nederskov (JP) samt 14/12 120 Skrødstrup (JP).

Total: 1267. Antal indsendere: 9. Antal obs: 35.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
488	30	38	79	25	10	0	35	0	125	100	324

Hortulan (*Emberiza hortulana*)
Ingen !

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Yngel: På 24 optalte lokaliteter fandtes 107-116 par (Lok).

Enkelte vinterfund på trods af isvinteren.

De første ses om foråret 15/3 i Vasen, Randers (JP) og 18/3 i N Moesgård (LW).
Flest ses 28/3 20 Bjerregrav Mose (JP).

Fra efterårstrækket 24/10 97 S Sletterhage (JTL). Rørspurve ses indtil nytår,
flest 6/12 6 Vasen/Gudenå (JP).

Total: 515. Antal indsendere: 11. Antal obs: 84.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	5	62	89	133	59	58	0	5	101	2	6

Bomlærke (*Miliaria calandra*)

Fåtalig i amtet. En eftersøgning i Hørning kommune resulterede i kun 8 ex (ET).

Kun 1-2 y-par indsendt (Lok).

Eneste obs af mere end et par fugle er: 1/1 50 v. landevejen ml Randers-Hadsund (JP).

Total: 69. Antal indsendere: 5. Antal obs: 15.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
50	4	2	1	0	5	6	0	0	0	0	2

APPENDIX I

Mange spændende observationer i år, men en håbløst ringe mængde er blevet rapporteret til DOF's Sjældenhedsudvalg (SU). Kun 5 ud af 22 fund har SU modtaget. Så man ikke der er en del fejlbestemmelser imellem? Hvis intet andet er nævnt nedenfor er fundet udokumenteret.

Islom (*Gavia immer*)

27/4 1 ad N Moesgård (JTL) er ikke færdigbehandlet af SU. Desuden et ex fra maj.

Hvidnæbbet lom (*Gavia adamsii*)

1 fra dec.

Hvidkindet Skarveand (*Oxyura jamaicensis*)

1 fra maj. Arten er nordamerikansk, men der findes en stor vildtlevende bestand i Midt-England.

✓ Stellersand (*Polysticta stelleri*)

1 fra marts.

✓ Jagtfalk (*Falco rusticolus*)

1 fra maj.

✓ Slagfalk (*Falco cherrug*)

1 fra juni.

Steppehøne (*Syrnhaptles paradoxus*)

1 fra dec.

✓ Thorshane (*Phalaropus fulcarius*)

1 fra juli. Arten er ikke på SU-listen, men sommerøbs er ekstremt sjældne.

Hvidvinget Måge (*Larus glaucooides*)

1 fra jan og 1 fra maj.

✓ Alpesejler (*Apus melba*)

1 fra maj.

Mellemflagspatte (*Dendrocopus medius*)

5/1-86 1 Gjessø Savværk (PMc), er under SU-behandling.

✓ Storpiber (*Anthus novaeselandiae*)

1 fra maj.

Buskrørsanger (*Acrocephalus dumetorum*)

30-31/5 1 Brabrand Sø (JTL) behandles af SU.

Tornsanger (*Sylvia communis*)

1 fra 10/4 er 3 uger tidligere end normalt og 15 dage tidligere end amtets rekord.

✓ Korttået Træløber (*Certhia brachydactyla*)

Rapporteret fra to lokaliteter. 4 gange 1 fugl (marts, april (2), maj) syd for Århus og et ynglepar nordpå.

Det er påfaldende, at der stadig indløber udokumenterede iagttagelser fra Moesgård Skov, skønt arten ifølge "de professionelle" - dvs. den gruppe der forsker i Træløbernes udbredelse - forsvandt herfra i 1984 !

Fund af Korttået Træløber skal som bekendt (?) beskrives for SU, hvis der er gjort uden for Sønderjyllands-, Vejle- og Fyns amt.

APPENDIX II

Undslupne fangenskabsfugle.


Madarinand (*Aix galericulata*)

9/5 et par Salten å ved Velling Skov (JB) - gammel kending her.

30/11 1 han Dyrehaven, Århus (NA) og 12/12 1 han Remstrup å (PB).

"Red-cheeked Cordon-Bleu" (*Estrilda bengala*)

20/7 1 Kongslund, Randers (JP)



APPENDIX III

Rettelser og tilføjelser til tidligere Lokalrapporter. Vi har i år ryddet op i bunken af post og fundet en del rettelser og forsinkede observationer, som vi her kun bringer de vigtigste af.

Vil du være sikker på at få dine obs med i rapporten, så overhold tidsfristen, dvs. vi skal have alle observationer senest 20. jan. Men husk at alle obs, uanset hvornår vi modtager dem, opbevares i kartoteket på Sølyst.

1981

Sort Glente (*Milvus migrans*)

Tilføj flg. obs fra NØ-Djursland: 12/4 1-2, 13/4 1 og 16/4 1, alle (Jan og Jacob Silberg, Silkeborg, Studielejren på Nord-Djursland, Påsken 1981).

Havørn (*Haliaetus albicilla*)

Tilføj: "30/3 1 ad Trige Skov (LLH)".

Dværghåge (*Larus minutus*)

Tilføj: "Efterår: 27/9 1 ad N Fornæs (RD)".

1983

(?) = ukendt observatør

Sorthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*)

Tilføjelse: "23/9 8 Brabrand Sø (JWJ)". Fr sent her.

Pibesvane (*Cygnus columbianus*)

Tilføjelse: "Efterår: 21/10 8 Kysing Fjord (JWJ)".

Knarand (*Anas strepera*)

Tilføjelse: "Efterår: 17/9 2 Brabrand Sø (JWJ)".

Sort Glente (*Milvus migrans*)

Tilføj: "16/5 1 ad rst Følle Vig/Hestehave, Kalø Vig (Allan Haagensen)".

Blå Kørhøg (*Circus cyaneus*)

Tilføj: "Et sommerfund, som vi desværre mangler observatør til: 28/8 1 han Kysing Fjord (?)".

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*)

Tilføj: to sene fugle: 12/9 1 Brabrand Sø (?) og 17/9 1 Ry (?)

Dværgryle (*Calidris minuta*)

Tilføj: "Efterår: 28/8 1 Kysing Fjord (?)".

Mudderkltire (*Tringa hypoleucos*)

Tilføj: "en sen fugl: 9/10 1 Kysing Fjord (JWJ)".

Natravn (*Caprimulgus europæus*)

Tilføj: "5/6 2 i parringsflugt, Brabrand Sø, Vestenden (JWJ)".

Skærpiber (*Anthus spinoletta littoralis*)

Tilføj: "Efterår: Ny l. dato: 24/9 2 Sondrup Strand (PC)".

Sule (Sula bassana)

Tilføj: "1/9 47 trk Ø Lushage, Helgenæs (SEL)". En stor obs der bringer års-totalen op på 70 ex.

Rød Glente (Milvus milvus)

Tilføj: "Sommer: 29-30/6 1 Brattingsborg, Samsø (PER)".

Natugle (Stix aluco)

Tilføj: "Y-fund: "flere par" Fussing Skovene (PER)" og "Brattingsborg, Samsø 1-2 par (PER)".

Pirol (Oriolus oriolus)

Tilføj: "8/6 1 sy Brattingsborg, Samsø (PER)".

1985

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Tilføjelse: "26/4 1 Kalundborg-færgen (PBu) samt Indland (usædvanligt): 23/3 1 Brørand Sø (PBu)".

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Tilføjelse: "Yderligere et par store koncentrationer: 6/1 9 Emborg Bro + 11 Rye Bro + 10 Ry Kanal, alle Gudenåen, og alle (JK), 20/10 44 Norsminde Fjord (AJ)".

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

Tilføjelse: "En stor kystobs: 24/4 40 Amstrup red v. Alrø (PC)". og "yngel: Brørand Sø 70 par (AJ)".

Sorthalsel Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Tilføjelse: "Yngel: Brørand Sø 6-9 par (AJ)", samt flg obs: "21/5 19 Brørand Sø (ny max) og 8/7 3 Brørand Sø, begge (AJ)".

Sule (Sula bassana)

Desværre er behandlingen af Sule faldet ud, alle obs bringes derfor her (se desuden Sørvæn nr. 4, 1986 side 18):

Kysing Næs: 9/9 1 N (HLL), 30/9 1 (LPJ), 12/10 26 N (LB), 21/10 2 N (BHJ).
Fornæs: 6/4 1 S (GI) og 8/9 1 N (RD).

Grågåse (Anser anser)

Tilføjelse: "Sensommer: 27/7 2 Alrø og 2/8 12 Alrø, begge (AJ)".

Mørkbuget Knortegåse (Branta bernicla bernicla)

Tilføjelse: "26/12 20 Studstrupværket (AJ)".

Gravand (Tadorna tadorna)

Tilføjelse: "Ynglefund: 3/6 29 ad + 8 pull Tåstrup Sø (AJ)".

Pibeand (Anas penelope)

Tilføjelse: "Sommerfund: 3/6 1 hun Tåstrup Sø, 28/6 9 Kysing Fjord, 3/7 11 Kysing Fjord, 21/7 2 Kysing Fjord, 18/8 1 Sødringholm, 18/8 6 Sødring Kær, alle (AJ)".

Krikand (Anas crecca)

Tilføjelse: "Store summertal: 28/6 43 + 3/7 34 + 13/7 22 + 21/7 12, alle Kysing Fjord, og alle (AJ)".

Spidsønd (Anas acuta)

Tilføjelse: "Efterår: 18/8 6 Sødring Kær (AJ)".

Hvinand (Bucephala clangula)

Tilføjelse: "Sommerfund: 28/6 1 Kysing Fjord (AJ)".

Lille Skallesluger (Mergus albellus)

Rettelse: Observationerne under "øvrige" 3/3 1 han + 3 hun (TB, ET) mangler lokalitet. Det var Mossø, Vest.

Tilføjelse: "Forår: 10/3 1 han + 3 hun Lindholm Hoved, Mossø (JK)" og "Efterår: 29/12 1 hun Silkeborg Langsø (PMc)".

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Tilføjelse: "Sommerfund: 27/5 1 hun Brabrand Sø, 2/8 1 han + 1 hun Alrø, begge (AJ)".

Sort Glente (Milvus migrans)

Tilføjelse: "6/7 1 imm Splidholm (AJ)".

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Rettelse: Observationerne 4/1 Højlund Skov, 21-22/1 Højlund Skov, 19/10 Salten Langsø, 20/10 Højlund Skov, alle (TV), udgår.

Tilføjelse: "Efterår: 20/10 1 brun v. Skanderborg (IV)".

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Tilføjelse: "Yngel: 3/8 1k Brabrand Sø (AJ)".

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Tilføjelse: "Efterår: 4/8 1 + 1 juv Salten Langsø, 25/8 1 Lindholm Hoved, Mossø, begge (JK)".

Strandskade (Haematopus ostralegus)

Rettelse: Observationerne "19/5 Klostermølle (TV)" og "9/7 Klostermølle (TV)" udgår (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Tilføjelse: "Store tal fra efteråret: 6/7 64, 13/7 167, 21/7 129, alle Lerdrup Vig og alle (AJ), 27/7 95 + 2/8 48 Alrø, begge (AJ)".

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Tilføjelse: "Efterår: 13/7 52 Lerdrup Vig, 21/7 5 Horskær, begge (AJ), samt store tal fra Kysing Fjord: 15/7 5, 21/7 2, 26/7 6 (AJ) er mange herfra".

Lille Præstekrave (Charadrius dubius)

Tilføjelse: "Brabrand Sø: 27/6 2, 2/7 13, 5/7 6, 12/7 2, 18/7 2, 28/7 3, alle (AJ). Er de største og seneste obs herfra".

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Tilføjelse: "Efterår, ny 1. dato: 6/7 1 Horskær (AJ), 13/7 1 Alrø + 1 Horskær (AJ)".

Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Tilføjelse: "Efterår, ny 1. dato: 13/7 2 Alrø (AJ) samt flg. obs: 27/7 10 Alrø + 1 Horskær, 2/8 3 Alrø + 3 5 Horskær, 18/8 12 Sødring Kær, alle (AJ)".

Temmincksryle (Calidris temminckii)

Tilføjelse: "Efterår: 12/7 2 Brabrand Sø (AJ)". Er ny 1. dato.

Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea)

Tilføjelse: "Kysing Fjord: 13/7 4 og 21/7 1 (AJ). Alrø: 21/7 19 og 2/8 3 (AJ) samt 13/7 1 Horskær (AJ)".

Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Tilføjelse: "Efterår: Ny 1. dato: 2/7 1 + 3/7 2 Kysing Fjord (AJ)".

Brushane (Philomachus pugnax)

Tilføjelse: "Sommerfund: 28/6 1 + 3/7 3 Kysing Fjord (AJ), 21/7 4 Lerdrup Vig (AJ)".

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*)

Rettelse: Observationen "31/12 1 Klosterkær (TV)" udgår (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Tilføjelse: "Vinter: 15/12 1 Kysing Fjord (AJ)".

Lille Kobbersnepe (*Limosa lapponica*)

Tilføjelse: "Efterår, en række tidlige fund: 6/7 1 Alrø + 4 Splidholm, 13/7 26 Alrø + 2 Horskær + 16 Splidholm + 1 Kysing Fjord, 21/7 4 S Splidholm, alle (AJ)".

Hvidklire (*Tringa nebularia*)

Tilføjelse: "Efterår: tidlige fugle: 28/6 3 + 3/7 13 Kysing Fjord (AJ).

Indlandsøbs (Usædvanligt): 4/8 1 Gudensø (JK) samt et stort tal: 27/7 36 Lerdrup Vig (AJ)".

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*)

Tilføjelse: "Efterår: store tal: 8/7 35 Brabrand Sø (AJ) og 21/7 18 Kysing Fjord (AJ)".

Dværqmåge (*Larus minutus*)

Rettelse: observationen "19/5 1 IK Alrø (KB)" rettes til: "19/5 1 2K ...".

Hættemåge (*Larus ridibundus*)

Rettelse: "Ynglefund: Brude Sø 5-10 par (TV)" overflyttes til 1984.

Tilføjelse: "alligevel en optælling af Brabrand Sø kolonien: 19/5 3903 reder (AJ)".

Rovterne (*Sterna caspia*)

Tilføjelse: 9/6 1 Råby Odde, Randers Fjord (ML). En sen fugl og den eneste i 1985.

Splitterne (*Sterna sandvicensis*)

Rettelse: Indlandsiaqtagelsen 18/10 1 Mossø (TV) overflyttes til 1984.

Tilføjelse: "Indland: 18/7 1 + 2 SV Brabrand Sø (AJ)".

Havterne (*Sterna paradisaca*)

Tilføjelse: "Indland: 27/5 3 Brabrand Sø (AJ), 4/8 5-10 Emborg vig (JK)".

Store tal: "28/6 6 Kysing Fjord, 6/7 175 Lerdrup Vig, 13/7 24 Lerdrup Vig + 60 Horskær, alle (AJ)". Disse store tal hæver årssummen op på 338 ex.

Natugle (*Strix aluco*)

Rettelse: Ynglepar Højlund Skov 0-1 par (TV) udgår (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Skovhornugle (*Asio otus*)

Rettelse: De to lokaliteter nævnt under "sikre ynglefund" er i virkeligheden det samme område. Under rubrikken "sikre ynglefund" skal derfor stå: Vaserne/Kungslund 1 par m. 3-5 unger (JP)".

Mursejler (*Apus apus*)

Rettelse: "4/11 100 Vorup, Randers (LTP)" rettes til: "4/8 100 . . .".

Isfugl (*Alcedo atthis*)

Rettelse: Observationerne "ynglefund Klosterkanalen (TV)" samt observationerne "18/10 Dødeåen (TV)" og "19/10 Salten å (TV)" overflyttes til 1984.

Vendehals (*Jynx torquilla*)

Tilføjelse: "19/5 1 sy Funder ådal (PB)".

Grønspætte (*Picus viridis*)

Rettelse: Lokaliteterne Højlund Skov + Pindal Mose (TV) nævnt under "mulige ynglelokaliteter" udgår. (Var i 1984 og lokaliteterne er i Vejle amt).

Sortspøtte (*Dryocopus martius*)

Rettelse: Ynglefund Addithus Skov udgår (lokaliteten i Vejle amt).

Tilføjelse: "Sikre ynglepar: Velling Skov 2 par (BRS)" + "Mulige ynglepar: Gjes-sø Skov 1 par, Høvild Skov 1 par (BRS)".

Hødelærke (*Lullula arborea*)

Tilføjelse: "6/10 1 Emborg (JK)".

Landsvale (*Hirundo rustica*)

Rettelse: 19/10 15 trk Salten Langsø (TV)" overflyttes til 1984.

Engpiber (*Anthus pratensis*)

Rettelse: Observationen "31/12 1 Klosterkær (IV)" udgår (var i 1984 og lokalite-ten er i Vejle amt).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*)

Rettelse: Ynglefund 1 par Klostermølle (TV) udgår (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*)

Rettelse: Observationen 29/12 13 rst Ry Station (TV) overflyttes til 1984.

Vandstær (*Cinclus cinclus*)

Rettelse: Observationerne "18/10 + 20/10 Klostermølle (TV)" udgår (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)

Rettelse: Observationen "3/7 1 juv Klostermølle (TV)" udgår. Observationen er fra 1984 og lokaliteten er i Vejle amt. Rødstjert ynglede ikke på Klostermølle det år ifølge (TV).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*)

Rettelse: Observationen "3/7-10/7 1 par + 3 juv Klosterkær (TV)" udgår. (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*)

Rettelse: Observationen "20/10 Klostermølle (TV)" udgår. (var i 1984 og lokalite-ten er i Vejle amt).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Rettelse: Observationen "30/12 2 rst Kragsø (TV)" overflyttes til 1984.

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Rettelse: "Ankomst 28/1 1 Houlbjerg Skov (JP)" rettes til "ankomst 28/3".

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Rettelse: Linjen med max-tal er desværre faldet ud og bringes derfor her: "Gjer-rild: Dagligt 6/5-20/5 1000-3000 rst, flest 12/5 4500 rst (GF)".

Grå fluesnapper (*Muscicapa striata*)

Rettelse: "Ynglefund Odinsgade, Århus (FF)" rettes til "....Odensegade, Århus (FF)".

Halemejse (*Aegithalos caedulus*)

Afsnittet om Halemejse er desværre faldet ud:

I alt 125 racebestemte, heraf 39 nord., 39 mellem. og 47 sydl. samt 368 ubestem-te, fra 19 indsendere.

Yngel: 5-6 par fra 5 lokaliteter er ringe.

Største obs blev 27/11 20 nordl. + 12 sydl. Vasen, Randers (KNM), og 23/11 40 u-best. Fussingø (JSP).

Allike (*Corvus monedula*)

Rettelse: Observationen "1/10 ca 2000 Hald Sø (TV)" overflyttet til 1984. (Hvor ligger Hald Sø ???).

Grønsisken (*Carduelis spinus*)

Rettelse: Sommerfund "8/7 i Klostermølle (TV)" udgår. (var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Gråsisken (*Carduelis flammea*)

Rettelse: Observationen "10/7 i sy Klosterkær (TV)" udgår. (Var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*)

Rettelse: Observationerne "19/10 Blidsø (TV)" og "20/10 Klostermølle (TV)" udgår. (Var i 1984 og lokaliteterne er i Vejle amt).

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*)

Rettelse: Observationen "19/10 Blidsø (TV)" udgår. (Var i 1984 og lokaliteten er i Vejle amt).

Karindompap (*Carpodacus erythrinus*)

Rettelse: "24/5 1, 25/5 2, alle trk S Anholt (OGJ)" rettes til: "...alle sy...".

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*)

Rettelse: Observationen "22/6 1 par Klostermølle (TV)" udgår. Obs. var i 1984 og lok er i Vejle amt. Fuglene yngede desuden ikke her i 1984 ifølge (TV).

Laplandsværting (*Calcarius lapponicus*)

Rettelse: Observationen "30/1 1-2 Alrø (OGJ)" rettes til "30/11 1-2 Alrø (OGJ)".

Artsindex, numre henviser til sidetal

Aftenfalk	28	Brangås	14
Agerhøne	31	Br. Fluesnapper	62
Alk	42	Brushane	36, 77
Alkefugl sp.	42	Buskrørsanger	58, 74
Allike	67, 80	Bynkefugl	55, 79
Alm Gul Vipstjert	50	Bysvale	49
Alm Hvid Vipstjert	52	Digesvale	48
Alm Kjøve	40	Dobbeltbekkasin	36, 78
Alm Ryle	36, 77	Dompap	71
Alposejler	46, 74	Drosselrørsanger	59
Atlingand	17	Duehøg	26
Blæder	46	Dværgfalk	28
Bjergand	19	Dværgmåge	40, 75, 78
Bjergirisk	70	Dværgryle	35, 75
Bjerglærke	48	Dværgterne	41
Bjergvipstjert	51, 79	Ederfugl	20
Blisgås	13	Engpiber	50, 79
Blishøne	32	Engsnarre	32
Blå Kærhøg	26, 75, 77	Enkeltbekkasin	36
Blåhals	54	Falk sp.	28
Blåmejse	64	Fasan	31
Bogfinke	69	Fiskchejre	10
Bomlærke	73	Fiskeørn	28, 75, 77

Fjeldvåge	27	Kongeørn	28
Fjordterne	41	Kortnæbbet Gås	13
Fløjlsand	20	Korttået Træløber	64, 74
Fuglekonge	61	Krikand	16, 76
Gransanger	61, 79	Krumnæbbet Ryle	35, 77
Gravand	15, 76	Kvækerfinke	69
Græshoppesanger	58	Kærnbider	72, 80
Grønbenet Rørhøne	32	Kærsanger	58
Grønirisk	69	Landsvale	49, 79
Grønsisken	69, 80	Laplandsværling	72, 80
Grønspætte	47, 78	Lille Flagspætte	47
Grå fluesnapper	62, 79	Lille Fluesnapper	62
Gråand	16	Lille Kobberrøppe	37, 78
Grågås	13, 76	Lille Korsnøb	71, 80
Gråkrage	68	Lille Lappedykker	8, 76
Gråmåge	41	Lille Præstekrave	34, 77
Gråsisken	70, 80	Lille Regnspøve	37
Gråspurv	68	Lille Skallesluger	21, 77
Gråstrubet lappedykker	8	Lomvie	42
Gul vipstjert	50	Lunde	43
Gulbug	59	Lysbuget Knortegås	14
Gulspurv	72	Lærkefalk	29
Gærdesanger	59	Løvsanger	61, 79
Gærdesmutte	53	Mallebuk	9
Gøg	44	Mandarinand	74
Halemejse	63, 79	Markpiber	49
Havesanger	60	Mellemflagspætte	47, 74
Havlit	20	Mellemkjøve	40
Havterne	41, 78	Misteldrossel	57, 79
Havørn	24, 75	Mosehornugle	45
Hedehøg	26	Mudderklire	39, 75, 78
Hedelærke	48, 79	Munk	60
Hjejle	34, 77	Mursegler	46, 78
Hortulan	73	Musvit	64
Huldue	43	Musvåge	27
Husrødstjert	54	Mørkbuget Knorlegås	14, 76
Husskade	66	Natravn	45, 75
Hvæpsevåge	23	Nattergal	54
Hvid stork	11	Natugle	45, 76, 78
Hvid Vipstjert	52	Nordi. Gul vipstjert	51
Hvidkindet Skarveand	22, 73	Nordisk Lappedykker	9
Hvidklire	38, 78	Nøddekrige	66
Hvidnæbbet Lom	7, 73	Odinshane	39
Hvidsisken	71	Pibeand	15, 76
Hvidvinget Måge	40, 74	Pibesvane	12, 75
Hvinand	20, 76	Pirol	65, 76
Hættemåge	40, 78	Plettet Rørvagtel	32
Isfugl	46, 78	Pungmejse	65
Islandsk Ryle	35, 77	Ravn	68
Islandsk Rødben	38	Ride	41
Islom	7, 73	Ringdrossel	56
Jagtfalk	30, 73	Ringdue	43
Jernspurv	53	Rovterne	78
Kanadagås	14	Rød Glente	24, 76
Karmincompap	71, 80	Rødben	38
Kirkeugle	44	Rødhals	54
Klyde	33, 77	Rødrygget Tornskade	65
Knarand	16, 75	Rødstjert	54, 79
Knopsvane	12	Rødstrubet Lom	7
Knortegås	14	Rødstrubet Piber	50

Rødtoppet Fuglekonge	61	Stormmåge	40
Rørdrum	10	Storpiber	49, 74
Rørhøg	25, 77	Strandhøjle	34
Rørsanger	59	Strandskade	33, 77
Rørspurv	73	Stær	68
Råge	67	Sule	9, 76
Sandløber	35	Sumpmejse	63
Sangdrossel	56, 79	Svaleklire	38
Sanglærke	48	Svartbag	41
Sangsvane	12	Sædgås	13
Savisanger	58	Sækonge	43
Sildemåge	40	Sølvmåge	40
Silkehale	52, 79	Taffeland	18
Sivsanger	58	Tejst	42
Sjagger	56	Temmincksryle	35, 77
Skarv	10	Thorshane	39, 74
Skøand	17	Tinksmed	39
Skovhornugle	45, 78	Topmejse	63
Skovpiber	49	Toplærke	48
Skovsanger	60	Toppet Lappedykker	8, 76
Skovskade	66	Toppet Skallesluger	22
Skovsneppe	36	Topskarv	10, 73
Skovspurv	69	Tornirisk	70
Skægmejse	62	Tornsanger	59, 74
Skærpiber	50, 75	Trane	33
Slagfalk	30, 73	Tredækker	36
Slørugle	44	Troldand	18
Snøspurv	72	Træløber	64
Sodfarvet Skråpe	9	Turteldue	44
Solsort	56	Tyrkerdue	44
Sort Glente	24, 75, 77	Tårnfalk	28
Sort Stork	11	Vagtøl	31
Sortand	20	Vandrefalk	30
Sortgrå Ryle	35	Vandrikse	31
Sorth. Lappedykker	9, 75, 76	Vandstær	52, 79
Sortklire	38	Vendehals	47, 78
Sortkrage	68	Vibe	34
Sortmejse	64	Vindrossel	56
Sortrygget Hvid Vipstjert	52	Ørn sp.	28
Sortspætte	47, 79	Østlig Musvåge	27
Sortstrubet Lom	7, 76		
Sortterne	41		
Spidsand	16, 76		
Spilletterne	41, 78		
Spurvehøg	26		
Spætmejse	64		
Stellersand	20, 73		
Stenpikker	55		
Stenvendor	39		
Steppehøne	43, 74		
Stillits	69		
Stor Flagspætte	47		
Stor Kobbersneppe	37		
Stor Korsnøb	71, 80		
Stor Præstekrave	34		
Stor Regnspeve	37		
Stor Skallesluger	22, 77		
Stor Skrigørn	27, 73		
Stor Tornskade	65		
Storkjuve	40		

BIDRAGYDERE

Følgende bidragydere har ydet materiale. For bosatte i Århus nævnes intet bynavn.

PB	Preben Bach, Silkeborg	JM	Jan Michaelsen
JB	Jørgen Ballegård, Silkeborg	Moes	Moesgård-rapporten
KB	Kim Biledgaard, Horsens	JCN	Jalmer Clod Nielsen, Silkeborg
EB	Erik Borg, Odder	PN	Peter Nielsen, Hinnerup
LB	Lars Borup	PNN	Peder Nygaard Nielsen, Års
LeB	Leif Brauer, Skodsborg	EBO	Else Brask Ovesen
NPB	Niels Peter Brøgger, Ikast	JP	Jørgen Pagter, Randers
EBu	Erik Buchwald	HeP	Henning Pedersen, Viborg
PBU	Peter Bundgaard	JSP	Jens Skovgaard Pedersen, Thorsager
TB	Torben Bøgeskov	SFP	Stig Frøjk Pedersen, Silkeborg
HCh	Hans Christensen, Tønder	HP	Hans Pinstrup, Horsens
JC	Jens Christensen	LTP	Lars Tom-Petersen, Randers
TKC	Thomas Kjær Christensen	MCR	Marcel C. Rahner, Malling
HeC	Henning Christiansen	JRR	John R. Rasmussen, Randers
HC	Hans Christophersen, Ålborg	PER	Per Egge Rasmussen, Randers
BD	Bo Damgaard, Ikast	NR	Nis Rathenborg
DOF	Dansk Ornitologisk Forenings turreferater	JS	Jacob Salvig
SD	Svend Dybkjær, København	JSt	Jesper Sterum
He	Henning Ettrup	JOS	Jens Otto Svendsen
FFa	Flemming Falk, Floes	BRS	Bo Ryge Sørensen, Silkeborg
FF	Finn Frandsen		Lars Therkelsen, Samsø
GF	Gjerrild Fuglestation	ET	Eigil Thomasen, Hørning
FF	Georg Guldvang, Silkeborg	JFT	Jens Fromsejer Thomsen
NH	Niels Hannow, Flemming	JT	Jesper Tofft
BeH	Bent Hansen	TV	Thomas Vikstrøm, Birkerød
JH	John Hansen	LW	Lars Witting
LLH	Lars Lund Hansen	ØBF	Østjysk Biologisk Forenings turreferater
OTH	Otto Trap Hansen, Hørning	NA	Niels Aagaard
SKH	Steen Kjærlund Hansen, Ebeltoft	Nø	Nøddekrigeundersøgelsen v/HP
KeH	Keld Henriksen		
HFj	Horsens Fjord-gruppen v/L.P. Johansson		
SH	Søren Højager		
EH	Erik Hørning		
AJ	Allan Janniche		
BHJ	Bjarke Huus Jensen		
SMJ	Svend Møller Jensen, Hinnerup		
JWJ	Jens Wolf Jespersen		
LPJ	Lars P. Johansson, Ommestrup		
OGJ	Ole Gylling-Jørgensen, Malling		
JK	Jens Kirkeby, Ry		
FK	Flemming Kofoed, Rønne		
JNK	Jesper Nelby Kristiansen, Grenå		
ChL	Christian Lange		
PL	Peter Lange		
HLL	Henning Lykke Larsen		
SEL	S. E. Lauritzen, Birkerød		
JTL	Jørgen Terp Laursen		
Lok	Lokalitetsregistreringen for Århus amt		
FL	Flemming Lundberg		
ML	Mogens Lykkegård, Randers		
CEM	Carl Erik Mabeck		
PMc	Patrick McDonald, Silkeborg		

